



دفترچه سوال آزمون

۹۷ اسفند ماه ۳

سال دهم ریاضی

تعداد کل سوالهای آزمون: ۱۲۰
مدت پاسخ‌گویی: ۱۶۵ دقیقه

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	زمان پاسخ‌گویی	شماره صفحه
فارسی و نگارش (۱)	۱۰	۱-۱۰	۱۰ دقیقه	۳
عربی زبان قرآن (۱) شاهد (گواه)	۲۰	۱۱-۳۰	۲۰ دقیقه	۴-۵
دین و زندگی (۱)	۱۰	۳۱-۴۰	۱۵ دقیقه	۶
زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۴۱-۵۰	۱۵ دقیقه	۷
ریاضی عادی شاهد (گواه)	۲۰	۵۱-۷۰	۳۵ دقیقه	۸-۱۴
		۷۱-۹۰		
هندسه	۱۰	۹۱-۱۰۰	۱۵ دقیقه	۱۵-۱۶
فیزیک عادی	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۳۰ دقیقه	۱۷-۲۴
		۱۲۱-۱۴۰		
شیمی عادی	۲۰	۱۴۱-۱۶۰	۲۵ دقیقه	۲۵-۳۰
		۱۶۱-۱۸۰		
نظرخواهی حوزه	—	۲۹۰-۲۹۸	—	۳۱
جمع کل	۱۲۰		۱۶۵ دقیقه	۳۲

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳

تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳



۱۰ دقیقه

فارسی (۱)

ادبیات انقلاب اسلامی

(دریادلان صفحه‌شکن، خاک آزادگان)

صفحه‌های ۷۴ تا ۹۳

نگارش (۱)

نوشته‌ی ذهنی (۱)، جانشین‌سازی

صفحه‌های ۷۲ تا ۸۳

فارسی و نگارش (۱)

۱- بیت زیر را کدام واژه کامل می‌کند؟

«به دیوار دلم گر نقش کین بود / من آن را در گچ ... گرفتم»

(۱) اسوه

(۲) نسیان

(۲) جنود

(۴) گلشن

۲- واژه‌های «توسن»، «مهیب»، «فرق» و «تقریظ» به ترتیب چه معنایی دارند؟

(۱) اسب سرکش، هول آور، دوری، ستودن

(۲) اسب رام، ترسیده، آسودگی، نکوهش

(۳) اسب سرکش، ترسناک، رهایی، نکوهش

(۴) اسب رام، وحشت‌کرده، جدایی، ستودن

۳- در کدام عبارت نادرستی املایی وجود دارد؟

(۱) ملک گفت: سزاواری که در تعذیب تو مبالغت رو.

(۳) جاهای که از سر غضب و وقاره و حسد برخیزد.

۴- کدام نوع فعل در عبارت زیر نیست؟

«وسایل سنگین راهسازی را بر شاورها کرده‌اند تا به محض شکستن خطوط مقدم دشمن، آن‌ها را به آن سوی رودخانه ارونده حمل کنند. بچه‌ها نیز

همان بچه‌های بی‌تکلف و متواضع و ساده‌ای هستند که همیشه در مسجد می‌بینی و تو تا به حال درنمی‌یافته‌ای.»

(۴) ماضی بعید

(۳) ماضی نقلی

(۲) مضارع التزامي

۵- در بیت گزینه‌ی ... مصراعی هست که اجزای جمله‌ای آن، کاملاً با ترتیب نقش دستوری جمله‌ای معیار آمده است.

(۱) چه شوی تنگدل ار بر تو همی بازم عشق / عشق بازیدن با خوبان رسمیست قدیم

(۲) عشق رسمیست ولیکن همه اندوه دل است / خنک آن کو را از عشق نه ترس است و نه بیم

(۳) با توانایی و با جود کم آمیزد حلم / خواجه بوسهل توانا و جواد است و حلیم

(۴) عید او باد سعید و روز او باد چو عید / دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم

۶- نقش دستوری چند تا از واژه‌های مشخص شده در ایات زیر «نهاد» است؟

(الف) اقرار دهد شاه جهان را به همه فضل / آن کس که دهد خلق به فصلش همه اقرار

(ب) کفار پراکنده و برکنده شدستند / از بس که شکسته‌ست ملک لشکر کفار

(ج) پیکار همی‌جوید پیوسته ولیکن / کس نیست که با لشکر او جوید پیکار

(د) دشوار جهان نزد ملک باشد آسان / آسان ملک نزد همه گیتی دشوار

(ه) دینار چنان بخشید ما را که بر ما / پیوسته بود خوارترین چیزی دینار

(۱) یکی

(۲) دو تا

(۳) سه تا

(۴) چهار تا

۷- در کدام بیت جمله‌ی غیرساده دیده نمی‌شود؟

(۱) من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندرو / از نهیب دیو دل خوناب گشته هر زمان

(۲) زان درازی راه با دل گفتمی هر ساعتی / کاین بیابان را مگر پیدا نخواهد بد کران

(۳) اندر این اندیشه بودم کز کنار شهر بست / بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان

(۴) شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زی / کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران

۸- در بیت زیر، دو واژه‌ی ... و ... هر دو رکن دوم تشییه هستند.

«شوخ‌چشمی چو مگس کردم و برداشت عدو / به مگس‌ران ملامت ز کنار شکرم»

(۱) مگس، شکر

(۲) مگس، مگس‌ران

(۳) من، شکر

۹- کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوش» قربات معنایی بازتری دارد؟

(۴) مگس‌ران، شکر

(۲) فلکبرپای دار و انجام‌افروز / خرد را بی‌میانجی حکمت‌آموز

(۱) تعالی الله یکی بی‌مثل و مانند / که خوانندش خداوندان خداوند

(۳) نگه‌دارنده‌ی بالا و پستی / گوا بر هستی او جمله هستی

۱۰- ارتباط تصویری و معنایی کدام بیت با بیت زیر آشکارتر است؟

«مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افزورده از مدنف من»

(۱) شود افسرده خون در پیکرش از سردي عالم / اگر نه شعله فطرت سخنور را به جوش آرد

(۲) از دل افسرده جز افسرده‌دل آگاه نیست / آن که داند و حشتش شب‌های تار من تویی

(۳) بگشای تربیتم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم دود از کفن برآید

(۴) آتش آن نیست که از شعله‌ی او خنده جمع / آتش آن است که در خرم‌پروانه زندن



٢٠ دقیقه

«هذا خلقُ الله»
متن درس + الجملة الفعلية و
الإسمية + مع ساقِ سیارة الاجرة
صفحههای ٤٧ تا ٥٣

عربی، زبان قرآن (۱)

١١- «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ يَدْعَا الْخَلْقُ»، عَيْنَ التَّرْجِمَةِ الصَّحِيحَةِ:

(۱) بگو در زمین بگردند و ببینند چگونه (خدواند) آفرینش را آغاز کرده است!

(۲) بگو در زمین بگردید پس بنگرید چگونه (خدواند) آفرینش را آغاز کردا!

(۳) بگو در زمین سیر کنید تا چگونگی آفرینش خداوند را ببینیدا!

(۴) بگو در زمین گردش کنید و بنگرید آفرینش چگونه آغاز شده است!

١٢- ما هو الصحيح:

(۱) القِطْ صُورًا جَمِيلَةً مِنْ هَذِهِ الْمَناطِرِ الطَّبِيعِيهِ! از این منظرههای طبیعی، عکس‌هایی زیبا گرفت!

(۲) هل يمكن أن أستفيد من مقالات هذه المكتبة؟! آيا ممكن است که از این مقاله‌ها در کتابخانه استفاده کنم؟!

(۳) قال السائق: ينْفُصُ زَيْتُ سِيَارَتِي الْأُجْرَةِ خَلَالَ نَصْفِ الْيَوْمِ! رَانَدَهُ گفت: روغن تاکسی‌ام در طول نصف روز تمام می‌شودا!

(۴) علينا أن نستعمل هذه الأحتساب الطيبة طبق وصفة الطيبة! ما باید این گیاهان دارویی را طبق نسخه پرشک به کار ببریما!

١٣- عَيْنَ الصَّحِيحَ فِي التَّرْجِمَةِ:

(۱) ما قَسْمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْلِ! خداوند برای بندگان چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است!

(۲) تَعِيشُ حَيَوانَاتٍ مَائِيَّةً فِي أَعْمَاقِ الْمَحِيطِ! حیواناتی آبی در اعماق دریا زندگی می‌کنند!

(۳) مَنْ طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَ وَ جَدَ! کسی که چیزی را خواست، تلاش کرد و پیدا کرد!

(۴) كَانَ الْطَّلَابُ يَسْاعِدُ بَعْضَهُمْ بَعْضَاً! دانش‌آموزان به یکدیگر کمک کرده بودند!

١٤- عَيْنَ الْخَطَأَ فِي تَرْجِمَةِ الْعِبارَاتِ:

(۱) كیف لا تتحرّک عین البومة و هي قادرة على الرؤیة؟! چگونه چشم جعد حرکت نمی‌کند در حالی که او توانا بر دیدن است؟!

(۲) تحذیر الحيوانات لإبعادهم عن الخطر من وظائف الزراقة!: هشدار به حیوانات برای دور شدن از خطر از وظایف زرافه است!

(۳) زیارتک لسلمان الفارسی مقبوله إن شاء الله و مأجوره: زیارت تو از سلمان فارسی اگر خدا بخواهد پذیرفته شده و پاداش داده شده است!

(۴) مَنْ كَبَرَ حَمَقَهُ أَغْرِقَ فِي مَدِحِ شَخْصٍ أَوْ ذَمَّهُ: هر کس حماقتش زیاد شود در ستایش از شخصی یا مذمت او زیاده روی می‌کندا!

١٥- عَيْنَ الْأَصْحَاحَ لِلْفَرَاغَاتِ: «تَسْتَطِيْعُ . . . أَنْ تُدِيرَ . . . فِي اِتْجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ دُونَ أَنْ . . . رَأَسَهَا!»

(۱) الْحِرَباءُ - يَدِئُهَا - يُحَرِّكُ

(۲) الْفَطَّةُ - عَيْنَهَا - تُحَرِّكُ

(۳) الْبَوْمَةُ - ذَنَبُهَا - تُحَرِّكُ

١٦- عَيْنَ غَيْرِ الْمَنَاسِبِ لِلْمَفْهُومِ: «لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ إِلَّا فَاعْلَمُ!»

(۱) مَنْ حَفَرَ بِتَرَا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهَا!

(۳) مَنْ زَرَعَ الدُّوَانَ، حَصَدَ الْخُسْرَانَ!

١٧- عَيْنَ الْقَرِيبِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ: «كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتُهُ الْمَوْتُ»

(۱) روز مرگ نفسي وعده دیدار به / وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

(۲) آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست / هرگز گمان میر که مر او را فنا بود

(۳) اگر مرگ دادست بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

(۴) هر که آمد عمارتی نو ساخت / رفت و منزل به دیگری پرداخت

١٨- عَيْنَ عِبَارَةِ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْخَبْرِ:

(۱) ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل!

(۲) أَتَعْرِفُ مَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِيَّ؟!

(۳) ثمرة العلم اخلاص العمل!

(۴) هَذِهِ النَّبَاتَاتُ تَفَيدُنَا لِمَعَالِجَةِ الْأَمْرَاضِ!

١٩- عَيْنَ الْمَفْعُولِ مَضَافًا وَ مَوْصُوفًا مَعًا:

(۱) يَرْعَ الْفَلَاحَ الْمَجَدَ أَشْجَارَ التَّفَاحِ!

(۳) تَقْرَأُ بَنْتِي الْمَجَهِدَةِ الْكِتَبَ الْمُفَيَّدَةَ مَرَاتٍ!

(۲) فِي أَيِّ عِبَارَةِ مَا جَاءَ الْمُبَدِّدَ:

(۱) أَلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

(۳) «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا»



پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

آزمون گواه (شاهد)

٢١- «يَمْلِكُ أَغْلَبُ الْحَيَّانَاتِ لُغَةً عَامَّةً أَيْضًا سَتَطِيعُ مِنْ خَلَالِهَا أَنْ تَسْفَاهُمْ مَعَ بَعْضِهَا!». عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي التَّرْجِمَةِ:

- (١) اکثر حیوانات زبانی مشترک دارند که به واسطه‌ی آن قادرند باهم تفاهم داشته باشند!
- (٢) حیوانات اغلب زبان مشترکی نیز دارند که از آن طریق باهم توان برقراری ارتباط دارند!
- (٣) بیش تر حیوانات یک زبان عمومی نیز دارند که از طریق آن می‌توانند هم‌دیگر را درک کنند!
- (٤) بیش تر جانداران زبانی دارند که عموماً به وسیله‌ی آن می‌توانند پیام یکدیگر را دریافت کنند!

٢٢- عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي التَّرْجِمَةِ:

(١) مِئَاتُ الْمَصَابِحِ الْمُتَدَدِّدَةِ الْمُلُوَّنَةِ: صدھا چراغ گوناگون رنگارنگ.

(٢) تُحَوَّلُ ظَلَامُ أَعْمَاقِ الْمُحِيطِ إِلَى نَهَارٍ مُضِيءٍ: اعماق تاریک دریا را به روزی روشن تبدیل می‌کند.

(٣) هَذِهِ الْأَضْوَاءُ تَتَبَعِّثُ مِنْ نَوْعٍ مِنَ الْبَكْيَرِيَا الَّتِي: این نورها از نوعی باکتری فرستاده می‌شود که،

(٤) تَعِيشُ تَحْتَ عُبُونِ بَعْضِ الْأَسْمَاكِ: زیر چشمان بعضی از ماهی‌ها زندگی می‌کنند!

٢٣- عَيْنِ الْخَطَأِ فِي تَرْجِمَةِ مَا تَحْتَهُ خَطَّ:

(١) عَيْنِ الْبُوْمَةِ ثَابِتَةٌ وَلَا تَسْتَرِحُكُ: جذب

(٣) فَتَسْتَطِعُ أَنْ تُدْبِرَ رَأْسَهَا مُتَنَبِّينَ وَسَبْعِينَ دَرْجَةً: که بچرخاند

(٤) قَدْ أَنْشَدَ خَاقَانِيُّ الشَّاعِرُ الْإِيرَانِيُّ قُصْدِيَّةً عِنْدَ مُشَاهِدَتِهِ إِيَّوَانَ كِسْرَى!. عَيْنِ سُؤَالِيَّسَ جَوابُهُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ:

- (٤) أَيْنَ عَاشَ خَاقَانِيُّ؟
- (٣) مَنْ شَاهَدَ إِيَّوَانَ كِسْرَى؟
- (٢) مَتَى أَنْشَدَ قُصْدِيَّةً؟
- (١) مَاذَا أَنْشَدَ خَاقَانِيًّا؟

٢٤- عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي تعیین نوع الجملة:

(١) الْحَاكِلُ قَوْلَ الَّذِي يَكْذِبُ كَثِيرًا: يُصَدِّقُ

(٣) الْحَاضِرُونَ الْلَّاعِبِينَ فِي مُسَابِقَيْنِ: شَجَعُوا

٢٥- عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي تعیین نوع الجملة:

(٢) الْلَّوْنُ الْبَنْفَسَجِيُّ لُغْرَفَةِ النَّوْمِ ... الْأَعْصَابِ: مُهَدِّي

(٤) لَا تَكْتُبْ ... عَلَى الْآثارِ الْتَّارِيْخِيَّةِ وَالْأَشْجَارِ: ذُكْرَى

(٣) أَفْضَلُ الْجُودِ بِذِلِّ الْمَوْجُودِ: جملة فعلية

٢٦- عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي تعیین صفة للفاعل:

(٢) فِي الْمَدْرَسَةِ طَالَعَتْ: جملة اسمية

(٤) يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ: جملة فعلية

(١) أَحَبُّ عَبَادِ اللَّهِ إِلَى أَنْفَهُمْ لِعَبَادَهُ: جملة فعلية

٢٧- عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي تعیین صفة للنَّفَاعَلِ:

(١) عَلَيْنَا أَنْ نُمارِسَ الرِّبَابِيَّةِ الصَّبَاحَةِ!

(٣) شَاهَدَتْ أَسْتَاذُ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمَكَتبَةِ!

■ إِقْرَأُ النَّصَّ التَّالِي ثُمَّ أَجِبُ عن الأسئلة بدقة:

الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة و على الضيف أن يتحوّل بعد ثلاثة أيام ... ذهب رجل إلى صديقه بقي عنده أياماً متولية حتى شعر بالتعب من إقامته الطويلة ففكّر في حيلة ليتخلص منه. فاقتصر على ضيوفه الاشتراك في مسابقة قفز لتعيين الشخص الفائز. ثم قال لولده: عندما يقفز الضيف إلى خارج البيت، أغلق الأباب، عند المسابقة قفز الضيف متراً أقل من صاحب البيت و قال: متراً واحداً إلى داخل البيت خيراً من مترين إلى الخارج!

٢٨- عَيْنِ التَّرِيبِ مِنْ مَعْنَى عِبَارَةِ «مَتْرٌ وَاحِدٌ إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ مَتْرِينَ إِلَى الْخَارِجِ!»:

(١) مَنْ طَمَعَ بِالْكَثِيرِ مَا حَصَلَ عَلَى الْقَلِيلِ!

(٣) خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا!

٢٩- «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة و على الضيف أن يتحوّل بعد ثلاثة أيام!». ما معنى «على الضيف أن يتحوّل؟»؟

(٤) عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَعْوَسَ!

(٢) عَلَيْهِ بِالْتَّخَرُجِ!

(٣) عَلَيْهِ بِالْتَّحْوِيلِ!

٣٠- «فاقتصر على ضيوفه الاشتراك في مسابقة قفز لتعيين الشخص الفائز!». عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَرَابِيَّ لِلكلمات:

(٤) الفائز: صفة

(٣) الشَّخْصُ: فاعل

(٢) الاشتراك: مفعول



۱۵ دقیقه

- تفکر و اندیشه
فرجام کار
قدم در راه
آهنگ سفر
صفحه‌های ۸۲ تا ۱۰۶

دین و زندگی (۱)

۳۱- در چه زمانی ناله حسرت دوزخیان برمی‌خیزد و آنان به خداوند چه می‌گویند؟

۱) هنگام ورود به بزرخ- دریغ برما، به خاطر کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.

۲) هنگام دچار شدن به عذاب- دریغ برما، به خاطر کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.

۳) هنگام دچار شدن به عذاب- خدا به ما وعده‌ای را داد اما ما نپذیرفتیم.

۴) هنگام ورود به بزرخ- خدا به ما وعده‌ای را داد اما ما نپذیرفتیم.

۳۲- تعبیر قرآنی «سیصلون سعیر» درباره چه موضوعی به کار رفته و نتیجه آن چیست؟

۱) صورت اخروی خوردن مال یتیم- بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

۲) صورت اخروی خوردن مال یتیم- آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

۳) تجسم اعمال انسان در بزرخ- آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

۴) تجسم اعمال انسان در بزرخ- بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

۳۳- براساس آموزه‌های وحیانی، علت «سرور بهشتیان» و «شعلهور شدن آتش از درون جان جهنه‌یان» به ترتیب چیست؟

۱) وصول به مقام خشنودی- تصویر عمل

۲) دوری از رنج و درماندگی- تصویر عمل

۳) وصول به مقام خشنودی- حقیقت عمل

۳۴- طبق بیان صریح قرآن خداوند در سوره نساء برای چه کسانی عذابی دردناک فراهم کرده است؟

۱) کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد، می‌گوید: الان توبه کردم.

۲) کسانی که در دنیا مست و مغدور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند.

۳) کسانی که نماز نمی‌خوانند و از محروم‌دان دستگیری نمی‌کرددند.

۴) کسانی که همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می‌شوند و روز رستاخیز را تکذیب می‌کرددند.

۳۵- دوزخیان معتقدند که علت گمراهی‌شان چیست و چه چیزی آنان را از یاد خدا بازداشت؟

۱) گناهان بزرگ- شقاوت و غفلتشان

۲) شیطان، بزرگان و سرورانشان- دوستانشان

۳) شیطان، بزرگان و سرورانشان- شقاوت و غفلتشان

۳۶- مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان‌شکنی با خداست، به جز ...

۱) عدم نگریستن خدا به آن‌ها در قیامت

۲) عدم طهارت از گناه

۳) بی‌نظمی امور دنیوی

۴) عدم بهره در آخرت

۳۷- در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت... است تا... و قرآن کریم تعبیر اسوه نیکو را برای... به کار برد است.

۱) محاسبه- ثمرات موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید- اهل بیت (ع)

۲) ارزیابی- ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- پیامبر (ص)

۳) ارزیابی- ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- پیامبر (ص)

۳۸- پیامبر اسلام (ص)، ... را موجب رستگاری و نجات انسان می‌شمردند و اسوه بودن بزرگان دین در اموری است که ...

۱) پیام بستن با خدا- به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر می‌کند.

۲) پیام بستن با خدا- همواره برای بشر خوب و بالرزش است.

۳) پیام بستن با خدا- به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر می‌کند.

۳۹- رسیدن آسان به هدف، معلوم کدامیک از راه‌های گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت از خداوند است؟

۱) تصمیم و عزم برای حرکت

۲) مراقبت

۳) محاسبه و ارزیابی

۴) عهد بستن با خداوند

۴۰- مطابق حدیث علوی، «علیت» و «راه حل» از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها چیست؟

۱) گذشت ایام- محاسبه

۲) نافرمانی از الگوها- محاسبه

۳) نافرمانی از الگوها- مراقبت

۴) گذشت ایام- مراقبت

**زبان انگلیسی (۱)****PART A: Vocabulary and Grammar**

Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

۱۵ دقیقه

The Value of Knowledge
Listening and Speaking
تا ابتدای ۷۱ صفحه‌های ۸۶ تا

41- I haven't seen David for a long time. The last time I saw him, he ... to find a job in Miami.

- 1) tried 2) has tried
3) was trying 4) will try

42- Were the students ... about the school's plan for going on a picnic next Friday when the teacher came in?

- 1) will talk 2) talking 3) talked 4) are going to talk

43- People often wonder whether they could jump just before a falling lift hits the floor, but ... this tactic will not work.

- 1) especially 2) correctly 3) unfortunately 4) rapidly

44- After the war between two neighboring countries came to an end, a lot of mass ... were found by the local people.

- 1) problems 2) stories 3) pains 4) graves

45- Scientists are trying hard to ... effective medicines to cure the cancer which is a very dangerous disease and often causes death.

- 1) develop 2) describe 3) identify 4) compare

46- Although my mother told me repeatedly to wear clothes that bring ... protection against the extreme cold in the winter days, I didn't pay attention to her.

- 1) believable 2) appropriate 3) interesting 4) amazing

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Would you like to have a birthday party every 13 days? Then Gliese 581c is the place for you! Astronomers ... (47) ... found the planet Gliese 581c. It goes around the star Gliese 581 once every 13 days. Earth ... (48) ... its star, the sun, every 365 days. Gliese 581c is an exoplanet- a planet that exists beyond our solar system. It is the most earthlike exoplanet discovered so far. Astronomers say there could be liquid water on Gliese 581c. And where there's water, there could be ... (49) This planet will most probably be a very important goal of the ... (50) ... of space missions.

- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 47- 1) recently | 2) hopefully | 3) sadly | 4) carefully |
| 48- 1) collects | 2) divides | 3) orbits | 4) creates |
| 49- 1) planet | 2) life | 3) research | 4) invention |
| 50- 1) fact | 2) future | 3) gift | 4) material |



۳۵ دقیقه

معادله‌ها و نامعادله‌ها / تابع

فصل ۴ از ابتدای تعبین علامت چندجمله‌ای درجه دوم تا پایان فصل ۵ تا پایان مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن

صفحه‌های ۸۶ تا ۱۰۰

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل	چند از ۱۰ آزمون امروز
-------------------------------	-----------------------

ریاضی (۱)

۵۱- کدامیک از روابط زیر قطعاً یک تابع را مشخص می‌کند؟

(۱) رابطه‌ای که به هر عدد، ریشه‌های دوم آن را نسبت دهد.

(۲) رابطه‌ای که به هر کلاس، دانش‌آموزان آن را نسبت دهد.

(۳) رابطه‌ای که به هر دانش‌آموز، دوستان او را نسبت دهد.

(۴) رابطه‌ای که به هر عدد، ریشه سوم آن را نسبت می‌دهد.

۵۲- یک جسم از بالای یک ساختمان با ارتفاع ۱۵ متر به هوا پرتاب می‌شود. اگر ارتفاع این جسم از سطح زمین در زمان t از رابطه

محاسبه شود، در چه فاصله زمانی ارتفاع توب از سطح زمین بیشتر از ۱۵ متر خواهد بود؟

$$\left(\frac{18}{5}, \frac{156}{5}\right) \quad (۲) \quad (۰, ۱۸) \quad (۱)$$

$$\left(0, \frac{18}{5}\right) \quad (۴) \quad \left(0, \frac{9}{\gamma}\right) \quad (۳)$$

۵۳- اگر $\{2, 2a+4, 2, -4a-2, (-\frac{4}{2a}, b-1), (\frac{2b}{3}, c+1)\}$ یک تابع باشد، حاصل $b - 2c + a$ کدام است؟

۵۴- اگر زوج‌های مرتب $(x+3, x+\frac{y}{\gamma})$ و $(x^2+y-5, 3)$ برابر باشند، y کدام است؟

$$1 \quad (۳) \quad 2 \quad (۲) \quad 3 \quad (۱)$$

۴) صفر

Konkur.in

$$4 \quad (۲) \quad 5 \quad (۱)$$

$$8 \quad (۴) \quad 7 \quad (۳)$$

۵۵- مقادیر a کدام باشد تا نمودار سهمی $y = (2a+1)x^2 - 4x + 1$ پایین‌تر از محور x ها قرار نگیرد؟


$$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \quad (۲) \quad \left(-\infty, \frac{3}{\gamma}\right] \quad (۱)$$

$$\left[-\frac{1}{\gamma}, +\infty\right) \quad (۴) \quad \left[\frac{3}{\gamma}, +\infty\right) \quad (۳)$$

دانش‌آموز عزیز، تنها و تنها به یکی از دو دسته سوال‌های عادی و یا موازی پاسخ دهید.



۵۶- اگر نمودار ون تابع $f = \{(2x^3 - 6, x^3), (4x, x+6)\}$ مطابق شکل زیر باشد، کدامیک، جزء مؤلفه‌های اول این تابع است؟ ($a \neq b$)



۱۲ (۱)

۴ (۲)

۸ (۳)

۲ (۴)

۵۷- تابع $\{(5, 2m), (5, 4m-1), (6-2m, n^2 - \frac{rn}{r}), (2n+1, n^2)\}$ شامل چند زوج مرتب متمایز است؟

۳ (۲)

۴ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

۵۸- به ازای چند عدد طبیعی نامعادله $\frac{x^4 - 2x^3 + x^2}{x^2 - 5x + 6} \leq 0$ برقرار است؟

۲) یک

۱) هیچ

سایت Konkur.in

دو

۴) بیشمار

Konkur.in

[-2, 1] (۲)

[-2, 4] (۱)

۵۹- مجموعه جواب نامعادله $2 \leq \left| \frac{x-2}{3} - x \right|$ کدام است؟

[-4, 2] (۴)

[-3, -2] \cup [-1, 1] (۳)

۶۰- مجموعه جواب نامعادله $1 \leq 2x^3 - x - 3 \leq 5x - 1$ ، شامل چند عدد صحیح است؟

۴ (۲)

۳ (۱)

۴) بیشمار

۵ (۳)



پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

سوالهای شاهد (گواه)

۶۱- کدام یک از رابطه‌های زیر، یک تابع را توصیف نمی‌کند؟





(۱) رابطه‌ای که هر فرد را به شماره‌ی کد ملی اش نسبت می‌دهد.

(۲) رابطه‌ای که شعاع یک دایره را به مساحت آن نسبت می‌دهد.

(۳) رابطه‌ای که کتاب ریاضی دهم را به فصل‌هایش نسبت می‌دهد.

(۴) رابطه‌ای که ارتفاع یک فنر ثابت را به جرم وزنهایی که به آن وصل می‌شوند، نسبت می‌دهد.

۶۲- کدام گزینه نمایش یک تابع است؟

۶۳- مجموعه $A = \{a, b, c\}$ و مجموعه $B = \{1, 2\}$ مفروض‌اند. چند تابع از A به B وجود دارد که شامل عدد ۲ نباشد؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۴ (۴) هیچ تابعی وجود ندارد.

۴ (۳)

Konkur.in

۶۴- به ازای کدام مقادیر m ، عبارت $(m-1)x^3 + 6x^2 + 2m + 1$ برای هر مقدار دلخواه x ، مثبت است؟ $m > 2/5$ (۲) $m < -2$ (۱) $1 < m < 2/5$ (۴) $1 < m < 2$ (۳)۶۵- مقادیر سهمی $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$ در بازه‌ی (a, b) بزرگتر از $\frac{7}{2}$ است. بیشترین مقدار $a - b$ کدام است؟

۵ (۲)

۴ (۱)

۶ (۴)

۵/۵ (۳)



۶۶- در بازه $[a, b]$ ، سهی $y = 2x^3 + x$ بالای خط $y = 1$ نیست، بیشترین مقدار $b - a$ برابر است با:

۲ (۲)

 $\frac{3}{2}$ (۱)

۳ (۴)

 $\frac{1}{2}$ (۳)

۶۷- رابطه $A = \{(3, m^4), (2, 1), (-3, m), (-2, m), (3, m+2), (m, 4)\}$ به ازای کدام مقدار m ، یک تابع است؟

-۱ (۲)

-۲ (۱)

 m هیچ مقدار (۴)

۲ (۳)

۶۸- اگر مجموعه جواب نامعادله $|x - a| \geq b$ به صورت $(-\infty, 3] \cup [6, +\infty)$ باشد، a کدام است؟

۳/۵ (۲)

۴ (۱)

۳ (۴)

۴/۵ (۳)

۶۹- اگر رابطه $R = \{(6, 4^{x+y}), (5, x^3 - y^2), (6, 64), (5, 15)\}$ ، یک تابع باشد، مقدار x^y برابر کدام است؟

 $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۱)


-۱ (۴)

۱ (۳)

Konkur.in

۷۰- اگر مجموعه جواب نامعادله $|2x + b| > 2c - b$ به صورت زیر باشد، در این صورت حاصل c - b کدام است؟

۶ (۱)



۸ (۲)

-۶ (۳)

-۸ (۴)



۳۵ دقیقه

معادله‌ها و نامعادله‌ها

فصل ۴ از ابتدای تعیین علامت
چندجمله‌ای درجه‌ی دوم تا بایان فصل

صفحه‌های ۸۶ تا ۹۳

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقب‌تر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

ریاضی (۱)

۷۱- مجموعه جواب نامعادله $-5 < 4x - 3 |$ کدام گزینه است؟

(۲) (۲, -۲)

(۱) $(-\frac{1}{2}, 2)$ (۴) $(-\frac{1}{2}, -2)$ (۳) \emptyset ۷۲- یک جسم از بالای یک ساختمان با ارتفاع ۱۵ متر به هوا پرتاب می‌شود. اگر ارتفاع این جسم از سطح زمین در زمان t از رابطه

محاسبه شود، در چه فاصله زمانی ارتفاع توپ از سطح زمین بیشتر از ۱۵ متر خواهد بود؟

(۲) $(\frac{18}{5}, \frac{156}{5})$ (۱) $(0, 18)$ (۴) $(\frac{18}{5}, 0)$ (۳) $(0, \frac{9}{\gamma})$ ۷۳- به ازای چه مقادیری از m عبارت $A = x^2 + mx + m + 3$ همواره مثبت است؟ (کامل‌ترین گزینه را انتخاب نمایید.)

(۲) (۰, ۴)

(۱) (-۲, ۴)

(۴) (۴, ۶)

(۳) (-۲, ۶)

۷۴- مجموعه جواب نامعادله $\frac{x-1}{x+2} > 2$ ، شامل چند عدد صحیح است؟

۱) (۲)
۲) (۳)
۳) بی‌شمار

(۱) صفر

۷۵- مقادیر a کدام باشد تا نمودار سهمی $y = (2a+1)x^2 - 4x + 1$ پایین‌تر از محور x ها قرار نگیرد؟

(۲) $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ (۱) $(-\infty, \frac{3}{\gamma}]$ (۴) $[-\frac{1}{2}, +\infty)$ (۳) $[\frac{3}{\gamma}, +\infty)$ ۷۶- به ازای کدام مجموعه مقادیر m ، عبارت $\frac{(m-1)x^2 + (m-1)x + 1}{-x^2 + 3x - 4}$ همواره منفی است؟ ($m \neq 1$)(۲) $m > -1$ (۱) $m > 1$ (۴) $-1 < m < 5$ (۳) $1 < m < 5$



۷۷- مجموعه جواب نامعادله $x^3 - 3 \leq 2x^2 - x - 3 \leq 5x - 1$, شامل چند عدد صحیح است؟

(۲) ۴

(۱) ۳

(۴) بی شمار

(۳) ۵

۷۸- مجموعه جواب نامعادله $\frac{x^2 + x}{x^2 - x - 12} \leq \frac{2}{x - 4}$ کدام است؟

(۲) $(-3, -2] \cup [3, 4)$ (۱) $(-3, 3] \cup (4, 5]$ (۴) $(-3, -2] \cup (4, 5]$ (۳) $(-3, 1] \cup [3, 4)$

۷۹- به ازای چند عدد طبیعی نامعادله $\frac{x^4 - 2x^3 + x^2}{x^2 - 5x + 6} \leq 0$ برقرار است؟

(۲) یک

(۱) هیچ

(۴) بی شمار

(۳) دو

۸۰- مجموعه جواب نامعادله $2 \left| \frac{x-2}{3} - x \right| \leq 0$, کدام است؟

(۲) $[-2, 1]$ (۱) $[-2, 4]$ (۴) $[-4, 2]$ (۳) $[-3, -2] \cup [-1, 1]$

پاسخ دادن به این سؤالات اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

سؤالهای شاهد (گواه)

۸۱- اگر بازه $[a, b]$, مجموعه جواب نامعادله $3x^3 + 4x^2 \leq 4x^3 + 2a + b$ باشد، حاصل $2a + b$ کدام است؟

(۲) $-\frac{5}{2}$ (۱) $\frac{1}{2}$

Konkur.in

(۳) ۴

۸۲- به ازای چند مقدار صحیح، عبارت $(x^3 - 4x + 4)(x - 5)^4$ نامثبت است؟

(۲) ۵

(۱) ۴

(۴) بی شمار

(۳) ۳

۸۳- به ازای کدام مقادیر m , عبارت $(m-1)x^3 + 6x + 2m + 1$, برای هر مقدار دلخواه x , مثبت است؟

(۲) $m > 2/5$ (۱) $m < -2$ (۴) $1 < m < 2/5$ (۳) $1 < m < 2$



-۸۴- مقادیر سهمی $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$ در بازه‌ی (a, b) بزرگتر از $\frac{7}{2}$ است. بیشترین مقدار $a - b$ کدام است؟

۵ (۲)

۴ (۱)

۶ (۴)

۵/۵ (۳)

-۸۵- مجموعه جواب نامعادله $\frac{-x^2 + 3x + 10}{x^3 - 1} > 0$ کدام است؟

(-۵, +\infty) (۲)

(-۲, 1) (۱)

(-\infty, 5) (۴)

(-\infty, -2) \cup (1, 5) (۳)

-۸۶- در بازه $[a, b]$ ، سهمی $y = 7x^3 + x - 1$ بالای خط $y = 1$ نیست، بیشترین مقدار $b - a$ برابر است با:

2 (۲)

\frac{3}{2} (۱)

3 (۴)

\frac{1}{2} (۳)

-۸۷- به ازای چه حدودی از m عبارت $\frac{(m+2)x^3 + 2mx + m - 1}{-x^3 + 3x - 4}$ همواره منفی است؟

-2 < m < 2 (۲)

-2 < m (۱)

m < 2 (۴)

2 < m (۳)

-۸۸- اگر مجموعه جواب نامعادله $|x - a| \geq b$ به صورت $(-\infty, 3] \cup [6, +\infty)$ باشد، a کدام است؟

3/5 (۲)


4 (۱)

3 (۴)

4/5 (۳)

-۸۹- اگر مجموعه جواب نامعادله $|2x + b| > c$ به صورت زیر باشد، در این صورت حاصل $b - 2c$ کدام است؟

6 (۱)



8 (۲)

-6 (۳)

-8 (۴)

-۹۰- مجموعه جواب نامعادله $\frac{|3x - 2|}{x^2 + x + 1} \leq \frac{5}{x^2 + x + 1}$ کدام است؟

[-\frac{7}{3}, 1] (۲)

[-1, \frac{7}{3}] (۱)

[1, +\infty) (۴)

(-\infty, \frac{7}{3}] (۳)

در کنار سوال‌های طراحی شده، سوالاتی با سطح دشواری شناسایی شده انتخاب شده است: یک هدف این است دانش آموز خودش را با این آزمون شاهد و گواه می‌سنجد و علت دیگر اینکه دانش آموزان بایستی بدانند که در ابتدا سوالات استاندارد را کار کنند و پیش بروند.



۱۵ دقیقه
چند ضلعی ها
چند ضلعی ها و بیزگی هایی از آنها

صفحه های ۵۳ تا ۶۴

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس هندسه (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

هندسه (۱)

۹۱- تعداد قطرهای یک چندضلعی، دو برابر تعداد اضلاع آن است. این چندضلعی حداکثر چند زاویه 140° درجه می‌تواند داشته باشد؟

۵ (۲)

۶ (۱)

۳ (۴)

۴ (۳)

۹۲- کدامیک از گزاره‌های زیر، لزوماً یک چندضلعی محدب را مشخص نمی‌کند؟

(۱) هر زاویه داخلی آن کمتر از 180° است.

(۲) سایر رأس‌های چندضلعی در یک طرف خطی قرار می‌گیرند که شامل هر کدام از ضلع‌های آن باشد.

(۳) یک قطر چندضلعی، آنرا به دو چندضلعی محدب تقسیم می‌کند.

(۴) تمام نقاط پاره خطی که دو نقطه دلخواه درون چندضلعی را بهم وصل می‌کند، درون چندضلعی است.

۹۳- چه تعداد از گزاره‌های زیر همواره درست است؟

(الف) چهارضلعی‌ای که دو قطر برابر داشته باشد، مستطیل است.

(ب) چهارضلعی‌ای که قطرهای آن عمودمنصف یکدیگر باشند، مریغ است.

(پ) چهارضلعی‌ای که قطرهای آن نیمساز زاویه‌های داخلی باشند، لوزی است.


۱ (۲)

۱ هیچ

۳ (۴)

۲ (۳)

۹۴- در متوازی‌الاضلاع شکل زیر، AH و AH' به ترتیب ارتفاع‌های وارد بر ضلع‌های BC و CD هستند. $D\hat{A}H' + B\hat{A}H$ همواره برابر کدام است؟

 \hat{C} (۱) \hat{B} (۲) $\hat{C} - \hat{B}$ (۳) $\frac{\hat{C}}{2}$ (۴)


۹۵- در متوازی‌الاضلاع شکل زیر، M و N وسطهای اضلاع AD و BC می‌باشند. اگر $QN = 3$ باشد، طول DQ کدام است؟

 $\frac{9}{2}$ (۱)

۵ (۲)

 $\frac{11}{2}$ (۳)

۶ (۴)





۹۶- در مثلث قائم‌الزاویه ABC ، اندازه یکی از زاویه‌های حاده، سه برابر اندازه زاویه حاده دیگر است. اگر طول ارتفاع وارد بر وتر برابر 2 باشد، طول وتر کدام است؟


$$4\sqrt{2} \quad (2)$$

(۱)

$$8\sqrt{2} \quad (4)$$

(۳)

۹۷- در مثلث قائم‌الزاویه ABC ، $\hat{A} = 90^\circ$ ، AM میانه وارد بر وتر است. اندازه HM کدام است؟



$$\frac{9}{4} \quad (1)$$

$$\frac{5}{2} \quad (2)$$

$$\frac{5\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{5\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

۹۸- در یک متوازی‌الاضلاع که طول قطرهای آن برابر 4 و 7 واحد است، از هر رأس خطی به موازات یکی از قطرها رسم کردہ‌ایم، محیط چهارضلعی حاصل از

تقاطع این خطوط کدام است؟

$$11 \quad (2)$$

(۱)

$$16 \quad (4)$$

(۳)

۹۹- وسطهای اضلاع یک مستطیل را به طور متواالی به هم وصل کردہ‌ایم و یک چهارضلعی با یک زاویه 60° حاصل شده است. نسبت طول به عرض این مستطیل

سایت Konkur.in

کدام است؟

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2)$$

(۱)

Konkur.in

$$\sqrt{2} \quad (3)$$

۱۰۰- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ که محیط آن برابر 24 است، از نقطه M وسط ضلع AB به دو رأس C و D وصل می‌کنیم. اگر $AD = 2AD$ و

باشد، حاصل $\hat{B} = 60^\circ$ کدام است؟

$$9\sqrt{3} \quad (2)$$

(۱)

$$18\sqrt{3} \quad (4)$$

(۳)

کارنامه پنج نوع درس: این کارنامه درس‌های شما را به پنج دسته تقسیم می‌کند. ۱- دروسی که نقطه قوت پایدار شماست

۲- دروسی که نقطه قوت شماست ۳- دروسی که نیاز به اندکی تلاش دارد ۴- دروس نوسانی ۵- دروس چالشی

۳۰ دقیقه
ویژگی‌های فیزیکی مواد / دما و گرما
فصل ۲ از ابتدای شارة در حرکت و اصل برنولی تا پایان فصل و فصل ۴ تا پایان انسیساط گرمایی
صفحه‌های ۸۲ تا ۱۰۴

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس **فیزیک (۱)**، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

فیزیک (۱)

۱۰۱ - هنگام اوج گیری هواپیما، تندي هوا در بالاي بال هواپیما از زير آن است و درنتيجه، فشار هوا در بالاي بال، از زير آن است.


(۲) کمتر ، کمتر

(۴) کمتر ، بيشتر

(۱) بيشتر ، بيشتر

(۳) بيشتر ، کمتر

۱۰۲ - در لوله‌ای پر از آب، مطابق شکل، آب از چپ به راست به صورت لایه‌ای در حال شارش است. بهترتبی از راست به چپ در بخش تندي آب در حال افزایش و در بخش فشار آب در حال افزایش است.



E . A (۱)

E . B (۲)

B . D (۳)

D . B (۴)

۱۰۳ - چه تعداد از موارد زير صحیح است؟

الف) هر مشخصه قابل اندازه‌گيری که با گرمی و سردي جسم تغيير کند، می‌تواند به عنوان کمیت دماستنجی در نظر گرفته شود.

ب) گستره دماستنجی يك ترموکوبيل به جنس سيمهای آن بستگی دارد.

پ) برای دما، حد بالايی وجود ندارد.

ت) به دليل دقت بيشتر دماستنج ترموکوبيل نسبت به دماستنج گازی، دماستنج ترموکوبيل در بسياري از وسائل صنعتي، گرمایشي و سرمایشي يافت می‌شود.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۰۴ - اگر دمای جسمی که $45/5^{\circ}\text{C}$ است را بر حسب کلوین با T و دمای جسم دیگری که $7/5^{\circ}\text{C}$ است را بر حسب درجه فارنهایت با F نشان دهیم، نسبت

عددی $\frac{T}{F}$ کدام است؟

Konkur.in
۶ (۲)
۷ (۴)


$\frac{91}{15}$ (۱)

۳ (۳)

۱۰۵ - آب در لوله (۱) با سطح مقطع A_1 با تندي v_1 حرکت می‌کند. اين لوله در نقطه‌اي انشعاب پيدا می‌کند و آب از دو لوله (۲) و (۳) که سطح مقطع آنها

به ترتيب $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{4}$ برابر سطح مقطع لوله اوليه است عبور می‌کند. اگر نسبت تندي آب در لوله (۱) به تندي آب در لوله (۲) برابر ۲ باشد، نسبت تندي آب

در لوله (۲) به تندي آب در لوله (۳) کدام است؟ (لوله‌ها پر از آب هستند و جريان آب در هر سه لوله به صورت لایه‌ای است).



$\frac{1}{5}$ (۱)


$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{2}{5}$ (۳)

$\frac{5}{2}$ (۴)



۶- مطابق شکل، لوله U شکل به دو نقطه یک لوله با سطح مقطع‌های متفاوت متصل است و آب داخل لوله U شکل در تعادل است. اگر با ورود جریان لایه‌ای هوا به داخل لوله، اختلاف فشار 500 Pa بین دو مقطع A_1 و A_2 ایجاد شود، بهترین آب در کدام سمت لوله U شکل بالاتر می‌رود و اختلاف ارتفاع آب در دو شاخه لوله U شکل چند سانتی‌متر خواهد بود؟ (سطح مقطع دو طرف لوله U شکل برابر بوده، $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ است.)



(۱) چپ، ۳

(۲) راست، ۳

(۳) چپ، ۵

(۴) راست، ۵

۷- شکل زیر، شیر بسته شده به انتهای لوله آب را نشان می‌دهد. آب با تنیدی $v_1 = 1/25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از لوله با مقطع دایره‌ای به قطر $d_1 = 10 \text{ cm}$ وارد می‌شود و از

خروجی آن که سطح مقطع دایره‌ای به قطر $d_2 = 2/5 \text{ cm}$ دارد، خارج می‌شود. اگر خروجی شیر در ارتفاع ۱ متری از سطح زمین و به صورت عمودی نگه داشته شده باشد و آنرا لحظه‌ای باز کرده و سپس بیندیم، آب حداقل تا چه ارتفاعی از سطح زمین بر حسب متر بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)


مقاومت هوا صرف نظر کنید.)

(۱) ۳/۵

(۲)

(۳)

(۴)



۸- یک دماسنجد که به صورت خطی مدرج شده است، در فشار 1 atm ، دمای نقطه ذوب بخ را -30°C درجه و دمای نقطه جوش آب را 120°C درجه نشان می‌دهد. رابطه بین دمای این دماسنجد (x) و دماسنجد فارنهایت (F) کدام است؟

$$F = \frac{6}{5}x + 36 \quad (۲)$$

$$F = \frac{2}{3}x + 20 \quad (۱)$$

$$F = \frac{6}{5}x + 68 \quad (۴)$$

$$\frac{9}{5}F = \frac{2}{3}x - 12 \quad (۳)$$

۹- دمای یک جسم را از $\frac{200}{9}^\circ\text{C}$ درجه سلسیوس، 20°C درجه سلسیوس افزایش می‌دهیم. دمای این جسم در مقیاس فارنهایت چند درصد افزایش یافته است؟

(۱) ۴۰

(۲)

(۲)

(۳)

۱۰- اگر دمای جسمی بر حسب کلوین، دو برابر شود، بر حسب درجه سلسیوس، کدام رابطه همواره صحیح است؟ (θ_1 دمای اولیه و θ_2 دمای نهایی جسم بر حسب درجه سلسیوس هستند، 0°C و صفر کلوین، -273°C است.)

$$1 < \frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 2 \quad (۲)$$

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} > 2 \quad (۱)$$


(۴) هیچ کدام از گزینه‌ها، همواره صحیح نیست.

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 1 \quad (۳)$$

در مورد فرمول‌های فیزیک بیشتر فکر کنید سعی کنید مفهوم رابطه‌ها را درک کنید بعد از این کار نوبت به حل تمرین و تست می‌رسد.



۱۱۱- با توجه به نمودار تغییرات طول میله‌های نازک A و B نسبت به تغییرات دما، نسبت ضریب انبساط طولی میله A به ضریب انبساط طولی میله B کدام است؟



- ۲ (۱)
۳ (۲)
۴ (۳)
۸ (۴)

۱۱۲- دو نوار آلومینیمی و آهنی در اختیار داریم. طول نوار آهنی در دمای اتاق برابر 450 cm است. طول نوار آلومینیمی در همین دما چند سانتی‌متر باشد تا

$$\text{به‌ازای تغییر دمای یکسان اختلاف طول دو نوار همواره ثابت بماند? } \frac{1}{K} = 24 \times 10^{-6} \text{ آلومنینم و آهن } (\alpha)$$

- ۲۰۰ (۲)
۱۵۰ (۱)
۱۲۵۰ (۴)
۳۰۰ (۳)

۱۱۳- دو میله به طول‌های L_1 و L_2 و ضریب‌های انبساط طولی α_1 و α_2 را به هم پرج می‌کنیم و میله‌ای به طول $L = L_1 + L_2$ می‌سازیم. اگر α را

به‌عنوان ضریب انبساط طولی معادل میله ساخته شده در نظر بگیریم، کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (۲) \qquad \alpha < \alpha_1 + \alpha_2 \quad (۱)$$

- ۴) باید مقادیر عددی را داشته باشیم تا بتوانیم نظر دهیم. $\alpha > \alpha_1 + \alpha_2 \quad (۳)$

۱۱۴- اگر دمای یک میله فلزی را از 20°C به 30°C برسانیم، طول میله 2 mm افزایش می‌یابد. اگر دمای این میله را از 20°C به 140°F برسانیم، طول


میله نسبت به طول آن در دمای 20°C ، چند میلی‌متر بلندتر خواهد شد؟

- ۴ (۲)
۲ (۱)


- ۱۶ (۴)
۸ (۳)

۱۱۵- مطابق شکل (۱)، دو نوار فلزی در دمای اتاق هم‌طول هستند و در این دما به هم پرج شده‌اند. اگر دما به اندازه ΔT افزایش یابد، دو نوار، مطابق شکل (۲)

خم می‌شوند و به صورت کمانی از دایره به شعاع R درمی‌آیند. اگر $\frac{R}{d} = 10^{-3}$ باشد، اگر دما به اندازه ΔT از تغییر d صرف نظر کنید.



۲۰۰۳ (۱)



۲۰۰۰ (۲)


۱۰۰۱/۵ (۳)

۱۰۰۰ (۴)



۱۱۶- مطابق شکل، یک نوار حلقوی از فلزی با ضریب انبساط طولی $\frac{1}{K} \times 10^{-6}$ ساخته شده است. اگر دمای آن را ۱۰۰ درجه سلسیوس افزایش دهیم، میزان

افزایش سطح قسمت فلزی، چند میلی‌متر مربع است؟



$$10\pi \quad (1)$$

$$16\pi \quad (2)$$

$$12\pi \quad (3)$$

$$18\pi \quad (4)$$

۱۱۷- درون یک ظرف استوانه‌ای بزرگ با ضریب انبساط ناچیز که روی یک سطح کاملاً افقی قرار دارد، تارتفاع h مایعی با ضریب انبساط حجمی β وجود دارد.

اگر دمای مایع تغییر کند، نسبت تغییر ارتفاع مایع به تغییر دمای آن کدام است؟ (یکای تمامی کمیت‌های معرفی شده، یکاهای SI است).

$$3\beta h \quad (2)$$

$$\beta h \quad (1)$$

$$\frac{2}{3}\beta h \quad (4)$$

$$\frac{1}{3}\beta h \quad (3)$$

۱۱۸- ظرفی استوانه‌ای با مساحت قاعده 40cm^2 و ارتفاع 40cm که روی سطح افقی کاملاً صافی قرار دارد، محتوی 1200cm^3 مایع با ضریب انبساط حجمی

$\frac{1}{K} \times 10^{-5}$ است. اگر ضریب انبساط طولی ظرف $\frac{1}{K} \times 10^{-6}$ باشد و دمای ظرف و مایع به طور یکنواخت 25°C افزایش یابد، چند سانتی‌متر

مکعب مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟ (با این تغییر دما، مایع و ظرف، تغییر حالت نمی‌دهند).

$$426 \quad (2)$$

$$26 \quad (1)$$

(۴) مایع از ظرف بیرون نمی‌ریزد.

$$36 \quad (3)$$

۱۱۹- اگر دمای یک کره توپر مسی به حجم اولیه 200cm^3 را 100°C افزایش دهیم، چگالی آن تقریباً درصد می‌یابد.

$$(\alpha_{مس} = 17 \times 10^{-6}) \quad (1)$$

$$0/51 \quad (2)$$

$$0/17 \quad (1)$$

$$0/17 \quad (4)$$

$$0/51 \quad (3)$$

۱۲۰- اگر دمای آب درون سه ظرف (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب 276K ، $39/20^\circ\text{F}$ و 14°C باشد و چگالی آب درون ظرف‌های (۱)، (۲) و (۳) را به ترتیب ρ_1 ، ρ_2 و ρ_3 بنامیم، کدام گزینه در مورد مقایسه چگالی آب درون این سه ظرف صحیح است؟

$$\rho_2 > \rho_1 > \rho_3 \quad (2)$$

$$\rho_3 = \rho_2 = \rho_1 \quad (1)$$

$$\rho_3 > \rho_1 > \rho_2 \quad (4)$$

$$\rho_1 > \rho_3 > \rho_2 \quad (3)$$



۳۰ دقیقه

ویژگی‌های فیزیکی مواد /
دما و گرمافصل ۳ از ابتدای شارة در حرکت و
اصل برنولی تا پایان فصل و فصل ۴ تا
بایان دما و دماستجی

صفحه‌های ۸۲ تا ۹۵

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقب‌تر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

فیزیک (۱)

۱۲۱- هنگام اوج گیری هواپیما، تندي هوا در بالاي بال هواپیما از زير آن است و درنتيجه، فشار هوا در بالاي بال، از زير آن است.

(۲) کمتر ، کمتر

(۴) کمتر ، بيشتر

(۱) بيشتر ، بيشتر

۱۲۲- کدام‌پک از گزينه‌های زير نادرست است؟

(۱) در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندي شاره، فشار آن کاهش می‌یابد.

(۲) در حرکت تلاطمی شاره، نقش کلی جريان شاره و مسیر حرکت ذرات آن، بهطور مداوم تغيير می‌کند.

(۳) روزهایی که باد می‌وزد، ارتفاع موج‌های دریا یا اقیانوس بالاتر از ارتفاع میانگین می‌شود.

(۴) هنگامی که در سطح بالاي يك ورق کاغذ می‌دمیم، تندي جريان هوا در بالاي کاغذ بيشتر از زير آن می‌شود و با توجه به اصل برنولي، فشار هوا در زير کاغذ کمتر از بالاي آن شده و به طرف بالا حرکت می‌کند.

۱۲۳- کميٌّ دماستجيٌّ ترموكوپل، است و نسبت به دماستج مقاومت پلاتيني، دقت دارد.

(۲) جريان ، کمتری

(۱) جريان ، بيشتری

(۴) ولتاژ ، کمتری

(۳) ولتاژ ، بيشتری

۱۲۴- چه تعداد از موارد زير صحيح است؟

(الف) هر مشخصه قابل اندازه‌گيري که با گرمي و سردي جسم تغيير کند، می‌تواند به عنوان کميٌّ دماستجي در نظر گرفته شود.

(ب) گستره دماستجي يك ترموكوپل به جنس سيم‌های آن بستگی دارد.

(پ) برای دما، حد بالاي وجود ندارد.

(ت) به دليل دقت بيشتر دماستج ترموكوپل نسبت به دماستج گازی، دماستج ترموكوپل در بسياري از وسائل صنعتي، گرمایشي و سرمایشي يافت می‌شود.


۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۲۵- در لوله‌اي پر از آب، مطابق شكل، آب از چپ به راست به صورت لایه‌اي در حال شارش است. به ترتيب از راست به چپ در بخش تندي آب در حال افزایش و در بخش فشار آب در حال افزایش است.



E . A (۱)


E . B (۲)

B . D (۳)

D . B (۴)



۱۲۶- درون لوله شکل زیر، جریان لایه‌ای یک شاره تراکم‌ناپذیر برقرار است. اگر قطر لوله در مقطع (۱) و مقطع (۲) به ترتیب 80 mm و 20 mm باشد و تندي شاره در مقطع (۱)، $2 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ باشد، تندي شاره در مقطع (۲) چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ (لوله پر از شاره است و سطح مقطع لوله در همه جای آن به شکل دایره است).



(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

۱۲۷- اگر دمای جسمی که $45/5^{\circ}\text{C}$ است را برحسب کلوین با T و دمای جسم دیگری که $7/5^{\circ}\text{C}$ است را برحسب درجه فارنهایت با F نشان دهیم، نسبت

$$\text{عددی} \frac{T}{F} \text{ کدام است؟}$$


۶ (۱)

۹۱ (۲)

۷ (۳)

۱۵ (۴)

۱۲۸- مطابق شکل زیر، توسط پمپی، هوای درون لوله به طرف پمپ شارش می‌شود. کدام گزینه، مقایسه درستی از ارتفاع مایع درون لوله‌ها ارائه می‌دهد؟ (جریان هوای درون لوله، لایه‌ای بوده و مایع در تعادل است).



(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۱۲۹- شلنگی به قطر 2 سانتی‌متر به آبپاشی که دارای 24 سوراخ دایره‌ای می‌باشد متصل شده است. قطر هر سوراخ $0/2\text{ سانتی‌متر}$ است. اگر تندي آب در

شنلگ $1/5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، تندي آن هنگام خروج از سوراخ‌های آبپاش چند متر بر ثانیه است؟ (جریان آب درون شلنگ و آبپاش به صورت لایه‌ای است).

۶/۲۵ (۱)

۱/۵ (۲)


۳۶ (۳)

۱۵ (۴)

۱۳۰- آب در لوله (۱) با سطح مقطع A_1 با تندي v_1 حرکت می‌کند. این لوله در نقطه‌ای انشعاب پیدا می‌کند و آب از دو لوله (۲) و (۳) که سطح مقطع آنها

به ترتیب $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{4}$ برابر سطح مقطع لوله اولیه است عبور می‌کند. اگر نسبت تندي آب در لوله (۱) به تندي آب در لوله (۲) برابر ۲ باشد، نسبت تندي آب

در لوله (۲) به تندي آب در لوله (۳) کدام است؟ (لوله‌ها پر از آب هستند و جریان آب در هر سه لوله به صورت لایه‌ای است).



(۱)

(۲)

(۳)

(۴)


اگر پاسخ دادن به سوالی وقت زیادی از شما می‌گیرد، در پایان آزمون به آن پاسخ دهید.



۱۳۱- مطابق شکل، لوله U شکل به دو نقطه یک لوله با سطح مقطع‌های متفاوت متصل است و آب داخل لوله U شکل در تعادل است. اگر با ورود جریان

لایه‌ای هوا به داخل لوله، اختلاف فشار 500 Pa بین دو مقطع A_1 و A_2 ایجاد شود، بهترین آب در کدام سمت لوله U شکل بالاتر می‌رود و اختلاف

ارتفاع آب در دو شاخه لوله U شکل چند سانتی‌متر خواهد بود؟ (سطح مقطع دو طرف لوله U شکل برابر بوده، $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ است.)




(۱) چپ، ۳

(۲) راست، ۳

(۳) چپ، ۵

(۴) راست، ۵

۱۳۲- مطابق شکل، دو مخزن استوانه‌ای A و B را که در ابتدا خالی هستند به ترتیب توسط لوله‌های استوانه‌ای A و B در مدت t_A و t_B پر از آب



(۱) ۶

(۲) ۱۲

(۳) ۲۴

(۴) ۴۸

۱۳۳- شکل زیر، شیر بسته شده به انتهای لوله آب را نشان می‌دهد. آب با تندی $\frac{m}{s} = 1/25 = 1/25$ از لوله با مقطع دایره‌ای به قطر $d_1 = 10 \text{ cm}$ وارد می‌شود و از

خروجی آن که سطح مقطع دایره‌ای به قطر $d_2 = 2/5 \text{ cm}$ دارد، خارج می‌شود. اگر خروجی شیر در ارتفاع ۱ متری از سطح زمین و به صورت عمودی

نگه داشته شده باشد و آن را لحظه‌ای باز کرده و سپس بیندیم، آب حداقل تا چه ارتفاعی از سطح زمین بر حسب متر بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



مقاومت هوا صرف نظر کنید.

(۱) ۳/۵

(۲)

(۳)

(۴) ۲۱

۱۳۴- دمای یک محیط را در فشار 1 atm با دماسنجهای سلسیوس و فارنهایت اندازه می‌گیریم، عدد دماسنچ فارنهایت 52° برابر عدد دماسنچ سلسیوس

است. دمای این محیط بر حسب کلوین کدام است؟

(۱) ۲۵

(۲) -۱۳

(۳)

(۴) ۲۴۸



۱۳۵- یک دماسنجد که به صورت خطی مدرج شده است، در فشار atm ۱، دمای نقطه ذوب بین را -30° درجه و دمای نقطه جوش آب را 120° درجه نشان می‌دهد. رابطه بین دمای این دماسنجد (x) و دماسنجد فارنهایت (F) کدام است؟

$$F = \frac{6}{5}x + 36 \quad (2)$$

$$F = \frac{2}{3}x + 20 \quad (1)$$

$$F = \frac{6}{5}x + 68 \quad (4)$$

$$\frac{9}{5}F = \frac{2}{3}x - 12 \quad (3)$$

۱۳۶- دمای یک جسم را از $\frac{200}{9}$ درجه سلسیوس، 20° درجه سلسیوس افزایش می‌دهیم. دمای این جسم در مقیاس فارنهایت چند درصد افزایش یافته است؟

۴۰ (۲)

۳۶ (۱)

۹۰ (۴)

۵۰ (۳)

۱۳۷- کمترین و بیشترین دمای ثبت شده بر روی کره زمین $184K$ در قطب جنوب و $344K$ در کویر لوت است. اختلاف این دو دما چند درجه فارنهایت است؟

است؟

۴۴ (۲)

۱۶۰ (۱)

۱۴۴ (۴)

۲۸۸ (۳)

۱۳۸- دماسنجد که به صورت خطی مدرج شده است، در فشار atm ۱، دمای نقطه جوش آب را 140° و دمای نقطه ذوب بین را 20° نشان می‌دهد. در چه دمایی

(برحسب درجه سلسیوس)، این دماسنجد عدد دما را برابر با دماسنجد سلسیوس نشان می‌دهد؟

۱۰۰ (۲)

۴۰ (۱)

-۱۰۰ (۴)

-۴۰ (۳)

۱۳۹- اگر دمای جسمی برحسب کلوین، دو برابر شود، برحسب درجه سلسیوس، کدام رابطه همواره صحیح است؟ (θ_1 دمای اولیه و θ_2 دمای نهایی جسم

برحسب درجه سلسیوس هستند، 0° و صفر کلوین، -273°C است.)

$$1 < \frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 2 \quad (2)$$

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} > 2 \quad (1)$$

۴) هیچ کدام از گزینه‌ها، همواره صحیح نیست.

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 1 \quad (3)$$

۱۴۰- در فشار atm ۱، دماسنجد که به صورت خطی مدرج شده است، دمای 20°C را 80° درجه و دمای 24°C را 150° درجه نشان می‌دهد. در همین فشار،

این دماسنجد دمای نقطه جوش آب را چند درجه نشان می‌دهد؟

۱۰۰ (۲)

۵۰ (۱)

۲۰۰ (۴)

۱۵۰ (۳)



۲۵ دقیقه
ردیای گازها در زندگی
فصل ۲ از ابتدای چه بر سر هواکره می‌آوریم؟ تاپیان خواص و رفتار گازها

صفحه‌های ۶۸ تا ۸۴

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس شیمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

شیمی (۱)

۱۴۱ - پاسخ صحیح پرسش‌های «آ»، «ب» و «پ» به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

آ) گازهای نیتروژن و اکسیژن در چه شرایطی با هم واکنش می‌دهند؟

ب) واکنش تبدیل گاز اوزون به گاز اکسیژن چگونه است؟

پ) گاز N₂ که اصلی‌ترین جزء سازنده هواکره است، دارای کدام ویژگی است؟

(۱) دمای کم-برگشت‌ناپذیر- واکنش‌پذیری زیاد

(۲) دمای بالا- برگشت‌پذیر- واکنش‌پذیری کم

۱۴۲ - کدام‌یک از گزینه‌های زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟ (گزینه‌ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید).

«مایع‌ها جامد‌ها »

(۱) همانند - تراکم‌پذیرند

(۲) برخلاف - تراکم‌ناپذیرند

(۳) همانند - تراکم‌ناپذیرند

(۴) برخلاف - تراکم‌پذیرند

۱۴۳ - حجم یک نمونه گاز به چه تعداد از موارد زیر وابسته نیست؟

«مول- فشار- جرم مولی- جرم- دما- جنس گاز »

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۳

۱۴۴ - با توجه به جدول داده شده به جای × کدام عدد باید نوشته شود؟ (شرایط دو گاز یکسان است). (C=۱۲, O=۱۶: g.mol^{-۱})

فرمول گاز	CO _۲	O _۲
مول (mol)	۰/۲۵	۰/۲۵
حجم (L)	۵/۶	۵/۶
جرم (g)	۱۱/۰	x

(۱) ۱۱/۰

(۲) ۱۶/۰

(۳) ۸/۰

(۴) ۴/۰

۱۴۵ - چند مورد از عبارت‌های زیر صحیح هستند؟

• افزایش میانگین دمای کره زمین سبب شده تا شرایط آب و هوایی در نقاط گوناگون زمین تغییر کند.

• دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند دمای کره زمین تا سال ۲۱۰۰ بین ۱/۸ تا ۴ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.

• شواهد نشان می‌دهند که فصل بهار در نیمکره شمالی زمین، نسبت به ۵۰ سال گذشته در حدود یک ماه زودتر آغاز می‌شود.

• میانگین جهانی دمای سطح زمین از سال ۱۸۵۰ تا سال ۲۰۰۰ به طور پیوسته افزایش یافته است.

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۱

(۴) ۳

۱۴۶ - کدام گزینه جاهای خالی را به درستی کامل می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

الف) وجود گاز در هوایی که تنفس می‌کیم، سبب آسیب رساندن به ریه‌ها و سوزش چشم‌ها می‌شود.

ب) هوای آلوده کلانشهرها که اغلب به رنگ قهوه‌ای روشن است ناشی از وجود گاز در آن است.

پ) اکسیدهای عنصر در هنگام رعد و برق در هوا شکل می‌گیرند.

(۱) نیتروژن دی‌اکسید - اوزون - نیتروژن

(۲) اوزون - نیتروژن مونوکسید - کربن

(۳) نیتروژن مونوکسید - نیتروژن دی‌اکسید - نیتروژن

(۴) اوزون - نیتروژن دی‌اکسید - کربن



۱۴۷- در میان سوخت‌های «بنزین، زغال‌سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی» بهترین از راست به چپ، استفاده از کدام سوخت آلاینده‌های بیشتری ایجاد می‌کند و

$$\text{کدام سوخت پس از گاز طبیعی، گرمای بیشتری بر حسب کیلوژول بر گرم} \left(\frac{\text{kJ}}{\text{g}} \right) \text{ آزاد می‌کند؟}$$

- (۱) زغال‌سنگ - هیدروژن
 (۲) زغال‌سنگ - بنزین
 (۳) بنزین - هیدروژن
 (۴) بنزین - بنزین

۱۴۸- تمامی گزینه‌های زیر نادرست‌اند، به جزء:

(۱) در استفاده از منابع تولید برق، انرژی خورشید دلایل کربن‌دی‌اکسید کمتری نسبت به باد در تولید مقدار برق یکسان بر جای خواهد گذاشت.

(۲) اگر هواکره وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین به میزان 18°C کاهش پیدا می‌کرد.

(۳) یکی از راه‌های به حداقل رساندن اثرات کربن‌دی‌اکسید، رها کردن گاز CO_2 تولید شده در ارتفاعات بالای هواکره است.

(۴) دگرشکل (آلوتروب) به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می‌شود.

۱۴۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف) ماده به حالت گاز، شکل و حجم معینی ندارد و به شکل ظرف محتوی آن درمی‌آید.

ب) شکل و حجم ماده جامد به شکل ظرف محتوی آن بستگی ندارد.

پ) شکل یک نمونه مایع به شکل ظرف محتوی آن وابسته است.

(۱) ۳
 (۲) ۲
 (۳) ۱
 (۴) صفر

۱۵۰- فردی بالغ به طور میانگین ۱۶ بار در دقیقه نفس می‌کشد و هر بار $7/0$ لیتر هوا وارد ریه‌هایش می‌شود. در یک شبانه‌روز چند مول هوا وارد ریه‌های این

شخص می‌شود؟ (شرایط را STP در نظر بگیرید و هر شبانه‌روز را ۲۴ ساعت در نظر بگیرید).

(۱) ۱۰۲۸
 (۲) ۳۶۰
 (۳) ۷۲۰
 (۴) ۱۲۰





۱۵۱- چه تعداد از ویژگی‌های زیر بین سوخت‌های سبز و پلاستیک‌های سبز مشترک است؟

الف) زیست تخریب پذیرند.
 (ب) در ساختار خود اکسیژن دارند.





ت) از مواد گیاهی ساخته می‌شوند.
 (پ) ساختار پلیمری دارند.

(۱) ۴
 (۲) ۳
 (۳) ۲
 (۴) ۱

۱۵۲- کدامیک از واکنش‌های زیر مربوط به تشکیل اوزون تروپوسفری است؟



۱۵۳- کدامیک از نمودارهای زیر ارتباط بین مول و حجم گازها در دما و فشار ثابت را به درستی نشان می‌دهد؟



روزبه امین‌تفوشی (رقبه ۵ کشوری ۱۳۹۷): بعد از آزمون حتماً ارزیابی انجام داده و اشکالات خود را به صورت عمیق و دقیق رفع نمایید.



۱۵۴ - کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ ($\text{He} = 4, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) شیمیدان‌ها دمای 273K و فشار یک اتمسفر را به عنوان شرایط STP در نظر گرفته‌اند.
- (۲) قرار دادن بادکنک‌های پر شده از هوا درون نیتروژن مایع سبب می‌شود که حجم آنها به شدت کاهش یابد.
- (۳) همواره حجم ۲ گرم گاز هلیم با حجم ۲۴ گرم گاز اوزون با هم یکسان و برابر $11/2$ لیتر است.
- (۴) برای توصیف یک نمونه گاز افزون بر مقدار، باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.

۱۵۵ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در مولکول اوزون برابر با $\frac{3}{5}$ است.
- (۲) گاز اوزون در هواکره به مقدار فراوان یافت می‌شود.
- (۳) اوزون نسبت به اکسیژن در دمای بالاتری به مایع تبدیل می‌شود.
- (۴) اکسیژن نسبت به اوزون واکنش پذیری بیشتری دارد.

۱۵۶ - در سیلندری با پیستون متحرک به حجم ۲ لیتر، ۳ مول گاز نیتروژن دارای فشاری ۲ اتمسفر می‌باشد. اگر دمای گاز درون ظرف را بر حسب کلوین ۲ برابر کنیم، حجم گاز و فشار آن چگونه تغییر می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

- (۲) نصف می‌شود - دو برابر می‌شود
- (۴) تغییر نمی‌کند - نصف می‌شود
- (۱) دو برابر می‌شود - دو برابر می‌شود
- (۳) دو برابر می‌شود - تغییر نمی‌کند

۱۵۷ - کدامیک از گزینه‌های زیر تعریف درستی از قانون آووگادرو می‌باشد؟

- (۱) در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.
- (۲) در دما و فشار یکسان، یک مول از گازهای مختلف حجمی معادل $22/4$ لیتر دارد.
- (۳) در حجم و دمای یکسان، یک مول از گازهای مختلف فشار یکسانی ایجاد می‌کنند.
- (۴) در دمای یکسان، برای یک نمونه گاز تغییرات حجم رابطه وارونه با تغییرات فشار دارد.

۱۵۸ - چه تعداد از نمودارهای زیر درباره کمیت‌های مطرح شده درست رسم شده‌اند؟



۱)

۳)

۱۵۹ - اگر در یک شهر که شامل ۱۰۰۰۰ خانه است، برق مصرفی هر خانه به طور میانگین X کیلووات ساعت در ماه باشد و در صورتی که منبع تولید برق، زغال‌سنگ بوده و به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق مقدار $9/6 \text{ kg}$ کربن‌دی‌اکسید تولید کند، برای تصفیه کربن‌دی‌اکسید تولید شده در یک سال، این شهر به چند درخت احتیاج دارد؟ (فرض کنید هر درخت سالانه 12 kg کربن‌دی‌اکسید مصرف می‌کند).

- (۱) $6000X$
- (۲) $6000X/2$
- (۳) $9000X$
- (۴) $5000X$

۱۶۰ - اگر فرض کنیم هوا فقط شامل گازهای نیتروژن و اکسیژن به ترتیب با درصد حجمی 80 و 20 درصد باشد، در 112 لیتر هوا در شرایط STP چند پیوند کووالانسی بین اتم‌ها وجود دارد؟ ($N_A = 14N_{\text{A}}$)

- (۱) $14N_A$
- (۲) $4N_A$
- (۳) $10N_A$
- (۴) $11N_A$



۲۵ دقیقه

ردپای گازها در زندگی

فصل ۲ از ابتدای چه برس هواکره می‌آوریم؟ تا پایان اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره

صفحه‌های ۶۸ تا ۸۱

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقب‌تر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

شیمی (۱)

۱۶۱- پاسخ صحیح پرسش‌های «الف» و «ب» به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

آ) گازهای نیتروژن و اکسیژن در چه شرایطی با هم واکنش می‌دهند؟

ب) گاز N₂ که اصلی ترین جزء سازنده هواکره است، دارای کدام ویژگی است؟

(۲) دمای بالا- واکنش پذیری زیاد

(۴) دمای بالا- واکنش پذیری کم

۱۶۲- کدام گزینه جاهای خالی را به درستی کامل می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

الف) وجود گاز در هوایی که تنفس می‌کیم، سبب آسیب رساندن به ریه‌ها و سوزش چشم‌ها می‌شود.

ب) هوای آلوده کلانشهرها که اغلب به رنگ قهوه‌ای روشن است ناشی از وجود گاز در آن است.

پ) اکسیدهای عنصر در هنگام رعد و برق در هوای شکل می‌گیرند.

(۲) اوزون - نیتروژن مونوکسید - کربن

(۴) اوزون - نیتروژن دی‌اکسید - نیتروژن

نیتروژن دی‌اکسید - اوزون - نیتروژن

نیتروژن مونوکسید - نیتروژن دی‌اکسید - کربن

۱۶۳- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی‌کند؟

«سوخت سبز سوختی است که»

(۱) از پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه‌های روغی به دست می‌آید.

(۲) در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارد.

(۳) به وسیله جانداران ذره‌بینی به مواد ساده‌تر تجزیه می‌شود.

(۴) اتانول و روغن‌های گیاهی را می‌توان نمونه‌هایی از آن دانست.

۱۶۴- کدام‌یک از گزینه‌های زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«توسعه پایدار یعنی این‌که در تولید هر فراورده، همه گزینه‌های، و آن در نظر گرفته شود.»

(۲) اقتصادی- اجتماعی- زیست محیطی

زیست محیطی- اجتماعی- فرهنگی

(۴) اقتصادی- زیست محیطی- سیاسی

زیست محیطی- سیاسی- اجتماعی

۱۶۵- در میان فراورده‌های حاصل از سوختن کدام‌یک از سوخت‌های زیر، گوگرد دی‌اکسید تولید می‌شود؟

(۲) گاز طبیعی

هیدروژن

(۴) بنزین

زغال سنگ

۱۶۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف) ردپای کربن دی‌اکسید نشان می‌دهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز تولید و وارد هواکره می‌شود.

ب) یکی از راهکارهای کاهش رد پای کربن دی‌اکسید، ایجاد کمرندهای سبز در شهرها، شهرک‌های صنعتی و روستاهای است.

پ) نقش هواکره برای کره زمین همانند نقش لایه پلاستیکی برای گلخانه است.

ت) پس از تابش پرتوهای خورشیدی به سمت زمین، پیش از رسیدن پرتوها به زمین، بخشی از پرتوها بازتابیده شده و به فضا بر می‌گردد.

(۱) ۲


۱

(۴) ۴

۳

۱۶۷- یکی از راهکارهای شیمی سبز برای محافظت از هواکره، تبدیل کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی به مواد معدنی است. کدام‌یک از

موارد زیر، واکنش‌هایی انجام شده را به درستی نشان می‌دهد؟



(۴) پ و ت

۳ ب و ت

۲ ب و ت


۱) الف و ت



۱۶۸- عبارت بیان شده در کدامیک از گزینه‌های زیر، از ویژگی‌های پلاستیک‌های سبز می‌باشد؟

- (۱) پلیمرهایی زیست تخریب‌ناپذیر هستند.
- (۲) بر پایه مواد جانوری و گیاهی مانند نشاسته ساخته می‌شوند.
- (۳) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می‌شوند و به طبیعت بازی گردند.
- (۴) قیمت تمام شده تولید این پلاستیک‌ها کمتر از قیمت تمام شده تولید پلاستیک‌ها با پایه نفتی است.

۱۶۹- چه تعداد از نمودارهای زیر درباره کمیت‌های مطرح شده درست رسم شده‌اند؟



۱۷۰- در میان سوخت‌های «بنزین، زغال‌سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی» بهترتب از راست به چپ، استفاده از کدام سوخت آلینده‌های بیشتری ایجاد می‌کند و

کدام سوخت پس از گاز طبیعی، گرمای بیشتری بر حسب کیلوژول بر گرم ($\frac{\text{kJ}}{\text{g}}$) آزاد می‌کند؟

- (۱) زغال‌سنگ - هیدروژن
- (۲) زغال‌سنگ - بنزین
- (۳) بنزین - هیدروژن
- (۴) بنزین - بنزین

۱۷۱- چند مورد از عبارت‌های زیر صحیح هستند؟

- افزایش میانگین دمای کره زمین سبب شده تا شرایط آب و هوایی در نقاط گوناگون زمین تغییر کند.
- دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند دمای کره زمین تا سال ۲۱۰۰ بین $1/8$ تا 4 درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.
- شواهد نشان می‌دهند که فصل بهار در نیمکره شمالی زمین، نسبت به 5° سال گذشته در حدود یک ماه زودتر آغاز می‌شود.
- میانگین جهانی دمای سطح زمین از سال ۱۸۵۰ تا سال ۲۰۰۰ به طور پیوسته افزایش یافته است.





۱

۲


۳

۴

۱۷۲- کدامیک از واکنش‌های زیر مربوط به تشکیل اوزون تروپوسفری است؟



۱۷۳- در میان نمودارهای زیر، کدامیک تغییرات دمای درون و بیرون یک گلخانه را در یک روز می‌ستانی بهترتب از راست به چپ به درستی نشان می‌دهد؟





۱۷۴- تمامی گزینه‌های زیر صحیح‌اند به جز?

- (۱) در باتری‌های قابل شارژ، واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر رخ می‌دهد.
- (۲) اصطلاح لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر می‌گویند که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد.
- (۳) مولکول‌های اوزون، مانع ورود تابش‌های فرابنفش خورشید به سطح زمین می‌شود تا موجودات زنده از اثرات زیانبار این تابش در امان بمانند.
- (۴) در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه‌ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره‌بینی درون آب استفاده می‌شود.

۱۷۵- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با پرتوهای تابیده شده از خورشید به زمین نادرست است؟

- (۱) بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله هواکره جذب می‌شود.
- (۲) زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد.
- (۳) بخش عمدۀ‌ای از این پرتوها به وسیله زمین جذب می‌شود.
- (۴) طول موج پرتوهای گسیل شده از زمین، کوتاه‌تر از طول موج پرتوهای تابیده شده از خورشید به زمین است.

۱۷۶- کدام گزینه صحیح است؟


- (۱) نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در مولکول اوزون برابر با $\frac{3}{5}$ است.
- (۲) گاز اوزون در هواکره به مقدار فراوان یافت می‌شود.
- (۳) اوزون نسبت به اکسیژن در دمای بالاتری به مایع تبدیل می‌شود.
- (۴) اکسیژن نسبت به اوزون واکنش‌پذیری بیشتری دارد.

۱۷۷- تمامی گزینه‌های زیر نادرست‌اند، به جز?

- (۱) در استفاده از منابع تولید برق، انرژی خورشید را بدین دلیل که این را بر جای خواهد گذاشت.
- (۲) اگر هواکره وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین به میزان 18°C کاهش پیدا می‌کرد.
- (۳) یکی از راه‌های به حداقل رساندن اثرات کربن‌دی‌اکسید، رها کردن گاز CO_2 تولید شده در هواکره است.
- (۴) دگرشکل (آلتوروب) به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می‌شود.

- ۱۷۸- اگر در یک شهر که شامل ۱۰۰۰۰ خانه است، برق مصرفی هر خانه به طور میانگین 6 kWe کیلووات ساعت در ماه باشد و در صورتی که منبع تولید برق، زغال‌سنگ بوده و به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق مقدار 9 kg کربن‌دی‌اکسید تولید کند، برای تصفیه کربن‌دی‌اکسید تولید شده در یک سال، این شهر به چند درخت احتیاج دارد؟ (فرض کنید هر درخت سالانه 12 kg کربن‌دی‌اکسید مصرف می‌کند).

- (۱) $6000\text{ X}^{(2)}$
 (۲) $5000\text{ X}^{(4)}$
 (۳) $9000\text{ X}^{(3)}$



۱۷۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر درباره واکنش روبه‌رو صحیح است؟

الف) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد پس از موازنۀ واکنش، برابر ۶ است.

ب) این واکنش تنها هنگام رعد و برق و در دماه‌های بالا انجام می‌شود.

پ) در این واکنش تمامی مواد شرکت کننده در واکنش حالت فیزیکی گازی دارند.

ت) در ساختار فراورده حاصل از واکنش، همه اتم‌ها به آرایش هشت‌تایی رسیده‌اند.

(۱) ۴ (۲) ۳

(۳) ۱ (۴) ۲

۱۸۰- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با واکنش روبه‌رو درست است؟

- (۱) در لایه اوزون واکنش (۱) بیشتر از واکنش (۲) رخ می‌دهد.
- (۲) به چنین واکنش‌هایی که در آن مقدار واکنش‌دهنده‌ها با فراورده‌ها برابر است، برگشت‌پذیر می‌گویند.
- (۳) در لایه اوزون، واکنش برگشت‌بیشتر از واکنش رفت رخ می‌دهد.
- (۴) با توجه به نحوه انجام این واکنش، نقش محافظتی و ثابت ماندن مقدار اوزون در لایه اوزون توجیه می‌شود.

کارنامه اشتباهات شما در آزمون، یادگیری‌های ناقص شما را مشخص کرده و می‌توانید آن را به **نقاط قوت** خود تبدیل کنید.

دانش آموزان گرامی؛ لطفاً در هنگام پاسخ‌گویی به سؤال‌های زیر، به شماره سؤال‌ها دقت کنید.

پشتیبان

تماس تلفنی پشتیبان

- ۲۹۰ آیا پشتیبان شما از آزمون گذشته تاکنون با شما تماس تلفنی گرفته است؟
- (۱) خیر، ایشان تماس تلفنی نگرفتند.
 - (۲) بله، ایشان تماس تلفنی گرفتند.
 - (۳) بله، تماس تلفنی ایشان از لحظه زمانی (در حد ۵ دقیقه) واز لحظه محتوا در حد خوب و کافی بود.
 - (۴) بله، تماس تلفنی ایشان از لحظه زمانی (بیش از ۵ دقیقه) واز لحظه محتوا در حد عالی بود.

تماس تلفنی: چه زمانی؟

- ۲۹۱ پشتیبان چه زمانی با شما تماس گرفت؟
- (۱) در زمان مناسب طبق توافق قبلی (قبل از مورد روز و ساعت تماس توافق کرده بودیم)
 - (۲) در زمان مناسب تماس گرفت (بینه قبل از آزمون) تماس گرفت.
 - (۳) در روز پنج شنبه (روز قبل از آزمون) تماس گرفت.
 - (۴) در روز با ساعت نامناسب تماس گرفت.

تماس تلفنی: چند دقیقه؟

- ۲۹۲ پشتیبان شما چند دقیقه با شما تماس تلفنی داشت؟
- (۱) یک دقیقه تا سه دقیقه
 - (۲) ۳ دقیقه تا ۵ دقیقه
 - (۳) بین ۵ تا ۱۰ دقیقه
 - (۴) بیش از ۱۰ دقیقه

کلاس رفع اشکال

- ۲۹۳ آیا در کلاس رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنید؟
- (۱) بله، امروز در کلاس رفع اشکال پشتیبان خودم شرکت خواهم کرد.
 - (۲) بله، در کلاس پشتیبان دیگر شرکت خواهم کرد (زیرا به آن درس نیاز بیش تری دارم)
 - (۳) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار می کند اما من امروز شرکت نمی کنم.
 - (۴) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار نمی کند.

شروع به موقع

- ۲۹۴ آیا آزمون در حوزه‌ی شما به موقع شروع می شود؟
- (۱) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقatt آغاز می شود.
 - (۲) پاسخ‌گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی شود.
 - (۳) پاسخ‌گویی به سؤال‌های علمی رأس ساعت آغاز نمی شود.
 - (۴) در هر دو مورد بی‌نظمی وجود دارد.

متاخرین

- ۲۹۵ آیا داشت آموزان متاخر در محل جداگانه متوقف می شوند؟
- (۱) خیر، متاسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متاخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.
 - (۲) این موضوع تا حدودی رعایت می شود اما نه به طور کامل
 - (۳) بله، افراد متاخر ابتدا متوقف می شوند و بعداً وارد حوزه می شوند اما در هنگام ورود، سروصدای همراه ایجاد می شود.
 - (۴) بله، افراد متاخر بعداً وارد حوزه می شوند ضمناً برای آنان محل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و بی‌نظمی و سروصدای ایجاد نمی شود.

مراقبان

- ۲۹۶ عملکرد و جدبیت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟
- | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------|
| (۱) خیلی خوب | (۲) خوب | (۳) متوسط | (۴) ضعیف |
|--------------|---------|-----------|----------|

پایان آزمون - ترک حوزه

- ۲۹۷ آیا در حوزه‌ی شما به داوطلبان قبل از پایان آزمون اجازه‌ی خروج زودهنگام داده می شود؟
- (۱) بله، قبل از پایان آزمون اجازه‌ی ترک حوزه داده می شود.
 - (۲) گاهی اوقات
 - (۳) به ندرت
 - (۴) خیر، هیچ‌گاه

ارزیابی آزمون امروز

- ۲۹۸ به طور کلی کیفیت برگزاری آزمون امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟
- | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------|
| (۱) خیلی خوب | (۲) خوب | (۳) متوسط | (۴) ضعیف |
|--------------|---------|-----------|----------|

: پاسخ نامه (کلید) آزمون ۱۳۹۷ اسفند ۱۳ گروه دهم ریاضی دفترچه

1	□ □ □ ✓	51	□ □ □ □ ✓	101	□ □ □ □ ✓	151	□ □ □
2	✓ □ □	52	□ □ □ □ ✓	102	□ □ □ □ ✓	152	□ □ □
3	□ □ □ ✓	53	□ □ □ □ ✓	103	□ □ □ □ ✓	153	✓ □ □
4	□ □ □ ✓	54	✓ □ □ □	104	□ □ □ □ ✓	154	□ □ □ ✓
5	□ □ □ ✓	55	□ □ □ □ ✓	105	✓ □ □ □	155	□ □ □ ✓
6	□ □ □ ✓	56	□ □ □ □ ✓	106	□ □ □ □ ✓	156	□ □ □ ✓
7	□ □ □ ✓	57	□ □ □ □ ✓	107	□ □ □ □ ✓	157	✓ □ □
8	□ □ □ ✓	58	✓ □ □ □	108	□ □ □ □ ✓	158	□ □ □ ✓
9	✓ □ □	59	□ □ □ □ ✓	109	□ □ □ □ ✓	159	□ □ □ ✓
10	□ □ □ ✓	60	✓ □ □ □	110	□ □ □ □ ✓	160	✓ □ □
11	✓ □ □	61	□ □ □ □ ✓	111	□ □ □ □ ✓	161	□ □ □ ✓
12	□ □ □ ✓	62	✓ □ □ □	112	✓ □ □ □	162	□ □ □ ✓
13	✓ □ □	63	✓ □ □ □	113	✓ □ □ □	163	✓ □ □
14	✓ □ □	64	✓ □ □ □	114	□ □ □ □ ✓	164	□ □ □ ✓
15	□ □ □ ✓	65	□ □ □ □ ✓	115	□ □ □ □ ✓	165	□ □ □ ✓
16	□ □ □ ✓	66	✓ □ □ □	116	□ □ □ □ ✓	166	□ □ □ ✓
17	□ □ □ ✓	67	□ □ □ □ ✓	117	✓ □ □ □	167	□ □ □ ✓
18	✓ □ □	68	□ □ □ □ ✓	118	✓ □ □ □	168	□ □ □ ✓
19	□ □ □ ✓	69	✓ □ □ □	119	□ □ □ □ ✓	169	✓ □ □
20	□ □ □ ✓	70	✓ □ □ □	120	□ □ □ □ ✓	170	□ □ □ ✓
21	✓ □ □	71	□ □ □ □ ✓	121	□ □ □ □ ✓	171	✓ □ □
22	✓ □ □	72	□ □ □ □ ✓	122	□ □ □ □ ✓	172	✓ □ □
23	□ □ □ ✓	73	□ □ □ □ ✓	123	□ □ □ □ ✓	173	□ □ □ ✓
24	□ □ □ ✓	74	□ □ □ □ ✓	124	□ □ □ □ ✓	174	□ □ □ ✓
25	✓ □ □	75	□ □ □ □ ✓	125	□ □ □ □ ✓	175	□ □ □ ✓
26	□ □ □ ✓	76	□ □ □ □ ✓	126	✓ □ □ □	176	□ □ □ ✓
27	□ □ □ ✓	77	✓ □ □ □	127	□ □ □ □ ✓	177	□ □ □ ✓
28	✓ □ □	78	✓ □ □ □	128	✓ □ □ □	178	□ □ □ ✓
29	□ □ □ ✓	79	✓ □ □ □	129	✓ □ □ □	179	□ □ □ ✓
30	□ □ □ ✓	80	□ □ □ □ ✓	130	✓ □ □ □	180	□ □ □ ✓
31	✓ □ □	81	✓ □ □ □	131	□ □ □ □ ✓		
32	✓ □ □	82	□ □ □ □ ✓	132	✓ □ □ □		
33	✓ □ □	83	✓ □ □ □	133	✓ □ □ □		
34	✓ □ □	84	□ □ □ □ ✓	134	□ □ □ □ ✓		
35	□ □ □ ✓	85	□ □ □ □ ✓	135	□ □ □ □ ✓		
36	✓ □ □	86	✓ □ □ □	136	□ □ □ □ ✓		
37	□ □ □ ✓	87	□ □ □ □ ✓	137	□ □ □ □ ✓		
38	□ □ □ ✓	88	□ □ □ □ ✓	138	□ □ □ □ ✓		
39	✓ □ □	89	□ □ □ □ ✓	139	□ □ □ □ ✓		
40	□ □ □ ✓	90	✓ □ □ □	140	□ □ □ □ ✓		
41	□ □ □ ✓	91	✓ □ □ □	141	□ □ □ □ ✓		
42	✓ □ □	92	□ □ □ □ ✓	142	✓ □ □ □		
43	□ □ □ ✓	93	✓ □ □ □	143	✓ □ □ □		
44	✓ □ □	94	□ □ □ □ ✓	144	□ □ □ □ ✓		
45	✓ □ □	95	□ □ □ □ ✓	145	□ □ □ □ ✓		
46	✓ □ □	96	✓ □ □ □	146	□ □ □ □ ✓		
47	✓ □ □	97	□ □ □ □ ✓	147	□ □ □ □ ✓		
48	□ □ □ ✓	98	✓ □ □ □	148	□ □ □ □ ✓		
49	□ □ □ ✓	99	□ □ □ □ ✓	149	✓ □ □ □		
50	✓ □ □	100	□ □ □ □ ✓	150	□ □ □ □ ✓		

سایت کنکور

Konkur.in



دفترچه پاسخ آزمون

۹۷ اسفندماه

دهم ریاضی

طراحان

فارسی و نگارش	افسانه احمدی - حبید اصفهانی - سپهر حسن خان پور - آکیتا محمدزاده
عربی زبان قرآن	درویشعلی ابراهیمی - مریم آقایاری - فرشته کیانی - رضا مقصومی
دین و زندگی	محبوبه ابسم - فردین سماقی - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کیمی - محمد مقدم
زبان انگلیسی	میرحسین زاهدی - علی شکوهی - علی اعشوری
ریاضی	علی ارجمند - عیباس اسدی امیرآبادی - علی رضا پورقایی - حسن تهاجمی - عاطفه خان محمدی - ابراهیم نجفی - امین نصرالله - سهند ولیزاده
هندسه	امیرحسین ابومحبوب - محمد بعیرانی - زهره رامشینی - علی فتح آبادی - نوید معیدی - فرشاد مهرافشان
فیزیک	زهرا احمدیان - خسرو ارغوانی فرد - محمد باغانی - اشکان برزکار - محمد جنگجو - اسماعیل حدادی - لیلا حسن زاده - سasan خبری - سیامک خبری - زهرا رامشینی - فرشید رسولی - مصطفی کیانی - مهدی میرابزاده - سید علی میرنوری - سید جلال میری
شیمی	محبوبه بیک محمدی عینی - بهزاد تقی زاده - پیمان خواجهی مجد - حسن رحمتی کوکنده - مانا زمان - منصور سلیمانی ملکان - حسین سلیمی - رسول عابدینی زواره - محمد عظیمیان زواره - کامران کیمتری - محمد جواد محسنی - سعید نوری - اشکان وندانی

گزینشگاران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	گزینشگر و مسئول درس	گروه ویراستاری	بازبینی نهایی	مسئول درس مستندسازی
فارسی و نگارش	حبید اصفهانی	سپهر حسن خان پور		الناز معتمدی
عربی زبان قرآن	رضا مقصومی	فرشته کیانی - سید محمد علی مرتضوی		محدثه پرهیز کار
دین و زندگی	حامد دورانی	صالح احصائی - سید احسان هندی		آرزو بالازاده
زبان انگلیسی	سپیده عرب	آناهیتا اصغری - فربیا توکلی		فاطمه فلاحت پیشه
ریاضی	امین نصرالله	مهران حسینی - ندا صالح پور - سید محمد علی مرتضوی	عاطفه خان محمدی	حیدر رضا رحیم خانلو
هندسه	امیرحسین ابومحبوب	ندا صالح پور - فرشاد فرامرزی	سید سروش کریمی مداحی	سمیه اسکندری
فیزیک	اشکان برزکار	سید امیرحسین اسلامی - محمد باغانی - اسماعیل حدادی	زهرا رامشینی	آتنه اسفندیاری
شیمی	حسین سلیمی	علی حسنی صفت - حسن رحمتی کوکنده	سعید آذر حزین	الهه شهبازی

گروه فنی و تولید

مدیران گروه	سید محمد علی مرتضوی (عمومی) - منصوره شاعری (اختصاصی)
مسئولین دفترچه	معصومه شاعری (عمومی) - منصوره شاعری (اختصاصی)
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: مریم صالحی مسئولین دفترچه: فرزانه خاکپاش (اختصاصی) - فاطمه فلاحت پیشه (عمومی)
حروف نگاری و صفحه آرایی	مهران رجبعلی (اختصاصی) - فاطمه علی یاری (عمومی)
ناظر چاپ	علیرضا سعدآبادی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



(آگیتا ممفرزاده)

-۶

بازگردانی ابیات:

(الف) در عبارت «آن کس که خلق به فصلش همه اقرار دهد، شاه جهان را به همه فضل اقرار دهد»، «خلق» نهاد فعل «اقرار دهد» نخست است.

(ب) در عبارت «از بس که ملک، لشکر کفار (را) شکسته است، کفار پراکنده و برکنده شده‌اند»، «ملک» نهاد فعل «شکسته است» است.

(ج) در عبارت «او پیوسته پیکار همی جوید ولیکن کس نیست که با لشکر او پیکار جوید»، «کس» نهاد فعل «نیست» است.

(د) در عبارت «دشوارِ جهان، نزد ملک، آسان باشد و آسانِ ملک، نزد همه گیتی، دشوار (باشد) است»، «دشوار» نخست، نهاد فعل آشکار «باشد» است.

(ه) در عبارت «دینار (را) چنان بخشد»، واژه‌ی «دینار» مفعول است.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۸۵ کتاب فارسی)

(آگیتا ممفرزاده)

-۷

بیت گزینه‌ی «۴» تعدادی جمله‌ی ساده و مستقل دارد. در دیگر ابیات جمله‌ی غیرساده هست:

گزینه‌ی «۱»: من بیابانی به پیش گرفتم که اندر آن، از نهیب دیو، هر زمان، دل، خوناب می‌گشت.

گزینه‌ی «۲»: از آن درازی راه هر ساعت با دل می‌گفتم که برای این بیابان، کرانی پیدا نخواهد بود.

گزینه‌ی «۳»: در این اندیشه بودم که از کنار شهر «بست»، بانگ آب هیرمند ناگهان به گوشم آمد.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۸۰ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۸

در بیت صورت سؤال، شاعر خود را به مگسی مانند کرده است که شوخ‌چشمی کرده است، ولی دشمن او را با ملامت‌های خود، که همچون مگس‌ران بوده است، آزرده است.

(آرایه‌های ادبی، مشابه صفحه‌ی ۸۲ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۹

در بیت گزینه‌ی «۱» نیز مثل مصراع صورت سؤال، شاعر به یکتایی خداوند اشاره می‌کند.

(مفهوم، صفحه‌ی ۸۳ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۱۰

در بیت گزینه‌ی «۳»، مثل بیت صورت سؤال، شاعر از بقای محبت به یار در دل خود سخن می‌گوید.

(مفهوم، صفحه‌ی ۸۴ کتاب فارسی)

(اخسانه احمدی)

-۱

شاعر در بیت صورت سؤال می‌گوید که اگر در دیوار دلش نقشی از کینه و دشمنی وجود داشته است، آن را با گچ فراموشی پوشانده است. ترکیب‌های «دیوار دل» و «گچ نسیان» هر دو اضافه‌ی تشبيه‌ی است.

(واژه، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۲

تسوین: اسب سرکش / مهیب: ترسناک، هول آور / فراق: دوری، جدایی / تقریظ:

ستودن

(واژه، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۳

در عبارت گزینه‌ی «۳» «واژه‌ی «وقاحت» نادرست نوشته شده است.

(اما، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۴

وسایل سنگین راهسازی را بار شناورها کرده‌اند: ماضی نقلی

«تا ... آن‌ها را به آن سوی رودخانه‌ی ارونده حمل کنند: مضارع التزامی

«بچه‌ها نیز همان بچه‌های بی‌تكلف ... هستند: مضارع اخباری

«که همیشه در مسجد می‌بینی: مضارع اخباری

«تو گویی تا به حال درنمی‌یافتدای: ماضی نقلی

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۷۷ کتاب فارسی)

(آگیتا ممفرزاده)

-۵

در جمله‌های «عشق رسمیست» و «همه اندوه دل است»، نهاد در ابتداء و فعل در انتهای کلام آمده است. در دیگر ابیات مصراعی با شرط‌های پادشه و وجود ندارد.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌های ۸۵ و ۸۶ کتاب فارسی)



(مریم آقاباری)

-۱۶

ترجمه عبارت سؤال: «نمی‌افتد در بدی، جز انجام‌دهنده آن!» که با همه گزینه‌ها، به جز گزینه «۴» (شیطان فقط می‌خواهد که بین شما دشمنی و کینه بیندازد) هم‌مفهوم است.

ترجمه گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: هر کس برای برادرش چاهی بکند، (خود) در آن می‌افتد.
گزینه «۳»: هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می‌کند.

(مفهوم، درس ۵، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۷

آیه شریفه و بیت گزینه «۴» هر دو به این مفهوم اشاره دارند که «هر کسی طعم مرگ را می‌چشد و می‌میرد!»

(مفهوم، درس ۵، ترکیبی)

(رویشلن ابراهیمی)

-۱۸

در عبارت گزینه «۲» چون جمله به صورت فعلیه آمده است، خبر نداریم، زیرا خبر فقط در جمله‌های اسمیه وجود دارد.
در گزینه «۱» «تَفَيْدُ»، در گزینه «۳» «إِخْلَاصُ» و در گزینه «۴» «سَلْمَانٌ» خبرند.

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(مریم آقاباری)

-۱۹

«ملائس» مفعول است که هم مضاف برای ضمیر «تا» و هم موصوف برای «الخريفية» می‌باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: «أشجار» مفعولی است که فقط مضاف است. (مضاف‌الیه آن «التفاح» می‌باشد).

گزینه «۲»: « شيئاً» مفعولی است که فقط موصوف است. (صفت آن «أفضل» می‌باشد).

گزینه «۳»: «بنت» فاعل است که هم مضاف و هم موصوف می‌باشد؛ «الكتب» مفعول است ولی فقط موصوف است، مضاف نیست.

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(مریم آقاباری)

-۱۱

«قُلْ»: (فعل امر للمخاطب) بگو/ «سِيرُوا»: (فعل امر دوم شخص جمع) بگردید/ «فِي الْأَرْضِ»: در زمین/ «فَانظُرُوا»: پس بنگرید/ «كَيْفَ»: چگونه/ «بِدَا»: آغاز کرد/ «الْخَلَقَ»: (مفعول) آفرینش را

(ترجمه، درس ۵، صفحه ۴۷)

(رضا معصومی)

-۱۲

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: «الْتَقِيطُ» فعل امر و به معنای «عکس بگیر» صحیح است.
گزینه «۲»: «آیا ممکن است از مقالات این کتابخانه استفاده کنم؟!»
گزینه «۳»: «ينقصَ كم می‌شود»

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۳

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۲»: «المَحِيطُ»: اقیانوس
گزینه «۳»: «هر کس چیزی را خواست و تلاش کرد، پیدا کرد!»
گزینه «۴»: «كانَ يَسْاعِدُ»: کمک می‌کردند (در اینجا فعل با توجه به فاعل «الطلَّابُ»، جمع ترجمه می‌شود).

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(رویشلن ابراهیمی)

-۱۴

ترجمه صحیح گزینه «۲»: هشدار به حیوانات برای دور کردنشان از خطر، از وظایف زرافه است!
«إِعْادِهِمْ: دور کردنشان»

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(مریم آقاباری)

-۱۵

ترجمه کامل عبارت: «أَفْتَابَ بِرَسْتَ مَىْ تَوَانَدَ دُوْ چَشْمَشَ رَادَ جَهَتَهَاتِ مُخْتَلِفِ بَجْرَخَانَدَ بَدُونَ اِينَ كَه سَرَشَ رَاهَ حَرَكَتَ دَهَدَ!»
«الْحِرَباءُ»: آفتاب پرست/ «غَيْنَيَهَا»: دو چشمش/ «أَنْ تُحرِّكَ»: که حرکت دهد

(مفهوم، درس ۵، صفحه ۴۹)



(کتاب یامع)

-۲۶

این عبارت با فعل «بُرید» شروع شده است، پس جمله فعلیه است.
(انواع بملات)

(کتاب یامع)

-۲۷

«أَحْيَاهُ»: فاعل / **«مَائِيَةً»:** صفت برای فاعل
تشريح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۱»: «الصَّابَاحَةُ»: صفت مفعول
گزینه «۲»: «الْمُجَدُّ»: صفت مبتدا
گزینه «۳»: «الْعَرَبِيَّةُ»: صفت مضارف‌الیه

(قواعد)

ترجمه متن درک‌طلب:

مهمنای سه روز است و آن‌چه زیاد باشد، صدقه است و مهمنان باید بعد از سه روز روانه شود ... مردم نزد دوستش رفت و روزهای پی دری نزد وی ماند تا این‌که از اقامت طولانی‌ش احساس رنج کرد. در نتیجه چاره‌ای اندیشید تا از دست او رهایی یابد. پس شرکت در یک مسابقه‌ی پرش را برای تعیین شخص برنده به مهمنان پیشنهاد کرد. سپس به پرسش گفت: هنگامی که مهمنان به بیرون خانه پرید در را بین. هنگام مسابقه مهمنان یک متر کمتر از صاحب خانه پرید و گفت: یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!

(کتاب یامع)

-۲۸

ضربالمثل: یک گنجشک در دست بهتر از ده تا، روی درخت است!
نزدیک به معنای عبارت: **یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!**

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «هَرَكْسٌ بِهِ زِيَادٌ طَمْعٌ كَنَدٌ بِهِ كَمٌ (نیز) نمی‌رسد!»
گزینه «۳»: «بَهْتَرِينَ كَارِهَا مَتوسِطَتَرِينَ آنَ هَاسِت!»
گزینه «۴»: «سَلامَت زَنْدَگِي در مَدارا و سازَگَارِي است!»

(درک مطلب- مفهوم)

(کتاب یامع)

-۲۹

«عَلَى الضَّيْفِ بِالِّإِنْتِقالِ»: بر مهمنان است که نقل مکان کند.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بَايدَ فَارَغَ التَّحْصِيلَ شُود!» نادرست است.
گزینه «۲»: «بر اوست که تبدیل کنند!» نادرست است.
گزینه «۴»: «مهمنان باید جبران کنند!» نادرست است.

(درک مطلب- ترجمه)

(کتاب یامع)

-۳۰

الشَّخْصُ: مضارف‌الیه

(درک مطلب- انواع بملات)

(فرشته کیانی)

-۲۰

در گزینه «۳»، مبتدا وجود ندارد؛ چرا که مبتدا در جمله‌ای است که اسمیه باشد؛ اما این جمله فعلیه است.

در گزینه «۲»، **«أشَجَعُ»** اسم تفضیل است. (شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند)

در گزینه‌های دیگر، مبتدا به ترتیب عبارتند از:

گزینه «۱»: «اللَّهُ

گزینه «۲»: «أشَجَعُ

گزینه «۴»: «كُلُّ

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(کتاب یامع)

-۲۱

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «أيضاً: نيز» ترجمه نشده است.

گزینه «۲»: «حيوانات اغلب ... توان ...» نادرست است.

گزینه «۴»: «... که عموماً ... پیام ... دریافت کنند!» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۲

صورت صحیح ترجمه این گزینه: **تاریکی اعماق اقیانوس را به روزی روش تبدیل می‌کند!**

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۳

«آن تحرک»: که حرکت دهد

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۴

در عبارت اصلی، محل زندگی خاقانی (به عنوان جواب این سوال) ذکر نشده است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۵

«خردمند، سخن کسی را که بسیار دروغ می‌گوید باور می‌کند!» (خطا)

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: رنگ بنفش برای اتاق خواب، آرام بخش اعصاب است!

گزینه «۳»: حاضران بازیگنان را در دو مسابقه **تشویق** کردن!

گزینه «۴»: روی آثار تاریخی و درختان **یادگاری** ننویس!

(مفهوم)



دین و زندگی (۱)

(مبوبیه ابتسام)

-۳۶

با توجه به آیه ۷۷ سوره آل عمران، نتایج پیمان شکنی با خداوند عبارت است از: عدم بهره داشتن در آخرت، سخن نگفتن خدا با او، عدم تگریستان خدا به آنها در قیامت، عدم طهارت از گناه، عذاب دردنگا.

(درس ۸، صفحه ۱۰۰)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۷

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه و ارزیابی است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. قرآن کریم می‌فرماید: «رسول خدا (ص) برای شما نیکوترین اسوه است.»

(درس ۸، صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۸

پیامبر اکرم (ص)، همواره از اهل بیت (ع) به عنوان انسان‌هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده‌اند و پیروی از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می‌شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده است و اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و بالرزش بوده‌اند و با گذشت زمان، حتی درک بهتری از آن‌ها نیز به دست آمده است.

(درس ۸، صفحه ۱۰۳)

(فریدن سماقی - لرستان)

-۳۹

آدمی با عزم خود، آنچه را که انتخاب کرده، عملی می‌سازد. هر قدر عزم قوی‌تر باشد، رسیدن به هدف آسان‌تر است.

(درس ۸، صفحه ۹۹)

(ممدر مقدم)

-۴۰

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم‌گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود و راه چاره، مراقبت است.»

(درس ۸، صفحه ۱۰۱)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۱

هنگامی که دوزخیان دچار عذاب الهی می‌شوند، ناله حسرت آنان برمی‌خیزد و می‌گویند: «ای کاش خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر او را اطاعت می‌کردیم، ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی‌کردیم، او ما را از یاد خدا باز داشت. درین بر ما، به خاطر آن کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۱)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۲

تعییر قرآنی «سیصلون سعیراً» در ادامه آیه «انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموالَ الْيَتَامَى ظَلَمًا آتَمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمْ نَارًا» آمده که دریاره صورت اخروی خوردن مال بینت است و نتیجه و تجسم آن، آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

(درس ۷، صفحه ۹۰)

(ممدر مقدم)

-۳۳

بهشتیان رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می‌یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند. آتش جهنم، بسیار سخت و سورانشده است. این آتش حاصل عمل خود انسان‌های است (حقیقت عمل) و برای همین، از درون جان آن‌ها شعله می‌کشد.

(درس ۷، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

(ویدیو کاغذی)

-۳۴

خداؤند در آیه ۱۸ سوره نساء می‌فرماید: «برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد، می‌گویند: الان توبه کردم، توبه نیست و این‌ها کسانی هستند که عذاب دردنگاکی برایشان فراهم کردیم.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۹)

(ویدیو کاغذی)

-۳۵

دوخیان گاهی دیگران را مقصراً می‌شمارند و می‌گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانم سبب گمراهی ما شدند». آنان می‌گویند: «ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی‌کردیم، او مرا از یاد خدا بازداشت.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۸)



(میرحسین زاهدی)

-۴۵

ترجمه جمله: «دانشمندان دارند تلاش‌های فراوانی می‌کنند تا داروهای مؤثری برای معالجه سرطان که بیماری بسیار خطرناکی است و غالباً باعث مرگ می‌شود، توسعه دهند.»

- (۱) توسعه دادن
 (۲) توصیف کردن
 (۳) شناسایی کردن
 (۴) مقایسه کردن

(واژگان)

(علی عاشوری)

-۴۶

ترجمه جمله: «اگرچه مادرم به طور مکرر به من می‌گفت که لباس‌هایی را بپوشم که محافظت مناسب در برابر سرمای شدید روزهای زمستانی فراهم می‌آورد، من هیچ اعتنایی به او نکردم.»

- (۱) باورپذیر
 (۲) مناسب
 (۳) جالب
 (۴) شغفت‌انگیز

(واژگان)

(علی شکوهی)

-۴۷

- (۱) اخیراً، به تازگی
 (۲) خوشبختانه، امیدوارانه
 (۳) با ناراحتی
 (۴) با دقت

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۴۸

- (۱) گردآوری کردن
 (۲) تقسیم کردن
 (۳) دور زدن، چرخیدن
 (۴) خلق کردن، ساختن

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۴۹

- (۱) سیاره
 (۲) زندگی
 (۳) تحقیق
 (۴) اختراع

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۵۰

- (۱) حقیقت
 (۲) آینده
 (۳) هدیه، کادو
 (۴) ماده، جنس

(کلوز تست)

زبان انگلیسی (۱)

-۴۱

(علی عاشوری)

ترجمه جمله: «مدت زیادی است که دیوید را ندیده‌ام. آخرین باری که او را دیدم، داشت تلاش می‌کرد تا در میامی شغلی پیدا کند.»

نکته مهم درسی

اگر کار و عملی در زمان مشخصی در گذشته استمرار داشته باشد، زمان جمله گذشته استمراری است.

(گرامر)

-۴۲

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «آیا دانش‌آموزان داشتند در مورد برنامه مدرسه برای رفتن به پیکنیک جمعه آینده صحبت می‌کردند وقتی که معلم وارد شد؟»

نکته مهم درسی

جمله گذشته ساده بعد از "when" در آخر جمله دوم نشان می‌دهد که جمله اول در زمان گذشته استمراری است و وجود "were" در اول جمله اول نکته را تأیید می‌کند. نکته انحرافی وجود "next Friday" به معنی «جمعه آینده» در جمله دوم است که جمله را آینده ساده نمی‌کند و گزینه «۱» درست نیست.

(گرامر)

-۴۳

(علی عاشوری)

ترجمه جمله: «مردم اغلب از خود می‌پرسند که آیا درست قبل از اصابت آسانسور در حال سقوط به زمین، آن‌ها می‌توانند (به بیرون) بپرنده، اما متأسفانه این تاکتیک کارساز نخواهد بود.»

۱) مخصوصاً

- (۱) به درستی
 (۲) به سرعت
 (۳) متأسفانه

(واژگان)

-۴۴

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «بعد از این که جنگ بین دو کشور همسایه به اتمام رسید، گورهای دسته‌جمعی زیادی توسط مردمان محلی یافت شد.»

- (۱) مشکلات
 (۲) داستان‌ها
 (۳) دردها
 (۴) گورها

(واژگان)



پاسخ‌نامه تشریحتی

سوال‌های اختصاصی

سایت کنکور

Konkur.in

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



$$\Rightarrow y = 6 - 2x = 4 \Rightarrow x + y = 1 + 4 = 5$$

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

(علیرضا پورقلی)

-۵۵

اگر پایین‌تر از محور x ها نباشد، پس یا مماس یا بالاتر از محور x ها است. این یعنی دهانه سهمی رو به بالا > 0 و $\Delta \leq 0$ باشد؛ بنابراین داریم:

$$\frac{\Delta \leq 0}{\Delta \leq 0} \rightarrow (-4)^2 - 4 \times 1 \times (2a+1) \leq 0 \Rightarrow 16 - 8a - 4 \leq 0$$

$$\Rightarrow -8a \leq -12$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow a \geq \frac{3}{4} \quad (1) \\ 2a+1 > 0 \Rightarrow a > -\frac{1}{2} \quad (2) \end{array} \right\} \xrightarrow{(1) \cap (2)} a \in \left[\frac{3}{4}, +\infty \right)$$

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

(امین نصرالله)

-۵۶

$$\begin{aligned} x^2 = x + 6 &\Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 3 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \Rightarrow 2x^2 - 6 = 12, \quad 4x = 12 \Rightarrow a = b \\ x = -2 \Rightarrow 2x^2 - 6 = 2, \quad 4x = -8 \end{cases} &\text{غیر قوی} \end{aligned}$$

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

(امین نصرالله)

-۵۷

از آنجا که تابع است پس وقتی مؤلفه اول دو زوج مرتب با هم برابر باشد، مؤلفه دوم آنها نیز با هم برابر است.

$$(5, 2m) = (5, 4m - 1) \Rightarrow 2m = 4m - 1 \Rightarrow m = \frac{1}{2}$$

$$\{(5, 1), (5, n^2 - \frac{3n}{2}), (2n+1, n^2)\}$$

$$\Rightarrow (5, 1) = (5, n^2 - \frac{3n}{2}) \Rightarrow n^2 - \frac{3n}{2} = 1 \Rightarrow n^2 - \frac{3n}{2} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (n-2)(n+\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = -\frac{1}{2} \\ n = 2 \end{cases}$$

تابع نیست

 $n = -\frac{1}{2}$ ۲ زوج مرتب دارد

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

ریاضی (۱) عادی

-۵۱

(علی ارمدند)

روابط گزینه‌های «۱» تا «۳»، به هر عضو از مجموعه اولیه، بیشتر از یک عضو را نسبت می‌دهند. بنابراین این روابط تابع نیستند اما در گزینه «۴» هر عدد تنها یک ریشه سوم دارد، بنابراین تابع است.

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

-۵۲

(عاطفه قان‌محمدی)

$$h = -5t^3 + 18t + 15 > 15 \Rightarrow -5t^3 + 18t > 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{18}{5} \end{cases}$$

عبارت $\Rightarrow t \in (0, \frac{18}{5})$: مجموعه جواب

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

-۵۳

(حسن تهامی)

اگر مؤلفه‌های اول زوج‌های مرتب برابر باشند، برای تابع بودن، باید مؤلفه دوم آنها نیز با هم برابر شوند.

$$2a+4 = -4a-2 \Rightarrow 6a = -6 \Rightarrow a = -1$$

$$\{(2, 2), (2, 2), (\frac{-4}{-2}, b-1), (\frac{4b}{2}, c+1)\}$$

$$\Rightarrow b-1=2 \Rightarrow b=3$$

$$(\frac{2 \times 3}{2}, c+1) \rightarrow (2, c+1)$$

$$\Rightarrow c+1=2 \Rightarrow c=1$$

$$\Rightarrow b-2c+a = 3 - 2 \times 1 + (-1) = 3 - 2 - 1 = 0$$

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

-۵۴

(امین نصرالله)

$$x + \frac{y}{2} = 3 \Rightarrow \frac{y}{2} = 3 - x \Rightarrow y = 6 - 2x \quad (*)$$

$$x^2 + y - 5 = 0 \xrightarrow{(*)} x^2 - 2x + 6 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$



$$\frac{3-\sqrt{13}}{2}, \dots, \frac{3+\sqrt{13}}{2} : \text{مجموعه جواب} \rightarrow (1), (2)$$

در مجموع ۴ عدد صحیح، ۰، ۱، ۲، ۳ در این مجموعه جواب وجود دارد.

(ریاضی، معادله ها و نامعادله ها، صفحه های ۱۶ تا ۱۹)

پاسخ سوال های شاهد (گواه)

(کتاب آبی)

-۶۱

گزینه ۱) تابع است، زیرا برای هر فرد، یک شماره کد ملی وجود دارد.

گزینه ۲) تابع است، زیرا به ازای هر شاعی، یک مساحت برای دایره وجود دارد.

گزینه ۳) تابع نیست، چون کتاب ریاضی دهم دارای ۷ فصل است.

گزینه ۴) رابطه ای که ارتفاع یک فنر ثابت را به جرم وزنه هایی که به آن وصل می شوند، نسبت می دهد، یک تابع است.

(ریاضی، تابع، صفحه های ۹۴ تا ۱۰۰)

(کتاب سه سطحی)

-۶۲


یک تابع از مجموعه \mathbf{B} به \mathbf{A} رابطه ای بین دو مجموعه است که در آن به هر عضو از \mathbf{A} ، دقیقاً یک عضو از \mathbf{B} نسبت داده شود. بنابراین تنها گزینه «۲» یک تابع است. توجه کنید که در گزینه «۴» از عضو ۴ در مجموعه اول هیچ پیکانی خارج نشده است، پس این گزینه تابع نیست.

(ریاضی، تابع صفحه های ۹۴ تا ۱۰۰)

(کتاب آبی)

-۶۳

مطابق شکل زیر فقط یک تابع وجود دارد.



(ریاضی، ارتابع، صفحه های ۹۴ تا ۱۰۰)

(سراسری ریاضی فارج از کشور - ۹۰)

-۶۴

عبارت درجه دوم $ax^2 + bx + c$ همواره مثبت است، هرگاه:

(سوال ولی زاده)

-۶۸

$$x^4 - 2x^3 + x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \\ x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \end{cases}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 2 \end{cases}$$

x	۰	۱	۲	۳	
x^2	+	◦	+	+	+
$x^2 - 2x + 1$	+	+	◦	+	+
$x^2 - 5x + 6$	+	+	+	◦	+
	+	◦	+	◦	+

$x \in \{0, 1\} \cup \{2, 3\}$

(ریاضی، معادله ها و نامعادله ها، صفحه های ۱۶ تا ۱۹)

(علی ارحمد)

-۶۹

$$\left| \frac{x-2}{3} - x \right| \leq 2 \Rightarrow \left| \frac{x-2-3x}{3} \right| \leq 2 \Rightarrow \left| \frac{-2x-2}{3} \right| \leq 2$$

$$\Rightarrow | -x - 1 | \leq 3 \Rightarrow | x + 1 | \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x + 1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -4 \leq x \leq 2 \Rightarrow [-4, 2] \text{ مجموعه جواب}$$

(ریاضی، معادله ها و نامعادله ها، صفحه های ۹۱ تا ۹۳)

(عاطفه قارن محمدی)

-۷۰


$$2x^2 - x - 3 \leq 5x - 1 \Rightarrow 2x^2 - 6x - 2 \leq 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{13}}{2} & x \\ x = \frac{3-\sqrt{13}}{2} & x \end{cases} \quad \begin{array}{c|ccccc} & \frac{x}{x^2-3x-1} & + & \frac{\frac{3-\sqrt{13}}{2}}{\frac{3+\sqrt{13}}{2}} & - & \frac{\frac{3+\sqrt{13}}{2}}{\frac{3+\sqrt{13}}{2}} \\ & + & \vdots & \vdots & - & \vdots \\ & \frac{3-\sqrt{13}}{2} & \leq x & \leq \frac{3+\sqrt{13}}{2} & (1) & \end{array}$$

$$x - 3 \leq 2x^2 - x - 3 \Rightarrow 2x^2 - 2x \geq 0 \Rightarrow x^2 - x \geq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 & x \\ x = 1 & x \end{cases} \quad \begin{array}{c|ccccc} & \frac{x}{x^2-x} & + & \frac{0}{0} & - & \frac{0}{0} \\ & + & \vdots & \vdots & - & \vdots \\ & 0 & \leq x & \leq 1 & \end{array} \Rightarrow x \geq 1 \text{ یا } x \leq 0 \quad (2)$$





$$\text{مجموعه جواب} = [a, b] = \left[-1, \frac{1}{2} \right] \Rightarrow b - a = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2}$$

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(سراسری تبریز فارج از کشور، ۸۵)

-۶۷

برای آنکه رابطه A یک تابع باشد، باید در آن هیچ دو زوج مرتب متمایزی، مؤلفه اول برابر نداشته باشند، بنابراین:

$$(3, m^3) = (3, m+2) \Rightarrow m^3 = m+2$$

$$\Rightarrow m^3 - m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (m-1)(m+1)^2 = 0 \Rightarrow m = 1, m = -1$$

با جایگذاری این مقادیر m و تشکیل رابطه داریم:

$$(1) \quad m = -1$$

$$\Rightarrow \{(3, 1), (2, 1), (-3, -1), (-2, -1), (3, 1), (-1, 4)\}$$

پس به ازای $m = -1$ تابع است.

$$(2) \quad m = 2$$

$$\Rightarrow \{(3, 4), (2, 1), (-3, 2), (-2, 2), (3, 4), (2, 4)\}$$

پس به ازای $m = 2$ تابع نیست. بنابراین فقط $m = -1$ قابل قبول است.

(ریاضی ا، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۹۰)

(کتاب آبی)

-۶۸

مجموعه جواب را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$x \geq 6 \quad \text{یا} \quad x \leq 3 \quad (1)$$

$$|x-a| \geq b \Rightarrow \begin{cases} x-a \geq b \\ \text{یا} \\ x-a \leq -b \end{cases} \quad \text{همچنین داریم:}$$

$$\Rightarrow x \geq a+b \quad \text{یا} \quad x \leq a-b \quad (2)$$

از مقایسه (1) و (2) با هم، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} a+b = 6 \\ a-b = 3 \end{cases} \Rightarrow 2a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{2} = \frac{4}{5} \quad (3)$$

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(کتاب سه سطه‌ی)

-۶۹

برای این که رابطه R یک تابع باشد، باید مؤلفه‌های دوم زوج‌های مرتبی که مؤلفه‌های اول یکسان دارند، با هم برابر باشند، بنابراین:

$$\Delta < 0, \quad a > 0$$

در عبارت $1 + mx + x^2 + 6x + 2m > 0$ خواهیم داشت:

$$a > 0 \Rightarrow m-1 > 0 \Rightarrow m > 1 \quad (1)$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow (6^2) - 4(2m+1)(m-1) < 0$$

$$\Rightarrow 8m^2 - 4m - 40 > 0 \Rightarrow 2m^2 - m - 10 > 0$$

$$\Rightarrow (m+2)(2m-5) > 0 \Rightarrow m < -2 \cup m > \frac{5}{2} \quad (2)$$

از اشتراک (1) و (2)، مجموعه جواب $m > \frac{5}{2}$ است.

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۱)

(سراسری تبریز، ۸۹)

-۶۵

$$\text{اگر سهمی بالای خط } y_2 = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 6 \text{ باشد، باید}$$

$y_1 > y_2$ باشد، پس:

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6 > \frac{1}{2}$$

$$\cancel{x^2} \rightarrow -x^2 + 4x + 12 > 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - 12 < 0 \Rightarrow (x+1)(x-12) < 0$$

x	-	-	-	+
$(x+1)(x-12)$	+	0	-	0

$$\Rightarrow -1 < x < 12 \Rightarrow x \in (-1, 12)$$

بنابراین بیشترین مقدار $b-a$ برابر ۶ است.

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۱)

(کتاب آبی)

-۶۶

اگر سهمی بالای خط $y = 1$ نباشد، یعنی باید نامعادله $1 \leq x^2 + 2x + 6$ را حل کنیم.

$$2x^2 + x - 1 \leq 0 \rightarrow (2x-1)(x+1) \leq 0$$

ریشه‌های معادله فوق $-1 = x$ و $\frac{1}{2} = x$ است، پس با تعیین علامت داریم:

x	-	$\frac{1}{2}$	+	
$2x^2 + x - 1$	+	0	-	0



(عطفه قان ممدوی)

$$h = -\Delta t^2 + 18t + 15 > 15 \Rightarrow -\Delta t^2 + 18t > 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{18}{\Delta} \end{cases}$$

$\frac{\Delta}{18}$

t	+	-
عبارت	و	و

⇒ مجموعه جواب: $t \in (0, \frac{18}{\Delta})$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)

-۷۲

(عطفه قان ممدوی)

$$A = x^2 + mx + m + 3 > 0$$

$$\begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta < 0 \Rightarrow m^2 - 4(m+3)(1) < 0 \Rightarrow m^2 - 4m - 12 < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (m+2)(m-6) < 0$$

m	-۲	۶
عبارت	+	-

⇒ مجموعه جواب: $m \in (-2, 6)$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)

-۷۳

(ابراهیم نجفی)

-۷۴

$$\frac{x-1}{x+2} > 2 \Rightarrow \frac{x-1}{x+2} - 2 > 0 \Rightarrow \frac{x-1-2(x+2)}{x+2} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{x-2x-1-4}{x+2} > 0 \Rightarrow \frac{-x-5}{x+2} > 0 \Rightarrow \begin{cases} -x-5 = 0 \Rightarrow x = -5 \\ x+2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases}$$

x	-۵	-۲
$-x-5$	+	-
$x+2$	-	+
$-x-5$	-	+
$x+2$	-	-

⇒ مجموعه جواب: $-5 < x < -2$

این مجموعه فقط شامل دو عدد صحیح -۴ و -۳ است.

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)

(علیرضا پورقلی)

-۷۵

اگر پایین تر از محور x ها نباشد، پس یا مماس یا بالاتر از محور x ها است. اینمعنی دهانه سهمی رو به بالا $(2a+1)^2 > 0$ و $\Delta \leq 0$ باشد؛ بنابراین داریم:

$$\Delta \leq 0 \rightarrow (-4)^2 - 4 \times 1 \times (2a+1) \leq 0 \Rightarrow 16 - 8a - 4 \leq 0$$

$$I) (6, 4^{x+y}) = (6, 64) \Rightarrow 4^{x+y} = 64 = 4^3 \Rightarrow x+y = 3$$

$$II) (\Delta, x^y - y^x) = (15, 15) \Rightarrow x^y - y^x = 15$$

$$\Rightarrow (x-y)(x+y) = 15 \xrightarrow{x+y=3} x-y = 5$$

$$\begin{cases} x+y = 3 \\ x-y = 5 \end{cases} \Rightarrow x = 4, y = -1$$

$$\Rightarrow x^y = (4)^{-1} = \frac{1}{4}$$

(ریاضی، تابع، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰)

(کتاب سه سطحی)

-۷۰

با توجه به محور، جواب نامعادله به صورت $x > 0 / \Delta / -6$ است. حال

نامعادله صورت سؤال را حل می‌کنیم:

$$|2x+b| > c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x+b > c \\ 2x+b < -c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x > c-b \\ 2x < -b-c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > \frac{c-b}{2} \\ x < \frac{-b-c}{2} \end{cases}$$

از مقایسه با جواب سؤال داریم:

$$\begin{cases} \frac{c-b}{2} = 0 / \Delta \\ \frac{-b-c}{2} = -6 / \Delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c-b = 1 \\ b+c = 13 \end{cases} \Rightarrow 2c = 14 \Rightarrow c = 7, b = 6$$

$$\Rightarrow 2c-b = 2 \times 7 - 6 = 8$$

(ریاضی، معادله ها و نامعادله ها، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۵)

ریاضی (۱) موازی

(علیرضا پورقلی)

-۷۱

هیچ عبارت قدرمطلقی از عدد منفی کوچکتر نمی‌شود، پس این نامعادله جواب ندارد. بنابراین گزینه صحیح گزینه «۳» است.

(ریاضی، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۵)



در مجموع ۴ عدد صحیح ۳, ۲, ۱, ۰ در این مجموعه جواب وجود دارد.

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(عای ارجمند)

-۷۸

$$\frac{x^2+x}{x^2-x-12} \leq \frac{2}{x-4} \Rightarrow \frac{x^2+x}{(x-4)(x+3)} - \frac{2}{x-4} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2+x}{(x-4)(x+3)} - \frac{2(x+3)}{(x-4)(x+3)} \leq 0 \Rightarrow P = \frac{x^2+x-2x-6}{(x-4)(x+3)} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2-x-6}{(x-4)(x+3)} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x-3)(x+2)}{(x-4)(x+3)} \leq 0$$

x	-۳	-۲	۳	۴
$x+3$	-	+	+	+
$x+2$	-	-	+	+
$x-3$	-	-	-	+
$x-4$	-	-	-	+
P	+	-	+	+

تعریف نشده

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(سوند و لیزاده)

-۷۹

$$x^4 - 2x^3 + x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \\ x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \end{cases}$$

$$x^4 - 5x^2 + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 1 \end{cases}$$

x	۰	۱	۲	۳
x^2	+	+	+	+
$x^2 - 2x + 1$	+	+	+	+
$x^4 - 5x^2 + 6$	+	+	+	+
	+	+	+	+

$x \in \{0, 1\} \cup \{2, 3\}$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(عای ارجمند)

-۸۰

$$\left| \frac{x-2}{3} - x \right| \leq 2 \Rightarrow \left| \frac{x-2-3x}{3} \right| \leq 2 \Rightarrow \left| \frac{-2x-2}{3} \right| \leq 2$$

$$\Rightarrow | -x - 1 | \leq 3 \Rightarrow | x + 1 | \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x + 1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -8a \leq -12$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a \geq \frac{3}{2} & \quad (1) \\ 2a + 1 > 0 \Rightarrow a > -\frac{1}{2} & \quad (2) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} (1) \cap (2) \\ \hline a \in \left[\frac{3}{2}, +\infty \right) \end{array} \right.$$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(عباس اسدی امیرآبادی)

$$\begin{aligned} -x^2 + 3x - 4 = 0 \Rightarrow \Delta = 9 - 4(-1)(-4) = 9 - 16 = -7 < 0 \\ a = -1 < 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \Delta < 0 \\ (m-1)^2 - 4(m-1) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

پس مخرج همواره منفی است. بنابراین صورت کسر باید همواره مثبت باشد یعنی

باید داشته باشیم:

$$\begin{cases} m-1 > 0 \Rightarrow m > 1 & (1) \\ \Delta < 0 \Rightarrow (m-1)^2 - 4(m-1) < 0 & \end{cases}$$

$$(m-1)(m-1-4) < 0 \Rightarrow (m-1)(m-5) < 0 \Rightarrow 1 < m < 5 \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} (1) \cap (2) \\ \hline 1 < m < 5 \end{array} \right.$$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

(عاطفه قانمودی)


$$2x^2 - x - 3 \leq 5x - 1 \Rightarrow 2x^2 - 6x - 2 \leq 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{13}}{2} \\ x = \frac{3-\sqrt{13}}{2} \end{cases} \quad \begin{array}{c|ccccc} x & \frac{3-\sqrt{13}}{2} & & \frac{3+\sqrt{13}}{2} \\ \hline x^2 - 3x - 1 & + & \bullet & - & \bullet & + \end{array}$$

$$x^2 - 3x - 1 \leq 0 \Rightarrow x^2 - 3x \geq 0 \Rightarrow x^2 - x \geq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{c|ccccc} x & \bullet & & 1 & & \\ \hline x^2 - x & + & \bullet & - & \bullet & + \end{array} \Rightarrow x \geq 1 \text{ یا } x \leq 0$$



$$\left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, 0 \right] \cup \left[1, \frac{3+\sqrt{13}}{2} \right]$$



(سراسری ریاضی قارچ از کشور - ۹۰)

-۸۳

عبارت درجه دوم $ax^2 + bx + c$ همواره مثبت است، هرگاه:

$\Delta < 0, \quad a > 0$

در عبارت درجه ۱ $(m-1)(x^2 + 6x + 2m + 1)$ خواهیم داشت:

$a > 0 \Rightarrow m-1 > 0 \Rightarrow m > 1 \quad (۱)$

$\Delta < 0 \Rightarrow (6^2) - 4(2m+1)(m-1) < 0$

$\Rightarrow 36 - 4m^2 - 4m > 0 \Rightarrow 2m^2 + m - 10 < 0$

$\Rightarrow (m+2)(2m-5) > 0 \Rightarrow m < -2 \cup m > \frac{5}{2} \quad (۲)$

از اشتراک (۱) و (۲)، مجموعه جواب $m > \frac{5}{2}$ است.

(ریاضی ا، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

(سراسری تبریز - ۱۹۹۰)

-۸۴

$y_2 = \frac{7}{2}$ بالای خط $y_1 = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$ باشد، باید

 $y_1 > y_2$ باشد، پس:

$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6 > \frac{7}{2}$

$\frac{x^2}{2} - 4x - 5 < 0 \Rightarrow (x+1)(x-5) < 0$

$x \quad | \quad -1 \quad 5$

$(x+1)(x-5) \quad | \quad + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad +$

$\Rightarrow -1 < x < 5 \Rightarrow x \in (-1, 5)$

بنابراین بیشترین مقدار $b - a$ برابر ۶ است.

(ریاضی ا، معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

(کتاب سه سطحی)

-۸۵

$\frac{-x^2 + 3x + 10}{x^2 - 1} > 0 \Rightarrow \frac{-x^2 + 3x + 10}{(x-1)(x^2 + x + 1)} > 0$

$\Rightarrow \frac{x^2 - 3x - 10}{x-1} < 0 \Rightarrow P(x) = \frac{(x-5)(x+2)}{(x-1)} < 0$

$x = 5, \quad x = -2, \quad x = 1$

 $\Rightarrow -4 \leq x \leq 2 \Rightarrow [-4, 2]$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

پاسخ سوال‌های شاهد (گواه)

(کتاب آبی)

-۸۱

$4x^2 \leq 4x + 3 \Rightarrow 4x^2 - 4x - 3 \leq 0$

با استفاده از اتحاد یک جمله مشترک داریم:

$4x^2 - 4x - 3 = 0 \Rightarrow (2x-3)(2x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$

جدول تعیین علامت را تشکیل می‌دهیم:

$$\begin{array}{c|ccccc} x & & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & & \\ \hline 4x^2 - 4x - 3 & + & 0 & - & 0 & + \end{array}$$

بنابراین $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$

$[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] = [a, b] \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow 2a+b = 2 \times (-\frac{1}{2}) + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

(کتاب آبی - با تغییر)

-۸۲

باید نامعادله زیر را حل کنیم و تعداد اعداد صحیح جواب آن را بیابیم:

$P = (3x-2)(x^2 - 4x + 4)(x-5)^2 \leq 0$

در $x = \frac{2}{3}$ و $x = 5$ تغییر علامت داریم اما چون توان عبارت $(x-2)^2$ زوج استبنابراین در $x = 2$ تغییر علامت نداریم. از طرفی به ازای $x = 0$ ، عبارت مثبت

است، پس جدول تعیین علامت به صورت زیر است.

$$\begin{array}{c|ccccc} x & & \frac{2}{3} & 2 & 5 & \\ \hline P & + & 0 & - & 0 & + \end{array}$$

بنابراین مجموعه جواب نامعادله بازه $[\frac{2}{3}, 5]$ است. و تعداد اعداد صحیح در این بازه

۵ است.

(ریاضی ا، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)



(کتاب آبی)

-۸۸

مجموعه جواب را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$x \geq 6 \text{ یا } x \leq 3 \quad (1)$$

$$|x-a| \geq b \Rightarrow \begin{cases} x-a \geq b \\ x-a \leq -b \end{cases} \quad \text{همچنین داریم:}$$

$$\Rightarrow x \geq a+b \text{ یا } x \leq a-b \quad (2)$$

از مقایسه (1) و (2) با هم، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} a+b=6 \\ a-b=3 \end{cases} \Rightarrow 2a=9 \Rightarrow a=\frac{9}{2}=4.5$$

(ریاضی، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(کتاب سه سطحی)

-۸۹

با توجه به محور، جواب نامعادله به صورت $x > 0/5$ یا $x < -6/5$ است. حال نامعادله صورت سؤال را حل می‌کنیم:

$$|2x+b| > c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x+b > c \\ 2x+b < -c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x > c-b \\ 2x < -b-c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > \frac{c-b}{2} \\ x < \frac{-b-c}{2} \end{cases}$$

از مقایسه با جواب سؤال داریم:

$$\begin{cases} \frac{c-b}{2} = 0/5 \\ \frac{-b-c}{2} = -6/5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c-b=1 \\ b+c=13 \end{cases} \Rightarrow 2c=14 \Rightarrow c=7, b=6$$

$$\Rightarrow 2c-b=2 \times 7-6=8$$

(ریاضی، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(کتاب سه سطحی)

-۹۰

عبارت $x^2 + x + 1$ به ازای هر x همواره مثبت است ($a > 0$ و $\Delta < 0$). پس در حل نامعادله می‌توانیم مخرج کسرها را ساده کنیم و جهت نامعادله عوض نمی‌شود. یعنی:

$$|3x-2| \leq 5 \Rightarrow -5 \leq 3x-2 \leq 5$$

$$\Rightarrow -5+2 \leq 3x \leq 5+2 \Rightarrow -3 \leq 3x \leq 7 \Rightarrow -1 \leq x \leq \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow x \in [-1, \frac{7}{3}]$$

(ریاضی، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

x	$-\infty$	-۲	۱	۵	$+\infty$
$x^2 - 3x - 10$	+	-	-	-	+
$x-1$	-	-	-	+	+
$P(x)$	-	-	-	-	+

مجموعه جواب $= (-\infty, -2) \cup (1, 5)$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)

(کتاب آبی)

-۸۶

اگر سهمی بالای خط $y=1$ نباشد، یعنی باید نامعادله $1 \leq x^2 + 2x^2$ را حل کنیم.

$$2x^2 + x - 1 \leq 0 \rightarrow (2x-1)(x+1) \leq 0$$

ریشه‌های معادله فوق $x = -1$ و $x = \frac{1}{2}$ است، پس با تعیین علامت داریم:

x	-۱	$\frac{1}{2}$
$2x^2 + x - 1$	+	-

$$[a, b] = [-1, \frac{1}{2}] \Rightarrow b-a = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2}$$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)

(کتاب آبی)

-۸۷

عبارت مخرج کسر همواره منفی است، زیرا در معادله آن $\Delta < 0$ و ضریب x^2 منفی است.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times (-4) \times (-1) = 9 - 16 = -7 < 0$$

ضریب x^2 در مخرج کسر

برای آن که مقدار کسر، همواره منفی باشد، باید عبارت صورت کسر همواره مثبت باشد، پس:

$$m+2 > 0 \Rightarrow m > -2 \quad (1)$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow (4m)^2 - 4(m-1) \times (m+2) < 0$$

$$\Rightarrow 4m^2 - 4m^2 - 4m + 8 < 0$$

$$\Rightarrow 8 < 4m \Rightarrow 2 < m \quad (2) \xrightarrow{\text{اشترآک (۱) و (۲)}} 2 < m$$

(ریاضی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۰)




$$\Rightarrow D\hat{A}H' + B\hat{A}H = \hat{C} - \hat{B}$$

(هنرسه، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۹)

(علی فتح‌آبادی)

-۹۵



$$AD = BC \Rightarrow \angle MD = \angle BN \Rightarrow MD = BN$$

از طرفی، $AD \parallel BC$ می‌باشد، بنابراین $MBND$ متوازی‌الاضلاع است.

$$\triangle CBP : QN \parallel PB \Rightarrow \frac{CN}{CB} = \frac{QN}{PB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{QN}{PB} \Rightarrow PB = 2QN$$

با همین استدلال، در مثلث ADQ ثابت می‌شود که: $\angle DQ = \angle MP$

$$MB = DN \Rightarrow MP + PB = DQ + QN$$


$$\Rightarrow MP + 2QN = \angle MP + QN \Rightarrow MP = QN = 3$$

$$\angle DQ = \angle MP = 2 \times 3 = 6$$

(هنرسه، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۹)

(زهره، رامشینی)

-۹۶



فرض کنید در مثلث قائم‌الزاویه

$$\hat{B} = 3\hat{C} \quad (\hat{A} = 90^\circ) \text{ ABC}$$

باشد، در این صورت داریم:

$$\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ \xrightarrow{\hat{B}=3\hat{C}} 4\hat{C} = 90^\circ \Rightarrow \hat{C} = 22.5^\circ$$

می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه، طول میانه وارد بر وتر، نصف طول وتر است.

بنابراین اگر AM میانه وارد بر وتر باشد، آنگاه $AM = CM$ و درنتیجه

$$\hat{A}_1 = \hat{C} = 22.5^\circ$$

هندسه (۱)

-۹۱

(علی فتح‌آبادی)

$$\frac{n(n-3)}{2} = 2n \xrightarrow{n \geq 3} \frac{n-3}{2} = 2 \Rightarrow n-3 = 4 \Rightarrow n = 7$$


$$\text{مجموع زوایای داخلی} = (7-2) \times 180^\circ = 900^\circ$$

از طرفی $6 \times 140^\circ + 60^\circ = 900^\circ$ ، پس این هفت‌ضلعی، می‌تواند حداقل ۶ زاویه 140° داشته باشد.

(هنرسه، صفحه ۵۵)

-۹۲

(فرشاد مهرافشان)

با رسم قطر AD در شکل مقابل، دو مثلث چندضلعی محدب (داریم ولی چندضلعی اولیه محدب نیست، بنابراین گزینه «۳» از ویژگی‌های یک چندضلعی محدب نیست).

(هنرسه، صفحه ۵۵)

-۹۳

(محمد بهیرایی)

چهارضلعی‌ای که دو قطر برابر داشته باشد، می‌تواند ذوزنقه متساوی‌الساقین نیز باشد و چهارضلعی‌ای که قطرهای آن عمودمیانی یکدیگرند، می‌تواند لوزی نیز باشد ولی چهارضلعی‌ای که قطرهای آن نیمساز زوایه‌های داخلی هستند، قطعاً لوزی است.

(هنرسه، صفحه‌های ۵۹ تا ۶۴)

-۹۴

(زهره، رامشینی)

می‌دانیم در هر چهارضلعی، مجموع زوایه‌های داخلی برابر 360° می‌شود و از آنجایی که $\hat{H} = \hat{H}' = 90^\circ$ ، پس:

$$\hat{H}\hat{A}\hat{H}' + \hat{C} = 180^\circ \quad (*)$$

از طرفی، می‌دانیم در متوازی‌الاضلاع جمع زوایه‌های مجاور برابر 180° و زوایه‌های


$$\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \xrightarrow{(*)} \hat{H}\hat{A}\hat{H}' = \hat{B}$$

روبه رو برابرند. بنابراین:

$$\hat{A} = \hat{C} \Rightarrow D\hat{A}\hat{H}' + \underbrace{\hat{H}\hat{A}\hat{H}'}_{\hat{B}} + B\hat{A}\hat{H} = \hat{C}$$



(امیرحسین ابومیبوب)



اگر وسطهای اضلاع یک مستطیل را به طور متوالی به هم وصل کنیم، یک لوزی حاصل می‌شود. می‌دانیم در لوزی قطرها عمودمنصف یکدیگرند و همچنین قطرها نیمساز زاویه‌های داخلی می‌باشند.


بنابراین در مثلث MON , $\hat{M} = 60^\circ$, $\hat{N} = 30^\circ$, $\hat{O} = 30^\circ$ است. با توجه به این که طول ضلع روبرو به زاویه 30° , نصف طول وتر و طول ضلع روبرو به زاویه 60° .

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ طول وتر است، داریم:}$$

$$\frac{ON}{OM} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} MN}{\frac{1}{2} MN} = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{ON}{OM} = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \sqrt{3}$$

(هنرسه، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲)

(نوید مهدی)



با توجه به این که $AM = AD$ و $AB = 2AD$ وسط M و $AB = 2AD$ است. درنتیجه مثلث AMD متساوی الساقین است. همچنین به دلیل مشابهه، BMC متساوی الاضلاع است و درنتیجه $BM = BC$ و چون $\hat{B} = 60^\circ$ است، مثلث DMC متساوی الاضلاع است و داریم:

$$ABCD \text{ محیط} = 24 \Rightarrow 2(AB + BC) = 24$$

$$\Rightarrow 2(AB + \frac{1}{2} AB) = 24 \Rightarrow 3AB = 24 \Rightarrow AB = DC = 8$$

$$\triangle MBC \text{ متساوی الاضلاع است.}$$

$$\hat{MCD} = 60^\circ \Rightarrow MD = \frac{\sqrt{3}}{2} DC = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 8 = 4\sqrt{3}$$

$$MC \times MD = 4 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$$

(هنرسه، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

-۹۹

$$\triangle AMC: \hat{M} = \hat{A} + \hat{C} = 45^\circ$$

طول ضلع روبرو به زاویه 45° در یک مثلث قائم‌الزاویه، طول وتر است، پس داریم:

$$\triangle AHM: \hat{M} = 45^\circ \Rightarrow AH = \frac{\sqrt{2}}{2} AM \xrightarrow{AH=2} 2 = \frac{\sqrt{2}}{2} AM \Rightarrow AM = 2\sqrt{2} \xrightarrow{AM=\frac{1}{2} BC} BC = 4\sqrt{2}$$

(هنرسه، صفحه‌های ۶۰ و ۶۱)

-۹۷

(محمد بقیری)

در مثلث قائم‌الزاویه، طول میانه وارد بر وتر نصف طول وتر است، پس:

$$BC = 2AM = 2 \times 8 = 16$$

$$\triangle ABC: \hat{A} = 90^\circ, \hat{B} = 75^\circ \Rightarrow \hat{C} = 15^\circ$$

در مثلث قائم‌الزاویه با یک زاویه 15° درجه، طول ارتفاع وارد بر وتر، $\frac{1}{4}$ طول وتر است.


$$AH = \frac{1}{4} \times 16 = 4$$

$$HM^2 = AM^2 - AH^2 \Rightarrow HM = \sqrt{25 - \frac{16}{4}} = \sqrt{\frac{75}{4}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

(هنرسه، صفحه‌های ۶۰ و ۶۱)

-۹۸

(فرشاد مهرافشان)



در چهارضلعی $MNPQ$, اضلاع روبرو دو به دو موازی هستند، پس این چهارضلعی موازی الاضلاع است.

$$\left. \begin{array}{l} MN = PQ = AC = 7 \\ MQ = NP = BD = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow MNPQ \text{ محیط} = 2(7+4) = 22$$

(هنرسه، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)



(زهرا احمدیان)

-۱۰۵

با استفاده از معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 + A_3 v_3$$

$$A_2 = \frac{3}{4} A_1, \quad A_3 = \frac{1}{4} A_1, \quad \frac{v_1}{v_2} = 2$$

$$\Rightarrow A_1 v_1 = \frac{3}{4} A_1 v_2 + \frac{1}{4} A_1 v_3 \Rightarrow v_1 = \frac{3}{4} v_2 + \frac{1}{4} v_3$$

$$\frac{+v_2}{v_2} \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \frac{v_3}{v_2} \Rightarrow 2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \frac{v_3}{v_2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_3}{v_2} = 5 \Rightarrow \frac{v_2}{v_3} = \frac{1}{5}$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی موارد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)


(فرشید رسولی)

-۱۰۶

هرچه سطح مقطع لوله کوچکتر باشد، تندي هوا بيشتر و فشار آن كمتر می‌شود. در

نتیجه چون $P_{A_1} > P_{A_2}$ است، $A_1 > A_2$ می‌شود. بنابراین آب در شاخه سمت

چپ پایین و در شاخه سمت راست بالا می‌رود و داریم:



از برابری فشار در نقاط A و B داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{A_1} = P_{A_2} + \rho_{\text{آب}} gh \Rightarrow P_{A_1} - P_{A_2} = \rho_{\text{آب}} gh$$

$$P_{A_1} - P_{A_2} = 500 \text{ Pa}, \quad \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\Rightarrow 500 = 1000 \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow h = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی موارد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)

فیزیک (۱) عادی

-۱۰۱

(مهدی میرابزاده)

بال هواپیما طوری طراحی می‌شود که در هنگام اوج گرفتن، تندي هوا در بالای بال بيشتر از زير آن باشد. در نتيجه، فشار هواي بالاي بال كمتر از فشار هواي زير آن است. بنابراین نیروی بالابر خالصی به بال هواپیما وارد می‌شود.

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی موارد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)

-۱۰۲

(زهره رامشینی)

طبق معادله پیوستگی در همه مقاطع لوله، حاصل ضرب سطح مقطع در تندي آب ثابت است. بنابراین در ناحیه‌هایی که سطح مقطع در حال کاهش است، تندي آب در حال افزایش (B) و در ناحیه‌هایی که سطح مقطع در حال افزایش است، تندي آب در حال کاهش (D) می‌باشد.

از طرفی در مسیر حرکت شاره، با کاهش تندي آب (افزایش سطح مقطع)، فشار آب افزایش می‌یابد. بنابراین در بخش D فشار آب در حال افزایش است.

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی موارد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)

-۱۰۳

(اسکان برگلر)

مورد «ت» نادرست است. دقت دماسنج ترموموپل نسبت به دماسنج گازی کمتر است و علت به کارگیری آن در بسیاری از وسائل صنعتی، گرمایشی و سرمایشی، این (فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۵) موضوع نیست.

-۱۰۴

(سید علی میرنوری)

$$\theta_1 = 45 / 5^\circ \text{C} \xrightarrow{T = \theta + 273} T = 45 / 5 + 273 = 318 / 5 \text{ K}$$

$$\theta_2 = 7 / 5^\circ \text{C} \xrightarrow{F = \frac{9}{5}\theta + 32} F = \frac{9}{5} \times 7 / 5 + 32 = 45 / 5^\circ \text{F}$$

یکای T و F با هم متفاوت است. اما خواسته سؤال، نسبت عددی $\frac{T}{F}$ است. بنابراین:

$$\frac{T}{F} = \frac{318 / 5}{45 / 5} = \frac{318 / 5}{45 / 5} = 7$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)



(محمد باغبان)

-۱۰۹

برای محاسبه درصد تغییرات متغیر X از رابطه $\frac{\Delta X}{X_1} \times 100$ استفاده می‌کنیم. درنتیجه

برای محاسبه درصد تغییرات دما در مقیاس فارنهایت (F) به صورت زیر عمل

می‌کنیم:

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \begin{cases} \Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta = \frac{9}{5} \times 20 = 36^\circ F \\ F_1 = \frac{9}{5}\theta_1 + 32 = \frac{9}{5} \times \left(\frac{20^\circ}{9}\right) + 32 = 72^\circ F \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta F}{F_1} \times 100 = \frac{36}{72} \times 100 = 50$$

بنابراین دما در مقیاس فارنهایت 50° درصد افزایش یافته است.

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

(اکسان برزکار)

-۱۱۰

$$\begin{aligned} T_2 &= 2T_1 \\ T &= \theta + 273 \end{aligned} \Rightarrow \theta_2 + 273 = 2 \times (\theta_1 + 273)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = 2\theta_1 + 273$$

$$\text{اگر: } \theta_1 > 0 \Rightarrow \theta_2 > 2\theta_1 \Rightarrow \frac{\theta_2}{\theta_1} > 2$$

$$\text{اگر: } -136/5^\circ C < \theta_1 < 0 \Rightarrow \frac{\theta_2}{\theta_1} < 0$$

$$\theta_2 \leq \theta_1 \leq -136/5^\circ C \Rightarrow 0 \leq \frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 1$$

بنابراین $\frac{\theta_2}{\theta_1}$ هر عددی به جز در فاصله $[1, 2]$ می‌تواند باشد. پس گزینه‌های «۱» و

«۳» همواره صحیح نیستند و گزینه «۲» نیز هیچ‌گاه صحیح نیست.

واضح است که دمای جسم نمی‌تواند از صفر کلوین کمتر باشد.

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

(سید جلال میری)

-۱۱۱

با استفاده از رابطه $\Delta L = \alpha L_1 \Delta T$ داریم:

$$L_2 - L_1 = \alpha L_1 \Delta T \Rightarrow L_2 = \alpha L_1 \Delta T + L_1$$

(زهره رامشینی)

-۱۱۷

طبق معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow \pi \frac{d_1^2}{4} v_1 = \pi \frac{d_2^2}{4} v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = v_1 \times \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1/25 \times \left(\frac{10}{2/5} \right)^2 = 1/25 \times 16 = 2 \frac{m}{s}$$

اگر خروجی آب از لوله را نقطه (A) و حداکثر ارتفاع آب نسبت به سطح زمین را نقطه (B) فرض کنیم، با توجه به ناچیز بودن مقاومت هوا و در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی داریم:

$$E_A = E_B \Rightarrow K_A + U_A = K_B + U_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

$$\xrightarrow[\text{از طرفین}]{\text{حذف}} \frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2 + gh_B$$

$$\xrightarrow[\substack{v_A = 2 \frac{m}{s}, h_A = 1m \\ v_B = ?, h_B = ?}]{} \frac{1}{2} \times 20^2 + 10 \times 1 = \frac{1}{2} \times 0 + 10 \times h_B$$

$$\Rightarrow h_B = 21m$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۶)

-۱۱۸

(ساسان فیری)

ابتدا رابطه بین دمای X و دمای سلسیوس θ را به دست می‌آوریم:

$$\frac{x - (-30)}{120 - (-30)} = \frac{\theta - 0}{100 - 0} \Rightarrow \frac{x + 30}{150} = \frac{\theta}{100} \Rightarrow 150\theta = 100x + 3000$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2}{3}x + 20 \quad (I)$$

حال از رابطه بین مقیاس فارنهایت و مقیاس سلسیوس کمک می‌گیریم:

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \Delta F = 9\theta + 160 \Rightarrow 9\theta = 5F - 160$$

رابطه (I) را در عدد ۹ ضرب می‌کنیم:

بنابراین:

$$5F - 160 = 6x + 180 \Rightarrow \Delta F = 6x + 340 \Rightarrow F = \frac{6}{5}x + 68$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)



بر حسب درجه فارنهایت را به درجه سلسیوس تبدیل کنیم، به همین منظور از رابطه

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \quad \text{استفاده می‌کنیم. بنابراین:}$$

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \xrightarrow{F=140^\circ F} 140 = \frac{9}{5}\theta + 32$$

$$\Rightarrow 10\lambda = \frac{9}{5}\theta \Rightarrow \theta = 60^\circ C$$

$$\Delta\theta = 30 - 20 = 10^\circ C, \Delta\theta' = 60 - 20 = 40^\circ C$$

اگر با استفاده از رابطه $\Delta L = \alpha L_1 \Delta\theta$ ، تغییر طول میله فلزی در حالت دوم را

حساب می‌کنیم، طول اولیه میله و ضریب انبساط طولی در دو حالت برابرند. پس:

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta\theta \xrightarrow{\text{ثابتاند}} \frac{\Delta L'}{\Delta L} = \frac{\Delta\theta'}{\Delta\theta}$$


$$\frac{\Delta L = 4 \text{ mm}}{\Delta L = 10 \text{ mm}} \Rightarrow \frac{\Delta L'}{\Delta L} = \frac{4}{10} \Rightarrow \Delta L' = 8 \text{ mm}$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸)

(اشکان برزگر)

-۱۱۵

$$\text{با استفاده از شکل زیر و رابطه} \frac{\text{طول کمان}}{\text{محیط دایره}} = \frac{\text{اندازه کمان}}{360^\circ} \quad \text{داریم:}$$



$$\widehat{AB} = \left(R + \frac{d}{2}\right)\gamma$$

$$\widehat{CD} = \left(R - \frac{d}{2}\right)\gamma$$

از طرفی با استفاده از رابطه

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta T, \text{ اگر طول اولیه}$$

میله‌ها را ℓ فرض کنیم، می‌توان

نوشت:

$$\widehat{AB} = \ell(1 + \alpha \Delta T), \quad \widehat{CD} = \ell(1 + \alpha \Delta T)$$

$$\begin{cases} \left(R + \frac{d}{2}\right)\gamma = \ell(1 + \alpha \Delta T) \\ \left(R - \frac{d}{2}\right)\gamma = \ell(1 + \alpha \Delta T) \end{cases} \Rightarrow \frac{R + \frac{d}{2}}{R - \frac{d}{2}} = \frac{1 + 2\alpha \Delta T}{1 + \alpha \Delta T} \quad \text{بنابراین:}$$

$$\Rightarrow \frac{R + \frac{d}{2}}{R - \frac{d}{2} - \left(R + \frac{d}{2}\right)} = \frac{1 + 2\alpha \Delta T}{1 + \alpha \Delta T - (1 + 2\alpha \Delta T)}$$

$$\Rightarrow \frac{R + \frac{d}{2}}{-d} = \frac{1 + 2\alpha \Delta T}{-\alpha \Delta T} \Rightarrow -\frac{R}{d} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{\alpha \Delta T} - 2$$

می‌توان نتیجه گرفت که شب نمودار $L - \Delta T$ برابر αL_1 می‌باشد:

$$\left. \begin{aligned} \Delta L_A &= 30 - 10 = 20 \text{ mm} \\ \Delta L_B &= 30 - 20 = 10 \text{ mm} \\ \Delta L &= \alpha L_1 \Delta T \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\Delta T_A = \Delta T_B} \frac{\Delta L_A}{\Delta L_B} = \frac{\alpha_A L_1 A}{\alpha_B L_1 B}$$

$$L_1 A = 10 \text{ mm}, \quad L_1 B = 20 \text{ mm}$$

از طرفی:

$$\frac{20}{10} = \frac{1}{2} \times \frac{\alpha_A}{\alpha_B} \Rightarrow \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = 4$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸)

(فسرو ارغوانی فرد)

-۱۱۲

برای آنکه اختلاف طول دو نوار همواره ثابت بماند باید تغییر طول دو نوار همواره

برابر باشد، بنابراین:

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta T = \alpha_{\text{آلومینیم}} L_1 \Delta T = \alpha_{\text{آلومینیم}} \Delta T$$

$$\Rightarrow 24 \times 10^{-9} \times L_1 = 8 \times 10^{-9} \times 450 \Rightarrow L_1 = 150 \text{ cm}$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸)

(لیلا هسن زاده)

-۱۱۳

اگر دمای میله را به اندازه ΔT افزایش دهیم، داریم:

$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 \Rightarrow$$

$$\alpha L \Delta T = \alpha_1 L_1 \Delta T + \alpha_2 L_2 \Delta T \Rightarrow \alpha L = \alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2$$

از طرفی با توجه به اینکه $L = L_1 + L_2$ است، داریم:

$$\left. \begin{aligned} L_1 < L \Rightarrow \alpha_1 L_1 < \alpha_1 L \\ L_2 < L \Rightarrow \alpha_2 L_2 < \alpha_2 L \end{aligned} \right\} \Rightarrow \alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2 < (\alpha_1 + \alpha_2) L$$

بنابراین:

$$\alpha L < (\alpha_1 + \alpha_2) L \Rightarrow \alpha < \alpha_1 + \alpha_2$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸)

(مصطفی کیانی)

-۱۱۴

ابتدا تغییر دمای را در دو حالت حساب می‌کنیم، دقت کنید، در حالت دوم باید دما



$$V_1 = 40 \text{ cm}^2 \times 40 \text{ cm} = 1600 \text{ cm}^3$$

حجم کل ظرف در ابتدا 1600 cm^3 بوده است و 1200 cm^3 از آن با مایع پر شده است. پس ظرفیت خالی ظرف برابر 400 cm^3 بوده است. بنابراین حجم مایع بیرون ریخته شده از ظرف برابر است با:

$$\Delta V_{\text{مایع}} = \Delta V_{\text{ظرف}} = 400$$

$$= 450 - 24 - 400 = 26 \text{ cm}^3$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

(سیماک فیری)

$$\Rightarrow \frac{R}{d} = 1/5 + \frac{1}{\alpha \Delta T} = 1/5 + \frac{1}{10^{-3}} = 1/5 + 1000 = 1001/5$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸)

-۱۱۶

با توجه به رابطه انبساط سطحی در جامدات، ابتدا مساحت سطح اولیه را حساب می‌کنیم. سپس تغییر سطح را هنگامی که دما را 100° درجه سلسیوس افزایش داده‌ایم، به دست می‌آوریم:

$$A_1 = \pi r_1^2 - \pi r_1^2 = \pi(r_1^2 - r_1^2) = \pi \times (20^2 - 10^2) = 300\pi \text{ cm}^2 \\ = 300\pi \times 10^{-4} \text{ mm}^2 = 3\pi \times 10^4 \text{ mm}^2$$

بنابراین:

$$\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta T = 2 \times 2 \times 10^{-9} \times 3\pi \times 10^4 \times 100 = 12\pi \text{ mm}^2$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه ۱۰۰)

-۱۱۷

با توجه به این که ضریب انبساط ظرف ناچیز است، تغییر ارتفاع مایع، تنها ناشی از انبساط خود مایع است. بنابراین:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta V_{\text{مایع}} = V_1 \beta \Delta T \\ \Delta V_{\text{مایع}} = A \Delta h_{\text{مایع}} \end{array} \right\} \Rightarrow A \Delta h_{\text{مایع}} = V_1 \beta \Delta T \\ \Rightarrow A \Delta h_{\text{مایع}} = Ah \beta \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta h_{\text{مایع}}}{\Delta T} = \beta h$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

-۱۱۸

ابتدا تغییر حجم ظرف را از رابطه $\Delta V_{\text{ظرف}} = 2\alpha V_1 \Delta T$ به دست می‌آوریم:

$$\Delta V_{\text{ظرف}} = 3 \times 2 \times 10^{-4} \times 40 \times 40 \times 250 = 24 \text{ cm}^3$$

تغییر حجم مایع را از رابطه $\Delta V_{\text{مایع}} = \beta V_1 \Delta T$ به دست می‌آوریم:

$$\Delta V_{\text{مایع}} = 1/5 \times 10^{-3} \times 1200 \times 250 = 450 \text{ cm}^3$$

از طرفی حجم اولیه ظرف برابر است با:

(محمد باغبان)


-۱۲۰

دمای آب درون سه ظرف را بر حسب درجه سلسیوس به دست می‌آوریم:

$$F_1 = \frac{9}{5}\theta_1 + 32 \Rightarrow 39/2 = \frac{9}{5}\theta_1 + 32 \Rightarrow \frac{9}{5}\theta_1 = 7/2 \Rightarrow \theta_1 = 4^\circ C$$

$$\theta_2 = 14^\circ C$$

$$T_3 = \theta_3 + 273 \Rightarrow 276 = \theta_3 + 273 \Rightarrow \theta_3 = 3^\circ C$$





(اشکان برگار)

-۱۲۴

مورد «ت» نادرست است. دقت دماسنچ ترموکوپل نسبت به دماسنچ گازی کمتر است و علت به کارگیری آن در بسیاری از وسایل صنعتی، گرمایشی و سرمایشی، این (فیزیک ا، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۵) موضوع نیست.

(زهره رامشینی)

-۱۲۵

طبق معادله پیوستگی در همه مقاطع لوله، حاصل ضرب سطح مقطع در تندی آب (Av) ثابت است. بنابراین در ناحیه‌هایی که سطح مقطع در حال کاهش است، تندی آب در حال افزایش (بخش B) و در ناحیه‌هایی که سطح مقطع در حال افزایش است، تندی آب در حال کاهش (بخش D) می‌باشد.

از طرفی در مسیر حرکت شاره، با کاهش تندی آب (افزایش سطح مقطع)، فشار آب افزایش می‌یابد. بنابراین در بخش D فشار آب در حال افزایش است.

(فیزیک ا، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۶)

(محمد پاگبان)

-۱۲۶

طبق معادله پیوستگی، رابطه $A_1v_1 = A_2v_2$ برقرار است. بنابراین می‌توان نوشت:

$$\pi r_1^2 \times v_1 = \pi r_2^2 \times v_2 \Rightarrow \pi \times \left(\frac{R}{2}\right)^2 \times 2 = \pi \times \left(\frac{r}{2}\right)^2 \times v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{\pi R^2}{\pi r^2} = \frac{R^2}{r^2} = \frac{4}{1}$$

(فیزیک ا، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۶)

(سید علی میرنوری)

-۱۲۷

$$\theta_1 = 45/5^\circ C \xrightarrow{T=0+273} T = 45/5 + 273 = 318/5 K$$

$$\theta_2 = 7/5^\circ C \xrightarrow{F=\frac{9}{5}\theta+32} F = \frac{9}{5} \times 7/5 + 32 = 45/5^\circ F$$

یکای T و F با هم متفاوت است. اما خواسته سؤال، نسبت عددی $\frac{T}{F}$ است. بنابراین:

$$\frac{T}{F} = \frac{318/5}{45/5} = 7$$

(فیزیک ا، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

سلسیوس چگالی آب افزایش و بعد از چهار درجه سلسیوس چگالی آب کاهش می‌یابد.

$$\Rightarrow p_1 > p_3 \text{ و } p_1 > p_2$$

بنابراین با توجه به گزینه‌ها، گزینه «۳» صحیح است.

(فیزیک ا، دما و گرما، صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۴)

فیزیک (۱) موازی

(مهدی میراب زاده)

-۱۲۱

بال هواییما طوری طراحی می‌شود که در هنگام اوج گرفتن، تندی هوا در بالای بال بیشتر از زیر آن باشد. در نتیجه، فشار هوای بالای بال کمتر از فشار هوای زیر آن است. بنابراین نیروی بالابر خالصی به بال هواییما وارد می‌شود.

(فیزیک ا، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۷)

(اشکان برگار)

-۱۲۲

وقتی یک ورق کاغذ را جلوی دهانتان می‌گیرید و در سطح بالای آن می‌دمید، تندی جریان هوا در بالای کاغذ بیشتر از زیر آن است. با توجه به اصل برنولی، فشار هوا در بالای کاغذ کمتر از زیر آن است. بنابراین نیروی بالاسوی خالصی به ورق کاغذ وارد می‌شود و کاغذ به طرف بالا حرکت می‌کند. سایر گزینه‌ها صحیح هستند.

(فیزیک ا، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۲ تا ۸۴)

(زهره رامشینی)

-۱۲۳

کمیت دماسنچی دماسنچ ترموکوپل، ولتاژ است و به دلیل دقت کمتر آن نسبت به دماسنچ‌های گازی، مقاومت پلاتینی و تفسنج، از مجموعه دماسنچ‌های معیار کنار گذاشته شد. بنابراین گزینه «۴» صحیح است.

(فیزیک ا، دما و گرما، صفحه ۹۴)



(زهرا احمدیان)

-۱۳۰

با استفاده از معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 + A_3 v_3$$

$$A_2 = \frac{3}{4} A_1, \quad A_3 = \frac{1}{4} A_1, \quad \frac{v_1}{v_2} = 2$$

$$\Rightarrow A_1 v_1 = \frac{3}{4} A_1 v_2 + \frac{1}{4} A_1 v_3 \Rightarrow v_1 = \frac{3}{4} v_2 + \frac{1}{4} v_3$$

$$\xrightarrow{+v_2} \frac{v_1}{v_2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \frac{v_3}{v_2} \Rightarrow 2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \frac{v_3}{v_2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_3}{v_2} = 5 \Rightarrow \frac{v_2}{v_3} = \frac{1}{5}$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)


(فرشید رسولی)

-۱۳۱

هرچه سطح مقطع لوله کوچکتر باشد، تندي هوا بیشتر و فشار آن کمتر می‌شود. در

نتیجه چون $P_{A_1} > P_{A_2}$ است، $A_1 > A_2$ می‌شود. بنابراین آب در شاخه سمت

چپ پایین و در شاخه سمت راست بالا می‌رود و داریم:



از برابری فشار در نقاط A و B داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{A_1} = P_{A_2} + \rho_{\text{آب}} gh \Rightarrow P_{A_1} - P_{A_2} = \rho_{\text{آب}} gh$$

$$P_{A_1} - P_{A_2} = 500 \text{ Pa}, \quad \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\Rightarrow 500 = 1000 \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow h = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)

(سید ملال میری)

-۱۲۸

طبق اصل برنولی، می‌دانیم در یک لوله افقی با افزایش تندي شاره، فشار آن کاهش می‌یابد و از طرفی می‌دانیم طبق معادله پیوستگی با کاهش سطح مقطع (مساحت)، تندي شاره افزایش می‌یابد. اگر مقاطع لوله افقی، بالای سر h_1 و h_2 را به ترتیب (۱)، (۲) و (۳) بنامیم:


$$v_1 > v_3 > v_2 \Rightarrow P_1 < P_3 < P_2$$

با توجه به این که نقاط هم‌سطح درون یک مایع در تعادل، دارای فشار برابر هستند،

نتیجه می‌گیریم:

$$P_A = P_B = P_C \Rightarrow P_1 + \rho gh_1 = P_2 + \rho gh_2 = P_3 + \rho gh_3$$

$$\Rightarrow \rho gh_1 > \rho gh_2 > \rho gh_3 \Rightarrow h_1 > h_2 > h_3$$



(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)

(سامان فبری)

-۱۲۹

طبق معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$A_1 = \pi \left(\frac{d_1}{2} \right)^2 = \frac{\pi d_1^2}{4} \quad : \text{مساحت سطح مقطع شلنگ}$$

$$A_2 = N \pi \left(\frac{d_2}{2} \right)^2 = 24 \times \frac{\pi d_2^2}{4} \quad : \text{مساحت سوراخ‌های آب‌پاش}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\pi d_1^2}{4} \right) \times 1/\Delta = (24 \times \frac{\pi d_2^2}{4}) \times v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{d_1^2 \times 1/\Delta}{24 \times d_2^2} = \frac{1/\Delta}{24} \times \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = \frac{1/\Delta}{24} \times \left(\frac{2}{0.2} \right)^2 = 6/24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴)



(سید جلال میری)

-۱۳۴

$$\left. \begin{aligned} F &= 0/52\theta \\ F &= \frac{9}{5}\theta + 32 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 0/52\theta = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \theta = -25^\circ C$$

$$T = \theta + 273 = -25 + 273 = 248 K$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

(سامان فیری)

-۱۳۵

ابتدا رابطه بین دمای X و دمای سلسیوس θ را به دست می‌آوریم:

$$\frac{x - (-30)}{120 - (-30)} = \frac{\theta - 0}{100 - 0} \Rightarrow \frac{x + 30}{150} = \frac{\theta}{100} \Rightarrow 150\theta = 100x + 3000$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2}{3}x + 20 \quad (I)$$

حال از رابطه بین مقیاس فارنهایت و مقیاس سلسیوس کمک می‌گیریم:

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow 5F = 9\theta + 160 \Rightarrow 9\theta = 5F - 160$$

رابطه (I) را در عدد ۹ ضرب می‌کنیم:

$$9\theta = 6x + 180$$

بنابراین:

$$5F - 160 = 6x + 180 \Rightarrow 5F = 6x + 340 \Rightarrow F = \frac{6}{5}x + 68$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

(محمد باغبان)

-۱۳۶

برای محاسبه درصد تغییرات متغیر X از رابطه $\frac{\Delta X}{X_1} \times 100$ استفاده می‌کنیم. درنتیجهبرای محاسبه درصد تغییرات دما در مقیاس فارنهایت (F) به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \begin{cases} \Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta = \frac{9}{5} \times 20 = 36^\circ F \\ F_1 = \frac{9}{5}\theta_1 + 32 = \frac{9}{5} \times (\frac{200}{9}) + 32 = 72^\circ F \end{cases}$$

(اسماعیل مرادی)

-۱۳۲

اگر حجم مخزن را با V ، سطح مقطع لوله ورودی به آن را با A و تنید آب در لوله ورودی به مخزن را با V نشان دهیم، زمان لازم برای پر شدن مخزن (t) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{حجم مخزن}}{\text{آهنگ شارش شاره}} = \frac{\text{زمان پر شدن مخزن}}{V}$$

$$\Rightarrow t = \frac{V}{Av} \Rightarrow t = \frac{\pi r^2 h}{\frac{\pi d^2}{4} v} = \frac{4r^2 h}{d^2 v}$$

$$\Rightarrow \frac{t_A}{t_B} = \left(\frac{r_A}{r_B}\right)^2 \times \frac{h_A}{h_B} \times \left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 \times \frac{v_B}{v_A} = 2^2 \times \frac{3}{2} \times 2^2 \times \frac{1}{2} = 12$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۲ تا ۸۴)

(زهره رامشینی)

-۱۳۳

طبق معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow \pi \frac{d_1^2}{4} v_1 = \pi \frac{d_2^2}{4} v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = v_1 \times \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 1/25 \times \left(\frac{10}{5}\right)^2 = 1/25 \times 16 = 2 \frac{m}{s}$$

اگر خروجی آب از لوله را نقطه (A) و حداکثر ارتفاع آب نسبت به سطح زمین را نقطه (B) فرض کنیم، با توجه به ناچیز بودن مقاومت هوا و در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی داریم:

$$E_A = E_B \Rightarrow K_A + U_A = K_B + U_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

$$\xrightarrow[\text{از طرفین}]{\text{حذف}} \frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2 + gh_B$$

$$\xrightarrow[v_B=0, h_B=?]{v_A=20 \frac{m}{s}, h_A=1m} \frac{1}{2} \times 20^2 + 10 \times 1 = \frac{1}{2} \times 0 + 10 \times h_B$$

$$\Rightarrow h_B = 10 m$$

(فیزیک، ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۸۲ تا ۸۴)



(اشنکان پرکار)

$$\left. \begin{array}{l} T_2 = 2T_1 \\ T = \theta + 273 \end{array} \right\} \Rightarrow \theta_2 + 273 = 2 \times (\theta_1 + 273)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = 2\theta_1 + 273$$

$$\text{اگر } \theta_1 > 0 \Rightarrow \theta_2 > 2\theta_1 \Rightarrow \frac{\theta_2}{\theta_1} > 2$$

$$\text{اگر } -136/5^\circ C < \theta_1 < 0 \Rightarrow \frac{\theta_2}{\theta_1} < 0$$

$$\text{اگر } -273^\circ C \leq \theta_1 \leq -136/5^\circ C \Rightarrow 0 \leq \frac{\theta_2}{\theta_1} \leq 1$$


بنابراین $\frac{\theta_2}{\theta_1}$ هر عددی بجز در فاصله $[1, 2]$ می‌تواند باشد. پس گزینه‌های «۱» و «۲» همواره صحیح نیستند و گزینه «۳» نیز هیچ‌گاه صحیح نیست.

واضح است که دمای جسم نمی‌تواند از صفر کلوین کمتر باشد.

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

(محمد پنگیبو)

-۱۴۰



$$\frac{\theta - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow \frac{\theta - 20}{24 - 20} = \frac{x - 8}{86 - 8}$$

$$\Rightarrow \frac{\theta - 20}{4} = \frac{x - 8}{6} \Rightarrow 6\theta - 120 = 4x - 32$$

$$\Rightarrow 4x = 6\theta + 200 \Rightarrow x = \frac{3}{2}\theta + 50$$

$$\theta = 100^\circ C \Rightarrow x = \frac{3}{2} \times 100 + 50 = 200^\circ$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

$$\Rightarrow \frac{\Delta F}{F_1} \times 100 = \frac{36}{72} \times 100 = 50$$

بنابراین دما در مقیاس فارنهایت 50° درصد افزایش یافته است.

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

-۱۴۱

(غیرشیدرسولی)

روش اول: با استفاده از رابطه میان دما در مقیاس‌های سلسیوس و کلوین داریم:

$$T = \theta + 273$$

$$\Rightarrow T_{\min} = \theta_{\min} + 273 \Rightarrow 184 = \theta_{\min} + 273 \Rightarrow \theta_{\min} = -89^\circ C$$

$$\Rightarrow T_{\max} = \theta_{\max} + 273 \Rightarrow 344 = \theta_{\max} + 273 \Rightarrow \theta_{\max} = 71^\circ C$$

با استفاده از رابطه میان دما در مقیاس‌های سلسیوس و فارنهایت داریم:

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow F_{\min} = \frac{9}{5} \times (-89) + 32 = -128/2^\circ F \\ \Rightarrow F_{\max} = \frac{9}{5} \times 71 + 32 = 159/8^\circ F \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \Delta F = 159/8 - (-128/2) = 288^\circ F$$

روش دوم:


$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta \xrightarrow{\Delta\theta = \Delta T} \Delta F = \frac{9}{5}\Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta F = \frac{9}{5} \times (344 - 184) = 288^\circ F$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

-۱۴۲

(فسرو ارغوانی فرد)



$$\theta = x \Rightarrow \frac{\theta}{100} = \frac{\theta - 20}{140} \Rightarrow 120\theta = 100\theta - 2000 \Rightarrow \theta = -100^\circ C$$

(فیزیک، دما و گرما، صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)



- نادرست؛ حدود یک هفته (نه یک ماه) زودتر آغاز می‌شود.
 - نادرست؛ با توجه به نمودار صفحه ۶۹ کتاب درسی، این افزایش پیوسته نیست.
- (شیمی ا، صفحه‌های ۶۹ و ۶۱)

(منصور سلیمانی ملکان)

-۱۴۶

- پاسخ سوالات الف، ب و پ را می‌توان در گزینه «۴» یافت.
- (شیمی ا، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(حسین سلیمی)

-۱۴۷

- در میان سوخت‌های ذکر شده، استفاده از زغال‌سنگ آلاینده‌های بیشتری ایجاد می‌کند و پس از هیدروژن و گاز طبیعی، بنزین گرمای بیشتری بر حسب کیلوژول بر گرم تولید می‌کند.
- (شیمی ا، صفحه ۷۶)

(حسین سلیمی)

-۱۴۸

- گزینه «۱»: انرژی خورشید ردپای کربن دی‌اکسید بیشتری نسبت به باد در تولید مقدار برق یکسان بر جای می‌گذارد.
- گزینه «۲»: اگر هواکره وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین به -18°C - کاهش می‌یابد.

- گزینه «۳»: یکی از راه‌های به حداقل رساندن اثرات کربن دی‌اکسید، دفن گاز CO_2 در مکان‌های عمیق و امن در زیرزمین است.
- (شیمی ا، صفحه‌های ۷۱، ۷۳، ۷۵ و ۷۸)

(پیمان فوابوی مهر)

-۱۴۱

- گازهای N_2 و O_2 در دمای بالا با هم واکنش می‌دهند.

- واکشن تبدیل گاز اوزون به گاز اکسیژن برگشت‌پذیر است.
 - گاز نیتروژن به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده هواکره، واکشن‌پذیری بسیار کمی دارد.
- (شیمی ا، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(حسین سلیمی)

-۱۴۲

- مایع‌ها همانند جامد‌ها تراکم‌ناپذیرند.
- (شیمی ا، صفحه ۸۱)

(حسن رحمتی کوکنده)

-۱۴۳

- حجم یک نمونه گاز به مقدار (مول و جرم گاز)، دما و فشار آن وابسته است و به جرم مولی گاز و جنس گاز وابسته نیست.
- (شیمی ا، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۳)

(پیمان فوابوی مهر)

-۱۴۴

$$\text{? g O}_2 = 0.25 \text{ mol O}_2 \times \frac{32 \text{ g O}_2}{1 \text{ mol O}_2} = 8.0 \text{ g O}_2$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۸۱ و ۸۳)

(محمد عظیمیان زواره)

-۱۴۵

- درست.

- درست.



(سعید نوری)

-۱۵۴

(کامران کیومرثی)

-۱۴۹

حجم ۲ گرم از گاز هلیم و ۲۴ گرم گاز اوزون در دما و فشار یکسان با هم برابر

تمامی عبارت‌ها صحیح هستند.

می‌باشد، زیرا تعداد مول‌های هر دو یکسان می‌باشد:

$$\text{? mol He} = 2 \text{g He} \times \frac{1 \text{mol He}}{4 \text{g He}} = 0.5 \text{mol He}$$

$$\text{? mol O}_3 = 24 \text{g O}_3 \times \frac{1 \text{mol O}_3}{48 \text{g O}_3} = 0.5 \text{mol O}_3$$

اما حجم این مقدار گاز در شرایط STP برابر با $11/2$ لیتر است و در شرایط دیگر،

حجم برابر با $11/2$ لیتر نیست.

(شیمی ا، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

(شیمی ا، صفحه‌های ۸۱ و ۸۲)

-۱۵۰

$$\begin{aligned} \text{? mol} &= 24 \text{h} \times \frac{60 \text{min}}{1 \text{h}} \times \frac{16}{1 \text{min}} \times \frac{1 \text{mol}}{22/4 \text{L}} = 720 \text{ mol} \\ &\text{هوای تنفس} \end{aligned}$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

-۱۵۱

(منصور سلیمانی ملکان)

-۱۵۵

(بهزاد تقی‌زاده)

-۱۵۲

مطابق ساختار لوویس زیر، نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در مولکول



مقدار گاز اوزون در هواکره ناچیز است.

اکسیژن نسبت به اوزن واکنش‌پذیری کمتری دارد.

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۵، ۶۶ و ۷۷ تا ۸۰)

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶)

-۱۵۳

(رسول عابدینی زواره)

-۱۵۶

(حسین سلیمانی)

در سیلندر با پیستون متحرک با تغییرات دما، حجم تغییر می‌کند ولی فشار ثابت

خواهد ماند. دما با حجم رابطه مستقیم دارد.

(شیمی ا، صفحه ۸۳)

با افزایش مول، حجم افزایش می‌یابد. برای مثال در دما و فشار ثابت اگر مول دو برابر شود، حجم دو برابر می‌شود.



(رسول عابدینی زواره)

-۱۶۰

$$N_2 = 112L \times \frac{1}{100} = 89/6 L N_A$$

$$O_2 = 112L \times \frac{1}{100} = 22/4 L O_A$$

$$\begin{cases} ? \text{ mol } N_A = 89/6 L N_A \times \frac{1 \text{ mol } N_A}{22/4 L N_A} = 4 \text{ mol } N_A \\ ? \text{ mol } O_A = 22/4 L O_A \times \frac{1 \text{ mol } O_A}{22/4 L O_A} = 1 \text{ mol } O_A \end{cases}$$



$$O_2 = 2 \text{ پیوند} \times 1 \text{ mol } O_A \times \frac{N_A O_A}{1 \text{ mol } O_A} \times \frac{\text{مولکول}}{1 \text{ مولکول}} = \text{تعداد پیوندهای کووالانسی در } O_2$$

پیوند

$$N_A = 12 \text{ پیوند} \times 4 \text{ mol } N_A \times \frac{N_A N_A}{1 \text{ mol } N_A} \times \frac{3 \text{ پیوند}}{1 \text{ مولکول}} = \text{تعداد پیوندهای کووالانسی در } N_A$$

پیوند

$$= 2N_A + 12N_A = 14N_A$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۴ و ۶۵، ۸۳ و ۸۴)

-۱۶۱

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{2T_1} \Rightarrow V_2 = 2V_1$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۸۲ و ۸۳)

-۱۶۷

(ماتا زمان)

طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم


(شیمی ا، صفحه ۸۳)

برابر است.

-۱۶۸

(سعید نوری)

بررسی نمودار الف: شبی این نمودار باید صعودی باشد و به صورت زیر است.



(شیمی ا، صفحه‌های ۷۲، ۶۹ و ۷۳)

-۱۶۹

(محمدجواد محسنی)

در این شهر مقدار $10000x$ کیلووات ساعت مصرف برق ماهانه وجود دارد؛ در نتیجهمقدار مصرف برق سالانه $120000x$ کیلووات ساعت است. در نتیجه مقدار

کربن دی اکسید تولید شده در سال برابر است با:

$$120000x \times 0.001 = 108000x \text{ kg CO}_2$$

در نتیجه تعداد درخت به دست می‌آید.

$$\frac{108000x}{12} = 9000x$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲)

(پیمان فراهی مهر)

-۱۶۱

شیمی (۱) موادی

(پیمان فراهی مهر)

• گازهای N_2 و O_2 در دمای بالا با هم واکنش می‌دهند.

• گاز نیتروزن به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده هوکرمه، واکنش‌پذیری بسیار

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

کمی دارد.





(اشنان و نزایی)

-۱۶۷

واکنش‌های انجام شده در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی به منظور تبدیل CO_γ به مواد

معدنی به صورت زیر است:



(شیمی ا، صفحه ۷۴)

(حسین سلیمانی)

-۱۶۸

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: پلاستیک‌های سبز، پلیمرهایی زیست‌تخریب‌پذیرند.

گزینه «۲»: این پلاستیک‌ها بر پایه مواد گیاهی همچون نشاسته ساخته می‌شوند.

گزینه «۴»: قیمت تمام شده تولید پلاستیک‌ها با پایه نفتی کمتر از قیمت تمام شده

تولید پلاستیک‌های سبز است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۵ و ۷۷)


(سعید نوری)

-۱۶۹

تنها نمودار ب درست رسم شده است.

بررسی نمودار الف: شبیه تولید کربن دی‌اکسید باید صعودی باشد و به صورت زیر

باشد:



بررسی نمودار ب: نمودار مساحت برف در نیمکره شمالی بر حسب سال به صورت زیر

(منصور سلیمانی ملکان)

-۱۶۲

پاسخ سوالات الف، ب و پ را می‌توان در گزینه «۴» یافت.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(حسین سلیمانی)

-۱۶۳

در ساختار سوخت‌های سبز، علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز یافت می‌شود.

(شیمی ا، صفحه ۷۴)

(مهربه یک محمدی عینی)

-۱۶۴

توسعه پایدار یعنی این که در تولید هر فراورده، همه گزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و


(شیمی ا، صفحه ۷۷)

زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.

(رسول عابدینی زواره)

-۱۶۵

فراورده‌های حاصل از سوختن زغال سنگ، به صورت زیر است:



(شیمی ا، صفحه ۷۶)

(اشنان و نزایی)

-۱۶۶

تمامی موارد ذکر شده درست است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۱، ۷۳ و ۷۵)



(حسن رحمتی‌کوئنده)

-۱۷۳

در یک روز زمستانی، تغییرات دمای هوای بیرون گلخانه نوسان زیادی دارد ولی تغییرات دمای درون گلخانه نوسان کمتری دارد.

(شیمی ا، صفحه ۷۷)



(شیمی ا، صفحه ۶۹)

(اشنان وندایی)

-۱۷۴

مولکول‌های اوزون مانع ورود بخش عمده‌ای از تابش‌های فرابینفشن خورشید به سطح زمین می‌شود تا موجودات زنده از آثار زیانبار این تابش در امان بمانند.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۹ و ۷۸)

-۱۷۰

(حسین سلیمانی)

در میان سوخت‌های ذکر شده، استفاده از زغال‌سنگ آلاینده‌های بیشتری ایجاد می‌کند و پس از هیدروژن و گاز طبیعی، بنزین گرمای بیشتری بر حسب کیلوژول بر گرم تولید می‌کند.

(کامران کیومرثی)

-۱۷۵

بخشی عمده‌ای از پرتوهای تابیده شده از خورشید به سطح زمین، توسط زمین، جذب و بخش قابل توجهی از آن، توسط زمین به صورت تابش فروسرخ با طول موج بلندتر (انرژی کمتر) بازتابیده می‌شود.

(شیمی ا، صفحه ۷۳)

-۱۷۱

(محمد عظیمیان زواره)

- درست.
- درست.
- نادرست؛ حدود یک هفته (نه یک ماه) زودتر آغاز می‌شود.
- نادرست؛ با توجه به نمودار صفحه ۶۹ کتاب درسی، این افزایش پیوسته نیست.

(منصور سلیمانی ملکان)


-۱۷۶

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۸ و ۶۹)

(حسین سلیمانی)

-۱۷۲

مطابق ساختار لوویس زیر، نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در مولکول



بررسی گزینه‌های نادرست:

اورزن برابر با $\frac{3}{4}$ است:

مقدار گاز اوزون در هواکره ناچیز است.

واکنش $\text{NO}_2(g) + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{NO}(g) + \text{O}_3(g)$ در حضور نور خورشید انجام می‌شود و به تولید مقداری گاز اوزون منجر می‌گردد. اوزون تولید شده در این واکنش همان اوزون تروپوسفری است.




(پیمان فوابوی مهر)

-۱۷۹

تنها عبارت «پ» درست است.


بررسی عبارت‌های نادرست:

الف) مجموع ضرایب مواد شرکت کننده در واکنش موازنه شده برابر ۵ است.



ب) گاز NO , گازی واکنش‌پذیر است و در دماهای پایین‌تر با گاز اکسیژن وارد واکنش می‌شود.

ت) ساختار لوویس گاز NO_2 به شکل زیر است که در آن، اتم نیتروژن به آرایش هشت‌تایی نرسیده است.



(شیمی ا، صفحه‌های ۵۸ تا ۶۰، ۶۴ و ۶۵)

(پیمان فوابوی مهر)

-۱۸۰

بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۳» در لایه اوزون واکنش‌های رفت و برگشت به یک میزان انجام می‌شود و همین امر موجب می‌شود که مقدار اوزون در هواکره، تقریباً ثابت باشد.

گزینه «۲»: در واکنش‌های برگشت‌پذیر، لزوماً مقدار واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها با یکدیگر برابر نیست.

گزینه «۴»: با توجه به برگشت‌پذیر بودن این واکنش، نقش محافظتی و ثابت ماندن مقدار اوزون در لایه اوزون توجیه می‌شود.

(شیمی ا، صفحه ۷۹)

اکسیژن نسبت به اوزون واکنش‌پذیری کمتری دارد.

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۴، ۶۵ و ۷۷ تا ۸۰)

(حسین سلیمان)

-۱۷۷

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: انرژی خورشید ردپای کربن دی‌اکسید بیشتری نسبت به باد در تولید مقدار برق یکسان بر جای می‌گذارد.

گزینه «۲»: اگر هواکره وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین به -18°C - کاهش می‌یافتد.

گزینه «۳»: یکی از راه‌های به حداقل رساندن اثرات کربن دی‌اکسید، دفن گاز CO_2 در مکان‌های عمیق و امن در زیرزمین است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۱ و ۷۵)

(محمد پوار محسنی)

-۱۷۸

در این شهر مقدار 10000X کیلووات ساعت مصرف برق ماهانه وجود دارد؛ در نتیجه مقدار مصرف برق سالانه 120000X کیلووات ساعت است. در نتیجه مقدار کربن دی‌اکسید تولید شده در سال برابر است با:

$$120000\text{X} \times 0.9 = 108000\text{X} \text{ kg CO}_2$$

در نتیجه تعداد درخت به دست می‌آید.

$$\frac{108000\text{X}}{12} = 9000\text{X}$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲)