



پایه دهم تجربی

۹۷ اسفند

و فقره سوال

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰ + ۹ سوال نظرخواهی مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
	فارسی و نکارش (۱)	۱۰	۱	۳	۱۰ دقیقه
	عربی زبان قرآن (۱) طراحی شاهد	۲۰	۱۱	۴	۲۰ دقیقه
	دین و زندگی (۱)	۱۰	۳۱	۶	۱۵ دقیقه
	زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۴۱	۷	۱۵ دقیقه
	ریاضی (۱) - عادی	۲۰	۵۱	۸	۳۰ دقیقه
	ریاضی (۱) - موازی	۲۰	۷۱	۱۱	
	فیزیک (۱) - عادی	۲۰	۹۱	۱۴	۳۵ دقیقه
	فیزیک (۱) - موازی	۲۰	۱۱۱	۱۷	
	زیست‌شناسی (۱) - عادی	۲۰	۱۳۱	۲۱	۲۰ دقیقه
	زیست‌شناسی (۱) - موازی	۲۰	۱۵۱	۲۳	
	شیمی (۱) - عادی طراحی شاهد	۲۰	۱۷۱	۲۶	۲۰ دقیقه
	شیمی (۱) - موازی طراحی شاهد	۲۰	۱۹۱	۲۸	
	نظرخواهی	۹	۲۹۰	۳۱	-

طراحان

نام طراحان	نام درس
افسانه احمدی - حمید اصفهانی - سپهر حسن خان پور - آکیتا محمدزاده	فارسی و نکارش (۱)
درویشعلی ابراهیمی - مریم آقایاری - فرشته کیانی - رضا معصومی	عربی زبان قرآن (۱)
محبوبه ابتسام - فردین سماقی - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کبر - محمد مقدم	دین و زندگی (۱)
میرحسین زاهدی - علی شکوهی - علی اشوری	زبان انگلیسی (۱)
علی ارجمند - ناصر استکندری - محمد بحرابی - داود بوالحسنی - محمد پوراحمدی - ایمان چینی فروشان - جمشید حسینی خواه - مهرداد خاجی - شکیب رجبی - رحیم مشتاق نظم - وهاب نادری - حسن نصرت ناهوک	ریاضی (۱)
جواد احمدی شعاعر - عبدالرضا امینی نسب - زهرا آقامحمدی - اسامیل حدادی - کمال خرمی - میثم دشتیان - سیدرضا رضوی - حمید زین کنش - هوشنگ غلام عابدی - عبدالله قفهزاده - سیدعلی میرنویزی - گوفر مفتاح - حسین ناصحی	فیزیک (۱)
علی رضا آروین - مازیار اعتمادزاده - توحید بابایی - امیرحسین بهروزی فرد - پیمان رسولی - محمد مهدی روزبهانی - علی کرامت - مهرداد محبی - سینا نادری - محمود نصرت ناهوک	زیست‌شناسی (۱)
علی رحیمی - هادی زمانیان - علی علمداری - محمد فلاحت‌نژاد - علی مجیدی - محمدعلی نیک پیما	شیمی (۱)

مسئولین درس

مسئولین درس گروه مستندسازی	مسئولین درس گروه آزمون	مسئولین درس
الناز معتمدی	سپهر حسن خان پور	حیدر اصفهانی
محمد ناصری	فرشته کیانی - سیدمحمدعلی هرتضوی	رضا معصومی
آرزو بالازاده	صالح احصائی - سیداحسان هندی	حامد دورانی
فاطمه فلاحت پیشه	آنهاهیتا اصغری - فربیا توکلی	زبان انگلیسی (۱)
حمدیرضا رحیم خانلو	سروش کربیمدادی - حمید زین کنش - حسین اسفینی - امیرحسین کارگردی	ریاضی (۱)
آتنه اسفندیاری	باک اسلامی - عرفان مختارپور - محمدحسن حاجی عابدی	فیزیک (۱)
لیدا علی‌اکبری	امیرحسین بهروزی فرد - علی علمداری - محمد عابدی - سیده بجهی	زیست‌شناسی (۱)
الهه شهبازی	امیرحسین معروفی - ایمان حسین نژاد - علی حسنه صفت	شیمی (۱)

گروه فنی و تولید

محيا اصغری	مدیر گروه اخلاقی
شیلا کیانی	مسئول دفترچه
مهنی علی‌محمدی جلالی	حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی اخلاقی
مدیر گروه: سیدمحمدعلی مرتضوی / مسئول دفترچه: مصصومه شاعری / حروف‌چین: فاطمه علیاری	گروه عمومی
مدیر گروه: مریم صالحی / مسئول دفترچه: فاطمه فلاحت پیشه - لیلا ایزدی	گروه مستندسازی
علی رضا سعد‌آبدی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچه (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۰۰ - تلفن: ۰۶۱۴۶۶۰۰ - ۰۶۱۰



۱۰ دقیقه

فارسی (۱)

ادبیات انقلاب اسلامی

(دریادلان صفحه‌شکن، خاک آزادگان)

صفحه‌های ۷۴ تا ۹۳

نگارش (۱)

نوشته‌ی ذهنی (۱)، جانشین‌سازی

صفحه‌های ۷۲ تا ۸۳

فارسی و نگارش (۱)

۱- بیت زیر را کدام واژه کامل می‌کند؟

«به دیوار دلم گر نقش کین بود / من آن را در گچ ... گرفتم»

(۱) اسوه

(۲) نسیان

(۲) جنود

(۴) گلشن

۲- واژه‌های «توسن»، «مهیب»، «فرق» و «تقریظ» به ترتیب چه معنایی دارند؟

(۱) اسب سرکش، هول آور، دوری، ستودن

(۲) اسب رام، ترسیده، آسودگی، نکوهش

(۳) اسب سرکش، ترسناک، رهایی، نکوهش

(۴) اسب رام، وحشت‌کرده، جدایی، ستودن

۳- در کدام عبارت نادرستی املایی وجود دارد؟

(۱) ملک گفت: سزاواری که در تعذیب تو مبالغت رو.

(۳) جاهای که از سر غضب و وقاره و حسد برخیزد.

۴- کدام نوع فعل در عبارت زیر نیست؟

«وسایل سنگین راهسازی را بر شاورها کرده‌اند تا به محض شکستن خطوط مقدم دشمن، آن‌ها را به آن سوی رودخانه ارونده حمل کنند. بچه‌ها نیز

همان بچه‌های بی‌تکلف و متواضع و ساده‌ای هستند که همیشه در مسجد می‌بینی و تو تا به حال درنمی‌یافته‌ای.»

(۴) ماضی بعید

(۳) ماضی نقلی

(۲) مضارع التزامي

۵- در بیت گزینه‌ی ... مصراعی هست که اجزای جمله‌ای آن، کاملاً با ترتیب نقش دستوری جمله‌ای معیار آمده است.

(۱) چه شوی تنگدل ار بر تو همی بازم عشق / عشق بازیدن با خوبان رسمیست قدیم

(۲) عشق رسمیست ولیکن همه اندوه دل است / خنک آن کو را از عشق نه ترس است و نه بیم

(۳) با توانایی و با جود کم آمیزد حلم / خواجه بوسهل توانا و جواد است و حلیم

(۴) عید او باد سعید و روز او باد چو عید / دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم

۶- نقش دستوری چند تا از واژه‌های مشخص شده در ایات زیر «نهاد» است؟

(الف) اقرار دهد شاه جهان را به همه فضل / آن کس که دهد خلق به فصلش همه اقرار

(ب) کفار پراکنده و برکنده شدستند / از بس که شکسته‌ست ملک لشکر کفار

(ج) پیکار همی‌جوید پیوسته ولیکن / کس نیست که با لشکر او جوید پیکار

(د) دشوار جهان نزد ملک باشد آسان / آسان ملک نزد همه گیتی دشوار

(ه) دینار چنان بخشید ما را که بر ما / پیوسته بود خوارترین چیزی دینار

(۱) یکی

(۲) دو تا

(۳) سه تا

(۴) چهار تا

۷- در کدام بیت جمله‌ی غیرساده دیده نمی‌شود؟

(۱) من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندرو / از نهیب دیو دل خوناب گشته هر زمان

(۲) زان درازی راه با دل گفتمی هر ساعتی / کاین بیابان را مگر پیدا نخواهد بد کران

(۳) اندر این اندیشه بودم کز کنار شهر بست / بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان

(۴) شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زی / کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران

۸- در بیت زیر، دو واژه‌ی ... و ... هر دو رکن دوم تشییه هستند.

«شوخ‌چشمی چو مگس کردم و برداشت عدو / به مگس‌ران ملامت ز کنار شکرم»

(۱) مگس، شکر

(۲) مگس، مگس‌ران

۹- کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوش» قربات معنایی بازتری دارد؟

(۴) مگس‌ران، شکر

(۳) من، شکر

(۱) تعالی الله یکی بی‌مثل و مانند / که خوانندش خداوندان خداوند

(۳) نگه‌دارنده‌ی بالا و پستی / گوا بر هستی او جمله هستی

۱۰- ارتباط تصویری و معنایی کدام بیت با بیت زیر آشکارتر است؟

«مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افزورده از مدنف من»

(۱) شود افسرده خون در پیکرش از سردي عالم / اگر نه شعله فطرت سخنور را به جوش آرد

(۲) از دل افسرده جز افسرده‌دل آگاه نیست / آن که داند و حشمت شب‌های تار من تویی

(۳) بگشای تربیتم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم دود از کفن برآید

(۴) آتش آن نیست که از شعله‌ی او خنده جمع / آتش آن است که در خرم‌پروانه زندن



٢٠ دقیقه

«هذا خلقُ الله»
متن درس + الجملة الفعلية و
الإسمية + مع ساقِ سیارة الاجرة
صفحههای ٤٧ تا ٥٣

عربی، زبان قرآن (۱)

١١- «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ يَدْعَا الْخَلْقُ»، عَيْنَ التَّرْجِمَةِ الصَّحِيحَةِ:

(۱) بگو در زمین بگردند و ببینند چگونه (خدواند) آفرینش را آغاز کرده است!

(۲) بگو در زمین بگردید پس بنگرید چگونه (خدواند) آفرینش را آغاز کردا!

(۳) بگو در زمین سیر کنید تا چگونگی آفرینش خداوند را ببینیدا!

(۴) بگو در زمین گردش کنید و بنگرید آفرینش چگونه آغاز شده است!

١٢- ما هو الصحيح:

(۱) القِطْ صُورًا جَمِيلَةً مِنْ هَذِهِ الْمَناطِرِ الطَّبِيعِيهِ! از این منظرههای طبیعی، عکس‌هایی زیبا گرفت!

(۲) هل يمكن أن أستفيد من مقالات هذه المكتبة؟! آيا ممكن است که از این مقاله‌ها در کتابخانه استفاده کنم؟!

(۳) قال السائق: ينْفُصُ زَيْتُ سِيَارَتِي الْأُجْرَةِ خَلَالَ نَصْفِ الْيَوْمِ! رَانَدَهُ گفت: روغن تاکسی‌ام در طول نصف روز تمام می‌شودا!

(۴) علينا أن نستعمل هذه الأحتساب الطيبة طبق وصفة الطبيبة!: ما باید این گیاهان دارویی را طبق نسخه پرشک به کار ببریما!

١٣- عَيْنَ الصَّحِيحَ فِي التَّرْجِمَةِ:

(۱) ما قَسْمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْلِ! خداوند برای بندگان چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است!

(۲) تَعِيشُ حَيَوانَاتٍ مَائِيَّةً فِي أَعْمَاقِ الْمَحِيطِ: حیواناتی آبی در اعماق دریا زندگی می‌کنند!

(۳) مَنْ طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَ وَ جَدَ! کسی که چیزی را خواست، تلاش کرد و پیدا کرد!

(۴) كَانَ الْطَّلَابُ يَسْاعِدُ بَعْضَهُمْ بَعْضَاً: دانش‌آموزان به یکدیگر کمک کرده بودند!

١٤- عَيْنَ الْخَطَأَ فِي تَرْجِمَةِ الْعِبارَاتِ:

(۱) كیف لا تتحرّک عین البومة و هي قادرة على الرؤیة؟! چگونه چشم جعد حرکت نمی‌کند در حالی که او توانا بر دیدن است؟!

(۲) تحذیر الحيوانات لإبعادهم عن الخطر من وظائف الزراقة!: هشدار به حیوانات برای دور شدن از خطر از وظایف زراfe است!

(۳) زیارتک لسلمان الفارسی مقبوله إن شاء الله و مأجوره: زیارت تو از سلمان فارسی اگر خدا بخواهد پذیرفته شده و پاداش داده شده است!

(۴) مَنْ كَبَرَ حَمَقَهُ أَغْرِقَ فِي مَدِحِ شَخْصٍ أَوْ ذَمَّهُ: هر کس حماقتش زیاد شود در ستایش از شخصی یا مذمت او زیاده روی می‌کندا!

١٥- عَيْنَ الْأَصْحَاحَ لِلْفَرَاغَاتِ: «تَسْتَطِعُ .. أَنْ تُدِيرَ .. فِي اِتْجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ دُونَ أَنْ .. رَأَسَهَا!»

(۱) الْحِرَباءُ - يَدِئُهَا - يُحَرِّكُ

(۲) الْفَطَّةُ - عَيْنَهَا - تُحَرِّكُ

(۳) الْبَوْمَةُ - ذَنَبَهَا - تُحَرِّكُ

١٦- عَيْنَ غَيْرِ الْمَنَاسِبِ لِلْمَفْهُومِ: «لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ إِلَّا فَاعْلَمُ!»

(۱) مَنْ حَفَرَ بِثَرَا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهَا!

(۲) مَنْ زَرَعَ الدُّوَانَ، حَصَدَ الْخُسْرَانَ!

١٧- عَيْنَ الْقَرِيبِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ: «كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتُهُ الْمَوْتُ»

(۱) روز مرگ نفسي وعده دیدار به / وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

(۲) آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست / هرگز گمان میر که مر او را فنا بود

(۳) اگر مرگ دادست بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

(۴) هر که آمد عمارتی نو ساخت / رفت و منزل به دیگری پرداخت

١٨- عَيْنَ عِبَارَةِ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْخَبْرِ:

(۱) ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل!

(۲) أَتَعْرِفُ مَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِيَّ؟!

(۳) ثمرة العلم اخلاص العمل!

(۴) هَذِهِ النَّبَاتَاتُ تَفَيدُنَا لِمَعَالِجَةِ الْأَمْرَاضِ!

١٩- عَيْنَ الْمَفْعُولِ مَضَافاً وَ مَوْصُوفاً مَعَا:

(۱) يَرْعَ الْفَلَاحَ الْمَجْدَ أَشْجَارَ التَّفَاحِ!

(۲) تَقْرَأُ بَنَتِي الْمَجْتَهِدَةِ الْكِتَبَ الْمُفَيَّدَةَ مَرَّاتٍ!

(۳) فِي أَيِّ عِبَارَةِ مَا جَاءَ الْمُبَدِّدَ:

(۱) أَلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

(۲) «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا»

(۴) أشیع الناس من غلب هواه!

(۵) «كُلُّ شَيْءٍ هَالَكَ إِلَّا وَجْهَهُ»



پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

آزمون گواه (شاهد)

٢١- «يَمْلِكُ أَغْلَبُ الْحَيَّانَاتِ لُغَةً عَامَّةً أَيْضًا سَتَطِيعُ مِنْ خَلَالِهَا أَنْ تَسْفَاهُمْ مَعَ بَعْضِهَا!». عَيْنِ الْجَوابِ الصَّحِيحِ فِي التَّرْجِمَةِ:

- (١) اکثر حیوانات زبانی مشترک دارند که به واسطه‌ی آن قادرند باهم تفاهم داشته باشند!
- (٢) حیوانات اغلب زبان مشترکی نیز دارند که از آن طریق باهم توان برقراری ارتباط دارند!
- (٣) بیش تر حیوانات یک زبان عمومی نیز دارند که از طریق آن می‌توانند هم‌دیگر را درک کنند!
- (٤) بیش تر جانداران زبانی دارند که عموماً به وسیله‌ی آن می‌توانند پیام یکدیگر را دریافت کنند!

٢٢- عَيْنِ غَيرِ الصَّحِيحِ فِي التَّرْجِمَةِ:

(١) مِئَاتُ الْمَصَابِحِ الْمُتَدَدِّدَةِ الْمُلُوَّنَةِ: صدھا چراغ گوناگون رنگارنگ.

(٢) تُحَوَّلُ ظَلَامُ أَعْمَاقِ الْمُحِيطِ إِلَى نَهَارٍ مُضِيءٍ: اعماق تاریک دریا را به روزی روشن تبدیل می‌کند.

(٣) هَذِهِ الْأَضْوَاءُ تَتَبَعِّثُ مِنْ نَوْعٍ مِنَ الْبَكْيَرِيَا الَّتِي: این نورها از نوعی باکتری فرستاده می‌شود که،

(٤) تَعِيشُ تَحْتَ عُبُونِ بَعْضِ الْأَسْمَاكِ: زیر چشمان بعضی از ماهی‌ها زندگی می‌کنند!

٢٣- عَيْنِ الْخَطَأِ فِي تَرْجِمَةِ مَا تَحْتَهُ خَطَّ:

(١) عَيْنِ الْبُوْمَةِ ثَابِتَةٌ وَ لَا تَسْتَرِحُكُ: جذب

(٣) فَتَسْتَطِعُ أَنْ تُدْبِرَ رَأْسَهَا مُتَنَبِّينَ وَ سَبْعِينَ دَرْجَةً: که بچرخاند

(٤) قَدْ أَنْشَدَ خَاقَانِيُّ الشَّاعِرُ الْإِيرَانِيُّ قِصِيدَةً عِنْدَ مُشَاهِدَتِهِ إِيَّوَانَ كِسْرَى!. عَيْنِ سُؤَالِيَّسَ جَوابُهُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ:

- (٤) أَيْنَ عَاشَ خَاقَانِي؟
- (٣) مَنْ شَاهَدَ إِيَّوَانَ كِسْرَى؟
- (٢) مَتَى أَنْشَدَ قِصِيدَتَهُ؟
- (١) مَاذَا أَنْشَدَ خَاقَانِي؟

٢٤- عَيْنِ الْخَطَأِ لِلفراغِ حَسْبِ الْمَعْنَى:

(١) ... الْحَالِقُ قَوْلَ الَّذِي يَكْذِبُ كَثِيرًا: يُصَدِّقُ

(٣) الْحَاضِرُونَ ... الْلَّاعِبِينَ فِي مُسَابِقَيْنِ: شَجَعُوا

٢٥- عَيْنِ الْخَطَأِ لِلفراغِ حَسْبِ الْمَعْنَى:

(٢) الْلَّوْنُ الْبَنْفَسَجِيُّ لُغْرَفَةِ النَّوْمِ ... الْأَعْصَابِ: مُهَدِّي

(٤) لَا تَكْتُبْ ... عَلَى الْآثارِ الْتَّارِيْخِيَّةِ وَ الْأَشْجَارِ: ذِكْرَى

(١) أَحَبُّ عَبَادِ اللَّهِ إِلَى أَنْفَهُمْ لِعَبَادَهُ: جملة اسميّة

(٣) أَفْضَلُ الْجُودِ بِذِلِّ الْمَوْجُودِ: جملة فعلية

٢٦- عَيْنِ الصَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ نَوْعِ الْجَملَةِ:

(٢) فِي الْمَدْرَسَةِ طَالَعْتُ: جملة اسمية

(٤) يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ: جملة فعلية

٢٧- عَيْنِ مَا فِيهِ صَفَةُ الْلَّفَاعِلِ:

(١) عَلَيْنَا أَنْ نُمارِسَ الرِّبَابِيَّةِ الصَّبَاحَةِ!

(٣) شَاهَدْتُ أَسْتَاذَ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمَكَتبَةِ!

■ إِقْرَأُ النَّصَّ التَّالِي ثُمَّ أَجْبُ عنَ الْأَسْئَلَةِ بِدَقَّةٍ:

الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة و على الضيف أن يتحوّل بعد ثلاثة أيام ... ذهب رجل إلى صديقه بقي عنده أياماً متولية حتى شعر بالتعب من إقامته الطويلة ففكّر في حيلة ليتخلص منه. فاقتصر على ضيوفه الاشتراك في مسابقة قفز لتعيين الشخص الفائز. ثم قال لولده: عندما يقفز الضيف إلى خارج البيت، أغلق الأباب، عند المسابقة قفز الضيف متراً أقل من صاحب البيت و قال: متراً واحداً إلى داخل البيت خيراً من مترين إلى الخارج!

٢٨- عَيْنِ التَّرِيبِ مِنْ مَعْنَى عِبَارَةِ «مَتْرٌ وَاحِدٌ إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ مَتَرَيْنِ إِلَى الْخَارِجِ!»:

(١) مَنْ طَمَعَ بِالْكَثِيرِ مَا حَصَلَ عَلَى الْقَلِيلِ!

(٣) خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا!

(٢) عَلَيْهِ الْقِيَسُ فِي الْمَدَارَاةِ!

(٤) الْأَضْيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ!». ما معنى «عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ؟»؟

(٤) عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَعْوَضَ!

(٣) عَلَيَّهِ بِالْتَّخَرُجِ!

(١) عَلَيْهِ بِالْتَّخَرُجِ

٣٠- «فَاقْتَرَحَ عَلَى ضَيْفِهِ الاشتراكَ فِي مُسَابِقَةِ قَفزِ لِتَعْيِينِ الشَّخْصِ الْفَائِزِ!». عَيْنِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْمَحْلَ الْإِعْرَابِيِّ لِلكلِماتِ:

- (٤) الْفَائِزُ: صفة
 - (٣) الشَّخْصُ: فاعل
 - (٢) الْاشتِراكُ: مفعول
 - (١) اقتَرَحَ: فعل و فاعل، و الجملة فعلية
- forum.konkur.in



۱۵ دقیقه

- تفکر و اندیشه
فرجام کار
قدم در راه
آهنگ سفر
صفحه‌های ۸۲ تا ۱۰۶

دین و زندگی (۱)

۳۱- در چه زمانی ناله حسرت دوزخیان برمی‌خیزد و آنان به خداوند چه می‌گویند؟

۱) هنگام ورود به بزرخ- دریغ برما، به خاطر کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.

۲) هنگام دچار شدن به عذاب- دریغ برما، به خاطر کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.

۳) هنگام دچار شدن به عذاب- خدا به ما وعده‌ای را داد اما ما نپذیرفتیم.

۴) هنگام ورود به بزرخ- خدا به ما وعده‌ای را داد اما ما نپذیرفتیم.

۳۲- تعبیر قرآنی «سیصلون سعیر» درباره چه موضوعی به کار رفته و نتیجه آن چیست؟

۱) صورت اخروی خوردن مال یتیم- بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

۲) صورت اخروی خوردن مال یتیم- آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

۳) تجسم اعمال انسان در بزرخ- آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

۴) تجسم اعمال انسان در بزرخ- بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

۳۳- براساس آموزه‌های وحیانی، علت «سرور بهشتیان» و «شعلهور شدن آتش از درون جان جهنه‌یان» به ترتیب چیست؟

۱) وصول به مقام خشنودی- تصویر عمل

۲) دوری از رنج و درماندگی- تصویر عمل

۳) وصول به مقام خشنودی- حقیقت عمل

۳۴- طبق بیان صریح قرآن خداوند در سوره نساء برای چه کسانی عذابی دردناک فراهم کرده است؟

۱) کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد، می‌گوید: الان توبه کردم.

۲) کسانی که در دنیا مست و مغدور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند.

۳) کسانی که نماز نمی‌خوانند و از محروم‌دان دستگیری نمی‌کرددند.

۴) کسانی که همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می‌شوند و روز رستاخیز را تکذیب می‌کرددند.

۳۵- دوزخیان معتقدند که علت گمراهی‌شان چیست و چه چیزی آنان را از یاد خدا بازداشت؟

۱) گناهان بزرگ- شقاوت و غفلتشان

۲) شیطان، بزرگان و سرورانشان- دوستانشان

۳) شیطان، بزرگان و سرورانشان- شقاوت و غفلتشان

۳۶- مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان‌شکنی با خداست، به جز ...

۱) عدم نگریستن خدا به آن‌ها در قیامت

۲) عدم طهارت از گناه

۳) بی‌نظمی امور دنیوی

۴) عدم بهره در آخرت

۳۷- در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت... است تا... و قرآن کریم تعبیر اسوه نیکو را برای... به کار برد است.

۱) محاسبه- ثمرات موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید- اهل بیت (ع)

۲) ارزیابی- ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- پیامبر (ص)

۳) ارزیابی- ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- پیامبر (ص)

۳۸- پیامبر اسلام (ص)، ... را موجب رستگاری و نجات انسان می‌شمردند و اسوه بودن بزرگان دین در اموری است که ...

۱) پیام بستن با خدا- به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر می‌کند.

۲) پیام بستن با خدا- به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر می‌کند.

۳) پیام بستن با خدا- همواره برای بشر خوب و بالرزش است.

۴) پیام بستن با خدا- همواره برای بشر خوب و بالرزش است.

۳۹- رسیدن آسان به هدف، معلوم کدامیک از راه‌های گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت از خداوند است؟

۱) تصمیم و عزم برای حرکت

۲) مراقبت

۳) محاسبه و ارزیابی

۴) عهد بستن با خداوند

۴۰- مطابق حدیث علوی، «علیت» و «راه حل» از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها چیست؟

۱) گذشت ایام- محاسبه

۲) نافرمانی از الگوها- محاسبه

۳) گذشت ایام- مراقبت

۳) نافرمانی از الگوها- مراقبت



زبان انگلیسی (۱)

PART A: Vocabulary and Grammar

Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

۱۵ دقیقه

The Value of Knowledge Listening ابتدای and Speaking صفحه‌های ۷۱ تا ۸۶

41- I haven't seen David for a long time. The last time I saw him, he ... to find a job in Miami.

42- Were the students ... about the school's plan for going on a picnic next Friday when the teacher came in?

- 1) will talk 2) talking 3) talked 4) are going to talk

43- People often wonder whether they could jump just before a falling lift hits the floor, but ... this tactic will not work.

- 1) especially 2) correctly 3) unfortunately 4) rapidly

44- After the war between two neighboring countries came to an end, a lot of mass ... were found by the local people.

- 1) problems 2) stories 3) pains 4) graves

45- Scientists are trying hard to ... effective medicines to cure the cancer which is a very dangerous disease and often causes death.

- 1) develop 2) describe 3) identify 4) compare

46- Although my mother told me repeatedly to wear clothes that bring ... protection against the extreme cold in the winter days, I didn't pay attention to her.

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Would you like to have a birthday party every 13 days? Then Gliese 581c is the place for you! Astronomers ...⁽⁴⁷⁾... found the planet Gliese 581c. It goes around the star Gliese 581 once every 13 days. Earth ...⁽⁴⁸⁾... its star, the sun, every 365 days. Gliese 581c is an exoplanet- a planet that exists beyond our solar system. It is the most earthlike exoplanet discovered so far. Astronomers say there could be liquid water on Gliese 581c. And where there's water, there could be ...⁽⁴⁹⁾.... This planet will most probably be a very important goal of the ...⁽⁵⁰⁾... of space missions.

- 47- 1) recently 2) hopefully 3) sadly 4) carefully

48- 1) collects 2) divides 3) orbits 4) creates

49- 1) planet 2) life 3) research 4) invention

50- 1) fact 2) future 3) gift 4) material



۳۰ دقیقه

معادله‌ها و نامعادله‌ها/تابع

فصل ۱۴ از ابتدای سهیمی تا
پایان فصل ۶ و فصل ۵ تا پایان
مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
صفحه‌های ۷۸ تا ۱۰۰

محل انجام محاسبات

ریاضی (۱) - عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:


از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۵۱- به ازای چه مقدار m نمودار پیکانی زیر نمایش یک تابع است؟



۱) هیچ مقداری برای m وجود ندارد.

۲)

۳)

۴)

۵۲- کدام یک از روابط زیر یک تابع را مشخص نمی‌کند؟


۱) رابطه‌ای که به هر نفر شماره ملی‌اش را نسبت دهد.

۲) رابطه‌ای که به هر درخت برگ‌هایش را نسبت دهد.

۳) رابطه‌ای که به شهر عدد جمعیتش را نسبت دهد.

۴) رابطه‌ای که به هر نفر طول قدش را نسبت دهد.

۵۳- کدام نمودار پیکانی زیر، بیانگر یک تابع است؟ (a و b اعداد حقیقی و متمایز هستند).



۵۴- اگر تابع $f = \{(a^2 - 1, b), (-2, 3), (8, 2b), a^2 + b^2\}$ کدام فقط شامل دو زوج مرتب متمایز باشد، مقدار $a^2 + b^2$ کدام است؟ (a و b اعداد حقیقی می‌باشند)

۴۱) ۴

۲۵) ۳

۱۳) ۲

۵) ۱

۵۵- اگر رابطه $f = \{(3, x+2y), (6, 2), (3, 4), (4, 4), (6, x-2y)\}$ تابع باشد، آنگاه $x+y$ کدام است؟

۵) ۴

$\frac{5}{2}) ۳$

$\frac{7}{2}) ۲$

۴) ۱

اگر پاسخ دادن به سؤالی وقت زیادی از شما می‌گیرد در پایان آزمون به آن پاسخ دهید.

محل انجام محاسبات

-۵۶ - اگر رابطه $f = \{(-1, a-4), (a-3, a-b), (-1, 1), (3, a), (2, 4)\}$ کدام است؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

-۵۷ - جدول تعیین علامت کدام یک از چندجمله‌ای‌های زیر به صورت زیر می‌باشد؟

x	-۲	1
y	- +	+ +

$$y = x^3 - x + 2 \quad (۲)$$

$$y = x^3 + x - 2 \quad (۱)$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 4 \quad (۴)$$

$$y = x^3 + 3x^2 - 4 \quad (۳)$$

-۵۸ - در کدام بازه باشد تا عبارت $A = (2 - |x|)(2x - 6)$ منفی باشد؟

(−۲, ۳) (۲)

(۲, +∞) (۱)

(-∞, ۲) (۴)

(-۲, ۲) ∪ (۳, +∞) (۳)

-۵۹ - اگر جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = \frac{bx(x-a)^3}{ax^3 + bx + c}$ به صورت زیر باشد، آنگاه مجموعه مقادیر ممکن برای b کدام است؟

x	-۱	0	2
$P(x)$	+	+	-

ن ت

{4, -4} (۴)

{-4} (۳)

{4} (۲)

{ } (۱)

-۶۰ - اگر بازه $(-1, 2)$ بزرگترین بازه‌ای باشد که در آن علامت عبارت $y = ax^3 + x + 2a^2$ مثبت باشد، a کدام است؟

-۱ (۴)

1 (۳)

 $\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۱)

-۶۱ - مجموعه جواب نامعادله $\frac{x^2 - x}{x + 2} \geq 2$ کدام است؟

 $\mathbb{R} - (-1, 4)$ (۲) $\mathbb{R} - [-1, 4]$ (۱) $(-2, -1) \cup [4, +\infty)$ (۴) $(-2, -1) \cup (4, +\infty)$ (۳)

-۶۲ - اگر رأس سهمی $y = 3x^2 + ax + b$ نقطه $S(1, -4)$ باشد، $a - b$ برابر با کدام گزینه است؟

-۵ (۴)

-۷ (۳)

5 (۲)

7 (۱)

-۶۳ - اگر $S(1, -4)$ رأس سهمی $y = ax^2 + bx + c$ باشد، طول نقطه تلاقی این سهمی با محور x ها کدام است؟

-۲, ۳ (۴)

-۳, ۵ (۳)

-۱, ۳ (۲)

-۲, ۴ (۱)

-۶۴ - اگر سهمی به معادله $y = ax^3 - bx + c$ از مبدأ مختصات و نقطه $A(-1, 3)$ بگذرد و محور تقارن آن $x = 2$

باشد، مقدار $15a + 5b + c$ کدام است؟

18 (۴)


21 (۳)

-۳ (۲)

9 (۱)


محل انجام محاسبات

۶۵- نمودار سهمی به معادله $y = -2x^2 + ax + a + 2$ به صورت زیر است. این سهمی قسمت مثبت محور x را در نقطه‌ای با کدام طول قطع می‌کند؟



- ۱) ۱
۲) ۲
 $\frac{3}{2}$ ۳
۴) ۴

۶۶- نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر است. حاصل $a + b + c$ کدام است؟



- $\frac{5}{3}$ ۱
 $-\frac{4}{3}$ ۲
 $\frac{7}{3}$ ۳
 $\frac{8}{3}$ ۴


۶۷- مجموعه جواب نامعادله $\left| \frac{|x-1|}{3} + 1 \right| \leq 2$ کدام است؟

- [-10, 4] ۴ [-2, 4] ۳ (-∞, 4] ۲ [-4, 2] ۱

۶۸- اگر عرض بالاترین نقطه سهمی به معادله $y = ax^2 + bx + k$ برابر با -1 و نمودار سهمی محور عرض‌ها را در نقطه‌ای به عرض -3 قطع کنده معادله محور تقارن سهمی کدام است؟

- $x = -1$ ۴ $x = 1$ ۳ $x = \frac{1}{2}$ ۲ $x = -\frac{1}{2}$ ۱

۶۹- شکل زیر سهمی به معادله $y = ax^2 + bx + c$ می‌باشد، کدام گزینه تعیین علامت y را به درستی نمایش می‌دهد؟



x	-3	11
y	-	-

x	-2	10
y	-	-

x	-4	12
y	-	-

x	-2	10
y	+	-

۷۰- اگر بالاترین نقطه سهمی $y = mx^2 + 2\sqrt{3}x + m + 2$ در ناحیه چهارم دستگاه مختصات باشد، حدود m

کدام است؟

- $-3 < m < 1$ ۲
 $-1 < m < 0$ ۴
 $m < -3$ ۱
 $-3 < m < -1$ ۳

۳۰ دقیقه

معادله‌ها و نامعادله‌ها

فصل ۱۴ از ابتدای سه‌می تا

پایان فصل

صفحه‌های ۷۸ تا ۹۳

محل انجام محاسبات

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقبتر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

ریاضی (۱) - موازی

۷۱ - اگر عبارت درجه اول $y = (a-2)x^3 - 3x + a$ به ازای هر مقدار x منفی باشد، مجموعه مقادیر ممکن برای a کدام است؟

$$\{a \mid a < 2\} \quad (2)$$

$$\{a \mid 0 < a < 3\} \quad (1)$$

$$\{2\} \quad (4)$$

$$\emptyset \quad (3)$$

۷۲ - معادله محور تقارن سه‌می $2y = -4x^3 + 8x + 2$ کدام است؟

$$x = -1 \quad (4)$$

$$x = 1 \quad (3)$$

$$x = -2 \quad (2)$$

$$x = 2 \quad (1)$$


۷۳ - کدام یک از معادلات زیر مربوط به سه‌می رویرو است؟

$$y = (x-2)^3 + 4 \quad (1)$$

$$y = (x+2)^3 - 4 \quad (2)$$

$$y = -(x-2)^3 - 4 \quad (3)$$

$$y = (x-2)^3 - 4 \quad (4)$$



۷۴ - اگر فاصله بین دو نقطه به طول‌های x^3 و $4x$ روی محور طول‌ها، به ازای $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ کوچکتر از ۵ باشد،

حداکثر مقدار $b - a$ چقدر است؟

$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۷۵ - به ازای کدام محدوده از m عبارت درجه دوم $mx^3 + 3mx - 9$ همواره منفی است؟

$$m < -1 \quad (2)$$

$$m < 0 \quad (1)$$

$$-4 < m < 0 \quad (4)$$

$$-5 < m < -1 \quad (3)$$

۷۶ - عبارت $\frac{(5-10x)^3}{3x^3-9x^2}$ به ازای چه مقادیری از x همواره مثبت است؟

$$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} < x < 3 \quad (1)$$

$$0 < x < 3 \quad (4)$$

$$0 < x < \frac{1}{2} \quad (3)$$

۷۷ - جدول تعیین علامت کدام یک از چند جمله‌ای‌های زیر به صورت زیر می‌باشد؟

x	-2	1
y	-	+

$$y = x^3 - x + 2 \quad (2)$$

$$y = x^3 + x - 2 \quad (1)$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 4 \quad (4)$$

$$y = x^3 + 3x^2 - 4 \quad (3)$$

$$x \text{ در کدام بازه باشد تا عبارت } A = (2 - |x|)(2x - 6) \text{ منفی باشد؟}$$

$$(-2, 3) \quad (2)$$

$$(2, +\infty) \quad (1)$$

$$(-\infty, 2) \quad (4)$$

$$(-2, 2) \cup (3, +\infty) \quad (3)$$

محل انجام محاسبات

۷۹- اگر جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = \frac{bx(x-a)^r}{ax^r + bx + c}$ به صورت زیر باشد، آنگاه مجموعه مقادیر ممکن برای b کدام است؟

x	-1	0	2
$P(x)$	+	+	-
ت	+	+	-

{4, -4} (۴)

{-4} (۳)

{4} (۲)

{ } (۱)

۸۰- اگر بازه $(-1, 2)$ بزرگترین بازه‌ای باشد که در آن علامت عبارت $y = ax^r + x + 2a^r$ مثبت باشد، a کدام است؟

-1 (۴)

1 (۳)

 $\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۱)

۸۱- مجموعه جواب نامعادله $\frac{x^r - x}{x + 2} \geq 2$ کدام است؟

 $\mathbb{R} - (-1, 4)$ (۴) $\mathbb{R} - [-1, 4]$ (۱) $(-2, -1] \cup [4, +\infty)$ (۴) $(-2, -1) \cup (4, +\infty)$ (۳)

۸۲- اگر رأس سهمی $y = 3x^r + ax + b$ نقطه $S(1, -4)$ باشد، $a - b$ برابر با کدام گزینه است؟

-5 (۴)

-7 (۳)

5 (۲)

7 (۱)

۸۳- اگر رأس سهمی $S(1, -2)$ به معادله $y = ax^r + bx - \frac{3}{2}$ باشد، طول نقاط تلاقی این سهمی با محور x ها کدام است؟

-2, 3 (۴)

-3, 5 (۳)

-1, 3 (۲)

-2, 4 (۱)

۸۴- اگر سهمی به معادله $y = ax^r - bx + c$ از مبدأ مختصات و نقطه $A(-1, 3)$ بگذرد و محور تقارن آن $x = 2$ باشد، مقدار $15a + 5b + c$ کدام است؟


18 (۴)

21 (۳)

-3 (۲)

9 (۱)

۸۵- نمودار سهمی به معادله $y = -2x^r + ax + a + 2$ به صورت زیر است. این سهمی قسمت مثبت محور x ها را در نقطه‌ای با کدام طول قطع می‌کند؟



5 (۱)


3 (۲)

 $\frac{3}{2}$ (۳)

4 (۴)

محل انجام محاسبات

-۸۶ - نمودار سهمی $y = ax^3 + bx + c$ کدام است؟



$\frac{5}{3}$ (۱)

$-\frac{4}{3}$ (۲)

$\frac{7}{3}$ (۳)

$\frac{8}{3}$ (۴)

-۸۷ - مجموعه جواب نامعادله $\left| \frac{|x-1|}{3} + 1 \right| \leq 2$ کدام است؟

$[-10, 4]$ (۴)

$[-2, 4]$ (۳)

$(-\infty, 4]$ (۲)

$[-4, 2]$ (۱)

-۸۸ - اگر عرض بالاترین نقطه سهمی به معادله $y = ax^3 + bx + k$ برابر با -1 و نمودار سهمی محور عرضها را در

نقطه‌ای به عرض -3 - قطع کند، معادله محور تقارن سهمی کدام است؟


$x = -1$ (۴)

$x = 1$ (۳)

$x = \frac{1}{2}$ (۲)

$x = -\frac{1}{2}$ (۱)

-۸۹ - شکل زیر سهمی به معادله $y = ax^3 + bx + c$ می‌باشد، کدام گزینه تعیین علامت y را به درستی نمایش می‌دهد؟



$$\begin{array}{c|ccc} x & -3 & 11 \\ \hline y & - & + & - \end{array}$$
 (۱)

$$\begin{array}{c|ccc} x & -2 & 10 \\ \hline y & - & + & - \end{array}$$
 (۲)

$$\begin{array}{c|ccc} x & -4 & 12 \\ \hline y & - & + & - \end{array}$$
 (۳)

$$\begin{array}{c|ccc} x & -2 & 10 \\ \hline y & + & - & + \end{array}$$
 (۴)

-۹۰ - اگر بالاترین نقطه سهمی $y = mx^3 + 2\sqrt{3}x + m + 2$ در ناحیه چهارم دستگاه مختصات باشد، حدود m

کدام است؟

$-3 < m < 1$ (۲)

$m < -3$ (۱)

$-1 < m < 0$ (۴)

$-3 < m < -1$ (۳)



۳۵ دقیقه

ویژگی‌های فیزیکی مواد
فصل ۱۱ از ابتدای فصل ۱۲ در
شاره‌ها تا پایان شناوری و
اصل اشمیدس
صفحه‌های ۷۰ تا ۸۱


محل انجام محاسبات

فیزیک (۱) - عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

- ۹۱- در ظرف زیر که تا نیمه آب ریخته شده است، اختلاف فشار دو نقطه A و B برابر با ΔP است. اگر ارتفاع آب موجود در ظرف ۲ برابر شود، اختلاف فشار همان دو نقطه چند برابر ΔP می‌شود؟



(۱) ۴

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) ۲

(۴) ۱

- ۹۲- چه ارتفاعی از ستون آب بر حسب سانتی‌متر، فشاری برابر با 5cmHg جیوه دارد؟ (چگالی آب و جیوه به

$$\text{ترتیب } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } 2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ است.}$$

(۱) ۶۸

(۲) ۳۴

(۳) ۶/۸

(۴) ۳/۴

- ۹۳- دو مایع A و B را در دو ظرف جداگانه می‌ریزیم و دو قطعه پلاستیکی هم‌جنس و کاملاً مشابه را در دو ظرف می‌اندازیم، در هر دو ظرف، قطعه روی سطح مایع شناور می‌ماند. کدام نتیجه‌گیری الزاماً درست است؟


(۱) چون قطعه روی سطح هر دو مایع شناور بوده است، پس چگالی دو مایع یکسان است.

(۲) نیروی شناوری بیشتری از ظرف مایع B به قطعه وارد می‌شود.

(۳) نیروی شناوری بیشتری از ظرف مایع A به قطعه وارد می‌شود.

(۴) نیروی شناوری یکسانی از ظرف دو مایع بر قطعه‌ها وارد می‌شود.

- ۹۴- مطابق شکل زیر، ۳ نقطه A، B و C را در یک مایع در حال تعادل در نظر بگیرید. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر با ΔP و بین دو نقطه A و C برابر با $\Delta P'$ و بین دو نقطه B و C برابر باشد، کدام گزینه صحیح است؟



$$\Delta P = \Delta P' > \Delta P'' \quad (۱)$$

$$\Delta P = \Delta P' = \Delta P'' \quad (۲)$$

$$\Delta P' > \Delta P'' > \Delta P \quad (۳)$$

$$\Delta P = \Delta P' < \Delta P'' \quad (۴)$$

- ۹۵- مطابق شکل زیر، ظرفی پر از مایع روی یک ترازو قرار دارد. قطعه چوبی به وزن 3N را روی سطح مایع قرار می‌دهیم اگر قطعه چوب روی سطح مایع شناور بماند، عددی که ترازو نشان می‌دهد چه تغییری می‌کند؟



(۱) تغییر نمی‌کند.

(۲) 3N زیاد می‌شود.

(۳) 3N کم می‌شود.

(۴) بستگی به چگالی مایع دارد.

- ۹۶- فشار کل در عمق ۳ متری از یک مایع ساکن به چگالی ρ برابر با 84cmHg است. فشار کل در عمق ۷/۵ متری از این مایع برابر چند سانتی‌متر جیوه است؟ (فشار هوا 75cmHg است).

(۱) ۹۱/۵

(۲) ۹۷/۵

(۳) ۸۸/۵

(۴) ۹۰

جهت بازیابی قبل آزمون، از کتاب‌های آبی کانون استفاده کنید.

محل انجام محاسبات

۹۷- یک زیردریایی در عمق ۹۰ متری اقیانوس به آرامی در حرکت است. اندازه نیرویی که از بیرون بر دریجه دایره‌ای شکل این زیردریایی به شعاع ۶۰ cm وارد می‌شود، چند کیلونیوتون است؟

$$(g = 10 \frac{N}{kg}, \rho = 10^3 \text{ kg/m}^3, P_0 = 10^5 Pa)$$




۱۰۸۰۰ (۴)

۱۰۸۰۰ (۳)

۹۷۲۰۰ (۲)


۹۷۲۰۰ (۱)

۹۸- در شکل زیر مایع‌ها در حال تعادل‌اند. اگر ارتفاع مایع با چگالی ρ_2 نصف شود، بعد از ایجاد تعادل، وضعیت مایع‌ها در لوله U شکل به چه صورتی درمی‌آید؟



۹۹- در شکل زیر، سطح مقطع قسمت پایین و بالای ظرف به ترتیب 5cm^2 و 20cm^2 می‌باشد. اگر ۶۴۰ گرم از مایع با چگالی

$$8 / ۰ \text{ درون ظرف بریزیم، بعد از ایجاد تعادل فشار ناشی از مایع در کف ظرف چند پاسکال است؟} (g = 10 \frac{N}{kg})$$



۲۴۰۰ (۱)


۳۲۰۰ (۲)

۵۶۰۰ (۳)

۲۱۰۰ (۴)

۱۰۰- نمودار فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح دریای آزاد مطابق شکل زیر است. اگر آزمایش توریچلی را در شهر اردکان که در ارتفاع تقریبی ۲۰۰۰ متری از سطح دریای آزاد واقع است، با آب انجام دهیم، ارتفاع ستون آب چند متر می‌شود؟

$$8 / ۰ \text{ آب } (\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}, g = 10 \frac{N}{kg})$$



۸۰۰ (۱)


۸ (۲)

۲۰۰ (۳)

۲ (۴)

۱۰۱- در شکل زیر آب در لوله‌ها در حال تعادل است. اگر فشار مخزن (۱) برابر با $12 \times 10^4 \text{ Pa}$ باشد، در این

$$8 / ۰ \text{ صورت } x \text{ چند سانتی‌متر است؟} (Fشار هوا = 10^5 \text{ Pa}, \text{ چگالی آب } \rho_a = 1000 \frac{kg}{m^3} \text{ و } g = 10 \frac{N}{kg} \text{ است.)}$$



۰ / ۵ (۱)

۵۰ (۲)


۱۰۰ (۳)

۱۰ (۴)

۱۰۲- در شکل زیر، لوله قائم را به اندازه ۶۰ درجه حول نقطه A به صورت ساعتگرد می‌چرخانیم. اگر مساحت

ته لوله 1cm^2 باشد، اندازه نیرویی که مایع به ته لوله وارد می‌کند، چند نیوتون می‌شود؟

$$8 / ۰ \text{ جیوه } (\rho_{جیوه} = 13/6 \frac{g}{cm^3}, g = 10 \frac{N}{kg})$$



۵ / ۱ (۱)


۱۰ / ۲ (۲)

۳ / ۴ (۳)

۶ / ۸ (۴)

محل انجام محاسبات

۱۰۳ - در شکل زیر، فشارسنج، فشار مخزن گاز را ۲ میلی‌متر جیوه نشان می‌دهد و مایع در حال تعادل است.



$$\text{چند سانتی‌متر است? } \left(\frac{g}{cm^3} = 13/6 \right)$$


(۱) ۶۸

(۲) ۶/۸

(۳) ۳۴

(۴) ۳/۴

۱۰۴ - در شکل زیر، چهار کره توخالی سبک همسان توسط نخ به کف طرف پر از آبی متصل شده و ساکن هستند. اندازه نیروی شناوری وارد بر آن‌ها در کدام گزینه به درستی مقایسه شده است؟

(۱) $A > B > C > D$ (۲) $A = B = C = D$ (۳) $D = C > B > A$ (۴) $D = C > A > B$

۱۰۵ - جرم‌های مساوی از دو مایع A و B را در ظرف‌های جداگانه‌ای ریخته و از یک چگالی‌سنج برای مقایسه چگالی آن‌ها استفاده می‌کنیم. اگر دستگاه چگالی‌سنج در مایع B بیشتر از مایع A فرو رود، نیروی شناوری وارد بر چگالی‌سنج از طرف مایع B نسبت به مایع A و حجم کل مایع B نسبت به حجم کل مایع A است.

(۱) بیشتر - بیشتر (۲) برابر - برابر (۳) بیشتر - کمتر (۴) برابر - کمتر

۱۰۶ - شکل زیر، ظرفی محتوی آب را نشان می‌دهد که روی یک ترازوی عقرهای قرار دارد و حجم آب داخل آن 120 cm^3 است. جسمی را توسط نخی به‌طور کامل در آب فرو می‌بریم. تغییر حجم آب در این حالت

$$25\text{ cm}^3 \text{ خواهد شد. عدد ترازو چند نیوتون و چگونه تغییر می‌کند؟ } \left(\rho = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

آب از ظرف سرریز نمی‌شود.)

(۱) ۲۵، کاهش

(۲) ۲۵، افزایش

(۳) ۵/۲۵، کاهش

(۴) ۵/۲۵، افزایش


۱۰۷ - قطعه فلزی توپیر، به جرم 27 g را به انتهای نیروسنجی متصل کرده و قطعه فلز را کاملاً وارد ظرف آبی می‌کنیم. در این حالت نیروسنج عدد $12\text{ N}/0$ را نشان می‌دهد. اگر این قطعه را کاملاً درون مایعی به

$$\text{چگالی } 8/0 \text{ فرو ببریم، در این حالت، نیروسنج چه عددی را بر حسب نیوتون نشان می‌دهد؟ } \left(\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \right)$$

$$\begin{array}{cccccc} 0/16 & 0/13 & 0/15 & 0/12 & 0/12 & (1) \\ (4) & (3) & (2) & (1) & (1) & \end{array}$$

۱۰۸ - در شکل زیر، اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز معادل با 23 cmHg باشد، ارتفاع h' چند سانتی‌متر است؟

$$\left(\rho_B = 3/4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \rho_A = 6/8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \text{ جیوه} \right)$$



(۱) ۴۸

(۲) ۳


(۳) ۱۲

(۴) ۱۰

محل انجام محاسبات


۱۰۹ - در شکل زیر، اگر فشار هوا محيط برابر 75cmHg ، چگالی آب برابر $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و چگالی جیوه $10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ باشد، فشار پیمانه‌ای گاز مخزن B تقریباً برابر با کدام گزینه است؟ (g = $10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

$$\text{در حال تعادل می‌باشند.} \\ 67\text{cmHg} \quad (1) \\ -8\text{kPa} \quad (2) \\ 8\text{cmHg} \quad (3) \\ -11\text{kPa} \quad (4)$$



۱۱۰ - در شکل زیر، سطح مقطع لوله‌های A و B به ترتیب 300cm^2 و 100cm^2 است و در لوله U شکل، آب، روغن و مایع نامعلوم فرضی p_3 به حال تعادل قرار دارند. در لوله A آنقدر روغن می‌ریزیم تا این لوله کاملاً پُر شود. در این صورت چند گرم از مایع p_3 از لوله B به بیرون می‌ریزد؟ (چگالی آب و روغن

$$\text{به ترتیب } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ است.} \\ 640 \quad (1) \\ 480 \quad (2) \\ 240 \quad (3) \\ 320 \quad (4)$$



توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقبتر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

فیزیک (۱) - موازی

ویژگی‌های فیزیکی مواد
فلشار در شارهای
صفمه‌های ۷۰ تا ۷۸

۱۱۱ - در ظرف زیر که تا نیمی آب ریخته شده است، اختلاف فشار دو نقطه A و B برابر با ΔP است. اگر ارتفاع آب موجود در ظرف ۲ برابر شود، اختلاف فشار همان دو نقطه چند برابر ΔP می‌شود؟

$$\frac{1}{2} \quad (1) \\ 1 \quad (2) \\ \frac{1}{4} \quad (3) \\ 2 \quad (4)$$


۱۱۲ - چه ارتفاعی از ستون آب بر حسب سانتی‌متر، فشاری برابر با 5cmHg جیوه دارد؟ (چگالی آب و جیوه به

$$\text{ترتیب } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ است.} \\ 68 \quad (4) \\ 34 \quad (3) \\ 6/8 \quad (2) \\ 3/4 \quad (1)$$

۱۱۳ - اختلاف فشار هوا بالا و پایین یک ساختمان بلند با ارتفاع ۶۰ متر چند پاسکال است؟ (g = $10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

$$\text{چگالی هوا را ثابت و برابر با } 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ در نظر بگیرید.} \\ 6000 \quad (4) \\ 600 \quad (3) \\ 60 \quad (2) \\ 0 \quad (1) \text{ صفر}$$

۱۱۴ - مطابق شکل زیر، A، B و C را در یک مایع در حال تعادل در نظر بگیرید. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر با ΔP و بین دو نقطه A و C برابر با $\Delta P'$ و بین دو نقطه B و C برابر باشد، کدام گزینه صحیح است؟ $\Delta P''$



$$\Delta P = \Delta P' > \Delta P'' \quad (1)$$

$$\Delta P = \Delta P' = \Delta P'' \quad (2)$$


$$\Delta P' > \Delta P'' > \Delta P \quad (3)$$

$$\Delta P = \Delta P' < \Delta P'' \quad (4)$$

محل انجام محاسبات

۱۱۵- نمودار زیر، فشار کل بر حسب عمق یک مایع را نشان می‌دهد. فشار ناشی از مایع در عمق ۵۰ متری

$$\text{بر حسب کیلوپاسکال کدام است؟ } (g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



(۱) ۵۱/۵

(۲) ۵۱۵

(۳) ۶۱/۶

(۴) ۶۱۶

۱۱۶- فشار کل در عمق ۳ متری از یک مایع ساکن به چگالی ρ برابر با 84cmHg است. فشار کل در عمق

۷/۵ متری از این مایع برابر چند سانتی‌متر جیوه است؟ (فشار هوا 75cmHg است.)

(۱) ۸۸/۵

(۲) ۹۰

(۳) ۹۷/۵

(۴) ۹۱/۵

۱۱۷- یک زیردریایی در عمق ۹۰ متری اقیانوس به آرامی در حرکت است. اندازه نیروی که از بیرون بر دریچه

دایره‌ای شکل این زیردریایی به شعاع 60cm وارد می‌شود، چند کیلونیوتون است؟

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}, \rho = 1024 \text{ kg/m}^3, \rho_0 = 10^5 \text{ Pa})$$

(۱) ۱۰۸۰۰





(۲) ۹۷۲۰۰

(۳) ۹۷۲۰

(۴) ۱۰۸۰

۱۱۸- در شکل زیر مایع‌ها در حال تعادل‌اند. اگر ارتفاع مایع با چگالی ρ_2 نصف شود، بعد از ایجاد تعادل،

وضعیت مایع‌ها در لوله U شکل به چه صورتی در می‌آید؟



۱۱۹- در هر یک از دو ظرف شکل زیر، m کیلوگرم مایع یکسان می‌ریزیم. جرم ظرف‌ها و مساحت کف ظرف‌ها برابر می‌باشند. به ترتیب از راست به چپ کدام ترازو عدد بیشتری را نشان می‌دهد، و فشار ناشی از مایع


در کدام ظرف بیشتر است؟

(۱) هر دو ترازو عدد یکسانی نشان می‌دهند و فشار در کدام هر دو ظرف برابر است.


(۱) ۱ ، ۱۲

(۲) ۲ ، ۱۳

(۳) هر دو ترازو عدد یکسانی نشان می‌دهند، ۲



۱۲۰- سه مایع مخلوط نشدنی مطابق شکل زیر در حال تعادل‌اند. چگالی مایع ρ_3 چند $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است؟



(۱) ۰/۶

(۲) ۱/۵


(۳) ۰/۸

(۴) ۱/۳۳

محل انجام محاسبات

۱۲۱ - در شکل زیر، سطح مقطع قسمت پایین و بالای ظرف به ترتیب 5cm^3 و 20cm^3 می‌باشد. اگر ۶۴۰ گرم از مایع با چگالی $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ درون ظرف بریزیم، بعد از ایجاد تعادل فشار ناشی از مایع در کف ظرف چند پاسکال است؟

$$\frac{g}{\text{cm}^3} = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$



- ۲۴۰۰ (۱)
۳۲۰۰ (۲)
۵۶۰۰ (۳)
۲۱۰۰ (۴)

۱۲۲ - درون ظرفی دو مایع مخلوط نشدنی A و B را ریخته‌ایم به طوری که ارتفاع مجموعه دو مایع در ظرف معادل ۴۰ سانتی‌متر است. اگر فشار کل در کف ظرف برابر $81/5\text{cmHg}$ باشد، ارتفاع مایع A در


$$2/72 \frac{g}{\text{cm}^3} = 80/68 \frac{g}{\text{cm}^3}$$

و $13/6$ و فشار هوا در محل برابر با 75cmHg است.

- ۳۰ (۴) ۲۵ (۳) ۱۰ (۲) ۱۵ (۱)

۱۲۳ - نمودار فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح دریای آزاد مطابق شکل زیر است. اگر آزمایش توریچلی را در شهر اردکان که در ارتفاع تقریبی ۲۰۰۰ متری از سطح دریای آزاد واقع است، با آب انجام دهیم، ارتفاع ستون آب چند متر می‌شود؟


$$\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$



- ۸۰۰ (۱)
۸۰ (۲)
۲۰۰ (۳)
۲ (۴)

۱۲۴ - در شکل زیر آب در لوله‌ها در حال تعادل است. اگر فشار مخزن (۱) برابر با $12 \times 10^4 \text{ Pa}$ باشد، در این


صورت x چند سانتی‌متر است؟ (فشار هوا $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ ، چگالی آب $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ است).



- ۰/۵ (۱)
۵۰ (۲)
۱۰۰ (۳)
۱۰ (۴)

۱۲۵ - در شکل زیر، لوله قائم را به اندازه ۶۰ درجه حول نقطه A به صورت ساعتگرد می‌چرخانیم. اگر مساحت ته لوله 1cm^2 باشد، اندازه نیرویی که مایع به ته لوله وارد می‌کند، چند نیوتون می‌شود؟

$$\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$




- ۵/۱ (۱)
۱۰/۲ (۲)
۳/۴ (۳)
۶/۸ (۴)

۱۲۶ - در شکل زیر، فشارسنج، فشار مخزن گاز را ۲ میلی‌متر جیوه نشان می‌دهد و مایع در حال تعادل است. h

چند سانتی‌متر است؟

$$\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$



- ۶۸ (۱)
۶/۸ (۲)
۳۴ (۳)
۳/۴ (۴)

محل انجام محاسبات


-۱۲۷- در شکل زیر، اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز معادل با 23cmHg باشد، ارتفاع h' چند سانتی‌متر است؟

$$\rho_A = \rho / \lambda \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad \rho_B = \gamma / \lambda \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\rho_A = 6 / 8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad \rho_B = 13 / 4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\text{جیوه} \quad \text{جیوه}$$

$$\rho_A = 6 / 8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad \rho_B = 13 / 4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$




۴۸۰ (۱)

۳۲۰ (۲)

۱۲۰ (۳)

۱۰۰ (۴)

-۱۲۸- در شکل زیر دو مایع با چگالی‌های ρ_1 و ρ_2 درون یک لوله U شکل در حال تعادل قرار دارند. اگر اندازه اختلاف فشار دو نقطه A و B برابر 100Pa باشد، کدام گزینه می‌تواند اختلاف فشار بین دو نقطه C و D ($P_C - P_D$) بر حسب پاسکال باشد؟



-۱۲۰۰ (۱)

۱۲۰۰ (۲)

-۸۰۰ (۳)

۸۰۰ (۴)

-۱۲۹- در شکل زیر، اگر فشار هوای محیط برابر $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و چگالی آب برابر $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و چگالی جیوه

$$\rho = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

$$13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$


در حال تعادل می‌باشند).

۶۷cmHg (۱)

-۸kPa (۲)


۸cmHg (۳)

-۱۱kPa (۴)



-۱۳۰- در شکل زیر، سطح مقطع لوله‌های A و B به ترتیب 100cm^2 و 300cm^2 است و در لوله U شکل، آب، روغن و مایع نامعلوم فرضی ρ_3 به حال تعادل قرار دارند. در لوله A آنقدر روغن می‌ریزیم تا این لوله کاملاً پُر شود. در این صورت چند گرم از مایع ρ_3 از لوله B به بیرون می‌ریزد؟ (چگالی آب و روغن

$$\text{به ترتیب } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ است.}$$



۴۸۰ (۱)

۶۴۰ (۲)

۳۲۰ (۳)

۲۴۰ (۴)

۲۰ دقیقه

گردش مواد در بدن / تنظیم
اسمای و دفع مواد رائد
فصل ۴ از ابتدای رگها تا
پایان فصل و فصل ۵ تا پایان
همایستایی کلیه‌ها
صفمه‌های ۶۴ تا ۸۳

زیست‌شناسی (۱) - عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زیست‌شناسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۱۳۱ - هر اندام لنفي که است، نمی‌تواند

- ۱) محل تخریب یاخته‌های خونی آسیب دیده - محل تولید بیشترین نوع از یاخته‌های خونی در دوران جنینی باشد.
۲) متصل به روده کور - همانند گرهای لنفي زیر بغل، در تصوفیه لنف از عوامل بیماری‌زا موثر باشد.
۳) در مجاورت مجرای لنفي چپ در ناحیه شکمی - از طریق سیاهرگ باب با کبد در ارتباط باشد.
۴) در نزدیکی قلب - لنف را مستقیماً به بزرگ‌سیاهرگ زیرین تخلیه نماید.

۱۳۲ - کدام عبارت، برای کامل نمودن جملة زیر مناسب است؟

«در انسان، نمی‌تواند منجر به شود.»

- ۱) کاهش طولانی مدت غلظت اکسیژن در مویرگ‌های نایپیوسته - افزایش ترشح اریتروپویتین
۲) افزایش فشار خون در گردش ششی - تحریک مستقیم گیرنده‌های فشاری
۳) کاهش غلظت اکسیژن خون - ارسال پیام عصبی به نوعی مرکز عصبی
۴) فعالیت ورزشی - افزایش تولید لنف

۱۳۳ - چند مورد درباره کوچک‌ترین رگ‌های بدن انسان در گردش خون عمومی، همواره صحیح است؟

- الف - به کمک شبکه‌ای از رشته‌های پروتونی، نوعی صافی مولکولی ایجاد می‌کنند.
ب - فشار اسمزی خون، در بخش ابتدایی آن بیشتر از بخش انتهایی آن است.
ج - تغییر قطر سرخرگ‌های کوچک، جریان خون آن را تنظیم می‌کند.
د - دارای دریچه‌هایی هستند که جریان خون را یک‌طرفه می‌کنند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳۴ - کدام گزینه عبارت درباره کلیه یک فرد سالم صحیح است؟

- ۱) هر گوییجه قرمز موجود در سرخرگ و ابران، از درون شبکه مویرگی اطراف لوله پیچ خورده نزدیک عبور می‌کند.
۲) در کلافک، خون از طریق یک سرخرگ وارد و توسط یک سیاهرگ خارج می‌شود.
۳) همه بیماری‌ها، در نتیجه برهم خوردن همایستایی پدید می‌آیند.
۴) بخش قشری می‌تواند در مجاورت لگنچه قرار گیرد.

۱۳۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«هر عامل محافظت‌کننده از کلیه انسان که قطعاً است.»

- ۱) مانع از نفوذ میکروب به کلیه‌ها می‌شود - قادر نقش در حفاظت از نوعی غده ترشح‌کننده هورمون در حالت‌های ویژه فشار روانی
۲) در حفاظت از یاخته‌های کلیه در برابر میکروب‌ها نقش دارد - واجد توانایی ترشح کلائز ماده زمینه‌ای در بافت خود
۳) در برابر فشارهای مکانیکی وارد شده، موثر است - قادر تماس مستقیم با بافت تولید کننده هورمون اریتروپویتین
۴) در حفظ موقعیت کلیه‌ها نقش ایفا می‌کند - واجد تنظیم شدید ورود و خروج مواد در مویرگ‌های خود

۱۳۶ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در شبکه مویرگی شبکه مویرگی کلافک کلیه انسان،»

- ۱) مغز استخوان، همانند - درصد حجمی یاخته‌های خونی ممکن است بیش تر از ۴۵ درصد شود.
۲) آبیشش ماهی، همانند - دو رگ با بافت ماهیچه‌ای زیاد شبکه مویرگی را احاطه می‌کنند.
۳) کبد، برخلاف - میزان خون رسانی توسط شبکه‌های عصبی رودهای تنظیم می‌شود.
۴) حبابک‌ها، برخلاف - خون تیره وارد و خون روشن خارج می‌شود.

برای هدف‌گذاری، به ساعات مطالعه خود در هر درس و میزان تسلطی که در هر درس دارید توجه کنید. ابتدا ببینید چند ساعت درس خوانده‌اید و چقدر
مبحث این آزمون را بد هستید، سپس هدف‌گذاری کنید.

۱۳۷ - در انسان، هر رگی که توانایی هدایت خون را به سمت بافت‌های مختلف بدن دارد، چه مشخصه‌ای دارد؟

- (۱) دارای یک لایه از یاخته‌های بافت پوششی در دیواره خود است.
- (۲) دارای فشار بیشینه ۱۲۰ و کمینه ۸۰ میلی‌متر جیوه است.
- (۳) در دیواره خود، ماهیچه‌های صاف حلقوی فراوان دارد.
- (۴) در درون آن، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد.

۱۳۸ - کدام عبارت، درباره هر جانور مهره‌داری که در آن خون تیره پس از ورود به قلب، از آن خارج می‌شود، نادرست است؟

- (۱) خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره‌ای آن عبور می‌کند.
- (۲) بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیواره داخلی بدن آن، فضایی شکل گرفته است.
- (۳) امکان جریان یک طرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش بافته و مواد دفعی در بدن آن فراهم است.
- (۴) دارای ساز و کاری است که باعث می‌شود جریان پیوسته‌ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی آن برقرار شود.

۱۳۹ - چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

- «هر که از ناف کلیه عبور می‌کند، قطعاً»
- الف- رگی- در تشکیل شبکه مویرگی درون کلیه نقش دارد.
 - ب- عصبی- متشکل از یاخته‌های اصلی بافت عصبی است.
 - ج- رگی- واحد رشته‌های الاستیک در لایه میانی خود است.
 - د- مجرای ادراری- در خروج ادرار از کلیه نقش دارد.

۱۴۰ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«در یک فرد بالغ، وجه مشترک همه گوییچه‌های سفیدی که دارند با در این است که»

- (۱) هسته دو قسمتی- مونوسیت‌ها- از یک نوع یاخته بنیادی منشأ می‌گیرند.
- (۲) دانه‌های روشن- بازووفیل‌ها- اندازه کوچک‌تری نسبت به لنفوسیت‌ها دارند.
- (۳) هسته تکی- نوتروفیل‌ها- می‌توانند در بافت‌های مختلف بدن پراکنده شوند.
- (۴) میان یاخته بدون دانه- نوتروفیل‌ها- نقش اصلی آن‌ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

۱۴۱ - کدام گزینه درباره هر سرخرگ متصل به گلومرول، صحیح است؟

- (۱) دارای دریچه در طول خود است که جهت حرکت خون را یک طرفه می‌کند و در برش عرضی، همواره گرد دیده می‌شود.
- (۲) قطعاً دارای خونی است که میزان یون هیدروژن متصل شده به هموگلوبین گوییچه‌های قرمز آن، زیاد است.
- (۳) پس از تبادل مواد غذایی در شبکه‌های مویرگی، رگی با لایه پیوندی و ماهیچه‌ای انک را ایجاد می‌کند.
- (۴) در قسمتی از کلیه قابل مشاهده است که در لپ‌های کلیه قرار دارد.

۱۴۲ - در بدن انسان، نمی‌تواند نمی‌تواند

(۱) برابر بودن فشار تراویشی و اسمزی- باعث توقف جریان توده‌ای شود.

(۲) تنگی سیاهرگ‌ها همانند کاهش آلبومین خون- منجر به بروز ادم شود.

(۳) مصرف غذاهای شور برخلاف افزایش مصرف مایعات- سبب ابتلاء به خیز شود.

(۴) باز و بسته شدن دریچه‌های لانه کبوتری- فقط وابسته به انقباض ماهیچه‌های اسکلتی مجاور آن‌ها باشد.

۱۴۳ - در بدن نوعی جانور دارای سامانه گردش خون بسته، تمامی تبادلات گازی از طریق پوست انجام می‌شود، مشخصه این جانور کدام است؟

- (۱) همانند قورباغه، خون ضمن یکبار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می‌کند.
- (۲) همانند پرندگان دانه‌خوار، دارای سنگدان است که از بخش عقبی معده تشکیل می‌شود.
- (۳) همانند ماهی، اکسیژن مورد نیاز یاخته‌های بدن، از گازهای محلول در آب به دست می‌آید.
- (۴) برخلاف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اکسیژن به یاخته‌های بدن و دور کردن CO_2 از آن‌ها نقش مهمی دارد.

۱۴۴ - کدام گزینه در مورد تصویر مقابل نادرست است؟

(۱) به تعداد حدود دو میلیون در ابتدای گردیزه‌های بدن انسان سالم قرار دارد.

(۲) در بخش قشری کلیه قرار دارد و تا ابتدای لوله هنله ادامه دارد.

(۳) جهت جریان مواد از A به سمت D به صورت یک طرفه است.

(۴) بخش C در تشکیل ادرار نقش دارد و جز گردیزه‌ها نیست.

۱۴۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟



«در شکل مقابل، دیده می‌شود که»

(۱) رشته‌های پروتئینی- از تأثیر ترومیبن بر فیبرینوزن ایجاد شده و یاخته‌های خونی و گرده‌ها را در بر می‌گیرد.

(۲) یاخته‌های خونی- آهن آزاد شده پس از تخریب آنان تنها به مغز استخوان می‌رود.

(۳) قطعات یاخته‌ای- بی‌رنگ و هسته‌دار می‌باشند و از گوییچه‌های خون کوچک‌تر اند.

(۴) یاخته‌های خونی- در انسان کروی و از یک طرف حالت فرورفتگی به خود گرفته‌اند.



۱۴۶ - کدام گزینه در مورد گردش خون ماهی صحیح است؟

- (۱) نوع رگ ورودی و خروجی به دستگاه تنفسی آن یکسان است.
- (۲) سرخرگ همانند سیاهرگ می‌تواند خون تیره یا روشن داشته باشد.
- (۳) کیفیت خون ورودی و خروجی به قلب از لحاظ میزان گازها یکسان نیست.
- (۴) بطن قلب بالاتر از دهلیز قلب قرار دارد و جهت جریان خون یک طرفه می‌باشد.

۱۴۷ - کدام گزینه در مورد کلیه انسان به درستی بیان شده است؟

- (۱) در ناف کلیه، سرخرگ کلیه بالاتر از میزانی قرار گرفته است.
- (۲) سرخرگ واپران برخلاف سرخرگ آوران، به سیاهرگ ختم نمی‌شود.
- (۳) با افزایش میزان عرق، بر مقدار ادرار تولید شده در کلیه افروزه خواهد شد.
- (۴) انشعابات سیاهرگی پس از گذشتن از ستون‌های کلیه، خون را از کلیه خارج می‌کنند.

۱۴۸ - چند مورد درباره هر ساختار قیفی‌شکل درون کلیه‌های انسان صحیح است؟

(الف) ادرار تولید شده را دریافت می‌کند.

(ب) در درون یکی از لپهای کلیه قرار دارد.

(ج) مواد موجود در آن، وارد ساختارهای لوله‌مانند می‌شوند.

(د) دارای شبکه‌ای از مویرگ‌های خونی در درون محفظه خود است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۴۹ - منابع جانوری آهن و فولیک‌اسید، ممکن نیست

(۱) منبع ویتامین B₁₂ نیز باشد.

(۲) در جنین انسان محل تولید گویچه‌های قرمز باشد.

(۳) در انسان بالغ با ترشح هورمونی، میزان تولید گویچه‌های قرمز را تنظیم کنند.

(۴) در انسان بالغ، از آهن آزاد شده طی تخریب یاخته‌های خونی، در ساخت مجدد آن‌ها استفاده کند.

۱۵۰ - در ارتباط با مسیرهای تبادل مواد در مویرگ‌های خونی کدام گزینه صحیح است؟

(۱) برای عبور مولکوهای آب بیش از یک روش وجود دارد.

(۲) اوره تنها براساس جریان توده‌ای به مویرگ وارد می‌شود.

(۳) آمینواسیدها همانند گلوکز با صرف انرژی از دیواره مویرگ خارج می‌شوند.

(۴) هموگلوبین ابتدا با درون‌بری و سپس برون‌رانی یاخته‌های پوششی، وارد خوناب می‌شود.

۲۰ دقیقه

گردش مهاد در بد
فصل ۱۴ از ابتدای (۱) تا
پایان فصل
صفحه‌های ۱۴۱ تا ۷۸

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون
عقبت‌تر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

زیست‌شناسی (۱) - موازی

۱۵۱ - هر اندام لنفي که است، نمی‌تواند

(۱) محل تخریب یاخته‌های خونی آسیب دیده - محل تولید بیشترین نوع از یاخته‌های خونی در دوران جنینی باشد.

(۲) متصل به روده کور - همانند گره‌های لنفي زیر بغل، در تصفیه لنف از عوامل بیماری‌زا موثر باشد.

(۳) در مجاورت مجرای لنفي چپ در ناحیه شکمی - از طریق سیاهرگ باب با کبد در ارتباط باشد.

(۴) در نزدیکی قلب - لنف را مستقیماً به بزرگ‌سیاهرگ زیرین تخلیه نماید.

۱۵۲ - کدام عبارت، برای کامل‌نمودن جمله زیر مناسب است؟

«در انسان، نمی‌تواند منجر به می‌شود.»

(۱) کاهش طولانی مدت غلظت اکسیژن در مویرگ‌های نایپوسته - افزایش ترشح اریتروپویتین

(۲) افزایش فشار خون در گردش ششی - تحریک مک مستقیم گیرنده‌های فشاری

(۳) کاهش غلظت اکسیژن خون - ارسال پیام عصبی به نوعی مرکز عصبی

(۴) فعالیت ورزشی - افزایش تولید لنف

۱۵۳ - کدام گزینه، در مورد «قطعات یاخته‌ای بی‌رنگ و بدون هسته» و «بیشترین یاخته‌ها»ی موجود در خون انسان، درست است؟ (به

ترتیب از راست به چپ)

(۱) واحد توپانی ترشح آنزیم - فاقد دنا درون هسته خود

(۲) واحد دانه‌های بزرگ بر از ترکیبات فعال - واحد دانه‌های در میان یاخته خود

(۳) جلوگیری از هدر رفتگ خون به چند طریق - حاوی پروتئین تنظیم‌کننده pH خون

(۴) حاصل قطعه قطعه شدن میان یاخته‌ای مگاکاربیوسیت‌ها - نقش در انتقال CO₂ در خون

۱۵۴ - کدام گزینه با بخش‌های موثر در تنظیم دستگاه گردش خون و فعالیت آن‌ها مطابقت ندارد؟

- ۱) هم‌زمان با فعالیت زیاد آنزیم کربنیکانیدراز؛ انقباض بنداره ابتدایی مویرگ‌های بافت
- ۲) همکاری مراکز مغزی؛ تأمین نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن در شرایط خاص
- ۳) ترشح نوعی هورمون از غده فوق کلیه؛ افزایش فشار خون سرخ‌گی
- ۴) ورود کلسیم به مایعات بدن؛ کاهش فشار خون سرخ‌گی

۱۵۵ - چند مورد درباره کوچک‌ترین رگ‌های بدن انسان در گردش خون عمومی، همواره صحیح است؟

- الف) به کمک شبکه‌ای از رشته‌های پروتوئینی، نوعی صافی مولکولی ایجاد می‌کنند.
- ب) فشار اسمزی خون، در بخش ابتدایی آن بیشتر از بخش انتهایی آن است.
- ج) تغییر قطر سرخ‌گهای کوچک، جریان خون آن را تنظیم می‌کند.
- د) دارای دریچه‌هایی هستند که جریان خون را یک‌طرفه می‌کنند.

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۱۵۶ - کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در هر جانوری که دارد، به طور حتم»

- ۱) گردش خون باز- ساختارهای تنفسی و بزهجه ارتباط یاخته‌های بدن با محیط وجود ندارد.
- ۲) دستگاه اختصاصی گردش مواد- تبادل مستقیم مواد بین خون و یاخته‌ها دیده می‌شود.
- ۳) گردش خون مضاعف- قلب دارای بیش از دو حفره است.
- ۴) گردش خون ساده- همه ویژگی‌های حیات دیده می‌شود.

۱۵۷ - در انسان، هر رگی که توانایی هدایت خون را به سمت بافت‌های مختلف بدن دارد، چه مشخصه‌ای دارد؟

- ۱) دارای یک لایه از یاخته‌های بافت پوششی در دیواره خود است.
- ۲) دارای فشار بیشینه ۱۲۰ و کمینه ۸۰ میلی‌متر جیوه است.
- ۳) در دیواره خود، ماهیچه‌های صاف حلقوی فراوان دارد.
- ۴) در درون آن، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد.

۱۵۸ - کدام عبارت، درباره هر جانور مهره‌داری که خون تیره پس از ورود به قلب، از آن خارج می‌شود، نادرست است؟

- ۱) خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره‌ای آن عبور می‌کند.
- ۲) بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیواره داخلی بدن آن، فضایی شکل گرفته است.
- ۳) امکان جریان یک‌طرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی در بدن آن فراهم است.
- ۴) دارای ساز و کاری است که باعث می‌شود جریان پیوسته‌ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی آن برقرار شود.

۱۵۹ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«در یک فرد بالغ، وجه مشترک همه گوچه‌های سفیدی که دارند با در این است که»

- ۱) هسته دو قسمتی- مونوستی- از یک نوع یاخته بنیادی منشأ می‌گیرند.
- ۲) دانه‌های روشن- بازویلهای- اندازه کوچک‌تری نسبت به لنفوسيت‌ها دارند.
- ۳) هسته تکی- نوتروفیل‌ها- می‌توانند در یاخته‌های مختلف بدن پراکنده شوند.
- ۴) میان یاخته بدون دانه- اوزیونوفیل‌ها- نقش اصلی آن‌ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

۱۶۰ - در بدن انسان، نمی‌تواند نمی‌تواند

- ۱) برابر بودن فشار تراویشی و اسمزی- باعث توقف جریان توده‌های شود.
- ۲) تنگی سیاهرگ‌ها همانند کاهش آلبومین خون- منجر به بروز ادم شود.
- ۳) مصرف غذاهای شور برخلاف افزایش مصرف مایعات- سبب ابتلا به خیز شود.
- ۴) باز و بسته شدن دریچه‌های لانه‌کبوتری- فقط وابسته به انقباض ماهیچه‌های اسکلتی مجاور آن‌ها باشد.

۱۶۱ - در بدن نوعی جانور دارای سامانه گردش خون بسته، تمامی تبادلات گازی از طریق پوست انجام می‌شود. مشخصه این جانور کدام است؟

- ۱) همانند قورباغه، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می‌کند.
- ۲) همانند پرندگان دانه‌خوار، دارای سنگدان است که از بخش عقبی معده تشکیل می‌شود.
- ۳) همانند ماهی، اکسیژن مورد نیاز یاخته‌های بدن، از گازهای محلول در آب به دست می‌آید.
- ۴) برخلاف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اکسیژن به یاخته‌های بدن و دور کردن CO_2 از آن‌ها نقش مهمی دارد.

..... ۱۶۲ - دستهای از رگ‌های خونی انسان، بیشترین حجم خون را در خود جای داده‌اند. در مورد برخی از این رگ‌های خونی می‌توان گفت

(۱) در برش عرضی، دارای مقطع گردتری نسبت به سایر رگ‌های خونی می‌باشند.


(۲) با داشتن دیواره نازک و جریان خون کند، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم می‌کنند.

(۳) افزایش فشار خون درون آن‌ها می‌تواند از سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد.

(۴) خون حاوی اکسیژن به طور مستقیم از شبکه مویرگ‌های خونی به آن‌ها وارد نمی‌شود.

..... ۱۶۳ - کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در شکل مقابل، مشاهده می‌شود که»



(۱) رشته‌های پروتئینی - از تأثیر ترمومیلن بر فیبرینوژن ایجاد شده و یاخته‌های خونی و گرده‌ها را در بر می‌گیرد.

(۲) یاخته‌های خونی - آهن آزاد شده پس از تخریب آنان تنها به مغز استخوان می‌رود.

(۳) قطعات یاخته‌ای - بی‌رنگ و هسته‌دار می‌باشند و از گوچه‌های خون کوچکتر اند.

(۴) یاخته‌های خونی - در انسان کروی و از یک طرف حالت فرورفته به خود گرفته‌اند.

..... ۱۶۴ - در جانوری که ساده‌ترین وجود دارد، وجود دارد.

(۱) ساختار در اندام‌های تنفسی مهره‌داران - جدایی کامل بطن‌ها رخ داده است.

(۲) نوع آبیش - در مسیر تبادل گازهای تنفسی، فقط یک لایه یاخته پوششی وجود دارد.

(۳) سامانه گردش مواد - گروهی از یاخته‌ها به جایه‌جایی مواد در این سامانه کمک می‌کنند.

(۴) سامانه گردش خون بسته - رگ‌های پشتی خون تیره را به پنج جفت قلب کمکی وارد می‌کنند.

..... ۱۶۵ - کدام گزینه در مورد گردش خون ماهی‌ها صحیح است؟

(۱) نوع رگ ورودی و خروجی به یاخته‌های وارد می‌شوند، هیچگاه نمی‌توانند

(۲) سرخرگ همانند سیاهرگ می‌تواند خون تیره یا روشن داشته باشد.

(۳) کیفیت خون ورودی و خروجی به قلب از لحاظ میزان گازها یکسان نیست.

(۴) بطن قلب بالاتر از دهلیز قلب قرار دارد و جهت جریان خون یک طرفه می‌باشد.

..... ۱۶۶ - کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در انسان، موادی که از طریق مویرگ‌های خونی به مایع بین یاخته‌ای وارد می‌شوند، هیچگاه نمی‌توانند»

(۱) ورود به یاخته‌های پوششی - در محافظت بدن از عوامل بیماری‌زا نقش داشته باشند.

(۲) منافذ پر از آب - توسط پروتئین انتقال‌دهنده موجود در غشاء یاخته‌های پرز روده منتقل شوند.

(۳) جریان توده‌ای - با تولید مولکول‌های کربنیک اسید در انتقال مولکول‌های CO_2 شرکت کنند.

(۴) غشای یاخته‌های پوششی - با تأثیر بر ماهیچه‌های صاف دیواره رگ‌ها، سرخرگ‌های کوچک را گشاد کنند.

..... ۱۶۷ - فردی ورزش طولانی مدت انجام داده است. به طور طبیعی، مشاهده چند مورد از اتفاقات زیر در این فرد امکان‌پذیر است؟

الف - افزایش مصرف دو نوع ویتامین از خانواده ویتامین‌های

ب - افزایش فاصله میان موج‌های T تا P بر روی منحنی قلب‌نگاره

ج - کاهش مصرف مولکول‌های ATP در گروه ویژه‌ای از یاخته‌های کبدی

(۱) ۱۰ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

..... ۱۶۸ - یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی یاخته‌های بنیادی میلوبئیدی

(۱) همانند - قطعاً موجب تولید گوچه‌های سفید بدون دانه می‌شوند.

(۲) برخلاف - در اثر تمایز به گوچه‌های سفید دانه‌دار تبدیل می‌شوند.

(۳) همانند - در اثر تقسیم یاخته‌های بنیادی مغز استخوان ایجاد می‌شوند.

(۴) برخلاف - به یاخته‌هایی تمایز می‌یابد که در تولید لخته خون نقش دارد.

..... ۱۶۹ - منابع جانوری آهن و فولیک اسید، ممکن نیست

(۱) منبع ویتامین B₁₂ نیز باشد.

(۲) در جنین انسان محل تولید گوچه‌های قرمز باشد.

(۳) در انسان بالغ، با ترشح هورمونی، میزان تولید گوچه‌های قرمز را تنظیم کنند.

(۴) در انسان بالغ، از آهن آزاد شده طی تخریب یاخته‌های خونی، در ساخت مجدد آن‌ها استفاده کند.

..... ۱۷۰ - در ارتباط با مسیرهای تبادل مواد در مویرگ‌های خونی کدام گزینه صحیح است؟

(۱) برای عبور مولکوهای آب بیش از یک روش وجود دارد.

(۲) اوره تنها براساس جریان توده‌ای به مویرگ وارد می‌شود.

(۳) آمینواسیدها همانند گلوکز با صرف انرژی از دیواره مویرگ خارج می‌شوند.

(۴) هموگلوبین ابتدا با درون بری و سپس برون رانی از یاخته‌های پوششی، وارد خوناب می‌شود.

۲۰ دقیقه

(دپای گازها در زندگی)
 فصل ۲ از ابتدای شیمی سیز تا
 پایان فصل
 صفحه‌های ۷۴ تا ۹۰

شیمی (۱) - عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
 لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس شیمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدھید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۱۷۱- در یک سیلندر با پیستون متحرک، در فشار ثابت، با کاهش دما و در دمای ثابت، افزایش حجم، می‌تواند نشانه سامانه باشد. (مقدار مول گاز در این فرایند ثابت است).

- (۲) حجم سامانه کاهش می‌باید - کاهش فشار
 (۴) حجم سامانه کاهش می‌باید - افزایش فشار

(۱) حجم سامانه افزایش می‌باید - افزایش فشار

(۳) حجم سامانه افزایش می‌باید - کاهش فشار


۱۷۲- همه عبارت‌های زیر صحیح است، به جز:

- (۱) در ساختار سوخت سیز و پلاستیک سیز حداقل سه نوع آتم وجود دارد.
 (۲) پلاستیک‌های سیز مولکول‌های کوچکی هستند که بر پایه مواد گیاهی ساخته می‌شوند.
 (۳) اتانول و روغن‌های گیاهی نمونه‌هایی از سوخت‌های سیز هستند.
 (۴) پلاستیک‌های سیز در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می‌شوند و به طبیعت باز می‌گردند.

۱۷۳- عبارت کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) براساس قانون آووگادرو در دما و فشار یکسان حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.
 (۲) در گازها برخلاف مایعات با افزایش فشار فاصله بین مولکول‌ها کاهش می‌باید.
 (۳) در دما و فشار یکسان تعداد اتم‌های موجود در یک لیتر از همه گازها با یکدیگر برابر است.
 (۴) برای توصیف یک نمونه گاز علاوه بر مقدار، باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.

۱۷۴- با توجه به واکنش (موازن نشده) زیر کدام مطلب نادرست است؟ $(O=16, C=12, H=1, g/mol^{-1})$




- (۱) برای اکسایش کامل ۰/۲۵ مول گلوکز باید ۴۸ گرم گاز اکسیژن مصرف شود.
 (۲) در دما و فشار یکسان، حجم گاز CO_2 تولید شده و O_2 مصرف شده در واکنش اکسایش مقداری گلوکز با یکدیگر برابر می‌باشد.
 (۳) گاز حاصل از اکسایش کامل یک مول گلوکز در شرایط استاندارد بیش از ۱۳۰ لیتر حجم دارد.
 (۴) نسبت جرم آب تولید شده به جرم گلوکز مصرف شده در اکسایش کامل گلوکز، همواره برابر با ۶ است.

۱۷۵- چند مورد از عبارت‌های زیر در ارتباط با گازهای O_2 و O_3 صحیح است؟

- الف) در فرایند جذب پرتوهای فرابنفش توسط گاز اوزون، پرتوهایی با انرژی بیشتر تولید می‌شود.
 ب) در فرایند تولید اوزون در تریوسفر واکنش دهندهای مشاهده می‌شود که موجب رنگ قهوه‌ای هوای شهرهای صنعتی می‌شود.
 پ) گاز اوزون از اکسیژن واکنش پذیرتر است، به همین دلیل این گاز آلاینده‌ای سمی و خطروناک بهشمار می‌رود.
 ت) گاز اوزون نسبت به گاز اکسیژن تمایل بیشتری برای مایع شدن دارد.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱




۱۷۶- چند مورد از عبارت‌های زیر در رابطه با واکنش مقابله صحیح است؟

- الف) نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به جفت الکترون‌های ناپیوندی در محصول واکنش برگشت برابر $\frac{1}{2}$ است.
 ب) در صورتی که تنها واکنش رفت صورت پذیرد، یکی از پیامدهای آن تخریب لایه اوزون است.
 پ) نسبت جرم مولی محصول واکنش برگشت به جرم مولی محصول واکنش رفت برابر $1/5$ است.
 ت) اگر واکنش تنها در جهت برگشت رخ دهد غلظت اکسیژن هواکره کاهش می‌باید و چرخه مختل می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

سعی کنید در هر آزمون برنامه‌ای فقط در یک یا دو درس، چند از ۱۰ خود را افزایش دهید.

۱۷۷- طبق واکنش موازن نشده زیر برای تولید H_2O به چند لیتر هوا در شرایط STP نیاز است؟ (٪ ۲۰ حجم هوا را گاز اکسیژن تشکیل می‌دهد).



(۱) ۲۶۸ (۲) ۶۷/۲ (۳) ۱۶۸ (۴) ۳۳۶

۱۷۸- کدام یک از نمونه گازهای زیر، در دمای ۳۷°C و فشار ۹۵۰ atm اتمسفر حجم بیشتری دارد؟ ($\text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{N} = ۱۴ : \text{g.mol}^{-۱}$)

(۱) ۱۰ گرم گاز کربن دی‌اکسید

(۲) ۲۲ مولکول گاز NO

(۳) ۱۵ مول گاز اکسیژن

(۴) گاز نیتروژن حاوی $۳/۰۱ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم نیتروژن

۱۷۹- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

الف) آمونیاک در دما و فشار اتاق به صورت مایع است و به عنوان کود به طور مستقیم به خاک تزریق می‌شود.

ب) یکی از چالش‌های عمده هابر در تهیه آمونیاک جداسازی آمونیاک از گازهای N_2 و H_2 است.

پ) از واکنش گاز نیتروژن و هیدروژن در دما و فشار اتاق می‌توان آمونیاک را تهیه کرد.

ت) فشار و دمای بهینه برای فرایند هابر، دمای ۲۰۰°C و فشار ۴۵۰atm است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۸۰- کدام یک از عبارت‌های زیر با توجه به واکنش سوختن زغال سنگ، گاز طبیعی، بنزین و هیدروژن صحیح نمی‌باشد؟

(۱) فراورده غیر مشترک هر یک از سوخت‌های بنزین و زغال سنگ، گوگرد تری اکسید است.

(۲) کمترین گرمای آزاد شده به‌ازای هر ریال هزینه بابت سوخت، متعلق به گاز هیدروژن است.

(۳) استفاده از سوخت هیدروژن و زغال سنگ به ترتیب کمترین و بیشترین آلاندنه را تولید می‌کند.

(۴) برای تولید یک کیلوژول گرما از سوختن مواد مختلف، مقدار بیشتری زغال سنگ نسبت به سایر سوخت‌ها باید بسوزد.

آزمون شاهد(گواه)- پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در ترازوگ کل شما تأثیر دارد.

۱۸۱- شمار اتم‌های کل در $۰/۵۶$ لیتر گاز کل در شرایط STP، برابر شمار اتم‌ها در چند گرم نئون است؟ ($\text{Ne} = ۲۰\text{g.mol}^{-۱}$)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۰/۵ (۴) ۱/۵

۱۸۲- کدام گزینه در مورد اوزون صحیح است؟


(۱) لایه اوزون به منطقه مشخصی از لایه تروپوسفر گفته می‌شود که بیشترین مقدار اوزون را دارا است.

(۲) مولکول‌های اوزون تمام بروتاهای فرایند خورشید را جذب می‌کنند.

(۳) در دمای ۱۲۳K اوزون برخلاف اکسیژن به حالت گازی وجود دارد.

(۴) گاز اوزون دگر شکل یا ایزوتوپ اکسیژن است.

۱۸۳- ظرف زیر را که در فشار $۲/۸\text{atm}$ و دمای ۲۷°C قرار دارد در نظر بگیرید. اگر پس از باز شدن شیر، دو گاز با یکدیگر مخلوط شده و به طور کامل واکنش دهنده دمای گازهای حاصل به اندازه ۱۰۰°C افزایش یابد، فشار نهایی گاز تقریباً چه تغییری می‌کند؟ (واکنش انجام شده به صورت $\text{H}_2\text{O(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$ است).



مولکول‌های اکسیژن:

مولکول‌های هیدروژن:

(۱) ۳/۰ اتمسفر کاهش می‌یابد.

(۲) ۳/۰ اتمسفر افزایش می‌یابد.

(۳) ۰/۹ اتمسفر کاهش می‌یابد.

(۴) ۰/۹ اتمسفر افزایش می‌یابد.

۱۸۴- کدام گزینه جمله‌ی مقابل را به درستی تکمیل می‌کند؟ «گاز نیتروژن».

(۱) ترکیبی بسیار واکنش پذیر است.

(۲) دارای اکسید قهوه‌ای رنگ NO می‌باشد.

(۳) در اثر رعد و برق با اکسیژن هوا ترکیب شده و اکسیدهای NO و NO_2 را می‌سازد.

(۴) یکی از فرآورده‌های واکنش تولید اوزون تروپوسفری از گاز NO_2 است.

۱۸۵- کدام عبارت درست است؟

(۱) توسعه پایدار به این معناست که در مصرف یک فراورده، همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و ... در نظر گرفته شود.

(۲) توسعه پایدار بیان می‌کند که اگر قیمت تمام شده تولید یک کالا برای کشور کاهش یابد، این توسعه سبب رشد واقعی کشور می‌شود.

(۳) ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سه رأس مثلث توسعه‌ی پایدار هستند.

(۴) سرمایه‌گذاری برخی از کشورها بر روی تولید گاز هیدروژن (H_2) برخلاف توسعه پایدار است.

- ۱۸۶- کدام گزینه در مورد فرایند هابر صحیح است؟
- در حضور فلز آهن و در شرایط STP ، می‌توان مقدار قابل توجهی آمونیاک تولید کرد.
 - انجام دادن واکنش در دما و فشارهای متفاوت برای کسب شرایط بهینه، تنها چالش این فرایند است.
 - در دما و فشار بهینه و در حضور کاتالیزگر همه واکنش‌دهنده‌ها به فاورده تبدیل می‌شوند.
 - اگر دمای مخلوط واکنش را به تدریج کاهش دهیم، بعد از آمونیاک، ابتدا گاز نیتروژن و سپس گاز هیدروژن به صورت مایع خارج می‌شوند.

۱۸۷- چه تعداد از موارد زیر در مورد هیدروژن نادرست هستند؟

- (الف) هیدروژن فراوان‌ترین عنصر در جهان است.
- (ب) هیدروژن مانند سوخت‌های فسیلی در ترکیب با آکسیژن می‌سوزد.
- (پ) گرمای آزاد شده به‌ازای سوخت یک گرم هیدروژن برسپ کیلوژول، از یک گرم بنزین کمتر است.
- (ت) فراوردهای حاصل از سوختن هیدروژن H_2O و CO_2 می‌باشد.


(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۸۸- چند مورد از عبارات زیر صحیح نیست؟

- (الف) در شیمی سبز شیمیدان‌ها در جست وجوی فرایندها و فراوردهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوان کیفیت زندگی را با بهره‌گیری از منابع طبیعی افزایش داد و همزمان از طبیعت محافظت کرد.
- (ب) برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی، کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می‌دهند.
- (پ) سوخت سبز از پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه روغنی به دست می‌آید.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

- ۱۸۹- ۰/۹۶ گرم از فلز قلیایی خاکی X مطابق واکنش زیر با H_2O کافی واکنش داده و در شرایط STP، ۸۹۶ میلی‌لیتر گاز هیدروژن آزاد می‌کند. فلز X کدام است؟



$$Mg = 24 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$Ca = 40 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$Ba = 137 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$Sr = 87 / 5 \text{ g.mol}^{-1}$$

- ۱۹۰- کدام مورد (ها) از مطالب زیر عبارت مقابله را به درستی کامل نمی‌کند؟ «در واکنش تولید اوزون تروپوسفری از گاز NO_2 ،».

(الف) نور خورشید عاملی مهم برای انجام واکنش است.

(ب) در شرایط یکسان حجم گازهای مصرفی با حجم گازهای تولیدی برابر است.

(پ) حجم گاز اوزون تولیدی دو برابر حجم گاز اکسیژن مصرفی است.

(۱) الف - ب (۲) ب - پ (۳) الف - پ (۴) ب - پ

۲۰ دقیقه

توجه: پاسخ دادن به این سوال‌ها مخصوص دانش‌آموزانی است که برنامه مدرسه آن‌ها از برنامه کانون عقبتر است و به سوالات عادی پاسخ نداده‌اند.

شیمی (۱) - موازی

(دیای گازها در زندگی
فصل ۱۱ ابتدای شیمی سبز تا
پایان اوون، دگر شکل ۱۱
اکسیژن در هواکره
صفحه‌های ۷۴ تا ۸۱

- ۱۹۱- کدام یک از موارد زیر جزء تلاش‌های شیمی سبز برای حفاظت از طبیعت قرار نمی‌گیرد؟

(۱) تولید روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت

(۲) دفن کردن کربن دی‌اکسید

(۳) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب

(۴) تولید منیزیم کربنات از منیزیم هیدروکسید

۱۹۲- همه عبارت‌های زیر صحیح هستند، به جز:

(۱) در ساختار سوخت سبز و پلاستیک سبز حداقل سه نوع آنم وجود دارد.

(۲) پلاستیک‌های سبز مولکول‌های کوچکی هستند که بر پایه مواد گیاهی ساخته می‌شوند.

(۳) اتانول و روغن‌های گیاهی نمونه‌هایی از سوخت‌های سبز هستند.

(۴) پلاستیک‌های سبز در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می‌شوند و به طبیعت باز می‌گردند.

- ۱۹۳- گستره انتشار گاز کربن دی‌اکسید به ازای طی یک کیلومتر مسافت برای ماشینی، بین ۱۳۳ تا ۱۵۲ گرم است. اگر این اtomobil سالانه ۲۰۰ کیلومتر مسافت طی کند، تقریباً حداقل چند ریال هزینه بنزین این اtomobil می‌شود؟ فراورده‌های دیگر واکنش سوختن بنزین کدام است؟ (به ازای تولید هر گرم CO_2 ، $CO_2 - 136000$ ریال هزینه می‌شود و قیمت هر گرم بنزین برابر ۱۴ ریال است.)

$$CO, SO_2 - 136000$$

$$H_2O, CO - 136000$$

$$H_2O, SO_2 - 120000$$

$$H_2O, CO - 120000$$

۱۹۴- چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

(الف) اوزون در لایه تروپوسفر آلاینده‌ای سمی و خطرناک می‌باشد، به طوری که سبب سوزش چشم‌ها و آسیب به ریه‌ها می‌شود.

(ب) گازهای اوزون و اکسیژن در شرایط عادی به ترتیب لاجوردی و آبی رنگ هستند.

(پ) واکنش سوختن مواد سوختی برخلاف چرخه اوزون استراتوسفری و واکنش باتری‌های قابل شارژ برگشت ناپذیراند.


(ت) مجموع ضرایب مواد در واکنش تولید اوزون تروپوسفری از نیتروژن دی‌اکسید برابر ۴ است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹۵- چند مورد از عبارت‌های زیر در ارتباط با گازهای O_3 و O_2 صحیح است؟

- الف) در فرایند جذب پرتوهای فرابنفش توسط گاز اوزون، پرتوهایی با انرژی بیشتر تولید می‌شود.
- ب) در فرایند تولید اوزون در تریپوسفر واکنش دهندهای مشاهده می‌شود که موجب رنگ قهوه‌ای هوای شهرهای صنعتی می‌شود.
- پ) گاز اوزون از اکسیژن واکنش پذیرتر است، به همین دلیل این گاز آلاینده‌ای سمی و خطرناک به شمار می‌رود.
- ت) گاز اوزون نسبت به گاز اکسیژن تمایل بیشتری برای مایع شدن دارد.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱



۱۹۶- چند مورد از عبارت‌های زیر در رابطه با واکنش مقابل صحیح است؟

- الف) نسبت جفت الکترون‌های پیوندی به جفت الکترون‌های ناپیوندی در محصول واکنش برگشت برابر $\frac{1}{2}$ است.
- ب) در صورتی که تنها واکنش رفت صورت پذیرد، یکی از پیامدهای آن تخریب لایه اوزون است.
- پ) نسبت جرم مولی محصول واکنش برگشت به جرم مولی محصول واکنش رفت برابر $1/5$ است.
- ت) اگر واکنش تنها در جهت برگشت رخ دهد غلظت اکسیژن هواکره کاهش می‌یابد و چرخه مختلف می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹۷- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) دگر شکل تنها به شکل‌های گوناگون مولکولی یک عنصر گفته می‌شود.
- ب) در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه و سبزیجات استفاده می‌شود.
- پ) آلوتروپ‌های یک عنصر خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند.
- ت) گاز اوزون در بخش‌های بالایی هواکره یک آلاینده و در بخش‌های پایینی یک پالاینده است.




(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹۸- کدام عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

- الف) برای کاهش ردپای CO_2 در هواکره، گاز CO_2 تولید شده در نیروگاه‌ها را به مواد معدنی مانند کلسیم کربنات تبدیل می‌کنند.
- ب) براساس شیمی سبز، سنگ‌های متخلخل در زیر زمین، میدان‌های قدیمی گاز و چاههای فعال نفت، محل مناسبی برای دفن CO_2 هستند.
- پ) با توجه به قیمت تمام شده بالای تولید پلاستیک با پایه نفتی، بعضی از کشورها در پی تولید پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیرند.
- ت) استفاده از گاز هیدروژن به عنوان سوخت به علت هزینه بالا با اهداف توسعه پایدار همسو نیست.

(۱) (الف)، (پ) (۲) (الف)، (ب) (۳) (ب)، (پ) و (ت) (۴) (پ)، (ت)

۱۹۹- با توجه به معادله واکنش‌های داده شده کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟



(۱) واکنش «پ» در حضور نور خورشید انجام می‌شود.

(۲) واکنش «الف» در هواکره تنها در هنگام رعد و برق صورت می‌گیرد.

(۳) مجموع ضرایب مواد در معادله موازن شده واکنش «الف» و «ب» برابر است.

(۴) حضور گاز قهوه‌ای رنگ **B** در هواکره موجب بارش باران اسیدی می‌شود.

۲۰۰- کدامیک از عبارت‌های زیر با توجه به واکنش سوختن زغال سنگ، گاز طبیعی، بنزین و هیدروژن صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) فراورده غیر مشترک هر یک از سوخت‌های بنزین و زغال سنگ، گوگرد تری اکسید است.

(۲) کمترین گرمای آزاد شده به‌ازای هر ریال هزینه بابت سوخت، متعلق به گاز هیدروژن است.

(۳) استفاده از سوخت هیدروژن و زغال سنگ کمترین بیشترین آلاینده را تولید می‌کند.

(۴) برای تولید یک کیلوژول گرما از سوختن مواد مختلف، مقدار بیشتری زغال سنگ نسبت به سایر سوخت‌ها باید بسوزد.

آزمون شاهد(گواه)- پاسخ دادن به این سوالات امباری است و در تراز ۵۱ شما تأثیر دارد.

۲۰۱- کدام گزینه جمله‌ی مقابله‌ی درستی تکمیل می‌کند؟ «گاز نیتروژن».

(۱) ترکیبی بسیار واکنش پذیر است.

(۲) دارای اکسید قهوه‌ای رنگ **NO** می‌باشد.


(۳) در اثر رعد و برق با اکسیژن هوا ترکیب شده و اکسیدهای **NO** و **NO₂** را می‌سازد.

(۴) یکی از فرآورده‌های واکنش تولید اوزون تریپوسفری از گاز **NO₂** است.

۲۰۲- کدام گزینه در مورد اوزون صحیح است؟

- (۱) لایه اوزون به منطقه مشخصی از لایه تروپوسفر گفته می‌شود که بیشترین مقدار اوزون را دارا است.
- (۲) مولکول‌های اوزون تمام پرتوهای فرابنفش خورشید را جذب می‌کنند.
- (۳) در دمای 122°K اوزون برخلاف اکسیژن به حالت گازی وجود دارد.
- (۴) گاز اوزون دگر شکل یا ایزوتوپ اکسیژن است.

۲۰۳- با توجه به شکل زیر (تکرار پیوسته و اکنش تبدیل اکسیژن و اوزون به یکدیگر) کدام گزینه نادرست است؟



- (۱) A نشان دهنده تابشی است که طول موج آن از ریزموچها کمتر است.
- (۲) B نشان دهنده پرتوی است که با فشار دادن کلید روشن و خاموش کنترل تلویزیون از انتهای آن خارج می‌شود.
- (۳) با توجه به شکل مقابل تبدیل O_2 به O_3 برگشت‌پذیر است.
- (۴) واکنش روبه‌رو در لایه تروپوسفر رخ می‌دهد.

۲۰۴- کدام عبارت درست است؟

- (۱) توسعه پایدار به این معناست که در مصرف یک فراورده، همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و ... در نظر گرفته شود.
- (۲) توسعه پایدار بیان می‌کند که اگر قیمت تمام شده تولید یک کالا برای کشور کاهش پاید، این توسعه سبب رشد واقعی کشور می‌شود.
- (۳) ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سه رأس مثلث توسعه‌ی پایدار هستند.
- (۴) سرمایه‌گذاری برخی از کشورها بر روی تولید گاز هیدروژن (H_2) برخلاف توسعه پایدار است.

۲۰۵- چه تعداد از موارد زیر در مورد مقایسه اوزون و اکسیژن درست است؟

- (الف) چگالی گاز اوزون بیشتر از گاز اکسیژن است.
- (ب) برای تعیین خواص و رفتار گازهای اوزون و اکسیژن پاید ساختار آن‌ها را بررسی کرد.
- (پ) جرم مولی گاز اوزون $\frac{3}{2}$ برابر جرم مولی گاز اکسیژن است.

۱۰۴ صفر

۲۰۳

۲۰۶- چه تعداد از موارد زیر در مورد هیدروژن نادرست هستند؟

- (الف) هیدروژن فراوان ترین عنصر در جهان است.
- (ب) هیدروژن مانند سوخت‌های فسیلی در ترکیب با اکسیژن می‌سوزد.
- (پ) گرمای آزاد شده بهازای سوخت یک گرم هیدروژن بر حسب کیلوژول، از یک گرم بنزین کمتر است.
- (ت) فراورده‌های حاصل از سوختن هیدروژن H_2O و CO_2 می‌باشد.

۱۰۴

۲۰۳

۲۰۷- چند مورد از عبارات زیر صحیح نیست؟

- (الف) در شیمی سبز شیمیدان‌ها در جست وجوی فرایندها و فراورده‌هایی هستند که به کمک آن‌ها بتوان کیفیت زندگی را با بهره‌گیری از منابع طبیعی افزایش داد و همزمان از طبیعت محافظت کرد.
- (ب) برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی، کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاهها و مراکز صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می‌دهند.
- (پ) سوخت سبز از پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه روغنی به دست می‌آید.

۱۰۴ صفر

۲۰۳

۲۰۸- کدام گزینه، عبارت (الف) را به صورت درست و عبارت‌های (ب) و (پ) را به صورت نادرست تکمیل می‌کند؟

- (الف) سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود اتمهای کربن و ... دارد.
- (ب) گرمای آزاد شده بهازای سوزاندن یک گرم بیشتر از یک گرم گاز طبیعی است.
- (پ) فراورده مشترک سوزاندن بنزین، زغال‌سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی است.

۱۰۴

۲۰۳

۲۰۹- گوگرد - زغال‌سنگ - بخار آب

۲۰۹- هیدروژن - هیدروژن - کربن دی‌اکسید

۲۰۹- اکسیژن - زغال‌سنگ - کربن دی‌اکسید

- (الف) با توجه به جدول روبرو، اگر اتومبیلی ساخته شود که سوخت آن هیدروژن باشد، با فرض آن که بازده این اتومبیل با اتومبیل‌های بنزینی معمولی برابر باشد، با هزینه سوخت مورد نیاز برای $10 \cdot km$ سفر با این اتومبیل به تقریب چند کیلومتر می‌توان با اتومبیل‌های معمولی مسافت کرد؟

۱۰۹

۶۷۱/۳

۲۰۸

نام سوخت	بنزین	هیدروژن
(kJ / g)	۴۸	۱۴۳
(Rial / g)	۱۴	۲۸۰۰

گستره انتشار گاز کربن دی‌اکسید (گرم) به ازای طی یک کیلومتر	برچسب لایندگی خودرو
۱۲۰	A
۱۲۰-۱۴۰	B
۱۴۰-۱۵۵	C
۱۵۵-۱۷۰	D
۱۷۰-۱۹۰	E

- (الف) فرض کنید کشوری در راستای توسعه‌ی پایدار سالانه دو نوع مالیات از مالکان خودرو دریافت کند. مالیات سالانه برابر 200 دلار و مالیات متغیر که به میزان کربن دی‌اکسید تولید شده از خودرو بستگی دارد. اگر خودروهای دارای برچسب A از پرداخت مالیات متغیر معاف باشند، خودرویی با برچسب E سالانه حداقل باید چند دلار مالیات بیشتر بپردازد؟ (هر خودرو به ازای تولید هر 100 کیلوگرم CO_2 اضافه 1 دلار مالیات متغیر می‌پردازد و میزان مسافتی که این دو خودرو در یک سال طی کردند با هم مساوی و برابر 18000 کیلومتر است).

۱۰۸

۵

۲۰۷

۹۴



نظرخواهی: دانشآموزان گرامی، لطفاً در هنگام پاسخ‌گویی به سوال‌های زیر، به شماره سوال‌ها دقت کنید.

تماس تلفنی پشتیبان

- ۲۹۰ - آیا پشتیبان شما از آزمون گذشته تاکنون با شما تماس تلفنی گرفته است؟

(۱) خیر، ایشان تماس تلفنی نگرفتند.

(۲) بله، ایشان تماس تلفنی گرفتند.

(۳) بله، تماس تلفنی ایشان از لحظه زمانی (در حد ۵ دقیقه) و از لحظه محتوا در حد خوب و کافی بود.

(۴) بله، تماس تلفنی ایشان از لحظه زمانی (بیش از ۵ دقیقه) و از لحظه محتوا در حد عالی بود.

تماس تلفنی: چه زمانی؟

- ۲۹۱ - پشتیبان چه زمانی با شما تماس گرفت؟

(۱) در زمان مناسب طبق توافق قبلی (قبل‌اً در مورد روز و ساعت تماس توافق کرده بودیم).

(۲) در زمان مناسب تماس گرفت (البته قبل‌اً در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم).

(۳) در روز پنج شنبه (روز قبل از آزمون) تماس گرفت.

(۴) در روز یا ساعت نامناسب تماس گرفت.

تماس تلفنی: چند دقیقه؟

- ۲۹۲ - پشتیبان شما چند دقیقه با شما تماس تلفنی داشت؟

(۱) یک دقیقه تا سه دقیقه

(۲) ۳ دقیقه تا ۵ دقیقه

(۳) بیش از ۱۰ دقیقه

(۴) بین ۵ تا ۱۰ دقیقه

کلاس رفع اشکال

- ۲۹۳ - آیا در کلاس رفع اشکال پشتیبان شرکت می‌کنید؟

(۱) بله، امروز در کلاس رفع اشکال پشتیبان خودم شرکت خواهم کرد.

(۲) بله، در کلاس پشتیبان دیگر شرکت خواهم کرد (زیرا به آن درس نیاز بیشتری دارم).

(۳) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار می‌کند اما من امروز شرکت نمی‌کنم.

(۴) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار نمی‌کند.

شروع به موقع

- ۲۹۴ - آیا آزمون در حوزه شما به موقع شروع می‌شود؟

(۱) بله، هر دو مورد (آزمون و نظرخواهی) به موقع و دقیقاً سرووقت آغاز می‌شود.

(۲) پاسخ‌گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی‌شود.

(۳) پاسخ‌گویی به سوال‌های علمی رأس ساعت آغاز نمی‌شود.

(۴) در هر دو مورد (آزمون و نظرخواهی) بی‌نظمی وجود دارد.

متاخرین

- ۲۹۵ - آیا دانشآموزان متاخر در محل جداگانه متوقف می‌شوند؟

(۱) خیر، متاسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متاخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.

(۲) این موضوع تا حدودی رعایت می‌شود اما نه به طور کامل.

(۳) بله، افراد متاخر ابتدا متوقف می‌شوند و بعداً وارد حوزه می‌شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همه‌مهه ایجاد می‌شود.

(۴) بله، افراد متاخر بعداً وارد حوزه می‌شوند ممتنع برای آنان محل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و بی‌نظمی و سر و صدا ایجاد نمی‌شود.

مراقبان

- ۲۹۶ - عملکرد و جدیت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

(۱) خیلی خوب (۲) خوب (۳) متوسط

(۴) ضعیف

پایان آزمون - ترک حوزه

- ۲۹۷ - آیا در حوزه شما به داوطلبان قبل از پایان آزمون اجازه خروج زود هنگام داده می‌شود؟

(۱) بله، قبل از پایان آزمون اجازه ترک حوزه داده می‌شود.

(۲) گاهی اوقات

(۳) به ندرت

(۴) خیر، هیچ‌گاه

ارزیابی آزمون امروز

- ۲۹۸ - به طور کلی کیفیت برگزاری آزمون امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

(۱) خیلی خوب (۲) خوب (۳) متوسط

(۴) ضعیف

آزمون ۱۳۹۷ اسفند ۱۰ گروه دهم تجربی دفترچه : پاسخ نامه (کلید)

1	□ □ □ ✓	51	✓ □ □	101	□ ✓ □ □	151	□ □ □ □	201	□ □ □
2	✓ □ □	52	□ ✓ □	102	□ □ ✓ □	152	✓ □ □	202	□ □ □
3	□ □ □ ✓	53	□ □ □ ✓	103	□ □ □ ✓	153	□ □ ✓	203	□ □ □
4	□ □ □	54	□ □ □ ✓	104	□ □ □ ✓	154	□ □ □ ✓	204	□ □ □
5	□ □ □ ✓	55	□ □ □ ✓	105	□ □ □ ✓	155	✓ □ □	205	□ □ □
6	□ □ □ ✓	56	□ □ □ ✓	106	□ □ □ ✓	156	□ □ □ ✓	206	□ □ □
7	□ □ □ ✓	57	□ □ □ ✓	107	□ □ □ ✓	157	✓ □ □	207	□ □ □
8	□ □ □ ✓	58	□ □ □ ✓	108	✓ □ □	158	✓ □ □	208	□ □ □
9	✓ □ □	59	✓ □ □	109	□ □ □ ✓	159	✓ □ □	209	□ □ □
10	□ □ □ ✓	60	□ □ □ ✓	110	□ □ □ ✓	160	□ □ □ ✓	210	□ □ □
11	✓ □ □	61	□ □ □	111	□ □ □	161	□ □ □	211	□ □ □
12	□ □ □ ✓	62	□ □ □ ✓	112	□ □ □ ✓	162	□ □ □ ✓	212	□ □ □
13	✓ □ □	63	✓ □ □	113	□ □ □ ✓	163	✓ □ □	213	□ □ □
14	✓ □ □	64	□ □ □ ✓	114	✓ □ □	164	□ □ □ ✓	214	□ □ □
15	□ □ □ ✓	65	□ □ □ ✓	115	□ □ □ ✓	165	✓ □ □	215	□ □ □
16	□ □ □ ✓	66	□ □ □ ✓	116	✓ □ □	166	□ □ □ ✓	216	□ □ □
17	□ □ □ ✓	67	□ □ □ ✓	117	□ □ □ ✓	167	✓ □ □	217	□ □ □
18	✓ □ □	68	□ □ □ ✓	118	□ □ □ ✓	168	□ □ □ ✓	218	□ □ □
19	□ □ □ ✓	69	□ □ □ ✓	119	□ □ □ ✓	169	□ □ □ ✓	219	□ □ □
20	□ □ □ ✓	70	✓ □ □	120	□ □ □ ✓	170	✓ □ □	220	□ □ □
21	✓ □ □	71	□ □ □ ✓	121	□ □ □ ✓	171	✓ □ □		
22	✓ □ □	72	□ □ □ ✓	122	✓ □ □	172	✓ □ □		
23	□ □ □ ✓	73	□ □ □ ✓	123	✓ □ □	173	✓ □ □		
24	□ □ □ ✓	74	□ □ □ ✓	124	✓ □ □	174	□ □ □		
25	✓ □ □	75	□ □ □ ✓	125	✓ □ □	175	✓ □ □		
26	□ □ □ ✓	76	✓ □ □	126	□ □ □ ✓	176	□ □ □		
27	□ □ □ ✓	77	□ □ □ ✓	127	✓ □ □	177	□ □ □		
28	✓ □ □	78	□ □ □ ✓	128	✓ □ □	178	□ □ □		
29	□ □ □ ✓	79	✓ □ □	129	□ □ □ ✓	179	✓ □ □		
30	□ □ □ ✓	80	□ □ □ ✓	130	✓ □ □	180	✓ □ □		
31	✓ □ □	81	□ □ □ ✓	131	□ □ □ ✓	181	✓ □ □		
32	✓ □ □	82	□ □ □ ✓	132	✓ □ □	182	□ □ □ ✓		
33	✓ □ □	83	□ □ □ ✓	133	✓ □ □	183	□ □ □		
34	✓ □ □	84	□ □ □ ✓	134	□ □ □ ✓	184	□ □ □		
35	□ □ □ ✓	85	□ □ □ ✓	135	✓ □ □	185	✓ □ □		
36	□ □ □ ✓	86	□ □ □ ✓	136	✓ □ □	186	□ □ □		
37	□ □ □ ✓	87	□ □ □ ✓	137	✓ □ □	187	□ □ □		
38	□ □ □ ✓	88	□ □ □ ✓	138	✓ □ □	188	□ □ □		
39	✓ □ □	89	□ □ □ ✓	139	□ □ □ ✓	189	✓ □ □		
40	□ □ □ ✓	90	✓ □ □	140	✓ □ □	190	□ □ □		
41	□ □ □ ✓	91	□ □ □ ✓	141	□ □ □ ✓	191	□ □ □		
42	✓ □ □	92	□ □ □ ✓	142	□ □ □ ✓	192	✓ □ □		
43	□ □ □ ✓	93	□ □ □ ✓	143	□ □ □ ✓	193	✓ □ □		
44	✓ □ □	94	✓ □ □	144	□ □ □ ✓	194	✓ □ □		
45	✓ □ □	95	✓ □ □	145	✓ □ □	195	✓ □ □		
46	✓ □ □	96	□ □ □ ✓	146	✓ □ □	196	□ □ □ ✓		
47	✓ □ □	97	□ □ □ ✓	147	✓ □ □	197	□ □ □ ✓		
48	□ □ □ ✓	98	□ □ □ ✓	148	□ □ □ ✓	198	□ □ □ ✓		
49	□ □ □ ✓	99	□ □ □ ✓	149	□ □ □ ✓	199	□ □ □ ✓		
50	✓ □ □	100	✓ □ □	150	✓ □ □	200	✓ □ □		

سایت کنکور

Konkur.in



(آگیتا ممفرزاده)

-۶

بازگردانی ابیات:

(الف) در عبارت «آن کس که خلق به فصلش همه اقرار دهد، شاه جهان را به همه فضل اقرار دهد»، «خلق» نهاد فعل «اقرار دهد» نخست است.

(ب) در عبارت «از بس که ملک، لشکر کفار (را) شکسته است، کفار پراکنده و برکنده شده‌اند»، «ملک» نهاد فعل «شکسته است» است.

(ج) در عبارت «او پیوسته پیکار همی جوید ولیکن کس نیست که با لشکر او پیکار جوید»، «کس» نهاد فعل «نیست» است.

(د) در عبارت «دشوارِ جهان، نزد ملک، آسان باشد و آسانِ ملک، نزد همه گیتی، دشوار (باشد) است»، «دشوار» نخست، نهاد فعل آشکار «باشد» است.

(ه) در عبارت «دینار (را) چنان بخشد»، واژه‌ی «دینار» مفعول است.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۸۵ کتاب فارسی)

(آگیتا ممفرزاده)

-۷

بیت گزینه‌ی «۴» تعدادی جمله‌ی ساده و مستقل دارد. در دیگر ابیات جمله‌ی غیرساده هست:

گزینه‌ی «۱»: من بیابانی به پیش گرفتم که اندر آن، از نهیب دیو، هر زمان، دل، خوناب می‌گشت.

گزینه‌ی «۲»: از آن درازی راه هر ساعت با دل می‌گفتم که برای این بیابان، کرانی پیدا نخواهد بود.

گزینه‌ی «۳»: در این اندیشه بودم که از کنار شهر «بست»، بانگ آب هیرمند ناگهان به گوشم آمد.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۸۰ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۸

در بیت صورت سؤال، شاعر خود را به مگسی مانند کرده است که شوخ‌چشمی کرده است، ولی دشمن او را با ملامت‌های خود، که همچون مگس‌ران بوده است، آزرده است.

(آرایه‌های ادبی، مشابه صفحه‌ی ۸۲ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۹

در بیت گزینه‌ی «۱» نیز مثل مصراع صورت سؤال، شاعر به یکتایی خداوند اشاره می‌کند.

(مفهوم، صفحه‌ی ۸۳ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۱۰

در بیت گزینه‌ی «۳»، مثل بیت صورت سؤال، شاعر از بقای محبت به یار در دل خود سخن می‌گوید.

(مفهوم، صفحه‌ی ۸۴ کتاب فارسی)

(اخسانه احمدی)

-۱

شاعر در بیت صورت سؤال می‌گوید که اگر در دیوار دلش نقشی از کینه و دشمنی وجود داشته است، آن را با گچ فراموشی پوشانده است. ترکیب‌های «دیوار دل» و «گچ نسیان» هر دو اضافه‌ی تشبيه‌ی است.

(واژه، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۲

تسوین: اسب سرکش / مهیب: ترسناک، هول آور / فراق: دوری، جدایی / تقریظ:

ستودن

(واژه، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۳

در عبارت گزینه‌ی «۳» «واژه‌ی «وقاحت» نادرست نوشته شده است.

(اما، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۴

وسایل سنگین راهسازی را بار شناورها کرده‌اند: ماضی نقلی

«تا ... آن‌ها را به آن سوی رودخانه‌ی ارونده حمل کنند: مضارع التزامی

«بچه‌ها نیز همان بچه‌های بی‌تكلف ... هستند: مضارع اخباری

«که همیشه در مسجد می‌بینی: مضارع اخباری

«تو گویی تا به حال درنمی‌یافتدای: ماضی نقلی

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۷۷ کتاب فارسی)

(آگیتا ممفرزاده)

-۵

در جمله‌های «عشق رسمیست» و «همه اندوه دل است»، نهاد در ابتداء و فعل در انتهای کلام آمده است. در دیگر ابیات مصراعی با شرط‌های پادشه و وجود ندارد.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌های ۸۵ و ۸۶ کتاب فارسی)



(مریم آقاباری)

-۱۶

ترجمه عبارت سؤال: «نمی‌افتد در بدی، جز انجام‌دهنده آن!» که با همه گزینه‌ها، به جز گزینه «۴» (شیطان فقط می‌خواهد که بین شما دشمنی و کینه بیندازد) هم‌مفهوم است.

ترجمه گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: هر کس برای برادرش چاهی بکند، (خود) در آن می‌افتد.
گزینه «۳»: هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می‌کند.

(مفهوم، درس ۵، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۷

آیه شریفه و بیت گزینه «۴» هر دو به این مفهوم اشاره دارند که «هر کسی طعم مرگ را می‌چشد و می‌میرد!»

(مفهوم، درس ۵، ترکیبی)

(رویشلن ابراهیمی)

-۱۸

در عبارت گزینه «۲» چون جمله به صورت فعلیه آمده است، خبر نداریم، زیرا خبر فقط در جمله‌های اسمیه وجود دارد.
در گزینه «۱» «تَفَيْدُ»، در گزینه «۳» «إِخْلَاصُ» و در گزینه «۴» «سَلْمَانٌ» خبرند.

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(مریم آقاباری)

-۱۹

«ملائس» مفعول است که هم مضاف برای ضمیر «تا» و هم موصوف برای «الخريفيّة» می‌باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: «أشجار» مفعولی است که فقط مضاف است. (مضاف‌الیه آن «التفاح» می‌باشد).

گزینه «۲»: « شيئاً» مفعولی است که فقط موصوف است. (صفت آن «أفضل» می‌باشد).

گزینه «۳»: «بنت» فاعل است که هم مضاف و هم موصوف می‌باشد؛ «الكتب» مفعول است ولی فقط موصوف است، مضاف نیست.

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(مریم آقاباری)

-۱۱

«قُلْ»: (فعل امر للمخاطب) بگو/ «سِيرُوا»: (فعل امر دوم شخص جمع) بگردید/ «فِي الْأَرْضِ»: در زمین/ «فَانظُرُوا»: پس بنگرید/ «كَيْفَ»: چگونه/ «بِدَا»: آغاز کرد/ «الْخَلَقَ»: (مفعول) آفرینش را

(ترجمه، درس ۵، صفحه ۴۷)

(رضا معصومی)

-۱۲

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: «الْتَقِيطُ» فعل امر و به معنای «عکس بگیر» صحیح است.
گزینه «۲»: «آیا ممکن است از مقالات این کتابخانه استفاده کنم؟!»
گزینه «۳»: «يَنْقُصُ كَمْ می‌شود»

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۳

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۲»: «الْمَحِيطُ»: اقیانوس
گزینه «۳»: «هر کس چیزی را خواست و تلاش کرد، پیدا کرد!»
گزینه «۴»: «كَانَ يَسْاعِدُ»: کمک می‌کردند (در اینجا فعل با توجه به فاعل «الطلاب»، جمع ترجمه می‌شود).

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(رویشلن ابراهیمی)

-۱۴

ترجمه صحیح گزینه «۲»: هشدار به حیوانات برای دور کردنشان از خطر، از وظایف زرافه است!
«إِبَاعِدُهُمْ: دور کردنشان»

(ترجمه، درس ۵، ترکیبی)

(مریم آقاباری)

-۱۵

ترجمه کامل عبارت: «أَفْتَابَ بِرَسْتَ مَىْ تَوَانَدَ دُوْ چَشْمَشَ رَادَرْ جَهَتَهَاتِي مُخْتَلِفَ بِجَرْخَانَدَ بَدونَ اينَ كَهَ سَرَشَ رَاهَ حَرَكَتَ دَهَدَ!»
«الحرباء»: آفتاب پرست/ «غَيْنَيَهَا»: دو چشمش/ «أَنْ تُحَرِّكَ»: که حرکت دهد

(مفهوم، درس ۵، صفحه ۴۹)



(کتاب یامع)

-۲۶

این عبارت با فعل «بُرید» شروع شده است، پس جمله فعلیه است.
(انواع بملات)

(کتاب یامع)

-۲۷

«أَحْيَاهُ»: فاعل / **«مَائِيَّةُ»:** صفت برای فاعل
تشريح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۱»: «الصَّابَاحَةُ»: صفت مفعول
گزینه «۲»: «الْمُجَدُّ»: صفت مبتدا
گزینه «۳»: «الْعَرَبِيَّةُ»: صفت مضارف‌الیه

(قواعد)

ترجمه متن درک‌طلب:

مهمنای سه روز است و آن‌چه زیاد باشد، صدقه است و مهمنان باید بعد از سه روز روانه شود ... مردم نزد دوستش رفت و روزهای پی دری نزد وی ماند تا این‌که از اقامت طولانی‌ش احساس رنج کرد. در نتیجه چاره‌ای اندیشید تا از دست او رهایی یابد. پس شرکت در یک مسابقه‌ی پرش را برای تعیین شخص برنده به مهمنان پیشنهاد کرد. سپس به پرسش گفت: هنگامی که مهمنان به بیرون خانه پرید در را بین. هنگام مسابقه مهمنان یک متر کمتر از صاحب خانه پرید و گفت: یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!

(کتاب یامع)

-۲۸

ضربالمثل: یک گنجشک در دست بهتر از ده تا، روی درخت است! نزدیک به معنای عبارت: **یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!**

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «هَرَكْسٌ بِهِ زِيَادٌ طَمْعٌ كَنَدٌ بِهِ كَمٌ (نیز) نمی‌رسد!»
گزینه «۳»: «بَهْتَرِينَ كَارِهَا مَتوسِطَتَرِينَ آنَ هَاسِت!»
گزینه «۴»: «سَلامَت زَنْدَگِي در مَدارا و سَازَگَارِي است!»

(درک مطلب- مفهوم)

(کتاب یامع)

-۲۹

«عَلَى الضَّيْفِ بِالِّإِنْتِقالِ»: بر مهمنان است که نقل مکان کند.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بَايدَ فَارَغَ التَّحْصِيلَ شُود!» نادرست است.
گزینه «۲»: «بَرَ اَوْسَتَ كَهْ تَبَدِيلَ كَنَد!» نادرست است.
گزینه «۴»: «مَهْمَانَ بَايدَ جَبْرَانَ كَنَد!» نادرست است.

(درک مطلب- ترجمه)

(کتاب یامع)

-۳۰

الشَّخْصُ: مضارف‌الیه

(درک مطلب- انواع بملات)

(فرشته کیانی)

-۲۰

در گزینه «۳»، مبتدا وجود ندارد؛ چرا که مبتدا در جمله‌ای است که اسمیه باشد؛ اما این جمله فعلیه است.

در گزینه «۲»، **«أشَجَعُ»** اسم تفضیل است. (شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند)

در گزینه‌های دیگر، مبتدا به ترتیب عبارتند از:

گزینه «۱»: «اللَّهُ

گزینه «۲»: «أشَجَعُ

گزینه «۴»: «كُلُّ

(انواع بملات، درس ۵، صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(کتاب یامع)

-۲۱

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «أَيْضًا: نَيْز» ترجمه نشده است.

گزینه «۲»: «حَيْوَانَاتُ الْأَغْلَبُ ... تَوَانَ ...» نادرست است.

گزینه «۴»: «... كَهْ عموماً ... پیام ... دریافت کنند!» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۲

صورت صحیح ترجمه این گزینه: **تاریکی اعماق اقیانوس را به روزی روشن تبدیل می‌کند!**

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۳

«أَنْ تُحَرِّكَ»: که حرکت دهد

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۴

در عبارت اصلی، محل زندگی خاقانی (به عنوان جواب این سوال) ذکر نشده است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

-۲۵

«خَرَدْمَنَد، سُخْنَ كَسِي رَاهَ بِسِيَارِ درُوغِ مَيْ گُويَدَ باورِ مَيْ كَنَد!» (خطا)

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: رنگ بنفش برای اتاق خواب، آرام بخش اعصاب است!

گزینه «۳»: حاضران بازیگنان را در دو مسابقه **تشویق** کردن!

گزینه «۴»: روی آثار تاریخی و درختان **یادگاری** ننویس!

(مفهوم)



دین و زندگی (۱)

(مبوبیه ابتسام)

-۳۶

با توجه به آیه ۷۷ سوره آل عمران، نتایج پیمان شکنی با خداوند عبارت است از: عدم بهره داشتن در آخرت، سخن نگفتن خدا با او، عدم تگریستان خدا به آنها در قیامت، عدم طهارت از گناه، عذاب دردنگا.

(درس ۸، صفحه ۱۰۰)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۷

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه و ارزیابی است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. قرآن کریم می‌فرماید: «رسول خدا (ص) برای شما نیکوترین اسوه است.»

(درس ۸، صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۸

پیامبر اکرم (ص)، همواره از اهل بیت (ع) به عنوان انسان‌هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده‌اند و پیروی از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می‌شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده است و اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و بالرزش بوده‌اند و با گذشت زمان، حتی درک بهتری از آن‌ها نیز به دست آمده است.

(درس ۸، صفحه ۱۰۳)

(فریدن سماقی - لرستان)

-۳۹

آدمی با عزم خود، آنچه را که انتخاب کرده، عملی می‌سازد. هر قدر عزم قوی‌تر باشد، رسیدن به هدف آسان‌تر است.

(درس ۸، صفحه ۹۹)

(ممدر مقدم)

-۴۰

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم‌گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود و راه چاره، مراقبت است.»

(درس ۸، صفحه ۱۰۱)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۱

هنگامی که دوزخیان دچار عذاب الهی می‌شوند، ناله حسرت آنان برمی‌خیزد و می‌گویند: «ای کاش خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر او را اطاعت می‌کردیم، ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی‌کردیم، او ما را از یاد خدا باز داشت. درین بر ما، به خاطر آن کوتاهی‌هایی که در دنیا کردیم.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۱)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۳۲

تعییر قرآنی «سیصلون سعیراً» در ادامه آیه «انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموالَ الْيَتَامَى ظَلَمًا آتَمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمْ نَارًا» آمده که دریاره صورت اخروی خوردن مال بینت است و نتیجه و تجسم آن، آتشی است که در شکم خویش فرو می‌برند.

(درس ۷، صفحه ۹۰)

(ممدر مقدم)

-۳۳

بهشتیان رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می‌یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند. آتش جهنم، بسیار سخت و سورانشده است. این آتش حاصل عمل خود انسان‌های است (حقیقت عمل) و برای همین، از درون جان آن‌ها شعله می‌کشد.

(درس ۷، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

(ویدیو کاغذی)

-۳۴

خداؤند در آیه ۱۸ سوره نساء می‌فرماید: «برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد، می‌گویند: الان توبه کردم، توبه نیست و این‌ها کسانی هستند که عذاب دردنگاکی برایشان فراهم کردیم.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۹)

(ویدیو کاغذی)

-۳۵

دوخیان گاهی دیگران را مقصراً می‌شمارند و می‌گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانم را سبب گمراهی ما شدند». آنان می‌گویند: «ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی‌کردیم، او مرا از یاد خدا بازداشت.»

(درس ۷، صفحه ۱۱۸)



(میرحسین زاهدی)

-۴۵

ترجمه جمله: «دانشمندان دارند تلاش‌های فراوانی می‌کنند تا داروهای مؤثری برای معالجه سرطان که بیماری بسیار خطرناکی است و غالباً باعث مرگ می‌شود، توسعه دهند.»

- (۱) توسعه دادن
 (۲) توصیف کردن
 (۳) شناسایی کردن
 (۴) مقایسه کردن

(واژگان)

(علی عاشوری)

-۴۶

ترجمه جمله: «اگرچه مادرم به طور مکرر به من می‌گفت که لباس‌هایی را بپوشم که محافظت مناسب در برابر سرمای شدید روزهای زمستانی فراهم می‌آورد، من هیچ اعتنایی به او نکردم.»

- (۱) باورپذیر
 (۲) مناسب
 (۳) جالب
 (۴) شغفت‌انگیز

(واژگان)

(علی شکوهی)

-۴۷

- (۱) اخیراً، به تازگی
 (۲) خوشبختانه، امیدوارانه
 (۳) با ناراحتی
 (۴) با دقت

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۴۸

- (۱) گردآوری کردن
 (۲) تقسیم کردن
 (۳) دور زدن، چرخیدن
 (۴) خلق کردن، ساختن

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۴۹

- (۱) سیاره
 (۲) زندگی
 (۳) تحقیق
 (۴) اختراع

(کلوز تست)

(علی شکوهی)

-۵۰

- (۱) حقیقت
 (۲) آینده
 (۳) هدیه، کادو
 (۴) ماده، جنس

(کلوز تست)

زبان انگلیسی (۱)

-۴۱

(علی عاشوری)

ترجمه جمله: «مدت زیادی است که دیوید را ندیده‌ام. آخرین باری که او را دیدم، داشت تلاش می‌کرد تا در میامی شغلی پیدا کند.»

نکته مهم درسی

اگر کار و عملی در زمان مشخصی در گذشته استمرار داشته باشد، زمان جمله گذشته استمراری است.

(گرامر)

-۴۲

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «آیا دانش‌آموزان داشتند در مورد برنامه مدرسه برای رفتن به پیکنیک جمعه آینده صحبت می‌کردند وقتی که معلم وارد شد؟»

نکته مهم درسی

جمله گذشته ساده بعد از "when" در آخر جمله دوم نشان می‌دهد که جمله اول در زمان گذشته استمراری است و وجود "were" در اول جمله اول نکته را تأیید می‌کند. نکته انحرافی وجود "next Friday" به معنی «جمعه آینده» در جمله دوم است که جمله را آینده ساده نمی‌کند و گزینه «۱» درست نیست.

(گرامر)

-۴۳

(علی عاشوری)

ترجمه جمله: «مردم اغلب از خود می‌پرسند که آیا درست قبل از اصابت آسانسور در حال سقوط به زمین، آن‌ها می‌توانند (به بیرون) بپرنده، اما متأسفانه این تاکتیک کارساز نخواهد بود.»

۱) مخصوصاً

- (۱) به درستی
 (۲) به سرعت
 (۳) متأسفانه

(واژگان)

-۴۴

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «بعد از این که جنگ بین دو کشور همسایه به اتمام رسید، گورهای دسته‌جمعی زیادی توسط مردمان محلی یافت شد.»

- (۱) مشکلات
 (۲) داستان‌ها
 (۳) دردها
 (۴) گورها

(واژگان)



»ریتم مشتق نظم«

-۵۵

$$\begin{aligned} (3, x+2y) \in f, (3, 4) \in f &\Rightarrow \begin{cases} x+2y = 4 \\ x = 3 \end{cases} \\ (6, 2) \in f, (6, x-2y) \in f &\Rightarrow \begin{cases} x-2y = 2 \\ x = 6 \end{cases} \\ \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3 &\xrightarrow{x+2y=4} 3 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

پس:

$$\Rightarrow x + y = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

»ریتم مشتق نظم«

-۵۶

$$(-1, a-4) \in f, (-1, 1) \in f \Rightarrow a-4 = 1 \Rightarrow a = 5$$

$$f = \{(-1, 1), (2, 5-b), (3, 5), (2, 4)\}$$

$$(2, 5-b) \in f, (2, 4) \in f \Rightarrow 5-b = 4 \Rightarrow b = 1$$

$$a+b = 5+1 = 6$$

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

»وہاب تاری«

-۵۷

همانطور که از جدول تعیین علامت دیده می‌شود ۱ و -۲ ریشه‌های چندجمله‌ای هستند. در اطراف $x = 1$ علامت چندجمله‌ای عوض شده و لی $x = -2$ در اطراف $x = -2$ علامت چندجمله‌ای عوض نشده است. پس $x = 1$ ریشه ساده و $x = -2$ ریشه مضاعف چندجمله‌ای می‌توانند باشند.

$$y = (x+2)^3(x-1) \Rightarrow y = (x^3 + 4x^2 + 4)(x-1)$$

$$\Rightarrow y = x^3 - x^2 + 4x^2 - 4x + 4x - 4$$

$$\Rightarrow y = x^3 + 3x^2 - 4$$

(صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی) (معارله‌ها و نامعادله‌ها)

»ریتم مشتق نظم«

-۵۸

$$A = 0 \rightarrow \begin{cases} 2 - |x| = 0 \Rightarrow |x| = 2 \Rightarrow x = \pm 2 \\ 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-۲	۲	۳	$+\infty$
$ x $	-	+	+	-	-
$2x - 6$	-	-	-	+	+
A	+	+	-	+	-

$$A < 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$$

(صفحه ۸۳ تا ۹۳ کتاب درسی) (معارله‌ها و نامعادله‌ها)


ریاضی (۱) - عادی

-۵۱

»مهوردار قابی«

می‌دانیم شرط تابع بودن نمودار پیکانی این است که از هر عضو مجموعه اول دقیقاً یک فلش خارج شود.

پس باید:



$$\begin{cases} m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1 \\ m^2 = m - 2 \Rightarrow m^2 - m + 2 = 0 \end{cases}$$

 $\Delta \Leftarrow$

معادله ریشه حقیقی ندارد. چون اشتراک جواب‌های دو معادله فوق تهی است، پس برای m مقداری وجود ندارد که به ازای آن، نمودار پیکانی فوق نمایش یک تابع باشد.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

»علی ارجمند«

-۵۲

رابطه‌ای که به هر درخت برگ‌هایش را نسبت می‌دهد تابع نیست چرا که به ازای مؤلفه اول یکسان (یعنی درخت) مولفه‌های دوم متفاوت (برگ‌هایش) را نسبت می‌دهد.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

»ناصر اسکندری«

-۵۳

نمودار پیکانی زمانی تابع است که از هر عضو مجموعه اول دقیقاً یک پیکان خارج شود، پس گزینه ۴ جواب است. در گزینه ۱ «از عضو ۲، دو پیکان خارج شده، در گزینه ۳» از a سه پیکان خارج شده و در گزینه ۲ «از ۳ هیچ پیکانی خارج نشده است.

(صفحه‌های ۹۶ و ۹۷ کتاب درسی) (تابع)

»وہاب تاری«

-۵۴

چون تابع فقط شامل دو زوج مرتب متمایز است، پس باید $a^2 - 1 = 8$ یا $a^2 - 1 = -2$ باشد.

$$a^2 - 1 = -2 \Rightarrow a^2 = -1$$

$$\begin{cases} a^2 - 1 = -2 \Rightarrow a^2 = -1 \\ a^2 - 1 = 8 \Rightarrow a^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow a = \pm 3 \text{ و } b = 2b - 4 \Rightarrow b = 4$$

مولفه‌های دوم نیز باید برابر باشد.

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = (\pm 3)^2 + 4^2 = 25$$

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)



x	$-\infty$	-2	-1	4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$	+	+	+	-	+
$x + 2$	-	+	+	+	+
$P(x) \geq 0$	-	+	+	-	+

(مجموعه جواب $[-2, -1] \cup [4, +\infty)$)

(صفحه‌های ۱۱ تا ۹۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

«شکل رهیب»

$$x_S = \frac{-b'}{2a'} = 1 \Rightarrow \frac{-a}{2} = 1 \Rightarrow a = -2$$

$$y = 3x^2 - 6x + b \xrightarrow{(1,-4) \in \text{نمای}} 3 - 6 + b = -4 \Rightarrow b = -1$$

$$a - b = (-2) - (-1) = -1$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«بهمشید هسینی فواه»

$$-\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a \quad (I)$$

حال مختصات رأس را در معادله سهی قرار می‌دهیم، در نتیجه داریم:

$$-2 = a(1)^2 + b(1) - \frac{3}{2}$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین را در ۲ ضرب می‌کنیم} -4 = 2a + 2b - \frac{3}{2}}$$

$$2a + 2b = -1 \quad (II) \xrightarrow{(I),(II)} a = -\frac{1}{2}, b = -1$$

$$\text{پس سهی مورد نظر به شکل } y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} \text{ است. حال نقاط}$$

تقاطع سهی با محور x ها را پیدا می‌کنیم.

$$y = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} = 0 \xrightarrow{\text{طرفین را در ۲ ضرب می‌کنیم}} x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«محمد پور احمدی»

چون سهی از نقاط $O(0,0)$ و $A(-1,3)$ می‌گذرد، پس این نقاط در معادله سهی صدق می‌کنند. داریم:

$$O(0,0) \Rightarrow 0 = 0 - 0 + c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow y = ax^2 - bx$$

$$A(-1,3) \Rightarrow a + b = 3 \quad (I)$$

«مهرداد قابوی»

x	-1	0	2
$P(x)$	+	+	-

-۵۹

از جدول تعیین علامت چنین برداشت می‌شود که 0 و 2 ریشه‌های صورت کسر و -1 ریشه مضاعف مخرج کسر $P(x)$ باشد، در نتیجه Δ در مخرج کسر صفر است. پس:

$$\begin{cases} a = 2 \\ a - b + c = 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = b - 2(*) \\ b^2 - 4b + 16 = 0 \\ b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow (b-4)^2 = 0 \Rightarrow b = 4 \xrightarrow{(*)} c = 2$$

$$\Rightarrow P(x) = \frac{4x(x-2)^2}{2(x+1)^2}$$

در نتیجه به ازای $x > 0$ ، حاصل عبارت مثبت و به ازای $x < 0$ ، حاصل عبارت منفی است، پس علامت $P(x)$ بست آمده مغایر با علامت‌های مندرج در جدول تعیین علامت است. پس مقداری برای b وجود ندارد.

(صفحه‌های ۱۱ تا ۹۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«رهیم مشتاق نظم»

چون بازه $(-1, 2)$ بزرگترین بازه‌ای است که عبارت درجه دوم مورد نظر در آن مثبت است، پس اولاً $x = -1$ و $x = 2$ ریشه‌های عبارت هستند و ثانیاً a منفی است.

$$y = ax^2 + x + 2a^2 \xrightarrow{x=-1} a - 1 + 2a^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2a^2 + a - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2a-1)(a+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ غ ق ق}$$

$$\xrightarrow{x=2} 4a + 2 + 2a^2 = 0 \Rightarrow a^2 + 2a + 1 = 0 \Rightarrow (a+1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = -1$$

باشد، پس فقط جواب $a = -1$ قابل قبول است.

(صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«محمد پور احمدی»

-۶۰

$$\frac{x^2 - x}{x+2} \geq 2 \Rightarrow \frac{x^2 - x}{x+2} - 2 \geq 0 \Rightarrow P(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x+2} \geq 0.$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ یا } x = -1 \text{ و } x = -2$$



«حسن نصرتی ناهوک»

-۶۸

سهمی دارای بیشترین مقدار است و نمودار سهمی رو به پایین است پس $a < 0$. سهمی محور عرضها را در عرض -3 قطع می‌کند، یعنی اگر $x = 0$ را در معادله قرار دهیم، $y = -3$ می‌شود، پس $3 = -3k$ است.

$$y = ax^2 + bx - 3$$

$$\text{عرض رأس سهمی} = -\frac{\Delta}{4a} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta}{4a} = 1 \Rightarrow \Delta = 4a \Rightarrow b^2 - 4ac = 4a \Rightarrow 16 + 12a = 4a$$

$$\Rightarrow -12a = 16 \Rightarrow a = -2 < 0$$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2(-2)} = 1 \Rightarrow \text{محور تقارن: } x = 1$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۷۸ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

«راور بوالمسنی»

-۶۹

چون رأس سهمی نقطه $(4, 8)$ است، معادله آن را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$y = a(x - 4)^2 + 8 \xrightarrow{(0, 0) \in f} 0 = a(0 - 4)^2 + 8$$

$$\Rightarrow 0 = 16a + 8 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$y = \frac{-1}{2}(x - 4)^2 + 8 \xrightarrow{y=0} \frac{1}{2}(x - 4)^2 = 8 \Rightarrow (x - 4)^2 = 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 4 = 8 \Rightarrow x = 12 \\ x - 4 = -8 \Rightarrow x = -4 \end{cases}$$

پس ریشه‌های معادله $y = 0$ برابر است با $x = -4$ و $x = 12$ همان‌طور که از نمودار مشخص است. جدول تعیین علامت به صورت گزینه «۳» می‌باشد.

(صفحه‌های ۷۱ تا ۷۸ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«راور بوالمسنی»

-۷۰

بالاترین نقطه سهمی، رأس سهمی می‌باشد و چون در ربع چهارم است پس $y_s > 0$, $x_s > 0$ است. از طرفی سهمی باید رو به پایین باشد، یعنی $m < 0$.

$$\begin{cases} x_s = -\frac{b}{2a} = \frac{-2\sqrt{3}}{2m} = -\frac{\sqrt{3}}{m} \\ y_s = m\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right)^2 + 2\sqrt{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right) + (m + 2) \end{cases}$$

$$x = \frac{-b'}{2a'} \xrightarrow{x=2} 2 = \frac{b}{2a} \Rightarrow b = 4a \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} a + 4a = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{5}, b = \frac{12}{5}$$

$$15a + 8b + c = 15 \times \frac{3}{5} + 8 \times \frac{12}{5} + 0 = 21$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۷۸ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«رمیم مشتاق نظم»

-۶۵

$$\frac{-b'}{2a'} = \frac{-a}{-4} = \frac{a}{4} \Rightarrow -2\left(\frac{a}{4}\right)^2 + a \times \frac{a}{4} + a + 2 = 8$$

$$\Rightarrow \frac{-a^2}{8} + \frac{a^2}{4} + a + 2 = 8 \xrightarrow{\times 8} -a^2 + 2a^2 + 8a + 16 = 64$$

$$\Rightarrow a^2 + 8a - 48 = 0 \Rightarrow (a + 12)(a - 4) = 0$$

$$\begin{cases} a = -12 \quad \text{غایق} \\ a = 4 \Rightarrow -2x^2 + 4x + 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 4 = 0 \\ \Rightarrow (x+1)(x-4) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 4 \end{cases}$$

توجه کنید که طول رأس سهمی یعنی $x = \frac{a}{4}$ باید مثبت باشد، پس

فقط $a = 4$ قابل قبول است.

(صفحه‌های ۷۱ تا ۷۸ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«علی ابرمند»

-۶۶

$$y(0) = 2 \Rightarrow c = 2$$

$$\begin{cases} y(-1) = 0 \Rightarrow a - b + 2 = 0 \\ y(3) = 0 \Rightarrow 9a + 3b + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-1}{12} = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b + c = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} + 2 = \frac{1}{3}$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۷۸ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«رمیم مشتاق نظم»

-۶۷

$$\left| \frac{|x-1|}{3} + 1 \right| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq \frac{|x-1|}{3} + 1 \leq 2 \Rightarrow -3 \leq \frac{|x-1|}{3} \leq 1$$

$$\Rightarrow -9 \leq |x-1| \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x-1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -2 \leq x \leq 4$$

(صفحه‌های ۹۱ تا ۹۴ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)



«بهمشید هسینی فواد»

-۷۴

می‌دانیم فاصله بین x^2 و $4x$ همان $|x^2 - 4x|$ می‌باشد، لذا داریم:

$$|x^2 - 4x| < 5 \Rightarrow -5 < x^2 - 4x < 5 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 4x < 5 & (1) \\ x^2 - 4x > -5 & (2) \end{cases}$$

نامعادله (۲) به صورت $x^2 - 4x + 5 > 0$ در می‌آید که در آن $a > 0, \Delta < 0$ است، پس عبارت درجه دوم همواره مثبت است، لذا جواب آن تمام عددهای حقیقی است. پس کافی است نامعادله (۱) را حل کنیم، خواهیم داشت:

$$x^2 - 4x - 5 < 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 1) < 0.$$

$$\Rightarrow -1 < x < 5 \Rightarrow x \in (-1, 5)$$

پس حداقل مقدار $b - a$ برابر با $= 6 - (-1) = 7$ است.

(صفحه‌های ۹۳ تا ۹۴ کتاب (رسی))

«ایمان پنی فروشن»

-۷۵

برای آن که عبارت درجه دوم همواره منفی باشد، باید ضریب x^2 و Δ هر دو منفی باشند.

$$a < 0 \Rightarrow m < 0 \quad (1)$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow (4m)^2 - 4(m)(-9) < 0 \Rightarrow 16m^2 + 36m < 0$$

$$\Rightarrow m^2 + 4m < 0 \Rightarrow m(m + 4) < 0 \Rightarrow -4 < m < 0 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(2)\cap(1)} -4 < m < 0$$

(صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴ کتاب (رسی))

«محمد پور احمدی»

-۷۶

$$(5 - 10x)^3 = 0 \Rightarrow 5 - 10x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$3x^3 - 9x^2 = 0 \Rightarrow 3x^2(x - 3) = 0 \Rightarrow 3x^2 = 0 \quad \text{یا} \quad x - 3 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{یا} \quad x = 3$$

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$(5 - 10x)^3$	+	+	-	-	-
$3x^2$	+	+	+	+	+
$x - 3$	-	-	-	+	+
$P > 0$	-	-	+	+	-

$$\Rightarrow x \in (\frac{1}{2}, 3)$$

(صفحه‌های ۸۳ تا ۸۴ کتاب (رسی))

$$= \frac{3}{m} - \frac{6}{m} + m + 2 = -\frac{3}{m} + m + 2 = \frac{m^2 + 2m - 3}{m}$$

در ناحیه چهارم داریم: $y_s < 0$ و $x_s > 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_s > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{m} > 0 \Rightarrow m < 0 & (I) \\ y_s < 0 \Rightarrow \frac{m^2 + 2m - 3}{m} < 0 \xrightarrow{m < 0} m^2 + 2m - 3 > 0 & \end{cases}$$

از اشتراک روابط (I) و (II) نتیجه می‌شود: $m < -3$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۹ کتاب (رسی) (معارفه‌ها و نظریه‌ها))

ریاضی (۱) - موازی

«دواود بوالحسنی»

-۷۱

عبارت درجه اول هیچ‌گاه همواره منفی یا همواره مثبت نمی‌باشد پس به ازای هیچ مقداری از a ، عبارت داده شده همواره منفی نمی‌باشد و پاسخ گزینه ۳ می‌باشد. توجه کنید که چون عبارت درجه اول است، ضریب x نمی‌تواند صفر باشد، یعنی $a \neq 0$ است.

x		$x = \frac{3}{a - 2}$
$(a - 2)x - 3$	$a - 2$	$a - 2$
مختلف علامت ۲		

(صفحه‌های ۸۳ تا ۸۸ کتاب (رسی))

«محمد بهیرابی»

-۷۲

$$2y = -4x^2 + 8x + 2$$

$$\Rightarrow y = -2x^2 + 4x + 1 \Rightarrow y = -2x^2 + 4x - 2 + 3$$

$$\Rightarrow y = -2(x^2 - 2x + 1) + 3$$

$$\Rightarrow y = -2(x - 1)^2 + 3$$

محور تقارن

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۹ کتاب (رسی))

«وهاب نادری»

-۷۳

اولاً سهمی رو به بالا می‌باشد. پس گزینه «۳» که در آن ضریب x^2 منفی است، حذف می‌شود. ثانیاً طول رأس سهمی $x_s = 2$ است، پس گزینه «۲» هم حذف می‌شود. ثالثاً نقطه $(2, -4)$ در ضایعه سهمی باید صدق کند، پس گزینه «۴» گزینه صحیح می‌باشد.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۹ کتاب (رسی))



$$\Rightarrow P(x) = \frac{4x(x-2)^2}{2(x+1)^3}$$

در نتیجه به ازای $x > 0$, حاصل عبارت مثبت و به ازای $x < 0$, حاصل عبارت منفی است، پس علامت $P(x)$ بسته آمده مغایر با علامتهای مندرج در جدول تعیین علامت است، پس مقداری برای b وجود ندارد.
 (صفحه‌های ۸۷ و ۹۳ کتاب درسی)

«ریتم مشتق نظم»

چون بازه $(-1, 2)$ بزرگترین بازه‌ای است که عبارت درجه دوم مورد نظر در آن مثبت است، پس اولاً $x = -1$ و $x = 2$ ریشه‌های عبارت هستند و ثانیاً a منفی است.

$$y = ax^4 + x + 2a^2 \xrightarrow{x=-1} a - 1 + 2a^2 = 0 \\ \Rightarrow 2a^2 + a - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2a-1)(a+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{x=2} 4a + 2 + 2a^2 = 0 \Rightarrow a^2 + 2a + 1 = 0 \Rightarrow (a+1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = -1$$

باید منفی باشد، پس فقط جواب $a = -1$ قابل قبول است.

(صفحه‌های ۸۷ و ۹۳ کتاب درسی)

«محمد پور احمدی»

$$\frac{x^2 - x}{x+2} \geq 2 \Rightarrow \frac{x^2 - x}{x+2} - 2 \geq 0 \Rightarrow P(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x+2} \geq 0$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ یا } x = -1 \text{ و } x = -2$$

x	$-\infty$	-2	-1	4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$	+	+	+	-	+
$x+2$	-	+	+	+	+
$P(x) \geq 0$	-	+	+	-	+

(مجموعه جواب $(-2, -1] \cup [4, +\infty)$)

(صفحه‌های ۸۸ و ۹۳ کتاب درسی)

«وهاب نادری»

همانطور که از جدول تعیین علامت دیده می‌شود ۱ و -۲ ریشه‌های چندجمله‌ای هستند. در اطراف $x = 1$ علامت چندجمله‌ای عوض شده ولی $x = 1$ در اطراف $x = -2$ علامت چندجمله‌ای عوض نشده است. پس $x = -2$ ریشه ساده و $x = -2$ ریشه مضاعف چندجمله‌ای می‌تواند باشد.

$$y = (x+2)^2(x-1) \Rightarrow y = (x^2 + 4x + 4)(x-1)$$

$$\Rightarrow y = x^3 - x^2 + 4x^2 - 4x + 4x - 4$$

$$\Rightarrow y = x^3 + 3x^2 - 4$$

(صفحه‌های ۸۷ و ۹۳ کتاب درسی)

«ریتم مشتق نظم»

$$A = 0 \rightarrow \begin{cases} 2 - |x| = 0 \Rightarrow |x| = 2 \Rightarrow x = \pm 2 \\ 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$
$2 - x $	-	+	-	-	-
$2x - 6$	-	-	-	+	+
A	+	-	+	-	-

$$A < 0 \Rightarrow x \in (-2, 2) \cup (3, +\infty)$$

(صفحه ۸۷ و ۹۳ کتاب درسی)

«مهرداد قابی»

x	-1	0	2
P(x)	+	+	-

از جدول تعیین علامت چنین برداشت می‌شود که ۰ و ۲ ریشه‌های صورت کسر و $x = 1$ ریشه مضاعف مخرج کسر $P(x)$ می‌باشد، در نتیجه

در مخرج کسر صفر است. پس:

$$\begin{cases} a = 2 \\ a - b + c = 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = b - 4(*) \\ b^2 - 4b + 16 = 0 \end{cases} \Rightarrow b^2 - 4b + 16 = 0$$

$$\Rightarrow (b-4)^2 = 0 \Rightarrow b = 4 \xrightarrow{(*)} c = 2$$



$$15a + 5b + c = 15 \times \frac{3}{5} + 5 \times \frac{12}{5} + 0 = 21$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

»ریاضی مشتق نظر«

-۸۵

$$\text{طول رأس سهمی} = \frac{-b'}{2a'} = \frac{-a}{-4} = \frac{a}{4} \Rightarrow -2\left(\frac{a}{4}\right)^2 + a \times \frac{a}{4} + a + 2 = 8$$

$$\Rightarrow \frac{-a^2}{4} + \frac{a^2}{4} + a + 2 = 8 \xrightarrow{\times 4} -a^2 + 2a^2 + 8a + 16 = 64$$

$$\Rightarrow a^2 + 8a - 48 = 0 \Rightarrow (a + 12)(a - 4) = 0$$

$$\begin{cases} a = -12 \quad \text{خ} \quad \text{ق} \quad \text{ق} \\ a = 4 \Rightarrow -2x^2 + 4x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \\ \Rightarrow (x+1)(x-3) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 3 \end{cases}$$

توجه کنید که طول رأس سهمی یعنی $x = \frac{a}{4}$ باید مثبت باشد، پس

فقط $a = 4$ قابل قبول است.

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

»علی ارممند«

-۸۶

$$y(0) = 2 \Rightarrow c = 2$$

$$\begin{cases} y(-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a - b + 2 = 0 \\ 4a + 3b + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-8}{12} = -\frac{2}{3} \\ b = \frac{4}{3} \end{cases} \\ y(3) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b + c = -\frac{2}{3} + \frac{4}{3} + 2 = \frac{8}{3}$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

»شیلکب رهی«

-۸۲

$$x_S = \frac{-b'}{2a'} = 1 \Rightarrow \frac{-a}{6} = 1 \Rightarrow a = -6$$

$$y = 3x^2 - 6x + b \xrightarrow{(1,-4) \in \text{نمی}} 3 - 6 + b = -4 \Rightarrow b = -1$$

$$a - b = (-6) - (-1) = -5$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

»جمشید هسینی فواه«

-۸۳

$$= 1 \Rightarrow b = -\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a \quad (\text{I})$$

حالا مختصات رأس را در معادله سهمی قرار می‌دهیم، در نتیجه داریم:

$$-2 = a(1)^2 + b(1) - \frac{3}{2}$$

طرفین را در ۲ ضرب می‌کنیم $\rightarrow -4 = 2a + 2b - 3$

$$2a + 2b = -1 \quad (\text{II}) \xrightarrow{(\text{I}), (\text{II})} a = \frac{1}{2}, b = -1$$

$$\text{پس سهمی مورد نظر به شکل } y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} \text{ است. حال نقاط}$$

تقاطع سهمی با محور x ها را پیدا می‌کنیم.

$$y = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

»محمد پور احمدی«

-۸۴

چون سهمی از نقاط $O(0,0)$ و $A(-1,3)$ می‌گذرد، پس این نقطه در

معادله سهمی صدق می‌کنند. داریم:

$$O(0,0) \Rightarrow 0 = 0 - 0 + c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow y = ax^2 - bx$$

$$A(-1,3) \Rightarrow a + b = 3 \quad (\text{I})$$

$$x = \frac{-b'}{2a'} \xrightarrow{x=-1} 2 = \frac{b}{2a} \Rightarrow b = 4a \quad (\text{2})$$

$$\xrightarrow{(\text{1}), (\text{2})} a + 4a = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{5}, b = \frac{12}{5}$$



$$\begin{aligned} y &= \frac{-1}{\lambda}(x - 4)^2 + \lambda \xrightarrow{y=0} \frac{1}{\lambda}(x - 4)^2 = \lambda \Rightarrow (x - 4)^2 = 64 \\ &\Rightarrow \begin{cases} x - 4 = \lambda \Rightarrow x = 12 \\ x - 4 = -\lambda \Rightarrow x = -4 \end{cases} \end{aligned}$$

پس ریشه‌های معادله $y = 0$ برابر است با $x = -4$ و $x = 12$

همان‌طور که از نمودار مشخص است، جدول تعیین علامت به صورت

گزینه «۳» می‌باشد.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۸ کتاب درسی)

«اووور بوالمسنی»

-۹۰

بالاترین نقطه سهمی، رأس سهمی می‌باشد و چون در ربع چهارم است، پس $y_s < 0$, $x_s > 0$ است. از طرفی سهمی باید رویه پایین باشد، یعنی $m < 0$.

$$\begin{cases} x_s = -\frac{b}{2a} = \frac{-2\sqrt{3}}{2m} = -\frac{\sqrt{3}}{m} \\ y_s = m\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right)^2 + 2\sqrt{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right) + (m+2) \end{cases}$$

$$= \frac{3}{m} - \frac{6}{m} + m + 2 = -\frac{3}{m} + m + 2 = \frac{m^2 + 2m - 3}{m}$$

در ناحیه چهارم داریم: $x_s > 0$ و $y_s < 0$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \begin{cases} x_s > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{m} > 0 \Rightarrow m < 0 \quad (\text{I}) \\ y_s < 0 \Rightarrow \frac{m^2 + 2m - 3}{m} < 0 \xrightarrow{m < 0} m^2 + 2m - 3 > 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow m > 1 \text{ یا } m < -3 \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

از اشتراک روابط (I) و (II) نتیجه می‌شود: $m < -3$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۸ کتاب درسی)

«ریم مشتاق نظم»

-۸۷

$$\left| \frac{|x-1|}{3} + 1 \right| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq \frac{|x-1|}{3} + 1 \leq 2 \Rightarrow -3 \leq \frac{|x-1|}{3} \leq 1$$

$$\Rightarrow -9 \leq |x-1| \leq 3 \Rightarrow -9 \leq x-1 \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x-1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -2 \leq x \leq 4$$

(صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳ کتاب درسی)

«حسن نصرتی تاهوک»

-۸۸

سهمی دارای بیشترین مقدار است و نمودار سهمی رو به پایین است پس

a. سهمی محور عرضها را در عرض -3 قطع می‌کند، یعنی اگر

x را در معادله قرار دهیم، $y = -3$ می‌شود، پس $k = -3$ است.

$$y = ax^2 + bx - 3$$

$$\text{عرض رأس سهمی} = -\frac{\Delta}{4a} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta}{4a} = 1 \Rightarrow \Delta = 4a \Rightarrow b^2 - 4ac = 4a \Rightarrow 16 + 12a = 4a$$

$$\Rightarrow -8a = 16 \Rightarrow a = -2 < 0$$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2(-2)} = 1 \Rightarrow x = 1$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۸ کتاب درسی)

«اووور بوالمسنی»

-۸۹

چون رأس سهمی نقطه (۴, ۸) است، معادله آن را به صورت زیر می‌توان

نوشت:

$$y = a(x - 4)^2 + 8 \xrightarrow{(a, b) \in f} y = a(x - 4)^2 + 8$$

$$\Rightarrow 8 = 16a + 8 \Rightarrow a = -\frac{1}{16}$$



مایع جایه‌جا شده برابر است. چون ظرف پر از مایع بوده، مایع بیرون ریخته شده همان مایع جایه‌جا شده است. بنابراین با قرار دادن چوب بر روی سطح مقداری از مایع بیرون می‌ریزد و وزن آن کم می‌شود اما مایع نیرویی بالاً سو به چوب و چوب هم نیرویی پایین‌سو به مایع وارد می‌کند که هم‌وزن مایع بیرون ریخته شده است. در نتیجه عددی که ترازو نشان می‌دهد تغییر نمی‌کند.

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۱ کتاب درسی)

-۹۶

در عمق ۳ متری فشار ناشی از مایع $84 - 75 = 9 \text{ cmHg}$ است، یعنی

$$\frac{9}{3} = 3 \text{ cmHg} \quad \text{افزایش}$$

یافته است. بنابراین به ازای $\frac{7}{5}$ متر افزایش عمق مایع، فشار به اندازه $\frac{7}{5} \times 3 = 22/5 \text{ cmHg}$ نسبت به سطح مایع افزایش می‌یابد در

نتیجه فشار کل در عمق $\frac{7}{5}$ متری برابر است با:

$$P = 75 + 22/5 = 97/5 \text{ cmHg}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۹۷


ابتدا فشار کل در محل زیردریایی را می‌یابیم و سپس به کمک رابطه $F = PA$ ، اندازه نیروی وارد بر دریچه زیردریایی را حساب می‌کنیم:

$$P = P_0 + \rho gh \rightarrow P = P_0 + 10^3 \times 10 \times 90 = 10^6 \text{ Pa}$$

$$A = \pi r^2 = 3 \times (0/6)^2 = 1/08 \text{ m}^2$$


$$F = PA = 10^6 \times 1/08 = F = 1080 \times 10^3 \text{ N} = 1080 \text{ kN}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)



-۹۸

فشار در نقاط همتراز از یک مایع ساکن برابر است. در حالت اول با توجه به شکل زیر داریم:



$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_2 g h_2 + P_0 = \rho_1 g h_1 + P_0$$


$$\Rightarrow \rho_2 h_2 = \rho_1 h_1$$

$$\Rightarrow 1/36 \times h_2 = 13/6 \times 1 \Rightarrow h_2 = 1.0 \text{ cm}$$

-۹۱

فیزیک (۱) - عادی

اختلاف فشار دو نقطه در یک مایع ساکن برابر $\Delta P = \rho g \Delta h$ است که با اضافه شدن آب هیچ کدام از ۳ پارامتر ρ ، g و Δh تغییری نکرده است، پس اختلاف فشار دو نقطه همان ΔP خواهد بود.



(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۹۲

-۹۲

با توجه به برابری فشار ستون آب و ستون جیوه داریم:

$$P_{\text{جيوه}} = P_{\text{آب}} \Rightarrow \rho_{\text{جيوه}} g h_{\text{جيوه}} = \rho_{\text{آب}} g h_{\text{آب}}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{جيوه}} h_{\text{جيوه}} = \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}}$$

$$\Rightarrow 13/6 \times 5 = 1 \times h_{\text{آب}} = 68 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۹۳

-۹۳

چون در هر دو حالت، قطعه روی سطح مایع شناور می‌ماند، پس اندازه نیروی شناوری مایع با اندازه وزن جسم در هر دو حالت برابر است. بنابراین:

$$(F_b)_A = W_{\text{جسم}} \Rightarrow (F_b)_A = (F_b)_B \\ (F_b)_B = W_{\text{جسم}}$$

پس نیروی شناوری یکسانی از طرف مایع A و B بر قطعه در هر دو حالت وارد می‌شود. توجه: این که هر دو جسم روی سطح مایع شناور هستند به این معنی است که چگالی دو مایع بیشتر از چگالی قطعه است. اما اطلاعات مسئله برای مقایسه چگالی دو مایع ناقص است.

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۱ کتاب درسی)

-۹۴

-۹۴

می‌دانیم در نقاط همتراز از یک مایع ساکن، فشار برابر است، پس دو نقطه C و D دارای فشار یکسانی هستند و $\Delta P'' = 0$ و بنابراین داریم:

$$P_B - P_A = P_C - P_A \Rightarrow \Delta P = \Delta P' > \Delta P''$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۹۵


-۹۵

با توجه به اصل ارشمیدس، مایع نیرویی بالاً سو به چوب وارد می‌کند که با وزن



«عبدالله خقہزاده»

فشار در نقاط همتراز از یک مایع ساکن با یکدیگر برابر است، اگر فشار مخزن (۲) را با P_A نشان دهیم، داریم:



$$\Rightarrow P_1 = P_0 + \rho g x + \rho g h_1$$

$$\Rightarrow 12 \times 10^3 = 10^5 + 10^3 \times 10(x + 1/5)$$


$$\Rightarrow 0/2 \times 10^3 = 10^3(x + 1/5) \Rightarrow x = 0/5 \text{ m} \Rightarrow x = 5 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب درسی)

«اسمعیل مرادی»

با استفاده از حالت اولیه می‌توان فشار را به دست آورد:

$$P_B = P_A \Rightarrow P_0 = \rho g h_1 \quad (1)$$



بعد از چرخاندن لوله داریم:

$$h_2 = l \sin 30^\circ = 100 \times \frac{1}{2} = 50 \text{ cm}$$

$$P_B = P_A \Rightarrow P_0 = \rho g h_2 + P_0$$

$$\Rightarrow P_B = P_0 - \rho g h_2$$

$$\Rightarrow P_B = P_0 - \rho g h_1 - \rho g h_2 \quad (1)$$

$$F_B = P_B \times A = \rho g(h_1 - h_2)A$$

$$\Rightarrow F_B = 13600 \times 10 \times (0/50 - 0/5) \times 10^{-4} = 3/4 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب درسی)

«اسمعیل مرادی»

فشارسنج فشار پیمانه‌ای مخزن گاز را نشان می‌دهد، بنابراین:


$$P_B = P_0 - P_0 = \rho g h_0 \quad (1)$$

از برابری فشار در نقاط همتراز لوله U شکل داریم:

$$P_B = P_0 + P_0 - P_0 = \rho g h_0 - \rho g h_0 \quad (2)$$

-۱۰۱

حال اگر ارتفاع مایع (۲) نصف شود، بعد از ایجاد تعادل داریم:



که در نتیجه شکل گزینه «۳» صحیح است.

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب درسی)

-۱۰۲

«عبدالرضا امینی نسب»

می‌دانیم فشار ناشی از مایعات ساکن به شکل ظرف وابسته نیست و فقط به چگالی و ارتفاع مایع بستگی دارد. بنابراین باید محاسبه کنیم، $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ از مایع تا چه ارتفاعی در ظرف بالا می‌آید.


ابتدا حجم مایع را به دست می‌آوریم:

$$m = 64 \text{ g}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{64}{0.8} = 80 \text{ cm}^3$$

$$V = a \cdot h + A \cdot H \Rightarrow 80 = 5 \times 4 + 20 \times H$$

$$\Rightarrow 80 = 20 + 20H \Rightarrow H = 3 \text{ cm}$$



يعني مایع قسمت باریک ظرف را کاملاً پر کرده و قسمت پهن تر را تا ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر پر می‌کند.

ارتفاع کل مایع در ظرف:

$$P = \rho \cdot g \cdot h' = 800 \times 10 \times 0.03 = 560 \text{ Pa}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب درسی)


-۱۰۳

«عبدالرضا امینی نسب»

با توجه به نمودار، فشار را در شهر اردکان 8 kPa می‌باشد. در این صورت اگر آزمایش توریچلی را در شهر اردکان با آب انجام دهیم، فضای خالی بالای ستون آب تنها محتوی بخار آب است و فشار آن ناجیز است. داریم:

$$P_B = P_0 = 8 \text{ kPa}$$

$$P_A = (\rho g h)$$



از طرفی نقاط A و B همترازند، بنابراین داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow (\rho g h) = 80 \times 10^3$$

$$\Rightarrow 1000 \times 10 \times h = 8 \times 10^3 \Rightarrow h = 8 \text{ m}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب درسی)



$$\begin{aligned} \text{ وزن آب جابه‌جا شده} &= \text{نیروی شناوری} \\ W' = \rho' \cdot V \cdot g &= m'g \Rightarrow ۰/۱۵ = m'g \Rightarrow \text{آب} \\ \downarrow &\downarrow \\ \text{فلز آب} & \\ \Rightarrow ۰/۱۵ = ۱۰ \times ۱۵ \times ۱۰^{-۶} \text{ m}^3 &= V_{\text{فلز}} \end{aligned}$$

در حالت دوم، هنگامی که فلز درون مایع دیگر قرار گیرد، داریم:
 وزن مایع جابه‌جا شده = نیروی شناوری
 $W - F'' = (\rho' \cdot V \cdot g) - (\rho \cdot V \cdot g)$
 $\Rightarrow ۰/۲۷ - F'' = ۸۰ \times ۱۵ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰$
 عددی که نیروستخ در حالت دوم نشان می‌دهد.
 $\Rightarrow ۰/۲۷ - F'' = ۰/۱۲ \Rightarrow F'' = ۰/۱۵ \text{ N}$
 (صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

«مینم (شتیان)»

از برابری فشار در دو نقطه M و N که هم‌تراز و در یک مایع ساکن هستند، استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} P_M = P_{\text{غاز}} + P_A \\ P_N = P_0 + P_{\text{جیوه}} + P_B \end{cases}$$
 $P_M = P_N \Rightarrow P_{\text{غاز}} + P_A = P_0 + P_{\text{جیوه}} + P_B$
 $\Rightarrow P_{\text{غاز}} - P_0 = P_B - P_A + P_{\text{جیوه}}$
 $\Rightarrow ۲۳ \text{ cmHg}$

با توجه به این که ارتفاع جیوه بالای نقطه N معادل با ۱۵ cm است پس $P_{\text{جیوه}}$ برابر با ۱۵ cmHg خواهد بود. اکنون فشار مایع A را بر حسب cmHg بدست می‌آوریم.

 $P_A = \rho_{\text{جیوه}} gh_A = \rho_{\text{جیوه}} \cdot ۱/۶ \times ۸ = ۱۳ \text{ cmHg}$
 $\Rightarrow P_A = ۱۳ \text{ cmHg}$
 $\Rightarrow ۲۳ = ۱۵ + P_B - ۱۳ \Rightarrow P_B = ۱۲ \text{ cmHg}$

اکنون ارتفاع h' را بدست می‌آوریم:

 $P_B = \rho_{\text{جیوه}} gh_B \Rightarrow ۱۲ = \rho_{\text{جیوه}} \cdot ۱/۶ \times h' \Rightarrow h' = ۴8 \text{ cm}$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب درسی)

«کمیل فرمی»

در این سوال فشار هوا بر حسب سانتی‌متر جیوه بیان شده و از دو مایع آب و جیوه استفاده شده است. برای حل راحت‌تر بهتر است فشار آب را نیز بر حسب سانتی‌متر جیوه تبدیل کنیم و سپس معادلات مربوط را بنویسیم. طبق رابطه $\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2$

$$\begin{aligned} \text{مایع} g h = \rho_{\text{جیوه}} g h &\Rightarrow h = \frac{\rho_{\text{جیوه}}}{\rho} \\ \Rightarrow ۱۲ / ۶ \times ۲ = ۰/۸ \times h &\Rightarrow h = ۳/۴ \text{ cm} \\ \text{(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب درسی)} & \end{aligned}$$

-۱۰۴

طبق اصل ارشمیدس، اندازه نیروی شناوری برابر است با وزن شاره‌ای که جابه‌جا شده است. چون کره‌ها یکسان هستند، نیروی شناوری برای D و C برابر است، زیرا به طور کامل در شاره غرق شده‌اند. نیروی شناوری برای کره A و کره B به میزانی از حجم آن‌ها که داخل شاره است، بستگی دارد و چون حجم فورفتہ در شاره برابر کره A بیش‌تر است، پس اندازه نیروی شناوری آن از B بیش‌تر و از جسم C و D کم‌تر است.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۰۵

طبق اصل ارشمیدس، چگالی‌سنجد در مایع‌های چگال‌تر نسبت به مایع‌هایی با چگالی کم‌تر به میزان کم‌تری فرو خواهد رفت. بنابراین چون چگالی‌سنجد در مایع B بیش‌تر فرو رفته است، چگالی مایع B کم‌تر از چگالی مایع A خواهد بود و طبق رابطه $\rho = \frac{m}{V}$ و با توجه به یکسان بودن جرم دو مایع، می‌توان نتیجه گرفت حجم کل مایع B نسبت به حجم کل مایع A بیش‌تر است.

از طرف دیگر چون چگالی‌سنجد روی سطح دو مایع شناور می‌گردد، پس اندازه نیروی شناوری وارد به آن در هر دو حالت برابر با وزن چگالی‌سنجد است. پس نیروی شناوری مایع B برابر با نیروی شناوری مایع A است.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۰۶

طبق اصل ارشمیدس وقتی جسمی در شاره‌ای فرو رود، شاره نیروی بالا سو به آن وارد می‌کند که با وزن شاره جابه‌جا شده توسط جسم برابر است:

 $F_b = m_{\text{ج}} g = (\rho V)_{\text{ج}} g = ۱۰۰ \times ۲۵ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰ = ۰/۲۵ \text{ N}$

این نیرو توسط شاره به جسم وارد می‌شود، طبق قانون سوم نیوتون جسم هم F_b به شاره همین نیرو را رو به پایین وارد می‌کند. پس عدد ترازو به اندازه افزایش می‌یابد.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۰۷

هنگامی که جسمی درون مایع قرار گیرد، نیروی شناوری رو به بالا به جسم وارد می‌شود و سبک‌تر شدن جسم می‌شود. پس اختلاف وزن واقعی جسم و وزن آن هنگامی که درون مایع قرار دارد، برابر با اندازه نیروی شناوری است. از طرفی نیروی شناوری با وزن مایع جابه‌جا شده برابر است.

وزن واقعی جسم برابر است با:

 $W = mg = ۲۷ \times ۱۰^{-۳} \times ۱۰ = ۰/۲۷ \text{ N}$
 $W - F' = ۰/۱۲ = ۰/۱۵ \text{ N}$

اکنون با توجه به این که نیروی شناوری برابر وزن مایع جابه‌جا شده است، داریم:



هنگام اضافه کردن روغن، حجم آب پایین رفته در شاخه سمت چپ با حجم آب بالا آمده در شاخه سمت راست برابر است اما از آن جا که سطح مقطع A سه برابر سطح مقطع B است پس ارتفاع آب بالا آمده در شاخه B باید سه برابر ارتفاع آب پایین رفته در شاخه A باشد. (روی شکل آن هارا x و $3x$ نامیده ایم). برای حل مسئله به چگالی مایع نامعلوم نیاز داریم. از برابری فشار در نقاط A و B استفاده می کنیم تا چگالی آن به دست آید.

$$P_A = P_0 + (\rho g h)$$

$$P_B = P_0 + (\rho_3 g h_3)$$

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_3 \times h_3 = \rho_0 \times h_0$$

$$\Rightarrow 0 / 8 \times 20 = \rho_3 \times 40 \Rightarrow \rho_3 = 0 / 4 \frac{g}{cm^3}$$

اکنون از برابری فشار در دو نقطه M و N استفاده می کنیم.

$$P_M = P_0 + (\rho g h')$$

$$P_N = P_0 + (\rho g h') + (\rho_3 g h_3)$$

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_0 \times h' + \rho_3 \times h'_3 = \rho_0 \times h_0 + \rho_3 \times h_3$$

$$\Rightarrow 0 / 8 \times (60 + x) = 1 \times 40 + 0 / 4 (60 - 3x)$$

$$\Rightarrow x = 12 \text{ cm}$$

بنابراین ارتفاع کنونی مایع ρ_3 برابر با $60 - 3x = 60 - 36 = 24 \text{ cm}$ است در حالی که در ابتداء ارتفاع آن 40 cm بوده است.

بنابراین $40 - 24 = 16 \text{ cm}$ از این مایع به بیرون ریخته شده است. داریم:

$$V = Ah = 100 \times 10^{-4} \times 16 \times 10^{-3} = 16 \times 10^{-7} \text{ m}^3 = 1600 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V = 0 / 4 \times 1600 = 640 \text{ g}$$


(صفحه های ۷۰ تا ۷۴ کتاب (رسی))

فیزیک (۱) - موازی


«هوشمنگ غلام عابدی»

-۱۱۱

اختلاف فشار دو نقطه در یک مایع ساکن برابر $\Delta P = \rho g \Delta h$ است که با اضافه شدن آب هیچ کدام از ۳ پارامتر ρ , g , Δh تغییری نکرده است، پس اختلاف فشار دو نقطه همان ΔP خواهد بود.



(صفحه های ۷۰ تا ۷۴ کتاب (رسی))



$$13600 \times g \times 1 \text{ cm} = 1000 \times g \times h_7 \Rightarrow h_7 = 13 / 6 \text{ cm}$$

يعنى فشار حاصل از ستون $13 / 6 \text{ cm}$ آب معادل 1 cm ستون جيوه است و

اگر آن را در دو و سه ضرب کنیم می توان گفت $27 / 2 \text{ cm}$ آب معادل 2 cm ستون $40 / 8 \text{ cm}$ آب معادل 2 cmHg است. با توجه به این توضیحات

به راحتی برای نقاط C و D داریم:

$$P_C = P_D \Rightarrow P_A + 7 \text{ cmHg} = 2 \text{ cmHg} + 7 \text{ cmHg}$$

$$\Rightarrow P_A = 7 \text{ cmHg}$$

پس فشار گاز مخزن A بر حسب سانتی متر جيوه به دست آمد. از طرفی مخزن

A به لوله U شکل سمت چپ نیز متصل است و فشار در نقاط E و F نیز

برابر است، در نتیجه:

$$P_F = P_E \Rightarrow P_A = 7 \text{ cmHg} + P_B$$

$$\Rightarrow 7 \text{ cmHg} = 3 \text{ cmHg} + P_B \Rightarrow P_B = 4 \text{ cmHg}$$

بنابراین فشار مخزن B برابر 4 cmHg می باشد. اما در این سوال فشار

پیمانهای مخزن B را خواسته که عبارت است از:

$$P_B - P_0 = 4 \text{ cmHg} - 7 \text{ cmHg} = -3 \text{ cmHg}$$

برای تبدیل آن به پاسکال:

$$P_B - P_0 = -3 \text{ cmHg} = -13600 \times 10 \times 0 / 0.8$$

$$= -10880 \text{ Pa} \cong -11 \text{ kPa}$$


(صفحه های ۷۸ تا ۷۹ کتاب (رسی))

«مینثم (شتیان)»

-۱۱۰

باید محاسبه کنیم که ارتفاع مایع نامعلوم چند سانتی متر افزایش می یابد. توجه

داشته باشید که مایع نامعلوم تا انتهای لوله فقط 20 cm فاصله دارد.





«عفتر مفتح»

ابتدا فشار کل در محل زیردریایی را می‌یابیم و سپس به کمک رابطه $F = PA$ ، اندازه نیروی وارد بر دریچه زیردریایی را حساب می‌کیم:

$$P = P_0 + \rho gh \quad \rightarrow \quad P = P_0 + \rho_1 g h_1$$


$$P = 10^5 + 10^3 \times 10 \times 90 = 10^6 \text{ Pa}$$

$$A = \pi r^2 = \pi \times (0.5)^2 = 0.8 \text{ m}^2$$

$$F = PA = 10^6 \times 0.8 \Rightarrow F = 10^6 \times 0.8 \text{ N} = 10^6 \text{ kN}$$


(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۱۱۷



«پوار احمدی شعار»

فشار در نقاط همتراز از یک مایع ساکن برابر است. در حالت اول با توجه به شکل زیر داریم:




$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_2 g h_2 + P_0 = \rho_1 g h_1 + P_0$$

$$\Rightarrow \rho_2 h_2 = \rho_1 h_1$$

$$\Rightarrow 1/36 \times h_2 = 1/6 \times h_1 \Rightarrow h_2 = 6 \text{ cm}$$

حال اگر ارتفاع مایع (۲) نصف شود، بعد از ایجاد تعادل داریم:



$$P_D = P_C \Rightarrow P_0 + \rho_2 g h_2' = P_0 + \rho_1 g h_1'$$

$$\Rightarrow \rho_2 h_2' = \rho_1 h_1'$$

$$\Rightarrow 1/36 \times h_2' = 1/6 \times h_1' \Rightarrow h_1' = 6 \text{ cm}$$

که در نتیجه شکل گزینه «۳» صحیح است.

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«عبدالله فقهزاده»

ترابو وزن مایع و ظرف را نشان می‌دهد که در هر دو حالت برابرند.

طبق رابطه $P = \rho gh$ فشار ناشی از مایع در کف ظرف به جنس مایع

یکسان است و ارتفاع مایع بستگی دارد که باید بررسی شود. در ظرف (۱)

دهانه آن در بالای ظرف نسبت به کف ظرف بیشتر می‌شود. چون حجم مایع

«همید زرین‌کفش»

-۱۱۲

با توجه به برابری فشار ستون آب و ستون جیوه داریم:

$$\text{آب} \times \text{آب} \times \rho_1 g h = \text{جیوه} \times \text{جیوه} \times \rho_2 g h \Rightarrow \rho_1 = \rho_2$$

$$\Rightarrow \text{آب} \times \text{آب} \times \rho_1 = \text{جیوه} \times \text{جیوه} \times \rho_2$$

$$\Rightarrow 12 / 6 \times 5 = 1 \times \text{آب} \Rightarrow \text{آب} = 6 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«همید زرین‌کفش»

-۱۱۳

با توجه به رابطه $\Delta P = \rho g \Delta h$ داریم:

$$\Delta P = 1 \times 10 \times 60 = 600 \text{ Pa}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«سیدعلی میرنوری»

-۱۱۴

می‌دانیم در نقاط همتراز از یک مایع ساکن، فشار برابر است، پس دو نقطه

B و C دارای فشار یکسانی هستند و $\Delta P'' = 0$ و بنابراین داریم:

$$P_B - P_A = P_C - P_A \Rightarrow \Delta P = \Delta P' > \Delta P''$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«عبدالله فقهزاده»

-۱۱۵

فشار کل در عمق h از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$P = P_0 + \rho gh$$

$$\Rightarrow \frac{h=0}{P=P_0} \Rightarrow P_0 = 1/0.1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow \frac{h=20 \text{ m}}{P=21/21 \times 10^5 \text{ Pa}} \Rightarrow 21/21 \times 10^5 = 1/0.1 \times 10^5 + \rho \times 10 \times 200$$

$$\Rightarrow \rho = 10^3 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

حال فشار حاصل از مایع در عمق ۵۰ متری برابر است با:

$$P = \rho gh = 10^3 \times 10 \times 50 = 51500 \text{ Pa} = 515 \text{ kPa}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«حسین ناصمی»

-۱۱۶

در عمق ۳ متری فشار ناشی از مایع $84 - 75 = 9 \text{ cmHg}$ است، یعنی بهازای

هر متر افزایش عمق مایع، فشار به اندازه $\frac{9}{3} = 3 \text{ cmHg}$ افزایش یافته است.

بنابراین به ازای $7/5$ متر افزایش عمق مایع، فشار به اندازه $7/5 \times 3 = 22/5 \text{ cmHg}$ نسبت به سطح مایع افزایش می‌یابد در نتیجه فشار

کل در عمق $7/5$ متری برابر است با:

$$P = 75 + 22/5 = 97/5 \text{ cmHg}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۱۱۹

«عبدالله فقهزاده»

ترابو وزن مایع و ظرف را نشان می‌دهد که در هر دو حالت برابرند.

طبق رابطه $P = \rho gh$ فشار ناشی از مایع در کف ظرف به جنس مایع

یکسان است و ارتفاع مایع بستگی دارد که باید بررسی شود. در ظرف (۱)

دهانه آن در بالای ظرف نسبت به کف ظرف بیشتر می‌شود. چون حجم مایع



«مینه دشتیان»

-۱۲۲

از آن جا که مجموع ارتفاع دو مایع در طرف برابر 40 cm است می‌توان نوشت:

$$h_A + h_B = 40\text{ cm} \quad (1)$$

از طرفی فشار کل در کف ظرف را این گونه می‌توان نوشت:

$$P_{\text{کل}} = P_0 + P_A + P_B \Rightarrow 81/5 = 75 + P_A + P_B$$

$$\Rightarrow P_A + P_B = 6/\Delta\text{cmHg}$$

برای تبدیل فشار حاصل از مایع A بر حسب cmHg می‌توان نوشت:

$$\rho_A gh_A = \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}}(A)$$

$$\Rightarrow 1.068 \times h_A = 13/6 \times h_{\text{Hg}}(A)$$

$$\Rightarrow h_{\text{Hg}}(A) = \frac{1}{13} h_A$$

$$\Rightarrow P_A = 1.068 h_A (\text{cmHg})$$

به طور مشابه برای تبدیل فشار حاصل از مایع B بر حسب cmHg می‌توان

نوشت:

$$\rho_B gh_B = \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}}(B) \Rightarrow 2/77 \times h_B = 13/6 \times h_{\text{Hg}}(B)$$

$$\Rightarrow h_{\text{Hg}}(B) = 1.068 h_B \Rightarrow P_B = 1.068 h_B (\text{cmHg})$$

$$P_A + P_B = 6/\Delta\text{cmHg} \Rightarrow 1.068 h_A + 1.068 h_B = 6/\Delta\text{cm} \quad (2)$$

با حل همزنمان معادله‌های (1) و (2) داریم:

$$\begin{cases} h_A + h_B = 40\text{ cm} \\ 1.068 h_A + 1.068 h_B = 6/\Delta\text{cm} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2h_A - 2h_B = -80 \\ 1.068 h_A + 1.068 h_B = 6/\Delta\text{cm} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(+) \quad -\frac{3}{2}h_A = -16}$$

$$\Rightarrow h_A = 10\text{ cm}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

عبدالرضا امینی نسب

-۱۲۳

با توجه به نمودار، فشار هوا در شهر اردکان 80kPa می‌باشد. در این صورت

اگر آزمایش توریچلی را در شهر اردکان با آب انجام دهیم، فضای خالی بالای

ستون آب تنها محتوی بخار آب است و فشار آن ناچیز است. داریم:

$$P_B = P_a = 80\text{kPa}$$


$$P_A = (\rho gh)_a$$

از طرفی نقاط A و B همترازنده، بنابراین داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow (\rho gh)_a = 80 \times 10^3$$

$$\Rightarrow 1000 \times 10 \times h = 8 \times 10^4 \Rightarrow h = 8\text{ m}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)




ریخته شده در دو ظرف و مساحت کف هر دو ظرف برابر است پس ارتفاع مایع

در ظرف (۲) بیشتر است، لذا $P_2 > P_1$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۱۲۰

با توجه به برابری فشار در نقاط همتراز A و B در مایع (۱) داریم:

$$P_A = P_B$$

$$\Rightarrow \rho_Y g h_Y + P_0 = \rho_Y g h_Y + \rho_1 g h_1 + P_0$$

$$\Rightarrow \rho_Y h_Y = \rho_1 h_3 + \rho_1 h_1$$

$$\Rightarrow 1/2 \times 15 = 1.0 \rho_3 + 2 \times 5$$

$$\Rightarrow 1.0 \rho_3 = 8 \Rightarrow \rho_3 = 1.0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

-۱۲۱

عبدالرضا امینی نسب

می‌دانیم فشار ناشی از مایعات ساکن به شکل ظرف وابسته نیست و فقط به چگالی و ارتفاع مایع بستگی دارد. بنابراین باید محاسبه کنیم، $g = 640\text{ cm/s}^2$ از مایع تا چه ارتفاعی در ظرف بالا می‌آید.


ابتدا حجم مایع را به دست می‌آوریم:

$$m = 640\text{ g}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{640}{1.0 / 8} = 80 \cdot \text{cm}^3$$

$$V = a \cdot h + A \cdot H \Rightarrow 80 = 8 \times 4 + 2 \times H$$

$$\Rightarrow 80 = 32 + 2 \times H \Rightarrow H = 24\text{ cm}$$

يعني مایع قسمت باریک ظرف را کاملاً پُر کرده و قسمت پهن تر را ارتفاع 30 cm سانتی‌متر پر می‌کند.ارتفاع کل مایع در ظرف: $h' = h + H = 24\text{ cm}$

$$P = \rho \cdot g \cdot h' = 1000 \times 10 \times 24 / 8 = 5600\text{ Pa}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)



«اسمعیل هدایی»

-۱۲۶

فشارستج فشار پیمانهای مخزن گاز را نشان می‌دهد، بنابراین:

$$P_{\text{غاز}} - P_0 = \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} \quad (1)$$

از برابری فشار در نقاط همتراز لوله U شکل داریم:

$$P_{\text{غاز}} = P_0 + P_{\text{مایع}} \Rightarrow P_{\text{غاز}} - P_0 = P_{\text{مایع}} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(2), (1)} P_{\text{غاز}} - P_0 = \rho_{\text{مایع}} gh_{\text{مایع}} \quad (3)$$

$$\Rightarrow 13 / 6 \times 2 = 0 / 8 \times h \Rightarrow h = 24 \text{ mm} = 3 / 4 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب (رسی))


«مینهم (شتیان)»

-۱۲۷

از برابری فشار در دو نقطه M و N که همتراز و در یک مایع ساکن هستند،

استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} P_M = P_{\text{غاز}} + P_A \\ P_N = P_0 + \rho_{\text{جیوه}} gh_1 + P_B \end{cases}$$



$$P_M = P_N \Rightarrow P_{\text{غاز}} + P_A = P_0 + \rho_{\text{جیوه}} gh_1 + P_B$$

$$\Rightarrow P_{\text{غاز}} - P_0 = \rho_{\text{جیوه}} gh_1 + P_B - P_A \quad (4)$$

با توجه به این‌که ارتفاع جیوه بالای نقطه N معادل با

است پس $\rho_{\text{جیوه}} P_{\text{غاز}}$ برابر با 15 cmHg خواهد بود. اکنون فشار مایع A را برحسب cmHg بدست می‌آوریم.

$$\rho_A gh_A = \rho_{\text{جیوه}} gh_1 \Rightarrow \frac{13}{6} \times 8 = 13 / 6 \times h_1 \quad (5)$$


$$\Rightarrow h_1 = 4 \text{ cm} \Rightarrow P_A = 4 \text{ cmHg}$$

$$\Rightarrow 23 = 15 + P_B - 4 \Rightarrow P_B = 12 \text{ cmHg}$$

«عبدالله حقه‌زاره»

-۱۲۴

فشار در نقاط همتراز از یک مایع ساکن با یکدیگر برابر است، اگر فشار مخزن

(۲) را با P_A نشان دهیم، داریم:

$$\begin{cases} P_A = P_0 + \rho g x \\ P_1 = P_A + \rho g h_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_1 = P_0 + \rho g x + \rho g h_1$$

$$\Rightarrow 13 \times 10^4 = 10^4 + 10^3 \times 10 \times (x + 15)$$

$$\Rightarrow 0 / 2 \times 10^4 = 10^4 \times (x + 15) \Rightarrow x = 0 / 2 \times 10^4 \Rightarrow x = 5 \text{ cm}$$


(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب (رسی))

«اسمعیل هدایی»

-۱۲۵

با استفاده از حالت اولیه می‌توان فشار هوا را بدست آورد:

$$P_B = P_A \Rightarrow P_0 = \rho g h_1 \quad (1)$$



بعد از چرخاندن لوله داریم:

$$h_1 = l \sin 30^\circ = 100 \times \frac{1}{2} = 50 \text{ cm}$$

$$P_B = P_A \Rightarrow P_0 = \rho g h_1 + P_B$$


$$\Rightarrow P_B = P_0 - \rho g h_1$$

$$\xrightarrow{(1)} P_B = P_0 - \rho g h_1$$

$$F_{\text{تملیه}} = P_B \times A = \rho g (h_1 - h_2) A$$

$$\Rightarrow F_{\text{تملیه}} = 13600 \times 10 \times (0 / 25 - 0 / 5) \times 10^{-4} = 3 / 4 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب (رسی))





$$\Rightarrow P_C + \rho_1 gx + \rho_1 gy = P_D + \rho_2 gx + \rho_2 gy$$

$$\Rightarrow P_D - P_C = gx(\rho_1 - \rho_2) + gy(\rho_1 - \rho_2)$$

$$\Rightarrow P_D - P_C = (P_B - P_A) + gy(\rho_1 - \rho_2)$$

در سمت راست عبارت بالا مقدار $(P_B - P_A)$ را از قبل می‌دانیم که مثبت است.

با توجه به این که $\rho_1 > \rho_2$ می‌باشد، عبارت دوم یعنی $gy(\rho_1 - \rho_2)$ نیز مثبت

است. پس $P_D - P_C$ ترکیبی از جمع دو عبارت مثبت بوده و مسلماً هم مثبت

است و هم از $(P_B - P_A)$ بزرگتر است. بنابراین $(P_C - P_D)$ باید مقداری

منفی و از نظر مقداری بزرگتر از ۱۰۰ باشد.

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴ کتاب درسی)

«کمیل فرمی»


-۱۲۹

در این سوال فشار هوا بر حسب سانتی‌متر جیوه بیان شده و از دو مایع آب و

جیوه استفاده شده است. برای حل راحت‌تر بهتر است فشار آب را نیز بر حسب

سانتی‌متر جیوه تبدیل کنیم و سپس معادلات مربوط را بنویسیم. طبق رابطه

$$\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2$$
 می‌توان نوشت:



$$13600 \times g \times 1\text{cm} = 1000 \times g \times h_2 \Rightarrow h_2 = 13/6\text{cm}$$

یعنی فشار حاصل از ستون هر $13/6\text{cm}$ آب معادل 1cmHg ستون جیوه

است و اگر آن را در دو و سه ضرب کنیم می‌توان گفت $27/2\text{cm}$ آب معادل

اکنون ارتفاع h' را بدست می‌آوریم:

$$\rho_B gh_B = \rho_2 gh$$
 جیوه

$$\Rightarrow 3/4 \times h' = 13/6 \times 12 \Rightarrow h' = 48\text{cm}$$


(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۸ کتاب درسی)

«کمیل فرمی»

-۱۲۸

چون مایع با چگالی ρ_1 در زیر قرار گرفته لذا $\rho_1 > \rho_2$ می‌باشد و مطابق شکل

اگر رابطه فشار را برای سطح هم‌فشار O بنویسیم خواهیم داشت:



$$\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2 \xrightarrow{\rho_1 > \rho_2} h_2 > h_1$$

این رابطه را به شکل دیگری هم می‌توان نوشت:

$$P_A + \rho_1 gx = P_B + \rho_2 gx \Rightarrow P_B - P_A = gx(\rho_1 - \rho_2)$$

با توجه به این رابطه و با توجه به این که $\rho_1 > \rho_2$ می‌توان نتیجه گرفت سمت

راست تساوی بالا مقداری مثبت دارد و مسلماً سمت چپ تساوی هم مقداری

مثبت است. یا به عبارتی $P_B > P_A$ است. پس از قسمت اول نتیجه می‌گیریم:

$$P_B - P_A = +100\text{Pa}$$

از طرفی مجدداً فشار در سطح هم‌فشار O را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P_C + \rho_1 g(x+y) = P_D + \rho_2 g(x+y)$$



نیازی نمودن

شناخت

آب بالا آمده در شاخه سمت راست برابر است اما از آن جا که سطح مقطع A

سه برابر سطح مقطع B است پس ارتفاع آب بالا آمده در شاخه B باید سه

برابر ارتفاع آب پایین رفته در شاخه A باشد. (روی شکل آنها را x و

نامیده ایم).

برای حل مسئله به چگالی مایع نامعلوم نیاز داریم. از برابری فشار در نقاط

A و B استفاده می کنیم تا چگالی آن بدست آید.

$$P_A = P_0 + (\rho gh)$$

$$P_B = P_0 + (\rho g h')$$

$$\frac{P_A = P_B}{\rho_0 \times 10 = \rho_1 \times 40} \Rightarrow \rho_1 = \frac{\rho_0 \times 10}{4}$$

$$\Rightarrow 10 / 4 \times 20 = \rho_1 \times 40 \Rightarrow \rho_1 = 10 / 4 \text{ g/cm}^3$$

اکنون از برابری فشار در دو نقطه M و N استفاده می کنیم.

$$P_M = P_0 + (\rho gh')$$

$$P_N = P_0 + (\rho gh') + (\rho g h'')$$

$$\frac{P_M = P_N}{\rho_0 \times 10 + \rho_1 \times h'' = \rho_0 \times 10 + \rho_1 \times h'}$$

$$\Rightarrow 10 / 4 (10 + x) = 10 / 4 (10 + 40 - 4x)$$

$$\Rightarrow x = 12 \text{ cm}$$

بنابراین ارتفاع کوئی مایع $\rho_1 = 10 / 4 \text{ g/cm}^3$ برابر با 24 cm است در

حالی که در ابتداء ارتفاع آن 40 cm بوده است.

بنابراین $40 - 24 = 16 \text{ cm}$ از این مایع به بیرون ریخته شده است. داریم:

$$V = Ah = 10 \times 10^{-4} \times 16 \times 10^{-2} = 16 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 16000 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V = 10 / 4 \times 16000 = 640 \text{ g}$$

(صفحه های ۷۰-۷۱ کتاب درسی)

آب بالا آمده در شاخه سمت راست برابر است اما از آن جا که سطح مقطع

به راحتی برای نقاط C و D داریم:

$$P_C = P_D \Rightarrow P_A + 7 \text{ cmHg} = 7 \text{ cmHg} + 7 \Delta \text{cmHg}$$

$$\Rightarrow P_A = 7 \text{ cmHg}$$

پس فشار گاز مخزن A بر حسب سانتی متر جیوه به دست آمد. از طرفی مخزن

به لوله U شکل سمت چپ نیز متصل است و فشار در نقاط E و F نیز

برابر است، در نتیجه:

$$P_F = P_E \Rightarrow P_A = 7 \text{ cmHg} + P_B$$

$$\Rightarrow 7 \text{ cmHg} = 7 \text{ cmHg} + P_B \Rightarrow P_B = 7 \text{ cmHg}$$

بنابراین فشار مخزن B برابر 7 cmHg می باشد. اما در این سوال فشار

پیمانه ای مخزن B را خواسته که عبارت است از:

$$P_B - P_0 = 7 \text{ cmHg} - 7 \text{ cmHg} = -7 \text{ cmHg}$$

برای تبدیل آن به پاسکال:

$$\begin{aligned} P_B - P_0 &= -7 \text{ cmHg} = -\rho gh = -13600 \times 10 \times 0.07 \\ &= -10880 \text{ Pa} \approx -11 \text{ kPa} \end{aligned}$$


(صفحه های ۷۰-۷۱ کتاب درسی)

-۱۳۰-

«مینم (شیان)

باید محاسبه کنیم که ارتفاع مایع نامعلوم چند سانتی متر افزایش می یابد. توجه

داشته باشید که مایع نامعلوم تا انتهای لوله فقط 20 cm فاصله دارد.



هنگام اضافه کردن روغن، حجم آب پایین رفته در شاخه سمت چپ با حجم



«مهرداد مهین»

-۱۳۵

در کلیه‌ها علاوه بر کپسول کلیه (بافت پیوندی رشته‌ای)، یاخته‌های اینمی مانند ماکروفازها وجود دارند که در حفاظت از کلیه نقش دارند. همه یاخته‌های ذکر شده توانایی ترشح کلازن ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید مطابق شکل ۲ فصل ۵ کتاب درسی، کپسول کلیه در حفاظت از غده فوق کلیه نقشی ندارد.

گزینه «۳»: دندنه‌های انتهایی و بافت چربی اطراف کلیه، کلیه را دربرابر ضربه (فسار مکانیکی) محافظت می‌کند. توجه کنید که بین بافت چربی اطراف کلیه و بافت کلیه، کپسول کلیه قرار دارد.

گزینه «۴»: چربی اطراف کلیه در حفظ موقعیت آن نقش دارد. بافت چربی دارای مویرگ‌های پیوسته است.

(صفحه‌های ۶۶، ۷۰، ۷۱، ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع موارد زاید)

«محمدمهدی روزبهانی»

-۱۳۶

در دیواره لوله گوارش (از مری تا مخرج) شبکه‌های یاخته‌های عصبی وجود دارند. این شبکه‌ها تحرک و ترشح را در لوله گوارش، تنظیم می‌کنند. کبد جزء لوله گوارش نیست.

(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳، ۵۳، ۶۴ و ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع موارد زاید)

«مهرداد مهین»

-۱۳۷

سرخرگ‌ها، مویرگ‌ها و سیاهرگ‌ها همگی توانایی هدایت خون را به سمت بافت‌های مختلف بدن دارند. همگی این رگ‌ها در دیواره خود دارای بافت پوششی سنگ فرشی تک لایه هستند.

(صفحه‌های ۶۴ تا ۶۶ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

«مهرداد مهین»

-۱۳۸

در همه مهره‌داران خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می‌شود. همگی به دلیل وجود لوله گوارش، دارای سلام یا حفره عمومی (بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیواره داخلی بدن) هستند. ضمناً ساز و کارهایی دارند که باعث می‌شود جریان پیوسته‌ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود ضمناً به دلیل وجود لوله گوارش، امکان جریان یکطرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش پایته و مواد دفعی فراهم است. در گردش خون ساده در ماهی و نوزاد دوزیستان، خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره‌ای جانور عبور می‌کند.

(صفحه‌های ۳۷، ۵۶، ۶۴ و ۷۷ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

«مازیار اعتمادزاده»

-۱۳۹

همه موارد صحیح هستند. رگ‌ها (سرخرگ و سیاهرگ کلیه)، اعصاب و میزنانی از ناف کلیه عبور می‌کنند. میزانی در خروج ادرار از کلیه نقش دارد. همه رگ‌های خونی دارای رشته‌های الاستیک در لایه میانی خود هستند.

(صفحه‌های ۱۹، ۶۴، ۸۱ و ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع موارد زاید)

«مهرداد مهین»

-۱۴۰

همان‌طور که در شکل ۲۰ فصل ۴ کتاب درسی می‌بینید، اندازه لنفوسيت‌ها کوچک‌تر از بازووفیل‌ها، انوزینوفیل‌ها و نتوروفیل‌ها است.

(صفحه‌های ۷۲ و ۷۴ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

زیست‌شناسی (۱) - عادی

-۱۳۱

تیموس در نزدیکی قلب قرار گرفته و لنف خارج شده از این غده همانند لنف سایر نقاط بدن ابتدا به سیاهرگ‌های زیرتقوه‌ای تخلیه می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در دوران جنبینی طحال، گویجه‌های قرمز که یاخته‌های خونی بدون هسته هستند را تولید می‌کند.

گزینه «۲»: آپاندیس متصل به روده کور است. تولید و تجمع لنفوسيت‌ها در گردها و اندام‌های لنفی، به از بین بدن عوامل بیماری‌زا کمک می‌کند.

گزینه «۳»: خون سیاهرگی طحال (اندام لنفی در مجاورت مجرای لنفي چچ) و روده به سیاهرگ باب تخلیه می‌شود.

(صفحه‌های ۳۲، ۳۳، ۶۹ و ۷۲ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

«مهرداد مهین»

-۱۳۲

گیرنده‌های فشاری در دیواره سرخرگ‌های گردش عمومی قرار دارند.

(صفحه‌های ۵۱، ۵۶، ۶۹ و ۷۳ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

«مهرداد مهین»

-۱۳۳

فقط مورد «الف» صحیح است.

در گردش خون عمومی انسان، مویرگ‌ها کوچک‌ترین رگ‌های بدن هستند.

بررسی موارد:

الف) سطح بیرونی مویرگ‌ها را غشای پایه (شبکه‌ای از رشته‌های بروتینی و گلیکوپروتینی)، احاطه می‌کند و نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول‌های بسیار درشت به وجود می‌آورد.

ب) همانطور که در شکل ۱۴ فصل ۴ مشاهده می‌کنید، فشار اسمزی خون در طول شبکه مویرگی ثابت است.

ج) ممکن است قبل از مویرگ سرخرگ نباشد. سیاهرگ باب خون تیره را به کبد وارد می‌کند؛ لذا گروهی از مویرگ‌های کبد، خون را از سیاهرگ دریافت می‌کنند.

د) در ابتدای بعضی از مویرگ‌ها بنداره مویرگی وجود دارد.

(صفحه‌های ۷۱، ۶۴ تا ۶۸ کتاب درسی) (گردش موارد در بدن)

«مازیار اعتمادزاده»

-۱۳۴

همانطور که در شکل ۴ فصل ۵ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، در محل ستون‌های کلیه، بخش قشری می‌تواند در مجاورت لگنجه قرار گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گروهی از گویجه‌های قرمز سرخرگ وابران از درون شبکه مویرگی اطراف لوله‌ی پیچ‌خوردید نزدیک (شبکه مویرگی دور لوله‌ای) عبور نمی‌کنند. (شکل ۶ فصل ۵)

گزینه «۲»: در کلافک، خون از طریق سرخرگ آوران، وارد و توسط سرخرگ وابران، خارج می‌شود.

گزینه «۳»: بسیاری از بیماری‌ها، در نتیجه برهم خوردن هم‌ایستایی پدید می‌آیند.

(صفحه‌های ۸۰ تا ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع موارد زاید)



گردها قطعات یاختهای بی رنگ و بدون هسته‌ای‌اند که درون خود دانه‌های زیادی دارند. (نادرستی گزینه ۳)
(صفهه‌های ۷۲، ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۴۶ «توفید بایان»

سرخرگ به آیشش ماهی وارد و سرخرگ نیز از آن خارج می‌شود.
بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۲»: سرخرگ شکمی خون تیره دارد، ولی سرخرگ پشتی خون روشون دارد، اما سیاه‌گ همیشه خون تیره دارد.
گزینه «۳»: خون وروودی و خروجی به قلب همیشه تیره است.
گزینه «۴»: بطون قلب ماهی پایین‌تر از دهلیز آن است.
(صفهه‌های ۷۸ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۴۷ «مفهوم نصرت ناهوک»

همانطور که در شکل ۴ فصل ۴ می‌بینید، در ناف کلیه، سرخرگ کلیه بالاتر از میزنای قرار گرفته است.
بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۲»: سرخرگ وابران همانند سرخرگ آوران به سیاه‌گ ختم نمی‌شود.
گزینه «۳»: با افزایش میزان عرق، از مقدار ادرار تولید شده در کلیه کاسته خواهد شد.
گزینه «۴»: انشعابات سیاه‌گی پس از عبور از ستون‌های کلیه، سیاه‌گ کلیه را می‌سازند. این سیاه‌گ (نه انشعابات سیاه‌گی) خون را از کلیه بیرون می‌برد.
(صفهه‌های ۸۱ تا ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید)

-۱۴۸ «مفهوم نصرت ناهوک»

فقط مورد «ج» صحیح است.
ساختارهای قیفی شکل کلیه‌های انسان، لگنچه و کپسول بومن (در ابتدای گردیزه) هستند. کپسول بومن در ابتدای هر گردیزه قرار دارد و فریند تشکیل ادراز در آن آغاز می‌شود. هر کدام از گردیزه‌ها در درون لپ کلیه قرار می‌گیرند. ادامه گردیزه پس از کپسول بومن، لوله‌ای شکل دارد. در درون کپسول بومن شبکه مویرگی اول با گلومرول قرار دارد. لگنچه در رأس هرم‌های کلیه قرار گرفته است و ساختاری قیفی شبکه گردیزه است. در تولید شده، به آن وارد و به میزنای (که لوله‌ای شکل است) هدایت می‌شود تا کلیه را ترک کند. لگنچه فاقد شبکه مویرگی است و در درون لپ‌ها قرار نمی‌گیرد.

(صفهه‌های ۸۱ تا ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید)

-۱۴۹ «امیرحسین بهروزی فرد»

منابع جانوری آهن و فولیک‌اسید، گوشت قرمز و جر (کبد) هستند، در انسان بالغ آهن ازآ داشد شده از تخریب یاخته‌های خونی آسیب دیده و مرده در مغز استخوان در ساخت دوباره گوییجه‌های قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
(صفهه‌های ۷۲ و ۷۳ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۵۰ «امیرحسین بهروزی فرد»

مولکول‌های آب با هر دو روش عبور از غشای یاخته‌های دیواره مویرگ و عبور از منفذ آن‌ها منتشر می‌شوند اولوه علاوه بر جریان توده‌ای (عبور از منفذ) عمده از غشای یاخته‌های دیواره مویرگ منتشر می‌شود. هموگلوبین در ساختار گوییجه قرمز (نه در داخل خوناب) قرار دارد توجه کنید درون‌بری و برون‌رانی توسط یاخته‌های پوششی دیواره مویرگ برای پروتئین‌های جابه‌جا شونده است. آمینواسیدها و گلوکز بدون صرف انرژی از منفذ منتشر می‌شوند.
(صفهه‌های ۶۱، ۶۷ و ۷۱ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۴۱ «سیننا ناری»

هر سرخرگ متصل به کلافک یا گلومرول (سرخرگ آوران و وابران) در لپ‌های کلیه مشاهده می‌شود.
(صفهه‌های ۴۵، ۸۱، ۸۳ و ۸۷ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید)

-۱۴۲ «سیننا ناری»

بررسی گزینه‌ها:
گزینه «۱»: برابر بودن فشار تراویشی و اسمزی، باعث توقف جریان توده‌ای می‌شود.
گزینه‌های «۲» و «۳»: کمبود پروتئین‌های خون (مانند الومین) و افزایش فشار خون درون سیاه‌گ‌ها می‌تواند از سرعت بازگشت این مایعات از بافت به خون بکاهد. در نتیجه، مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی‌گردند. در این حالت، بخش‌هایی از بدن، متورم می‌شود که به آن «خیز» یا «ددم» می‌گویند. مصرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات نیز می‌تواند به خیز منجر شود.

گزینه «۴»: فشار مکشی قفسه سینه در هنگام دم نیز سبب باز و بسته شدن دریچه‌های لانه کبوتری می‌شود.
(صفهه‌های ۶۱، ۶۷ و ۷۱ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۴۳ «علیله‌ضا آرین»

کرم خاکی جانوری دارای سالمانه گردش خون بسته است که تمامی تبادلات گازی خود را از طریق پوست انجام می‌دهد. دقت داشته باشد مهره‌دارانی که دارای گردش خون بسته می‌باشند و تنفس پوستی نیز دارند، می‌توانند تبادلات گازی خود را از طریق شش‌ها نیز انجام دهند. در کرم خاکی برخلاف ملخ، دستگاه گردش مواد در حمل و نقل گازهای تنفسی نقش دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در گردش خون مضاعف، خون ضمن یکبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می‌کند. گردش خون مضاعف و ساده فقط در مورد جانوران مهره‌دار صادق است و در کرم خاکی دیده نمی‌شود.
گزینه «۲»: سینگدان از بخش عقیمی معده تشکیل می‌شود و دارای ساختاری ماهیچه‌ای است. کرم خاکی معده ندارد.
گزینه «۳»: کرم خاکی، اکسیژن مورد نیاز یاخته‌های بدن خود را از هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک به دست می‌آورد نه از گازهای محلول در آب دریا.
(صفهه‌های ۳۷، ۵۲، ۵۳، ۷۷ و ۷۸ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۴۴ «پیمان رسول»

مواد A تا D به ترتیب کپسول بومن، لوله پیچ خورده نزدیک، لوله هنله و مجرای جمع کننده است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: کپسول بومن ابتدای گردیزه قرار دارد و هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه تشکیل شده است.
گزینه «۲»: لوله پیچ خورده نزدیک در بخش قشری کلیه قرار دارد و تا ابتدای لوله هنله ادامه دارد.
گزینه «۳»: جهت جریان مواد از کپسول بومن به سمت مجرای جمع کننده به صورت یکطرفه است.

گزینه «۴»: لوله هنله در تشکیل ادرار نقش دارد و جز اجزای گردیزه‌ها است.
(صفهه‌های ۸۱ و ۸۳ کتاب درسی) (تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید)

-۱۴۵ «پیمان رسول»

شكل، رشته‌های پروتئینی فیبرین را نشان می‌دهد که یاخته‌های خونی و گرددها را در برگرفته و تشکیل لخته داده است. دقت کنید که در انسان یاخته‌های خونی قرمز، کروی و از ۲ طرف فرورفته هستند. یاخته‌ها پس از تخریب آهن ازآ داد می‌کنند که یا در کبد ذخیره و یا به مغز استخوان می‌رود (نادرستی گزینه‌های ۴ و ۲)



«مهرداد مهین»

در همه مهرهاران خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می شود. همگی به دلیل وجود لوله گوارش، دارای سلول یا حفره عمومی (بنین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیواره داخلی بدن) هستند. ضمناً ساز و کارهای دارند که باعث می شود جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود. ضمناً به دلیل وجود لوله گوارش، امکان جریان یکطرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم است. در گردش ساده مثل ماهی و نوزاد دوزیستان، خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفراهی آن عبور می کند.

(صفحه های ۷۷، ۵۶، ۳۷ و ۷۲ کتاب درسی)

-۱۵۸

«مهرداد مهین»

همان طور که در شکل ۲۰ فصل ۴ کتاب درسی می بینید، اندازه لنفوسيت ها کوچک تر از بازو فيل ها، اثوزينوفيل ها و نتوروفيل ها است.

(صفحه های ۷۲ و ۷۴ کتاب درسی)

-۱۵۹

«سينا نادری»

بررسی گزینه ها:
گزینه «۱»: برای بودن فشار تراوشي و اسمزی، باعث توقف جریان توده ای می شود.
گزینه های «۲» و «۳»: کمبود پروتئین های خون (مانند آلبومین) و افزایش فشار خون درون سیاهرگ ها می تواند از سرعت بازگشت این مایعات از بافت به خون بکاهد. در نتیجه، مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی گردد. در این حالت بخش هایی از بدن، متور می شود که به آن «خیز» یا «ادم» می گویند. مصرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات نیز می تواند به خیز منجر شود.
گزینه «۴»: فشار مکشی قفسه سینه در هنگام دم نیز سبب باز و بسته شدن دریچه های لانه کبوتری می شود.

(صفحه های ۶۱، ۶۷ و ۷۱ کتاب درسی)

-۱۶۰

«علیرضا آروین»

کرم خاکی نوعی جانور دارای سامانه گردش خون بسته است که تمامی تبادلات گازی خود را از طریق پوست انجام می دهد. دقت داشته باشد مهرهارانی که دارای گردش خون بسته می باشند و تنفس پوستی نیز دارند، می توانند تبادلات گازی خود را از طریق شش های نیز انجام دهند. در کرم خاکی برخلاف ملخ، دستگاه گردش مواد در حمل و نقل گازهای تنفسی نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه «۱»: در گردش خون مضاعف، خون ضمن یکبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. گردش خون مضاعف و ساده فقط در مورد جانوران مهرهاران صادق است و در کرم خاکی دیده نمی شود.
گزینه «۲»: سنگان از بخش عقبی معده تشکیل می شود و دارای ساختاری ماهیچه ای است. کرم خاکی معده ندارد.
گزینه «۳»: کرم خاکی، اکسیژن مورد نیاز یاخته های بدن خود را از هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک به دست می آورد نه از گازهای محلول در آب دریا.

(صفحه های ۳۷، ۵۳، ۵۲، ۷۷ و ۷۸ کتاب درسی)

-۱۶۱

«علی رضا آروین»

دقت کنید سیاهرگ های بزرگ بدن مانند بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین، خون را به طور مستقیم از شبکه مویرگی دریافت نمی کنند. در خون سیاهرگی نیز اکسیژن وجود دارد.

(صفحه های ۴۰، ۵۶، ۶۶ و ۶۸ کتاب درسی)

-۱۶۲

«پیمان رسولی»

شکل، رشته های پروتئینی فیرین را نشان می دهد که یاخته های خونی و گرددها را در برگرفته و تشکیل لخته را داده است. دقت کنید که در انسان یاخته های خونی قرمز، کروی و دو طرف فرو رفته هستند. همچنین این

-۱۶۳

ریست شناسی (۱) - موازی

-۱۵۱

تیموس در نزدیکی قلب قرار گرفته و لنف خارج شده از این غده همانند لنف سایر نقاط بدن ابتدا به سیاهرگ های زیرترقوه ای تخلیه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه «۱»: در دوران جنبینی، طحال گویچه های قرمز که یاخته های خونی بدن هستند هستند را تولید می کند.

گزینه «۲»: آپاندیس متصل به رودهی کور است. تولید و تجمع لنفوسيت ها در گردها و اندام های لنفی، به از بین بردن عوامل بیماری را کمک می کند.

گزینه «۳»: خون سیاهرگی طحال گویچه های قرمز که یاخته های خونی چپ) روده به سیاهرگ باب تخلیه می شود.

(صفحه های ۶۹، ۷۰ و ۷۲ کتاب درسی)

«مهرداد مهین»

گیرنده های فشاری در دیواره سرخرگ های گردش عمومی قرار دارند.

(صفحه های ۵، ۵۶، ۶۹ و ۷۳ کتاب درسی)

-۱۵۲

«محمد مهری روزبهان»

بیش تر یاخته های خونی گویچه های قرمز هستند که هموگلوبین دارند. هموگلوبین ها و آنزیم کربنیک اسیدراز پروتئین تنظیم کننده pH خون می باشد. هموگلوبین همانند انواع گلوبولین ها با جذب و انتقال یون ها در کنترل pH خون نقش دارد.

گردهها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند.

(صفحه های ۴۵ و ۷۱ کتاب درسی)

-۱۵۳

«محمد مهری روزبهان»

ورود بعضی از مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن باعث تنگی رگ ها می شود. با تنگ شدن رگ ها فشار خون افزایش می یابد.

(صفحه های ۴۵ و ۷۰ کتاب درسی)

-۱۵۴

«مهرداد مهین»

فقط مورد «الف» صحیح است.
در گردش خون عمومی انسان، مویرگ ها کوچک ترین رگ های بدن هستند.

بررسی موارد:

الف) سطح بیرونی مویرگ ها را غشای پایه (شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئین)، احاطه می کند و نوع صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می آورد.

ب) همانطور که در شکل ۱۴ فصل ۴ مشاهده می کنید، فشار اسمزی خون در طول شبکه مویرگی ثابت است.

ج) ممکن است قتل از مویرگ سرخرگ نیاشد. سیاهرگ باب خون تیره را به کبد وارد می کند؛ لذا گروهی از مویرگ های کبد، خون را از سیاهرگ دریافت می کنند.

(د) در ابتدای بعضی از مویرگ های بنداره مویرگی وجود دارد.

(صفحه های ۶۱، ۶۴ و ۶۸ کتاب درسی)

-۱۵۵

«علی کرامت»

سامانه گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد، شکل گرفته است. بنابراین، همگی بیش از دو حفره قلبی دارند.

(صفحه های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷۷ کتاب درسی)

-۱۵۶

«مهرداد مهین»

سرخرگ ها، مویرگ ها و سیاهرگ ها، توانایی هدایت خون را به سمت بافت های مختلف بدن دارند. همگی در دیواره خود دارای بافت پوششی استگفرشی تکلایه هستند.

(صفحه های ۶۶ تا ۶۹ کتاب درسی)

-۱۵۷

که با تأثیر بر ماهیجه‌های صاف دیواره رگ‌ها، سرخرگ‌های کوچک را گشاد و بندارهای مویرگی را باز می‌کند تا میزان جریان خون در آن‌ها افزایش یابد.

(صفحه‌های ۳۱، ۴۵، ۶۷ و ۷۱ کتاب درسی)

«محمد‌مهدی روزبهان»

-۱۶۷

فقط مور «الف» صحیح است.

در بدن ما تنظیم میزان گویچه‌های قرمز، به ترشح هرمونی به نام اریتروپوئینست بستگی دارد. این هرمون توسعه گروه ویژه‌ای از یاخته‌های کلیه و کبد به درون خون ترشح می‌شود و روی مغز استخوان اثر می‌کند تا سرعت تولید گویچه‌های قرمز را زیاد کند. هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، این هرمون به طرز معنی‌داری افزایش می‌یابد که این حالت در کم خونی، بیماری‌های تنفسی و قلبی، ورزش‌های طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، ممکن است رخ دهد.

بررسی موارد:

(الف) برای ساخته شدن گویچه‌های قرمز در مغز استخوان، علاوه بر وجود آهن، فولیک‌اسید و ویتامین **B₁₂** نیز لازم است. ویتامین **B₁₂** از ویتامین‌های محلول در آب می‌باشد. همچنین فولیک‌اسید نیز نوعی ویتامین از خانواده **B** است که برای تقسیم طبیعی یاخته‌های لازم است.
(ب) هنگام کمبود میزان اکسیژن، بدنهای افزایش خورسازی به بافت‌ها، تعداد ضربان قلب را افزایش می‌دهد. برای افزایش تعداد ضربان قلب در یک دقیقه باید هر دوره کاری قلب کوتاه شود و این اتفاق باعث می‌شود که زمان استراحت قلب و لذا فاصله بین موجه‌ای **T** کاهش یابد.
(ج) هنگام کاهش اکسیژن تولید و ترشح هرمون اریتروپوئین توسعه گروه ویژه‌ای از یاخته‌های کلیه و کبد افزایش می‌یابد. جهت ساخت هرمون‌ها نیاز به مولکول‌های **ATP** است، پس با افزایش تولید و ترشح این هرمون‌ها مصرف مولکول‌های **ATP** توسط یاخته‌های سازنده آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

(صفحه‌های ۴۰، ۶۳، ۶۷ و ۷۳ کتاب درسی)

«پیمان رسول»

-۱۶۸

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱» و «۲»: با توجه به شکل ۱۸، یاخته‌های لنفوئیدی به گویچه‌های سفید بدون دانه و یاخته‌های میلوئیدی به گویچه‌های سفید دانه‌دار، گردیده و گویچه‌های قرمز تمايز می‌باشد.
گزینه «۳»: در اثر تقسیم یاخته‌های بنیادی مغز استخوان دو نوع یاخته لنفوئیدی و میلوئیدی ایجاد می‌شود.
گزینه «۴»: گردیده‌ها (دارای نقش در ایجاد لخته خون) در اثر تمایز یاخته‌های میلوئیدی ایجاد می‌شوند.

(صفحه‌های ۷۲ و ۷۴ کتاب درسی)

«امیرحسین بهروزی فر»

-۱۶۹

منابع جانوری آهن و فولیک‌اسید، گوشت قرمز و جگر (کبد) هستند در انسان بالغ، اهن آزاد شده از تخریب یاخته‌های خونی آسیب دیده و مرده در مغز استخوان در ساخت دیواره گویچه‌های قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(صفحه‌های ۷۲ و ۷۳ کتاب درسی)

«امیرحسین بهروزی فر»

-۱۷۰

مولکول‌های آب با هر دو روش عبور از غشای یاخته‌های دیواره مویرگ و عبور از منفذ آن‌ها منتشر می‌شوند. اوره علاوه بر جریان توده‌ای (عبور از منفذ) عمده‌ای از غشای یاخته‌های دیواره مویرگ منتشر می‌شود. هموگلوبین در ساختار گویچه قرمز (نه در داخل خوناب) قرار دارد. توجه کنید درون بری و برون رانی توسط یاخته‌های پوششی دیواره مویرگ برای پروتئین‌های جایه‌جا شونده است. آمینواسیدها و گلوكز بدون صرف انرژی از منفذ منتشر می‌شوند.

(صفحه‌های ۶۸، ۶۹ و ۷۱ کتاب درسی)

یاخته‌ها پس از تخریب آهن آزاد می‌کنند که با در کبد ذخیره و با همراه خون به مغز استخوان می‌رود (نادرستی گزینه‌های ۲ و ۴)
گردها قطعات یاخته‌ای بی‌رنگ و بدون هسته‌ای اند که درون خود دانه‌های زیادی دارند. (نادرستی گزینه ۳)
(صفحه‌های ۷۲ و ۷۵ کتاب درسی)

-۱۶۹


«مهرداد مهربان»

ساده‌ترین سامانه گردش مواد در برخی از بی‌مهرگان (مانند اسفنج‌ها) مشاهده می‌شود. عامل حرکت آب در اسفنج‌ها، یاخته‌های یقه‌دار هستند که تاژک دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پوست دوزیستان ساده‌ترین ساختار در اندام‌های تنفس مهره‌داران است. جدایی کامل بطن‌ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل‌ها رخ می‌دهد.

گزینه «۲»: ساده‌ترین آبشش‌ها، برستگی‌های کوچک و پراکنده پوستی هستند، مانند آبشش‌های ستاره‌ای دریابی، همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در مسیر تبادل گازهای تنفسی در سطوح تنفسی این جانور، بیش از یک لایه یاخته پوششی وجود دارد.



گزینه «۴»: ساده‌ترین سامانه گردش خون بسته در کرم‌های حلقوی مانند کرم خاکی وجود دارد. در کرم خاکی، فقط یک رگ پشتی (قلب اصلی) وجود دارد که خون را به سمت پنج جفت کمان رگی (قلب کمکی) منتقل می‌کند.

(صفحه‌های ۷۸، ۷۶ و ۵۳ کتاب درسی)

-۱۶۵

«تومید بابایی»

سرخرگ به آبشش ماهی وارد و سرخرگ نیز از آن خارج می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سرخرگ شکمی ماهی خون تیره و سرخرگ پشتی آن خون روشن دارد، اما سیاه‌مرگ آن همیشه خون تیره دارد.

گزینه «۲»: خون ورودی و خروجی به قلب ماهی تیره است.

گزینه «۴»: بطن قلب ماهی پالبین تراز دهلیز آن قرار دارد.

(صفحه‌های ۷۸ کتاب درسی)

-۱۶۶

«مازیار اعتمادزاده»

یک روش که به مبادله مواد در مویرگ‌ها کمک می‌کند، جریان توده‌ای است. در این روش، انتقال مواد از منفذ دیواره مویرگ‌ها صورت می‌گیرد که عامل آن اختلاف فشار میان درون و بیرون مویرگ است. باید توجه کنید که پروتئین‌های درشت، نمی‌توانند از منفذ غشای یاخته‌های بافت پوششی عبور کنند. آن‌زیم کربنیک‌انیدراز نوعی آنزیم موجود در گویچه‌های قرمز است که با ترکیب مولکول‌های آب و کربن‌دی‌اکسید باعث تولید مولکول‌های کربنیک‌اسید می‌شود. کربنیک‌اسید به سرعت به بون بیکریات CO_2 و هیدروژن تجزیه می‌شود و بنابراین، در انتقال مولکول‌های CO_2 شرکت می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پروتئین‌های درشت، با درون بری وارد یاخته‌های پوششی و برون رانی از آن‌ها خارج می‌شوند. گلوبولین‌ها در این می‌بازد و مبارزه با عوامل بیماری‌زا اهمیت دارند.

گزینه «۲»: مولکول‌هایی مانند گلوكز و یون‌های سدیم و پتاسیم که اتحلال آن‌ها در لبیدهای غشا کم است، از طریق منفذ غشایی منتشر می‌شوند. یون‌های سدیم و پتاسیم، توسط پروتئین انتقال دهنده سدیم-پتاسیم موجود در غشای یاخته‌های بزرگ روند.

گزینه «۴»: مولکول‌هایی مانند اکسیژن، کربن‌دی‌اکسید و اوره که اتحلال آن‌ها در لبیدهای غشا کم است، از طریق منفذ غشایی یاخته‌های دیواره مویرگ متشر شوند. کربن‌دی‌اکسید از جمله مواد گشاد کننده رگی است



گزینه «۴»: نسبت جرم آب تولید شده به جرم گلوكز مصرف شده در اکسایش کامل گلوكز همواره برابر با $0/6$ است.

$$\frac{6 \times 18}{180} = 0/6$$

(صفحه‌های ۸۳ تا ۸۵ کتاب (رسی))

«علی رهیمی»

-۱۷۵

تنها عبارت «الف» نادرست است.
نادرستی «الف»: در فرایند جذب پرتوهای فرابنفش توسط لایه اوزون، پرتوهایی با طول موج بلندتر (انرژی کمتر) تولید می‌شود.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب (رسی))


«علی رهیمی»

-۱۷۶

همه عبارت‌ها صحیح هستند.
(صفحه‌های ۷۸ و ۷۹ کتاب (رسی))

«محمدعلی نیک‌پیام»

-۱۷۷



(صفحه‌های ۸۳ تا ۸۵ کتاب (رسی))

«علی رهیمی»

-۱۷۸

در دما و فشار یکسان حجم مولی گازهای مختلف یکسان است. بنابراین حجم مولی گازها در دما و فشار داده شده را **A** فرض می‌کنیم:

گزینه «۱»:

$$? LCO_2 = 1 g CO_2 \times \frac{1 mol CO_2}{44 g CO_2} \times \frac{ALCO_2}{1 mol CO_2} = \frac{1}{44} \times A(LCO_2)$$

گزینه «۲»:

$$? LNO = 3/0.1 \times 10^{22} NO \times \frac{1 mol NO}{6/0.2 \times 10^{23} NO}$$

$$\times \frac{ALNO}{1 mol NO} = 0.05 \times A(LNO)$$

گزینه «۳»:

$$? LO_2 = 0/15 mol O_2 \times \frac{ALO_2}{1 mol O_2} = 0/15 \times A(LO_2)$$

شیوه (۱) - عادی

-۱۷۱

«هادی زمانیان»

در یک سیلندر با پیستون متحرک، در فشار ثابت، دما با حجم رابطه مستقیم دارد و در دمای ثابت، فشار با حجم رابطه عکس دارد؛ همچنین برای یک نمونه گاز، اگر هم دما ثابت باشد و هم فشار، افزایش حجم نشانه افزایش تعداد مول‌های گاز است.

(صفحه ۸۲ کتاب (رسی))

-۱۷۲

«علی علمداری»

پلاستیک‌های سبز پلیمرهایی هستند که بر پایه مواد گیاهی ساخته می‌شوند.

(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب (رسی))

-۱۷۳

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: براساس قانون آووگادرو در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.

گزینه «۲»: با افزایش فشار فاصله بین مولکول‌های مواد گازی کاهش می‌یابد در حالی که مایعات تراکم‌پذیری ناچیزی دارند که می‌توان از آن صرف نظر کرد.

گزینه «۳»: گازهای مختلف تعداد اتم‌های متفاوتی دارند (دو اتمی، سه‌اتمی و ...) بنابراین در دما و فشار یکسان تعداد اتم‌های موجود در یک لیتر از همه گازها با یکدیگر برابر نیست.


گزینه «۴»: برای توصیف یک گاز باید مقدار، دما و فشار آن مشخص باشد.

(صفحه‌های ۸۱ تا ۸۳ کتاب (رسی))

-۱۷۴

«محمد نلاح نژاد»

معادله موازنۀ شده اکسایش گلوكز به صورت زیر است:



$$? g O_2 = 0/25 mol C_6H_{12}O_6 \times \frac{6 mol O_2}{1 mol C_6H_{12}O_6} \times \frac{32 g O_2}{1 mol O_2} = 48 g O_2$$

گزینه «۲»: در واکنش اکسایش گلوكز مقدار مول O_2 مصرف شده با مقدار مول CO_2 تولیدی برابر است. با توجه به یکسان بودن دما و فشار، حجم این دو نمونه گاز با هم برابر است.

گزینه «۳»: گاز CO_2 تولید شده از اکسایش کامل یک مول گلوكز، در شرایط STP، برابر $134/4$ لیتر می‌باشد.

$$134/4 = 134/4 L$$

حجم CO_2 تولیدی.



«کتاب آبی»


اگر حجم یک مول گاز شرایط STP برابر $22/4$ لیتر باشد حجم یک مول گاز در فشار $2/8\text{ atm}$ و دمای 30°C برابر $\frac{800}{91}$ خواهد بود.

$$\frac{1 \times 22/4}{273} = \frac{2/8 \times v}{300} \Rightarrow v = \frac{800}{91}$$

حال مقدار مول هر گاز را به کمک حجم مولی گازها در دمای جدید را محاسبه می کنیم.

$$n = \frac{v}{\text{حجم مولی}} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{H}_2} = \frac{2}{\frac{800}{91}} = \frac{91}{400} \text{ mol} \\ n_{\text{O}_2} = \frac{1}{\frac{800}{91}} = \frac{91}{800} \text{ mol} \end{cases}$$

مطابق واکنش موازن شده به ازای واکنش کامل $\text{O}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$ معادل ۳ لیتر $\text{H}_2\text{O(g)}$ تولید می شود.



اکنون با استفاده از مقدار مول گاز و حجم آن، حجم مولی گاز در دما و فشار انتهای واکنش را محاسبه می کنیم.

$$n = \frac{v}{\text{حجم مولی}} \Rightarrow \frac{3}{\frac{91}{400}} = \frac{1200}{91} \text{ حجم مولی}$$

حال فشار انتهایی واکنش را محاسبه می کنیم.

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{1 \times 22/4}{273} = \frac{P \times \frac{1200}{91}}{400} \Rightarrow P \approx 2/5 \text{ atm}$$



$= 2/5 - 2/8 = 0/3 \text{ atm}$ تغییرات فشار

(صفحه های ۸۲ و ۸۳ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

بررسی گزینه ها:
گزینه «۱»: گاز نیتروژن به عنوان اصلی ترین جز سازنده هی هوا کره، واکنش پذیری بسیار کمی دارد.

گزینه «۲»: گاز NO_2 بی رنگ و گاز NO قهوه ای رنگ است.
گزینه «۳»: در اثر رعد و برق گاز نیتروژن با اکسیژن هوا ترکیب شده و طی واکنش های زیر به اکسیدهای نیتروژن تبدیل می شود.



گزینه «۴»: فرآورده های واکنش تولید اوزون تروپوسفری گازهای O_3 و NO هستند.

(صفحه های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه «۱»: توسعه پایدار یعنی این که در تولید هر فرآورده، همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آن در نظر گرفته شود.

گزینه «۳»: ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، ۳ رأس مثبت توسعه پایدار هستند.

-۱۸۳

$$\text{?LN}_2 = \frac{3/01 \times 10^{23}}{2 \times 6/02 \times 10^{23}} \text{ اتم N} \times \frac{1\text{molN}_2}{\text{اتم N}} \times \frac{\text{ALN}_2}{1\text{molN}_2}$$

$$= 0/25 \times A(\text{LN}_2)$$

با توجه به این که در گزینه «۴»، عدد بزرگتری در A ضرب شده است، پس حجم این نمونه نسبت به سایر گزینه ها بیشتر می باشد.

(صفحه های ۸۳ و ۸۵ کتاب درسی)

«علی مهدی

تنها عبارت «ب» صحیح است.

بررسی سایر عبارت ها:

«الف»: نقطه جوش آمونیاک -34°C درجه سلسیوس است و هر ماده در دمای بالاتر از نقطه جوش به صورت گاز است نه مایع!

«پ»: گازهای N_2 و H_2 در دما و فشار اتفاق با یکدیگر واکنش نمی دهند.
«ت»: دمای بهینه در فرایند هایپر 450°C درجه سلسیوس و فشار بهینه 20 atm است.

(صفحه های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی)

«علی علمداری

فراورده غیر مشترک سوخت های بنزین و زغال سنگ، گوگرد دی اکسید است.
(صفحه ۷۶ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

جرم گاز نیون را x فرض می کنیم. (N_A عدد آوگادرو است.)

$$\frac{1\text{molCl}_2}{0/56\text{LCl}_2} \times \frac{1\text{molCl}_2}{22/4\text{LCl}_2} \times \frac{2\text{N}_A \text{Cl}}{1\text{molCl}_2}$$

$$= x\text{g Ne} \times \frac{1\text{molNe}}{20\text{gNe}} \times \frac{\text{N}_A \text{Ne}}{1\text{molNe}} \Rightarrow x = 1\text{gNe}$$

توجه: در هر مول گاز کلر (Cl_2)، ۲ مول اتم کلر وجود دارد.

(صفحه های ۸۳ و ۸۵ کتاب درسی)

«کتاب آبی با تغییر»


بررسی گزینه ها:
گزینه «۱»: لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر گفته می شود که بیش ترین مقدار اوزون را دارا است.

گزینه «۲»: مولکول های اوزون مانع ورود بخش عمده ای از تابش های فرابنفش خورشید و سطح زمین می شود.
گزینه «۴»: اوزون دگر شکل یا آلتروپ اکسیژن است.

(صفحه ۷۸ کتاب درسی)



روش دیگر: جرم مولی فلز قلیابی خاکی را X فرض می‌کنیم.



$$\frac{1000 \text{ mL } H_2}{1 \text{ L } H_2} = 896 \text{ mL } H_2 \Rightarrow X = 24 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$\frac{1000 \text{ mL } H_2}{1 \text{ L } H_2} = 896 \text{ mL } H_2 \Rightarrow X = 24 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$


(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی)

«کتاب آبی با تغییر»

-۱۹۰

موارد «الف» و «ب» جمله مورد نظر را به درستی تکمیل می‌کنند.

واکنش مورد نظر به صورت زیر است:



(الف) وجود نور خورشید برای انجام شدن این واکنش ضروری است.

(ب) به دلیل این که مجموع ضرایب مواد گازی در دو طرف معادله واکنش با هم

برابر است، حجم گازهای مصرفی با حجم گازهای تولیدی برابر است.

(پ) ضرایب استوکیومتری O_3 و O_2 در دو طرف معادله یکسان است، پس

حجم اوزون تولیدی با حجم اکسیژن مصرفی برابر است.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

شیمی (۱) - موازی

«علی رهیمی»

-۱۹۱

برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی CO_2 را با منزیم اکسید واکنش می‌دهند.

(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی)

«علی علمداری»

-۱۹۲

پلاستیک‌های سبز پلیمرهایی هستند که بر پایه مواد گیاهی ساخته می‌شوند.

(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی)

«علی علمداری»

-۱۹۳

چون در صورت سوال حداقل هزینه را خواسته است، میزان کربن دی اکسید

تولید شده توسط ماشین بهاری طی مسافت یک کیلومتر را برابر ۱۳۳ گرم در

نظر می‌گیریم.

$$\frac{133 \text{ g } CO_2}{1 \text{ km}} \times \frac{0.22 \text{ g } CO_2}{1 \text{ g } CO_2} \times \frac{16 \text{ ریال}}{1 \text{ g}} \times \frac{\text{مسافت}}{200 \text{ km}} = 20.0 \text{ ریال}$$

$$= 120000$$

فراروده‌های واکنش سوختن بنزین، CO_2 ، H_2O و CO است.

(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی)

گزینه «۴»: سرمایه‌گذاری برخی کشورها در تولید گاز هیدروژن و پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر براساس توسعه‌ی پایدار است.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۱۸۶

فرایند هابر در حضور فلز آهن و در شرایط استاندارد ($1\text{atm}, 0^\circ\text{C}$) انجام

نمی‌شود (نادرستی گزینه ۱). انجام دادن واکنش در دما و فشارهای مختلف برای کسب شرایط بهینه یکی از چالش‌های این فرایند است (نادرستی گزینه ۲).

با توجه به این که فرایند هابر برگشت‌پذیر است، بنابراین به صورت کامل انجام نمی‌شود، در نتیجه در انتهای فرایند زمانی که با کاهش دما آمونیاک

به صورت مایع خارج می‌شود، مولکولهای هیدروژن و نیتروژن واکنش نداده در

طرف واکنش باقی می‌مانند (نادرستی گزینه ۳). زمانی که دمای مخلوط واکنش را به تدریج کاهش دهیم، با توجه به ترتیب نقطه جوش آن‌ها، ترتیب مایع شدن گازها به صورت "آمونیاک < نیتروژن < هیدروژن" می‌باشد.

(صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۱۸۷

مواد اول و ب صحیح می‌باشند.

بررسی سایر موارد:

(پ) گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم هیدروژن از یک گرم بنزین بیشتر است.

(ت) فراورده سوختن هیدروژن فقط H_2O می‌باشد.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی با تغییر»

-۱۸۸

همه عبارت‌ها صحیح می‌باشند.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۱۸۹

معادله واکنش را نوشه و حجم گاز H_2 را به مول تبدیل کرده و تعداد مول‌های فلز X را از طریق H_2 حساب می‌کنیم.



$$? \text{ mol } H_2 = 896 \text{ mL } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2240 \text{ mL } H_2} = 0.4 \text{ mol } H_2$$

$$? \text{ mol } X = 0.4 \text{ mol } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } X}{1 \text{ mol } H_2} = 0.4 \text{ mol } X$$

بنابراین با استفاده از جرم و تعداد مول‌های فلز X ، جرم مولی آن قابل محاسبه است.

$$X = \frac{0.4 \text{ mol} \times 24 \text{ g/mol}}{0.4 \text{ mol}} = 24 \text{ g/mol}$$



بنابراین مجموع ضریب‌های مواد در معادله موازن شده واکنش «الف» و «ب» با هم برابر نیست.

(صفحه ۷۸ کتاب درسی)

-۲۰۰ «علی علمداری»

فراورده غیر مشترک سوخت‌های بنزین و زغال‌سنگ، گوگرد دی اکسید است.

(صفحه ۷۶ کتاب درسی)



-۲۰۱ «کتاب آبی»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: گاز نیتروژن به عنوان اصلی‌ترین جز سازنده‌ی هوا کره، واکنش‌پذیری سیار کمی دارد.

گزینه‌ی «۲»: گاز NO_1 بی‌رنگ و گاز NO_2 قهوه‌ای رنگ است.

گزینه‌ی «۳»: در اثر رعد و برق گاز نیتروژن با اکسیژن هوا ترکیب شده و طی واکنش‌های زیر به اکسیدهای نیتروژن تبدیل می‌شود.



گزینه‌ی «۴»: فراورده‌های واکنش تولید اوزون تروپوسفری گازهای O_3 و NO هستند.

(صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

-۲۰۲ «کتاب آبی با تغییر»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر گفته می‌شود که بیش‌ترین مقدار اوزون را دارد.

گزینه‌ی «۲»: مولکول‌های اوزون مانع ورود بخش عمده‌ای از تابش‌های فرابنفش خورشید و سطح زمین می‌شود.

گزینه‌ی «۴»: اوزون دگر شکل یا آلتروپ اکسیژن است.

(صفحه ۷۸ کتاب درسی)

-۲۰۳ «کتاب آبی با تغییر»

واکنش نشان داده شده در لایه استراتوسفر هواکره روی می‌دهد.

(صفحه‌های ۷۸ و ۷۹ کتاب درسی)

-۲۰۴ «کتاب آبی»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: توسعه پایدار یعنی این‌که در تولید هر فراورده، همه گزینه‌های

«محمد غلاخ نژاد»

تنها عبارت «ب» نادرست است. اکسیژن و اوزون هر دو در شرایط عادی گازهای بی‌رنگ هستند اما اکسیژن در حالت مایع، آبی‌رنگ و اوزون مایع لاجوردی است.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۹۴

تنها عبارت «الف» نادرست است.

نادرستی «الف»: در فرایند جذب پرتوهای فرابنفش توسط گاز اوزون، پرتوهایی با طول موج بلندتر (انرژی کم‌تر) تولید می‌شود.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۹۵

«علی رهیمی»

تنها عبارت «الف» نادرست است.

نادرستی «الف»: در فرایند جذب پرتوهای فرابنفش توسط گاز اوزون، پرتوهایی با طول موج بلندتر (انرژی کم‌تر) تولید می‌شود.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۹۶

«علی رهیمی»

همه عبارت‌ها صحیح است.

(صفحه‌های ۷۸ و ۷۹ کتاب درسی)

«علی علمداری»

عبارت‌های «الف» و «ت» نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت «الف»: دگر شکل به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می‌شود.

عبارت «ت»: گاز اوزون در تروپوسفر (لایه پایینی هواکره) یک آلاند است.

استراتوسفر (لایه دوم هواکره) یک پالاند است.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

-۱۹۷

«علی علمداری»

نادرستی «ب»: چاههای فعل نفت محل مناسبی برای دفن CO_2 نمی‌باشد.

نادرستی «ب»: قیمت تمام شده تولید پلاستیک با پایه نفتی در کارخانه سیار کم است.


نادرستی «ت»: با وجود هزینه بالای تولید، حمل و نگهداری گاز هیدروژن اما به علت بازدهی بالای سوختن این گاز و تولید آلاند کم‌تر، استفاده از گاز هیدروژن، به عنوان سوخت، در مسیر توسعه پایدار قرار دارد.

(صفحه‌های ۷۶ تا ۷۷ کتاب درسی)

-۱۹۹

«علی علمداری»

واکنش‌های «الف» تا «پ» به صورت زیر، است.





گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم (kJ):

$$\text{زغال‌سنگ} > \text{بنزین} > \text{غاز طبیعی} > \text{هیدروژن}$$

(پ) بخار آب، فراورده مشترک سوزاندن بنزین، زغال‌سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی است.

پس گزینه «۴» پاسخ تست است.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۲۰۹

با توجه به جدول برای هر کیلوژول انرژی از هیدروژن به $\frac{۲۸۰۰}{۱۴۳}$ ریال و برای هر

$$\text{کیلوژول انرژی از بنزین به } \frac{۱۴}{۴۸} \text{ ریال پول نیاز داریم.$$

با توجه به این‌که طی مسافت یک کیلومتر توسط ماشین هیدروژنی نیازمند هر مقدار انرژی باشد، طی مسافت یک کیلومتر با ماشین بنزینی هم، همان مقدار انرژی لازم دارد، در نتیجه با هزینه سوخت مورد نیاز برای 10 km سفر با اتومبیل هیدروژنی می‌توان به تقریب $\frac{۶۷۱}{۳}$ کیلومتر با اتومبیل معمولی مسافرت کرد.

$$\frac{۲۸۰۰}{۱۴۳} \times ۱۰ = \frac{۲۸۰۰}{۱۴} \times \frac{۱۰}{۴} = \frac{۶۷۱}{۳}$$

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۲۱۰

دو خودرویی که برچسب آلایندگی‌شان A و E است را به ترتیب ۱ و شماره‌گذاری می‌کنیم. خودرویی با برچسب آلایندگی E، حداقل ۱۷۰ گرم کربن‌دی‌اکسید به ازای طی یک کیلومتر تولید می‌کند.

$$= ۱۸۰۰۰ \times ۱۷۰ = ۳۰۶۰۰۰۰ = ۳ / ۰۶ \times ۱۰^۳ \text{ kg}$$

میزان کربن‌دی‌اکسید تولید شده توسط خودروی شماره‌ی (۱)

$$= ۱۸۰۰۰ \times ۱۲۰ = ۲۱۶۰۰۰ = ۲ / ۱۶ \times ۱۰^۳ \text{ kg}$$

$$۳ / ۰۶ \times ۱۰^۳ - ۲ / ۱۶ \times ۱۰^۳ = ۹۰۰ \text{ kg}$$

$$\frac{۱ \text{ دلار مالیات اضافی CO}_2}{۹۰۰ \text{ کیلوگرم CO}_2 \text{ اضافی}} = \frac{۱۰۰ \text{ کیلوگرم CO}_2}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{۹۰۰ \times ۱}{۱۰۰} = ۹ \text{ دلار}$$

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در آن در نظر گرفته شود.

گزینه «۳»: ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، ۳ رأس مثلث توسعه‌ی پایدار هستند.

گزینه «۴»: سرمایه‌گذاری برخی کشورها در تولید گاز هیدروژن و پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر براساس توسعه‌ی پایدار است.

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۲۰۵

همه عبارت‌ها صحیح‌اند.

(آ) جرم مولی گاز اوزون بیش‌تر از اکسیژن است، بنابراین دارای چگالی بیشتری نسبت به اکسیژن است. چگالی اوزون در حدود $\frac{۲}{۱۴}$ گرم بر لیتر و چگالی اکسیژن در حدود $\frac{۱}{۴۳}$ گرم بر لیتر است.

(ب) ساختار هر ماده تعیین کننده خواص و رفتار آن است.

(پ) اوزون دارای ۳ اتم اکسیژن و گاز اکسیژن دارای ۲ اتم اکسیژن است. پس نسبت جرم مولی اوزون به گاز اکسیژن به صورت زیر است:

$$\frac{\text{جرم اتم اکسیژن} \times ۳}{\text{جرم اتم اکسیژن} \times ۲} = \frac{۳}{۲} \quad \text{جرم مولی اوزون}$$

(صفحه‌های ۷۶ و ۷۹ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

-۲۰۶

موارد a و b صحیح‌می‌باشند.

بررسی سایر موارد:

(پ) گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم هیدروژن از یک گرم بنزین بیش‌تر است.

(ت) فراورده سوختن هیدروژن فقط H_2O می‌باشد.

(صفحه ۷۶ کتاب درسی)

«کتاب آبی با تغییر»

-۲۰۷

همه عبارت‌ها صحیح‌اند.

(صفحه‌های ۷۶ تا ۷۸ کتاب درسی)

«کتاب آبی با تغییر»

-۲۰۸

(الف) سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز دارد.

(ب) به مقایسه زیر توجه کنید: