

۱	اثرات طلاق والدین روی کودکان شامل موارد زیر است، <u>بجز</u> :	
الف	اختلال نقص توجه بیش فعالی در کودکانی که پدر در خانه حضور ندارد بیشتر است	
ب	میزان طلاق در این کودکان در آینده دو برابر کودکان با خانواده های با ثبات است	
ج	اضطراب و کناره گیری اجتماعی در این کودکان تفاوتی با دیگران ندارد	
د	بزهکاری در دوران نوجوانی در آنها بیشتر دیده می شود	
	منبع:	

۲	براساس نظریه Gilligan مشخصه غالب تصمیم گیری اخلاقی در دختران کدام است؟	
الف	Perception of justice	
ب	Rationality	
ج	Ethics of caring	
د	Sense of fairness	
	منبع:	

۳	در مورد cyber bullying در نوجوانان همه عبارات زیر صحیح است، <u>بجز</u> :	
الف	در افرادی که خودشان قلدری را انجام می دهند علائم افسردگی پیش بینی می شود	
ب	در مطالعه ای در نوجوانان شیوع قلدری سنتی و مجازی با ۷٪ گزارش شده است	
ج	ارتباط افسردگی با قلدری سنتی قوی تر از ارتباط آن با قلدری مجازی است	
د	شیوع قلدری مجازی از یک تا ۶۲ درصد در نوجوانان گزارش شده است	
	منبع:	

۴	در موقعیت های محرومیت روانی - اجتماعی کدامیک از حرکات کلیشه ای بیشتر دیده می شود؟	
الف	Nail-biting	
ب	Head-banging	
ج	Hair-twirling	
د	Skin-picking	
	منبع:	

۵	دختر ۱۶ ساله‌ای از حدود ۶ ماه پیش با رژیم غذایی شدید دچار کاهش وزن شده و در طی این مدت دوره‌های پرخوری زیاد همراه با استفراغ‌های عمدی داشته و دایم با وزن خود مشغولیت ذهنی دارد. در این بیمار احتمال وجود کدامیک از یافته‌های زیر وجود دارد؟	
	الف	کاهش سطح هورمون‌های جنسی
	ب	هیپرکلسترولمی
	ج	سندروم روده تحریک پذیر
	د	هیپوترمی
	منبع:	

۶	همه مهارت‌های زیر در یک کودک ۳ ساله قابل انتظار است، <u>بجز</u> :	
	الف	کفش‌هایش را بپوشد
	ب	خودش بخوبی غذا بخورد
	ج	صورتش را بشوید و خشک کند
	د	دگمه‌هایش را باز کند
	منبع:	

۷	تعدادی بلوک خانه‌سازی به ۳ کودک داده شده و آنها به تنهایی مشغول ساختن سازه‌های خود هستند ولی بلوک‌ها را با هم به شکل اشتراکی استفاده می‌کنند. این الگو چه نوعی از بازی را نشان می‌دهد؟	
	الف	Parallel
	ب	Solitary
	ج	Cooperative
	د	Associative
	منبع:	

۸	در بیمار مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی که به علت کاهش وزن شدید در بیمارستان بستری شده است، کدامیک از اقدامات زیر صحیح است؟
الف	توزین هفتگی انجام شود
ب	روزانه ۲۵۰۰ کالری دریافت کند
ج	از مکمل‌های غذایی مایع استفاده شود
د	وعده‌های غذایی به شکل دو بار در روز داده شود
منبع:	

۹	در مصاحبه بالینی روانپزشکی کودکان و نوجوانان، Squiggle game را برای کدام سنین مناسب‌تر می‌دانید؟
الف	۲ سال اول زندگی
ب	۳-۵ سالگی
ج	۶-۱۲ سالگی
د	بالای ۱۲ سالگی
منبع:	

۱۰	در زمینه ابزارهای تشخیصی در حیطه روانپزشکی کودکان عبارت صحیح را در مورد Achenbach Child Behavior Checklist مشخص نمائید؟
الف	جزو مصاحبه‌های تشخیصی structured است.
ب	جزو مصاحبه‌های تشخیصی semi- structured است.
ج	جزو پرسشنامه‌هایی است که دامنه وسیعی از علائم را پوشش می‌دهد.
د	جزو پرسشنامه‌هایی است که روی نوع خاصی از علامت شناسی تمرکز می‌کند.
منبع:	

۱۱	در معاینه وضعیت روانی (MSE) کودکان در سنین مدرسه (school age) همه توانایی های زیر مطابق با انتظار است، <u>بجز</u> :
الف	بتواند اسم سه شیء را بعد از ۵ دقیقه بیاد آورد.
ب	بتواند شش رقم را رو به جلو تکرار کند.
ج	بتواند سه رقم را رو به عقب تکرار کند.
د	بتواند محاسبات ساده را انجام دهد.
منبع:	

۱۲	در تست هوشی وکسلر برای کودکان و نوجوانان عملکرد هوشی مرزی (borderline) برابر با کدامیک از نمرات زیر است؟
الف	۷۰-۸۰
ب	۸۰-۹۰
ج	۷۱-۸۴
د	۸۵-۸۹
منبع:	

۱۳	نوزادی در روز دوم پس از تولد دچار تحریک پذیری، لرزش، استفراغ، گریه با صدای زیر و الگوی خواب مختل شده است. مادر وی در دوران بارداری هروئین مصرف می کرده است. به همه داروهای زیر در درمان علائم فوق اشاره شده است، <u>بجز</u> :
الف	کلرپرومازین
ب	دiazepam
ج	فنوباربیتال
د	کلونیدین
منبع:	

۱۴	همه ویژگی‌های فیزیکی زیر جزو فنوتیپ تیپیک سندرم ایکس شکننده (Fragile X syndrome) بشمار می‌روند، <u>بجز</u> :
الف	گوش‌های دراز
ب	صورت دراز و کشیده
ج	قد بلند
د	ماکرو ارکیدیسم بعد از بلوغ
منبع:	

۱۵	همه خصوصیات زیر جزو ویژگی‌های سندرم توبروز اسکروزیس توام با ناتوانی ذهنی بشمار می‌روند، <u>بجز</u> :
الف	adenoma sebaceum
ب	seizure
ج	ash-leaf spots
د	microcephaly
منبع:	

۱۶	براساس DSM-5 در مورد تشخیص و شدت ناتوانی ذهنی عبارت صحیح را مشخص نمائید؟
الف	برای تشخیص ناتوانی ذهنی نقص در عملکرد هوشی به تنهایی کافی است.
ب	نقص در عملکرد تطابقی معیار کافی برای تشخیص ناتوانی ذهنی است.
ج	برای تشخیص ناتوانی ذهنی نقص در عملکرد هوشی و تطابقی هر دو لازم است.
د	شدت ناتوانی ذهنی بوسیله میزان نقص در عملکرد هوشی تعیین می شود.
منبع:	

۱۷	در مداخلات فارماکولوژیک برای درمان علائم رفتاری و روانشناختی در کودکان مبتلا به ناتوانی ذهنی عبارت <u>غلط</u> را مشخص نمایید؟
الف	ریسپریدون در درمان رفتارهای تخریبی در کودکان با هوش متوسط به پایین (below-average) کمک کننده است.
ب	این کودکان در خطر بالاتر تاردیو دیسکینزی ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک قرار دارند.
ج	عوارض جانبی داروهای محرک در درمان ADHD در این کودکان معادل آن در کودکان با رشد طبیعی است.
د	شواهدی برای بهبود طولانی مدت در مهارت های اجتماعی و یادگیری بدنبال درمان با متیل فنیدیت در این کودکان وجود ندارد.
منبع:	

۱۸	پسر ۹ ساله ای بدلیل تکرار قسمتی از کلمات موقع صحبت کردن، کشیدن صداها و اجتناب از گفتن برخی از کلمات که بطور مزمن از چندین سال قبل ادامه دارد به درمانگاه ارجاع شده است. جهت ارزیابی از نظر اختلالات همبود، بررسی کدامیک از موارد زیر را بیشتر توصیه می کنید؟
الف	اختلال افسردگی اساسی
ب	اختلال طیف اوتیسم
ج	اختلال نقص توجه - بیش فعالی
د	اختلال اضطراب اجتماعی
منبع:	

۱۹	پسر بچه ۷ ساله ای جهت ارزیابی به درمانگاه آورده شده است. در شرح حال والدین، در دستیابی و به اشتراک گذاشتن احساسات و افکارش با همسالان و انجام مکالمه تعاملی مشکل دارد و یکطرفه صحبت می کند و متوجه شوخی و کنایه نمی شود. جهت تشخیص اختلال فوق و در بررسی تشخیص های افتراقی، کدامیک از ارزیابی های زیر اولویت <u>کمتری</u> دارد؟
الف	WISC (Wechsler)
ب	Conners scale
ج	Autism Diagnostic Interview -R
د	Social phobia and Anxiety inventory
منبع:	

۲۰	پسر بچه ۳ ساله ای جهت بررسی تاخیر در صحبت کردن به درمانگاه ارجاع شده است. در بررسی ها مشخص شده که او حدود ۵۰ کلمه را می تواند هدفمند بیان کند و جمله بندی جملات دو کلمه ای به تازگی شروع شده است. دستورات را متوجه می شود و برای بیان خواسته ها از ایما و اشاره استفاده می کند. ارزیابی شنوایی نرمال گزارش شده است. احتمال وجود همه علائم در این کودک هست، <u>بجز</u> :
الف	مشکل در تلفظ
ب	مشکل در رمزگشایی
ج	مشکل در نگهداری واژه های جدید
د	مشکل در کاربرد درست زمان
منبع:	

۲۱	کودکی از نظر تکامل غیر کلامی می تواند با عوض کردن پاهای خود از پله ها بالا برود، بر روی یک پا لی لی کند، اجسام آشنا را طبقه بندی کند و بازی نقش دار انجام دهد. با توجه به مرحله تکاملی این کودک، کدامیک از توانایی های کلامی زیر را از وی انتظار داریم؟
الف	استفاده از حروف ربط بین دو جمله (اما، اگر)
ب	استفاده از حروف اضافه مربوط به زمان (قبل، بعد)
ج	بحث کردن در مورد احساسات
د	استفاده از تمام اجزا یک جمله حین صحبت کردن
منبع:	

۲۲	در تشخیص افتراقی اختلالات زبان در همه اختلالات زیر articulation مشکل دارد، <u>بجز</u> :
الف	intellectual disability
ب	autism spectrum disorder
ج	selective mutism
د	expressive language deficit
منبع:	

۲۳	دختر ۲ ساله‌ای با تاخیر زبانی جهت ارزیابی به درمانگاه روانپزشکی اطفال ارجاع داده شده است. در بررسی انجام شده مشخص می‌شود که وی قادر به تکلم هیچ کلمه‌ای نبوده، به دستورات ساده پاسخ نمی‌دهد، ولی منظور خود را با استفاده از اشاره یا نشان دادن بیان می‌کند. ارزیابی شنوایی نرمال است و رفتار یا حرکات کلیشه‌ای در وی وجود ندارد. با توجه به تشخیص، احتمال کدامیک از اختلالات زیر در بستگان وی می‌تواند بیشتر از جمعیت عمومی باشد؟
الف	اختلال طیف اوتیسم
ب	اختلال نقص توجه - بیش فعالی
ج	اختلال تیک
د	اختلال خواندن
منبع:	

۲۴	در بررسی کلامی پسر ۵ ساله مشخص می‌شود که او به جای واژه "کتاب" از "کتا" و به جای "میز" از "می" و موارد متعددی نظیر این مثال‌ها استفاده می‌کند. در درمان وی کدامیک از موارد زیر مناسب‌تر است؟
الف	درخواست از کودک برای خود-اصلاحی
ب	تولید صوت مشکل دار توسط کودک و پسخوراند فوری از سوی درمانگر
ج	تمرین هدایت شده روی اصوات خاص
د	تمرینات مربوط به بلع
منبع:	

۲۵	پدری به دخترش می‌گوید "من خیلی تشنه هستم" و دختر پس از شنیدن جمله پدر، برای وی یک لیوان آب می‌آورد. حداقل سن دختر را چند سال ارزیابی می‌کنید؟
الف	۴
ب	۶
ج	۸
د	۱۰
منبع:	

۲۶	کدام یک از خصوصیات زیر در کودکان با اختلال دلبستگی مهار گسیخته در مقایسه با نوع واکنشی، شاخص تر است؟	
الف	emotionally withdrawn responses toward adult caregivers	
ب	minimal social responsiveness to other	
ج	inappropriate social relatedness with unfamiliar adult	
د	limited positive affect	
	منبع:	

۲۷	موارد زیر از خصوصیات بیماران مبتلا به اختلال اسپرگر است، <u>بجز</u> :	
الف	Visible awkwardness	
ب	Inappropriate affect	
ج	Odd posture	
د	Poor coordination	
	منبع:	

۲۸	کدامیک از موارد زیر از مشخصات اختلال اسپرگر است؟	
الف	Clumsiness	
ب	Aggression	
ج	Self-injurious behavior	
د	withdrawal	
	منبع:	

۲۹	در کدامیک از اختلالات زیر سن شروع دیرتر و اختلال عملکرد <u>کمتر</u> است؟	
الف	Autistic disorder	
ب	Rett's disorder	
ج	Disintegrative disorder	
د	Asperger disorder	
	منبع:	

۳۰	کدامیک از داروهای زیر مورد تایید FDA در درمان اوتیسم است؟	
الف	Aripiprazole	
ب	Olanzapine	
ج	Quetiapine	
د	Trifluoperazine	
	منبع:	

۳۱	در اختلال طیف اوتیسم کدام دسته از علایم با درمان های رفتاری بهبودی کمتری نشان می دهند؟	
الف	Ritualistic behaviors	
ب	Language development	
ج	Aggressive behaviors	
د	Social development	
	منبع:	

۳۲	کدامیک از موارد زیر از مشخصات Social Communication Disorder محسوب می شود؟	
الف	وجود رفتارهای کلیشه ای یا تکراری	
ب	فقدان هرگونه تاخیر یا نقص تکلم	
ج	شیوع بالاتر در بستگان مبتلایان به اوتیسم	
د	برقراری ارتباطات عادی با دیگران	
	منبع:	

۳۳	در کدامیک از موارد زیر ابتلای پسران بنحو قابل ملاحظه ای بیشتر از دختران است؟	
الف	Autistic Spectrum disorder	
ب	Mood disorders	
ج	Language disorders	
د	Childhood-onset schizophrenia	
	منبع:	

*	
۳۴	همه موارد زیر برای تشخیص ADHD صحیح است، بجز:
الف	وجود علایم نقص توجه برای تشخیص کافی است
ب	وجود علایم پرتحرکی برای تشخیص کافی است
ج	علایم رفتاری باید حداقل در دو موقعیت وجود داشته باشد
د	وجود علایم تکانشی برای تشخیص کافی است
منبع:	

*	
۳۵	اولین علامتی که در اختلال بیش فعالی نقص توجه بهبود می‌یابد، کدام است؟
الف	Hyperactivity
ب	Distractibility
ج	Learning difficulties
د	Impulsivity
منبع:	

*	
۳۶	در درمان اختلال بیش فعالی بزرگسالان کدامیک از موارد زیر مورد تایید FDA است؟
الف	Long acting stimulants
ب	Methyl phenidate
ج	Dexedrine
د	Clonidine
منبع:	

*	
۳۷	درمان ADHD در شرایطی که بیمار سابقه اختلال تیک شدید داشته و علایم بهنگام غروب و شب تشدید می‌شود، با کدامیک از داروهای زیر مناسب‌تر است؟
الف	Methylphenidate
ب	Dexedrine
ج	Bupropion
د	Clonidine
منبع:	

		*
کدامیک از موارد زیر در اختلال بیش فعالی نقص توجه شایع تر گزارش شده است؟		۳۸
Hyperactivity	الف	
Inattention	ب	
Distractibility	ج	
Impulsivity	د	
		منبع:

		*
کدامیک از اختلالات یادگیری شایع تر است؟		۳۹
Reading disorder	الف	
Mathematics disorder	ب	
Disorder of written expression	ج	
Learning disorder NOS	د	
		منبع:

		*
Dyslexia معادل کدامیک از اختلالات زیر است؟		۴۰
Disorder of written expression	الف	
Reading disorder	ب	
Mathematics disorder	ج	
Learning disorder NOS	د	
		منبع:

		*
کدامیک از تست‌های زیر در تشخیص اختلال یادگیری بکار می رود؟		۴۱
WISC	الف	
WOODCOCK-JOHNSON	ب	
WMS-III	ج	
WPPSI	د	
		منبع:

		*
Articulation disorder در کدام مورد شایع است؟		۴۲
Autistic disorder	الف	
Mathematics disorder	ب	
Language disorder	ج	
Disorder of written expression	د	
		منبع:

		*
در خصوص نقش فاکتورهای ژنتیک در ایجاد اختلال تورت همه موارد زیر صحیح است، <u>بجز</u> :		۴۳
اختلال تورت و تیک حرکتی یا صوتی مزمن در یک خانواده دیده می شود	الف	
پسران مادران مبتلا به تورت ریسک بالاتری برای ابتلا دارند	ب	
شواهدی بر انتقال اختلال به صورت اتوزومال غالب وجود دارد	ج	
بیش از نیمی از مبتلایان به اختلال تورت، اختلال وسواسی- جبری دارند	د	
		منبع:

		*
پسر ۸ ساله به همراه والدین به کلینیک مراجعه نموده است. نامبرده دچار علائم اختلال تیک صوتی و حرکتی از ۶ ماه پیش می باشد که در ۲ هفته اخیر به علت شروع امتحانات تشدید شده است. کدامیک از درمان های رفتاری زیر به عنوان خط اول درمان پیشنهاد می کنید؟		۴۴
وارونه سازی عادت	الف	
بیوفیدبک	ب	
شناختی رفتاری	ج	
مواجهه و پیشگیری پاسخ	د	
		منبع:

*	
۴۵	در کودک ۵ ساله با شک به اختلال هماهنگی تکاملی، نداشتن مهارت در کدامیک از فعالیتها مطرح کننده این اختلال می باشد؟
الف	با استفاده از قیچی بتواند شکلی را ببرد
ب	ناخن هایش را کوتاه نماید
ج	تکه های پازل را درست کنار هم قرار دهد
د	زیپ شلوارش را بالا بکشد
منبع:	

*	
۴۶	در اختلال هماهنگی تکاملی، همبودی با همه اختلالات زیر شایع است، <u>بجز</u> :
الف	اختلال بیش فعالی/نقص توجه
ب	اختلال طیف اوتیسم
ج	اختلال زبانی
د	اختلال خواندن
منبع:	

۴۷	پسر ۱۰ ساله ای با سابقه تیک های حرکتی و صوتی از حدود ۲ سال پیش توسط والدین به شما ارجاع شده است. عملکرد تحصیلی کودک مناسب است و خود کودک احساس ناراحتی و مشکلاتی در روابط اجتماعی به دلیل تیک ها نداشته است. در مورد این کودک اقدام مناسب کدام است؟
الف	آموزش روانشناختی به والدین در مورد تیک
ب	انجام مداخلات رفتاری
ج	تجویز ریسپریدون با دوز پایین
د	تجویز کلونیدین با دوز پایین
منبع:	

۴۸	کدام یک از موارد زیر شایع‌ترین اختلال همراه با early onset bipolar disorder در کودکان پره‌پوبرتال می‌باشد؟
الف	Attention deficit hyperactivity disorder
ب	Anxiety disorder
ج	Psychotic disorder
د	Substance use disorder
منبع:	

۴۹	کودک ۲ ساله توسط والدین به کلینیک آورده شده است و ذکر می‌کنند که نامبرده علاقه به خوردن مهر نماز، گچ دیوار و جویدن نوک مدادهای رنگی دارد. در آزمایشات انجام شده برای وی، موردی به نفع مسمومیت سرب مشاهده نشده است، همه موارد زیر در درمان اختلال موثر است، <u>بجز</u> :
الف	Positive reinforcement
ب	Aversive behavioral
ج	Behavioral shaping
د	Increased parental attention
منبع:	

۵۰	کودک سه ساله با مادرش به کلینیک آورده شده است. مادر ذکر می‌کند که کودک از غذا خوردن اجتناب می‌کند، فقط سیب‌زمینی سرخ کرده دوست دارد که آن را هم به مقدار کم می‌خورد، معمولاً بی‌اشتها و کم‌حوصله و بیقرار است. در معاینه وزن کودک زیر طیف طبیعی است، کدام یک از درمان‌های زیر برای کودک موثر است؟
الف	غذا دادن به وی جلوی تلویزیون
ب	محرومیت دادن به کودک برای افزایش همکاری وی در غذا خوردن
ج	تغذیه کودک در فواصل ۳-۴ ساعت در روز
د	بستری کردن کودک در بیمارستان
منبع:	

۵۱	رفتارهای rumination با کدام یک از اختلالات زیر در نوجوان ممکن است همراهی داشته باشد؟	
الف	افسردگی شدید	
ب	اضطراب شدید	
ج	وسواس اجبار شدید	
د	سایکوتیک شدید	
منبع:		

۵۲	مادری با دختر ۷ ساله اش به کلینیک روانپزشکی مراجعه نموده و ذکر می کند نامبرده در دو هفته اخیر بدنبال تولد برادر کوچکش ۴ تا ۵ بار رختخواب خود را خیس کرده است، کودک از بابت این رفتار ناراحت است و شبها برای پیشگیری از این اتفاق برای خوابیدن مقاومت دارد، کدامیک از موارد فوق با تشخیص اختلال انورزی منافات دارد؟	
الف	سن شروع شب ادراری	
ب	دفعات شب ادراری در هفته	
ج	ایجاد دیسترس برای کودک	
د	طول مدت شب ادراری	
منبع:		

۵۳	مادری با پسر ۵ ساله اش مراجعه نموده است و ذکر می کند که نامبرده در ۶ ماه گذشته بیشتر روزها دچار بی اختیاری مدفوع می شود. در معاینه کودک از ۳ سالگی یبوست داشته است و سایر معاینات نرمال می باشد. همه موارد زیر در درمان کودک توصیه می شود، <u>بجز</u> :	
الف	تجویز خوراکی ملین 1g/kg PEG هر روز	
ب	خروج توده های مدفوع از روده ها تحت بیهوشی عمومی	
ج	شروع مداخلات رفتاری شناختی	
د	محرومیت دادن به کودک بدنبال بی اختیاری مدفوع	
منبع:		

۵۴	کودک ۷ ساله به علت انورزی تحت درمان با اسپری دسموپرسین قرار گرفته است. همه موارد زیر درخصوص استفاده از این دارو صحیح است، <u>بجز</u> :
الف	کاهش انورزی با میزان ۹۰-۱۰ موارد با این دارو اتفاق می افتد
ب	احتمال برگشت اختلال پس از قطع دارو وجود دارد
ج	احتقان و خونریزی از بینی از عوارض داروست
د	تشنج هیپرناترمیک خطرناک ترین عارضه جانبی دارو می باشد
منبع:	

۵۵	نوجوان ۱۳ ساله‌ای بدنبال ربوده شدن و مورد rape قرار گرفتن دچار علائم اضطرابی، بدخواهی، ناتوانی برای تمرکز شده است در مصاحبه، از ترس اینکه بزودی می‌میرد بسیار نگران است. (After that he expect to die young) این علامت چه نام دارد؟
الف	psychological amnesia
ب	psychological numbing
ج	sense of foreshortened future
د	exaggerated startle reaction
منبع:	

۵۶	همه موارد زیر بعنوان فاکتورهای بیولوژیکال در کودکان با PTSD شناخته شده است، <u>بجز</u> :
الف	memory deficits
ب	smaller corpus callosum
ج	lower intelligence quotient
د	decreased hippocampal volume
منبع:	

۵۷	Childhood PTSD با افزایش میزان همه اختلالات زیر همراه است، <u>بجز</u> :	
الف	افسردگی	
ب	اضطراب	
ج	سایکوز	
د	مصرف مواد	
منبع:		

۵۸	در درمان TFEBT برای کودکان PTSD در یکی از جلسات داستان اتفاق تروماتیک و پیامدهای آن توسط کودک تحت حمایت درمانگر، عنوان می شود و از تکنیک های هنر، خلاقیت و کلمات استفاده می شود. نام این جلسه درمانی کدام است؟	
الف	Affective expression	
ب	Mastery of trauma reminder	
ج	Cognitive coping and processing	
د	Trauma narrative	
منبع:		

۵۹	کودک ۷ ساله ای بنا به اظهار والدین معمولاً هر روز یک بار دچار حملات پرخاشگری می شود. معمولاً در بین حملات نیز عصبانی می باشد. این علائم از حدود ۳ سالگی وجود داشته است. کدامیک از تشخیص های زیر براساس DSM-5 جهت وی مطرح است؟	
الف	Bipolar Disorder	
ب	Attention Deficit Hyperactivity Disorder	
ج	Conduct Disorder	
د	Disruptive Mood Dysregulation Disorder	
منبع:		

۶۰	کدامیک از علائم اختلال نافرمانی - مقابله ای بیش از همه پیش‌بینی کننده اختلالات روانپزشکی در آینده می‌باشد؟	
	Irritability	الف
	Negativism	ب
	Disobedience	ج
	Violation of the rights of other	د
	منبع:	

۶۱	همه ویژگی‌های زیر جزء مهم‌ترین عوامل خطری است که اختلال سلوک را پیش‌بینی می‌کند، <u>بجز</u> :	
	Impulsivity	الف
	Depression	ب
	Neglect	ج
	Low IQ	د
	منبع:	

۶۲	کدامیک از یافته‌های بیولوژیک زیر در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده نشده است؟	
	افزایش فعالیت الکتریکی فرونتال	الف
	افزایش فعالیت سیستم نورآدرنرژیک	ب
	افزایش سروتونین پلاسما	ج
	کاهش حجم ماده خاکستری در آمیگدال چپ	د
	منبع:	

۶۳	پسر ۱۱ ساله به همراه والدین با علائم افسردگی خفیف مراجعه نموده است. نامبرده افت عملکرد واضحی ندارد. کدامیک از درمان‌های زیر در ابتدا برای وی پیشنهاد می‌کنید؟	
الف	روان‌درمانی شناختی رفتاری	
ب	دارو همراه درمان شناختی رفتاری	
ج	مداخلات حمایتی و سایکواجوکیشن	
د	روان‌درمانی بین فردی	
منبع:		

*		
۶۴	کدامیک از علائم زیر در افسردگی قبل از بلوغ نسبت به افسردگی نوجوانی با فرکانس بیشتری دیده می‌شود؟	
الف	somatic complaint	
ب	hopelessness	
ج	psychomotor retardation	
د	delusions	
منبع:		

*		
۶۵	نوجوان ۱۶ ساله‌ای با سابقه قبلی اختلال دوقطبی در یکسال پیش، در حال حاضر با علائم افسردگی مراجعه نموده است. تجویز کدامیک از داروهای زیر برای وی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟	
الف	لاموتریزین	
ب	دی‌والپروئکس	
ج	ریسپریدون	
د	کوئتیاپین	
منبع:		

*		
۶۶	Night Eating Syndrome دربرگیرنده خصوصیات زیر است، <u>بجز</u> :	
الف	نداشتن اشتها در طول روز	
ب	بی‌خوابی	
ج	وجود نشانه‌ها برای حداقل ۶ ماه	
د	خلق افسرده در ساعات شبانه	
منبع:		

*	
۶۷	تمام یافته‌های بیولوژیک زیر در کودکان و نوجوانان مضطرب دیده می‌شود، بجز:
الف	Higher Resting Heart Rate
ب	Elevated Salivary Cortisol
ج	Decreased Urinary Catecholamine
د	Greater Papillary Dilation During Cognitive Tasks
منبع:	

*	
۶۸	حداقل مدت لازم برای تشخیص Separation Anxiety Disorder چه مقدار است؟
الف	۴ هفته
ب	۸ هفته
ج	۶ ماه
د	یک سال
منبع:	

*	
۶۹	بر اساس مطالعه CAMS (Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study)، کدامیک از فاکتورهای زیر پیش‌بینی‌کننده بهبودی اضطراب در آینده می‌باشد؟
الف	سن پایین در شروع بیماری
ب	همراهی با افسردگی
ج	تشخیص در سنین بالاتر
د	شروع درمان در سن پایین‌تر
منبع:	

*	
۷۰	در کودک ۶ ساله‌ای که در موقعیت مدرسه صحبت نمی‌کند در حالی که با اعضای خانواده مشکلی در صحبت کردن ندارد، کدامیک از داروهای زیر ارجحیت دارد؟
الف	بوسپیرون
ب	پروپرانول
ج	فلوکستین
د	لورازپام
منبع:	

۷۱	بحران هویت معمولاً در چه سنی شروع می شود؟	
	الف	اواخر نوجوانی
	ب	اواخر کودکی
	ج	حدود ۱۳ سالگی
	د	حدود ۲۲ سالگی
	منبع:	

۷۲	تابلوی شایع رفتارهای وسواسی در اختلال وسواسی - جبری کودکان در همراهی با تیک، همه موارد زیر می باشد، بجز:	
	الف	Arranging
	ب	Counting
	ج	Ordering
	د	Cleaning
	منبع:	

۷۳	کدامیک از داروهای زیر در درمان OCD کودکان مورد تأیید FDA هنوز قرار نگرفته است؟	
	الف	سیتالوپرام
	ب	فلوکستین
	ج	کلومی پرامین
	د	فلوواکسامین
	منبع:	

۷۴	همه عوامل زیر در پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرنیای کودکی نقش دارد، بجز:	
	الف	شروع در سن پایین
	ب	کوتاهی دوره پسیکوز
	ج	تاخیر در رشد
	د	شروع تدریجی
	منبع:	

۷۵	کدامیک از علائم زیر در اسکیزوفرنیا با شروع در دوران کودکی در مقایسه با شروع بزرگسالی، <u>کمتر</u> مشاهده می‌شود؟	
الف	Loosening of Association	
ب	Auditory Hallucination	
ج	Poverty of Speech Content	
د	Illogical Thinking	
منبع:		

۷۶	در تشخیص افتراقی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و اسکیزوفرنیا در یک نوجوان ۱۶ ساله، وجود کدامیک از علائم زیر به نفع اسکیزوفرنیا می‌باشد؟	
الف	Blunted affect	
ب	Bizarre behavior	
ج	Ideas of reference	
د	Incoherence	
منبع:		

۷۷	کدامیک از موارد زیر در تشخیص‌های سوء مصرف مواد در DSM-5 وجود <u>ندارد</u> ؟	
الف	Substance dependence	
ب	Substance use	
ج	Substance intoxication	
د	Substance withdrawal	
منبع:		

۷۸	سندرم ترک ماری‌جوانا، چه مدت بعد از آخرین مصرف شروع می‌شود؟	
الف	۲ روز	
ب	۶ ساعت	
ج	۳ روز	
د	۲۴ ساعت	
منبع:		

۷۹	کدامیک از موارد زیر در سیستم طبقه‌بندی DSM-5 به عنوان Condition for further study در نظر گرفته شده است؟	
الف	Identity problem	
ب	Cannabis withdrawal	
ج	Academic problem	
د	Attenuated psychosis	
منبع:		

۸۰	دختر ۱۴ ساله‌ای با علائم مبهم شکمی در اورژانس بستری است. ارزیابی ارگانیک او منفی می باشد. در مشاوره روانپزشکی عنوان می کند که دو برادر ۲۰ و ۲۲ ساله او با تهدید در دو سال اخیر با او رابطه جنسی داشته‌اند. بیمار در چه مرحله‌ای از سوءرفتار جنسی قرار دارد؟	
الف	Engagement	
ب	Suppression	
ج	Secrecy	
د	Disclosure	
منبع:		

۸۱	بر اساس کارآزمایی‌های بالینی استفاده از یوگا در درمان همه موارد زیر در کودکان پیشنهاد شده است، <u>بجز</u> :	
الف	اختلالات خواب	
ب	مانیای حاد	
ج	افسردگی خفیف	
د	اختلال توجه	
منبع:		

۸۲	پسر ۱۴ ساله ای با علایم خلق گرفته، کناره گیری از دوستان و کم شدن انگیزه تحصیلی، پرخوابی و بی انرژی بودن از ماه اخیر، ارجاع شده است. براساس FDA کدام داروی زیر در درمان او مؤثرتر است؟	
	الف	نورتریپتیلین
	ب	اس سیتالوپرام
	ج	پاروکستین
	د	لیتیم
منبع:		

۸۳	تفاوت فارماکوکینتیک داروها در کودکان در مقایسه با بالغین شامل موارد زیر است، بجز:	
	الف	جذب گوارشی بیشتر
	ب	ظرفیت کبدی بیشتر
	ج	فیلتراسیون گلومرولی بالاتر
	د	میزان بافت چربی بیشتر
منبع:		

۸۴	تجویز کدام رده دارویی زیر می تواند باعث افزایش نمره وکسلر کودکان شود؟	
	الف	نوتروپیک ها
	ب	آنتی دپرسانت ها
	ج	استیمولانت ها
	د	آنتی سایکوتیک ها
منبع:		

۸۵	دختر ۱۷ ساله‌ای کلاس دوازدهم رشته تجربی که در چند هفته اخیر ۵ بار دچار عرق کردن ناگهانی، تپش قلب، احساس ترس از دیوانگی و سرگیجه، در مدرسه، بازار و خانه شده است. این علائم باعث شده است که با همراه از خانه خارج شود. مشکلات ارگانیک او رد شده است، مشکلی در مدرسه عنوان نشده اما مشکلاتی در روابط بین بیمار و والدینش وجود دارد. مداخلات درمانی او شامل موارد زیر است، <u>بجز</u> :
الف	درمان شناختی رفتاری بیمار
ب	تجویز فلوکستین
ج	تجویز کلرودیازپوکساید
د	جلسات سایکو اجوکیشن به خانواده
منبع:	

۸۶	هدف اولیه استراتژی‌های سایکوتراپی در کودک و نوجوان چیست؟
الف	تثبیت رابطه کاری با کودک و نوجوان
ب	برقراری راپورت درمانی با والدین
ج	کسب اطلاعات در مورد تفکر، درک و خلق کودک
د	ارتباط با معلم مدرسه و ارگان‌های اجتماعی
منبع:	

۸۷	"احساس تنهایی و بیگانگی از گروه همسالان در نوجوانان و کودکان با مشکل روانپزشکی" را با کدام فاکتور گروه درمانی می‌توان بهبود بخشید؟
الف	Universality
ب	Impaired Social Skills
ج	Hope
د	Altruism
منبع:	

*		۸۸
پسر ۱۴ ساله‌ای بعلت دزدی، آتش افروزی، خروج از خانه، نزاع و درگیری با پلیس ارجاع شده است، او در 2.5 سالگی توسط پدر ۵۷ ساله و مادر ۵۰ ساله به فرزندپذیری پذیرفته شده است. او از ابتدا علایم بیش فعالی/ نقص توجه و نافرمانی را داشته است. در دو سال اخیر مراجعات درمانی داشته اند که پسر از دریافت دارو و حضور در جلسات امتناع می‌کند. والدین عنوان می‌کنند توانایی مراقبت از او را ندارند. درمان انتخابی شما چیست؟		
الف	مصرف داروهای تزریقی	
ب	انتقال به مراکز روزانه	
ج	آموزش فرزندپروری به والدین	
د	انتقال به مرکز شبانه‌روزی	
منبع:		

*		۸۹
یافته‌های یک مطالعه اخیر در مورد استفاده از داروهای آنتی‌سایکوتیک و فرکانس مهار فیزیکی در درمان «رفتارهای اگرسو حاد در نوجوانان مراکز نگهداری» کدام صحیح است؟		
الف	مصرف آنتی‌سایکوتیک در دریافت کنندگان مهار فیزیکی کمتر بوده است.	
ب	اثر بخشی آنتی‌سایکوتیک‌ها در درمان اگرشن حاد در مراکز نگهداری مورد سؤال است.	
ج	دریافت کنندگان مهار فیزیکی با فرکانس زیاد، نیازی به دارو نداشتند.	
د	افرادی که دوز بالای آنتی‌سایکوتیک دریافت می‌کردند نیازی به مهار فیزیکی نداشتند.	
منبع:		

*		۹۰
کدام یک از موارد زیر جهت استفاده از مراکز روزانه مناسب می‌باشد؟		
الف	تلاش خودکشی	
ب	احتمال فرار	
ج	اختلال شناختی	
د	آتش افروزی	
منبع:		

		*
۹۱	ارزیابی Juvenile Competency فاکتورهای زیر را شامل می شود، <u>بجز</u> :	
الف	سن بالای دوازده سال	
ب	ارزیابی سطح عقلانی و کم توانی ذهنی	
ج	مرحله رشدی از نظر قضاوت - مسئولیت پذیری	
د	رشد جسمانی و بلوغ	
منبع:		

		*
۹۲	کودک ۷ ساله‌ای در هفته اخیر دچار علائم اضطراب، ترس، کابوس شبانه، زود گریه کردن، شکایت از سوزش ناحیه تناسلی، بی‌اشتهایی شده است و سعی دارد از مدرسه رفتن امتناع کند. کدام تشخیص احتمالی برایش مطرح است؟	
الف	Separation anxiety disorder	
ب	Major depression	
ج	Sexual abuse	
د	Physical abuse	
منبع:		

		*
۹۳	براساس انجمن روانپزشکان آمریکا (APA) اخذ رضایت برای افشاء اطلاعات محرمانه (به جز موارد خطر) از چه سنی می باشد؟	
الف	هشت سالگی	
ب	دوازده سالگی	
ج	چهارده سالگی	
د	هجده سالگی	
منبع:		

		*
براساس یک مطالعه تلاش خودکشی در کدام مورد قربانیان قلدری مدارس دو برابر سایر نوجوانان بوده است؟		۹۴
الف	سایبر Cyber	
ب	فیزیکی Physical	
ج	کلامی Verbal	
د	روابط Relational	
منبع:		

مشکلات طبی شایع در کودکان Foster Care در مقایسه با سایر کودکان شامل موارد زیر است، بجز:		۹۵
الف	مشکلات رشدی	
ب	بیماری های نورولوژیک	
ج	اختلالات کلامی	
د	مشکلات گوارشی	
منبع:		

کدام فاکتور زیر پیش آگهی بهتر فرزندخواندگی می باشد؟		۹۶
الف	فرزندخواندگی در سال های ابتدایی کودکی	
ب	طرد شدن توسط خواهر و برادرهای ناتنی	
ج	مدت اقامت طولانی تر در مرکز	
د	مشکلات بیشتر رفتاری کودک	
منبع:		

۹۷	دختر سه ساله ای توسط مربی مهد کودک بعثت کتک زدن و آزار و هل دادن سایر بچه ها که منجر به آسیب به کودکان شده ارجاع شده است. در بررسی کودک آثار کبودی و کتک خوردگی روی تنه کودک مشهود است. والدین از بد رفتاری و بی خوابی او شاکی هستند. مادر دارای پسر ۳ ماهه کولیکی و بی خواب است و با همسر معتادش درگیر می باشد. توصیه های درمانی شامل همه موارد زیر است، <u>بجز</u> :
الف	برنامه رفتاری کنترل قشقرق برای کودک
ب	ارجاع پدر جهت ترک مواد
ج	انتقال کودک به منزل مادر بزرگ
د	مشاوره والدین جهت اصلاح والدگری
منبع:	

۹۸	اختلالات روانپزشکی همراه با تروریسم شامل موارد زیر است، <u>بجز</u> :
الف	حملات تجزیه ای
ب	مانیای حاد
ج	سوء مصرف مواد
د	سوماتیزاسیون
منبع:	

۹۹	مادر ۲۵ ساله ای از پسر ۷ ساله اش انتظار دارد کاملاً منظم بوده و کارهای نظافت خانه را انجام دهد و در صورت امتناع کودک او را مورد شتمات و سرزنش قرار می دهد. این چه نوع سوء رفتاری محسوب می شود؟
الف	Educational
ب	Psychological
ج	Physical
د	Ritual
منبع:	

۱۰۰	کدامیک از داروهای زیر در درمان Binge Eating Disorder کاربرد ندارد؟	
الف	Desipramine	
ب	Aripiperazole	
ج	Fluoxetine	
د	Topiramate	
منبع:		

۱۰۱	اخلاق	درخصوص اتانازی غیرفعال (Passive) کدام جمله صحیح است؟
الف	جلوگیری از اقدامی که می تواند باعث طولانی شدن حیات فرد شود.	
ب	مداخله مستقیم به منظور خاتمه حیات فرد.	
ج	اتانازی که فرد از آن مطلع نبوده و صراحتاً و با هوشیاری آن را تایید نکرده است.	
د	اتانازی که هوشیارانه و با صراحت به وسیله فرد تایید شده است.	
منبع:		

۱۰۲	اخلاق	درخصوص تصمیم گیری برای امور درمانی در سنین کودکان دبستانی کدام گزینه صحیح ترین است؟
الف	به وسیله والدین کودکان بر مبنای مصلحت کودک.	
ب	به وسیله خود کودک با توجه به توانایی درک و تحلیل مناسب اطلاعات و کسب ارزش های پایدار.	
ج	تصمیم گیری به وسیله والدین، و در صورت ضرورت با کودک هم هماهنگ شود.	
د	تصمیم گیری توسط خود کودک با مشورت والدین.	
منبع:		

پاسخ نامه پذیرش دستیار فوق تخصص (روانپزشکی کودک و نوجوان)

۱	ج	۵۱	ب	۱۰۱	الف	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱	
۲	ج	۵۲	د	۱۰۲	ج	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲	
۳	ج	۵۳	د	۱۰۳		۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳	
۴	ب	۵۴	د	۱۰۴		۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴	
۵	ج	۵۵	ج	۱۰۵		۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵	
۶	ج	۵۶	د	۱۰۶		۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶	
۷	د	۵۷	ج	۱۰۷		۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷	
۸	ج	۵۸	د	۱۰۸		۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸	
۹	ج	۵۹	د	۱۰۹		۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹	
۱۰	ج	۶۰	الف	۱۱۰		۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰	
۱۱	ب	۶۱	ب	۱۱۱		۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱	
۱۲	الف	۶۲	ب	۱۱۲		۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲	
۱۳	د	۶۳	ج	۱۱۳		۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳	
۱۴	ج	۶۴	الف	۱۱۴		۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴	
۱۵	د	۶۵	الف	۱۱۵		۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵	
۱۶	ج	۶۶	ج	۱۱۶		۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶	
۱۷	ج	۶۷	ج	۱۱۷		۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷	
۱۸	د	۶۸	الف	۱۱۸		۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸	
۱۹	ب	۶۹	د	۱۱۹		۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹	
۲۰	ب	۷۰	ج	۱۲۰		۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰	
۲۱	الف	۷۱	الف	۱۲۱		۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱	
۲۲	ج	۷۲	د	۱۲۲		۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲	
۲۳	د	۷۳	الف	۱۲۳		۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳	
۲۴	ج	۷۴	ب	۱۲۴		۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴	
۲۵	ج	۷۵	ج	۱۲۵		۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵	
۲۶	ج	۷۶	د	۱۲۶		۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶	
۲۷	ب	۷۷	الف	۱۲۷		۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷	
۲۸	الف	۷۸	د	۱۲۸		۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸	
۲۹	د	۷۹	د	۱۲۹		۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹	
۳۰	الف	۸۰	د	۱۳۰		۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰	
۳۱	الف	۸۱	ب	۱۳۱		۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱	
۳۲	ج	۸۲	ب	۱۳۲		۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲	
۳۳	الف	۸۳	الف	۱۳۳		۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳	
۳۴	د	۸۴	ج	۱۳۴		۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴	
۳۵	الف	۸۵	ج	۱۳۵		۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵	
۳۶	الف	۸۶	الف	۱۳۶		۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶	
۳۷	د	۸۷	الف	۱۳۷		۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷	
۳۸	الف	۸۸	د	۱۳۸		۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸	
۳۹	الف	۸۹	ب	۱۳۹		۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹	
۴۰	ب	۹۰	ج	۱۴۰		۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰	
۴۱	ب	۹۱	د	۱۴۱		۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱	
۴۲	ج	۹۲	ج	۱۴۲		۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲	
۴۳	د	۹۳	ب	۱۴۳		۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳	
۴۴	الف	۹۴	الف	۱۴۴		۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴	
۴۵	د	۹۵	د	۱۴۵		۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵	
۴۶	ب	۹۶	الف	۱۴۶		۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶	
۴۷	الف	۹۷	ج	۱۴۷		۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷	
۴۸	الف	۹۸	ب	۱۴۸		۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸	
۴۹	ب	۹۹	ب	۱۴۹		۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹	
۵۰	ج	۱۰۰	ب	۱۵۰		۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	