

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

سراسری تجربی ۹۸

مجموع جواب های معادله مثلثاتی $4 \sin x \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = 1$ ، کدام است ؟ $\Delta\pi$ (۴) 4π (۳) 3π (۲) $\frac{5\pi}{2}$ (۱)

$$4 \sin x (-\cos x) = 1 \longrightarrow -4(\sin x \cos x) = 1 \longrightarrow -4\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) = 1$$

$$\sin 2x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \longrightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \left(-\frac{\pi}{6}\right) \longrightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{12} \\ 2x = 2k\pi + \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) \longrightarrow x = k\pi + \frac{7\pi}{12} \end{cases}$$

$$\frac{11\pi}{12} + \frac{23\pi}{12} + \frac{7\pi}{12} + \frac{19\pi}{12} = \frac{60\pi}{12} = 5\pi$$

سراسری تجربی ۹۸ - خارج از کشور

جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos 3x + \cos x = 0$ ، با شرط $\cos x \neq 0$ ، کدام است ؟ $k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۴) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۳) $k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۲) $\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$ (۱)

$$\cos 3x = -\cos x \longrightarrow \cos 3x = \cos(\pi - x) \longrightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + (\pi - x) \\ 3x = 2k\pi - (\pi - x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x = 2k\pi + \pi \\ 2x = 2k\pi - \pi \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \\ x = k\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

سراسری تجربی ۹۷

جواب کلی معادله مثلثاتی $\tan x \tan 3x = 1$ ، کدام است ؟ $\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8}$ (۴) $\frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}$ (۳) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ (۲) $\frac{k\pi}{4}$ (۱)

روش اول:

$$\tan x \cdot \tan 3x = 1 \longrightarrow \tan 3x = \frac{1}{\tan x} = \cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$3x = k\pi + \frac{\pi}{2} - x \longrightarrow 4x = k\pi + \frac{\pi}{2} \longrightarrow x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8}$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

روش دوم:

$$\tan x \cdot \tan 3x = 1 \longrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin 3x}{\cos 3x} = 1 \longrightarrow \sin x \cdot \sin 3x = \cos x \cdot \cos 3x$$

$$\cos x \cdot \cos 3x - \sin x \cdot \sin 3x = 0 \longrightarrow \cos(x + 3x) = 0 \longrightarrow \cos 4x = 0$$

$$4x = k\pi + \frac{\pi}{2} \longrightarrow x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8}$$

سراسری تجربی ۹۷ - خارج از کشور

$$\text{جواب کلی معادله مثلثاتی } \frac{\sin 3x + \sin 2x}{1 + \cos x} = 0, \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{(2k+1)\pi}{5} \quad (۴)$$

$$k\pi + \frac{\pi}{5} \quad (۳)$$

$$\frac{2k\pi}{5} \quad (۲)$$

$$\frac{k\pi}{5} \quad (۱)$$

$$\frac{\sin 3x + \sin 2x}{1 + \cos x} = 0 \xrightarrow[\substack{\cos x \neq -1 \\ x \neq 2k\pi + \pi}]{} \sin 3x + \sin 2x = 0 \longrightarrow \sin 3x = -\sin 2x$$

$$\sin 3x = \sin(-2x) \longrightarrow 3x = 2k\pi + (-2x) \longrightarrow 5x = 2k\pi \longrightarrow x = \frac{2k\pi}{5}$$

$$3x = 2k\pi + \pi - (-2x) \longrightarrow x = 2k\pi + \pi \longrightarrow \text{unacceptable}$$

سراسری تجربی ۹۶

$$\text{جواب کلی معادله مثلثاتی } \cos 2x + 2\cos^2 x = 0, \text{ کدام است؟}$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (۴)$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۲)$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (۲)$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۱)$$

روش اوّل:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\cos 2x + 2\cos^2 x = 0 \longrightarrow 2\cos^2 x - 1 + 2\cos^2 x = 0 \longrightarrow 4\cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{4} \longrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \longrightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \\ \cos^2 x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \longrightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \end{cases} \cup x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

تهیّه و تنظیم: سید علی موسوی

روش دوم: هر گاه دو طرف تساوی، دو نسبت هم نام و مربع کامل باشند، داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \sin^2 x = \sin^2 \alpha \\ \cos^2 x = \cos^2 \alpha \\ \tan^2 x = \tan^2 \alpha \end{array} \right\} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = k\pi \pm \alpha \quad \cos^2 x = \frac{1}{4} = \cos^2 \frac{\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

نکته: ک.م. چند کسر برابر است با نسبت ک.م.م صورت‌ها به ب.م.م مخرج‌ها

سراسری تجربی ۹۶ - خارج از کشور

مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\sin 2x + \cos(\frac{\pi}{2} - x) = 0$ ، در بازه $[0, 2\pi]$ ، کدام است؟**۵π (۴)**

$\frac{9\pi}{2} (3)$

$4\pi (2)$

$\frac{14\pi}{3} (1)$

۶

$2\sin x \cdot \cos x + \sin x = 0 \rightarrow \sin x(2\cos x + 1) = 0$

$\sin x = 0 \rightarrow x = k\pi \rightarrow x = 0, \pi, 2\pi$

$2\cos x + 1 = 0 \rightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = \cos \frac{2\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$

$x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$

$\pi + 2\pi + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = 5\pi$

در اینجا نیازی برای بدست آوردن جواب‌های کلی معادله مثلثاتی نیست، فقط کافی است جواب‌ها را در فاصله داده شده، مشخص کنیم.

$\sin 2x + \cos(\frac{\pi}{2} - x) = 0 \rightarrow \sin 2x + \sin x = 0 \rightarrow \sin 2x = -\sin x$

$$\sin 2x = \sin(-x) \rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + (-x) \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \\ 2x = 2k\pi + \pi + x \rightarrow x = (2k+1)\pi \end{cases}$$

سراسری تجربی ۹۵

جواب کلی معادله مثلثاتی $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$ ، کدام است؟

۷

$k\pi - \frac{\pi}{3} (4)$

$2k\pi \pm \frac{5\pi}{6} (3)$

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} (2)$

$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} (1)$

روش اول:

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

$$2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x = 0 \longrightarrow 2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0 \longrightarrow \Delta = 25$$

$$\cos x = \frac{3+5}{4} = 2 \notin [-1, 1]$$

$$\cos x = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = \cos \frac{2\pi}{3} \longrightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

روش دوم:

$$\xrightarrow{k=0} x = -\frac{\pi}{3} \longrightarrow 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \neq 0$$

$$\xrightarrow{k=0} x = \frac{2\pi}{3} \longrightarrow 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0 \longrightarrow (1) \rightarrow \text{True}$$

سراسری تجربی ۹۵ - خارج از کشور

جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos(x + \frac{\pi}{4})\cos(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}$ کدام است؟

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (1)$$

روش اول:

$$\cos(x + \frac{\pi}{4})\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4} \longrightarrow \frac{1}{2}\sin 2(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4} \longrightarrow \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \longrightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \xrightarrow{\div 2} x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

روش دوم:

$$\frac{1}{2}[\cos(x + \frac{\pi}{4} + x - \frac{\pi}{4}) + \cos(x + \frac{\pi}{4} - x + \frac{\pi}{4})] = \frac{1}{4}$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \longrightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \xrightarrow{\div 2} x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

سراسری تجربی ۹۴

جواب کلی معادله مثلثاتی $2\cos^2 x + 2\sin x \cos x = 1$ ، به کدام صورت است؟

$$k\pi + \frac{\pi}{8} \quad (4)$$

$$k\pi - \frac{\pi}{8} \quad (3)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \quad (2)$$

$$\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \quad (1)$$

$$2\cos^2 x + 2\sin x \cos x = 1 \longrightarrow 2\cos^2 x - 1 = -2\sin x \cos x \xrightarrow{\cos 2x = 2\cos^2 x - 1}$$

$$\cos 2x = -\sin 2x \xrightarrow{\div \cos 2x} \tan 2x = -1 = \tan(-\frac{\pi}{4}) \longrightarrow 2x = k\pi - \frac{\pi}{4} \longrightarrow x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$$

۸

۹

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

سراسری تجربی ۹۴ - خارج از کشور

جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos 3x + \cos x = 0$ ، با شرط $\cos x \neq 0$ ، کدام است؟

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۴)

$k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ (۲)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۱)

$$\cos 3x + \cos x = 0 \xrightarrow{\cos x \neq 0} \cos 3x = -\cos x \longrightarrow \cos 3x = \cos(\pi - x)$$

۱۰

$$3x = 2k\pi \pm (\pi - x) \longrightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + \pi - x \longrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \xrightarrow{\cos x \neq 0} \text{True} \\ 3x = 2k\pi - \pi + x \longrightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{2} \xrightarrow{\cos x \neq 0} \text{false} \end{cases}$$

سراسری تجربی ۹۳

در معادله مثلثاتی $\sin 2x(\sin x + \cos x) = \cos 2x(\cos x - \sin x)$ در بازه $[0, \pi]$ ، مجموع تمام جواب ها در بازه کدام است؟

$\frac{7\pi}{4}$ (۴)

$\frac{3\pi}{2}$ (۳)

$\frac{5\pi}{4}$ (۲)

$\frac{3\pi}{4}$ (۱)

۱۱

$\sin 2x(\sin x + \cos x) = \cos 2x(\cos x - \sin x)$

$\sin 2x \cdot \sin x + \sin 2x \cdot \cos x = \cos 2x \cdot \cos x - \cos 2x \cdot \sin x$

$\sin 2x \cdot \cos x + \cos 2x \cdot \sin x = \cos 2x \cdot \cos x - \sin 2x \cdot \sin x$

$$\sin 3x = \cos 3x \xrightarrow{\div \cos 3x} \tan 3x = 1 = \tan \frac{\pi}{4} \longrightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\xrightarrow{\div 3} x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \xrightarrow[k=0,1,2]{} \frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} + \frac{9\pi}{12} = \frac{5\pi}{4}$$

سراسری تجربی ۹۳ - خارج از کشور

جواب کلی معادله مثلثاتی $1 = \frac{\sin 3x}{\cos(\frac{3\pi}{2} + x)}$ ، به کدام صورت است؟

۱۲

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{3\pi}{4}$ (۳)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۲)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۱)

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} = 1 \xrightarrow{\sin x \neq 0} \sin 3x = \sin x \longrightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + x \longrightarrow x = k\pi \longrightarrow \text{false} \\ 3x = 2k\pi + \pi - x \longrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

بسمه تعالیٰ

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

سراسری تجربی ۹۲

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 \frac{5\pi}{4}$ به کدام صورت است؟

۱۳

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۲)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۱)

$(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x) = \sin^2(\pi + \frac{\pi}{4})$

$\cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = \cos \frac{2\pi}{3} \rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$

سراسری تجربی ۹۲ - خارج از کشور

مجموع تمام جواب‌های معادلهٔ مثلثاتی $\sin \Delta x + \sin 4x = 1 + \cos \pi$ در بازهٔ $[0, 2\pi]$ ، کدام است؟

۱۱π (۴)

۱۰π (۳)

۹π (۲)

۸π (۱)

$\sin \Delta x + \sin 4x = 1 + \cos \pi \rightarrow \sin \Delta x + \sin 4x = 0 \rightarrow \sin \Delta x = -\sin 4x = \sin(-4x)$

$$\begin{cases} \Delta x = 2k\pi - 4x \rightarrow x = \frac{2k\pi}{9} \rightarrow x = \frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}, \frac{6\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}, \frac{12\pi}{9}, \frac{14\pi}{9}, \frac{16\pi}{9}, \frac{18\pi}{9} \\ \Delta x = 2k\pi + \pi + 4x \rightarrow x = 2k\pi + \pi \rightarrow x = \pi \end{cases}$$

سراسری تجربی ۹۱

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\sin^2 x - \cos^2 x = \sin(\frac{3\pi}{2} + x)$ به کدام صورت است؟

$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۳)

$\frac{2k\pi}{3}$ (۲)

$\frac{k\pi}{3}$ (۱)

روش اول:

$1 - \cos^2 x - \cos^2 x = -\cos x \rightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$

$$\xrightarrow{a+b+c=0} \begin{cases} \cos x = 1 \rightarrow x = 2k\pi \\ \cos x = \frac{c}{a} = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \end{cases} \xrightarrow{\cup} x = \frac{2k\pi}{3}$$

روش دوم:

$\sin^2 x - \cos^2 x = \sin(\frac{3\pi}{2} + x) \rightarrow -\cos 2x = -\cos x$

$$\cos 2x = \cos x \rightarrow 2x = 2k\pi \pm x \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi \\ x = \frac{2k\pi}{3} \end{cases} \xrightarrow{\cup} x = \frac{2k\pi}{3}$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

روش سوم:

$$\cos 2x = \cos x \xrightarrow{k=1} x = \frac{\pi}{3} \xrightarrow{k=\infty} \cos \frac{2\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2}} (1), (3) \rightarrow \text{false}$$

$$\xrightarrow{k=2} x = 2\pi \xrightarrow{} \cos 4\pi = \cos 2\pi \xrightarrow{-1 = -1} (4) \rightarrow \text{false}$$

سراسری تجربی ۹۱ - خارج از کشور

$$\text{جواب کلی معادله مثلثاتی } \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \sqrt{3}, \text{ به کدام صورت است؟}$$

$$k\pi - \frac{\pi}{6} \quad (4)$$

$$k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \quad (2)$$

$$\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \quad (1)$$

روش اول:

$$\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \sqrt{3} \xrightarrow{} \tan 2x = \tan \frac{\pi}{3} \xrightarrow{} 2x = k\pi + \frac{\pi}{3} \xrightarrow{\div 2} x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$$

روش دوم:

$$\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \sqrt{3} \xrightarrow{} \frac{\frac{2\sin x}{\cos x}}{1-\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \sqrt{3} \xrightarrow{} \frac{2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \sqrt{3} \xrightarrow{} \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \sqrt{3}$$

$$\tan 2x = \sqrt{3} \xrightarrow{} 2x = k\pi + \frac{\pi}{3} \xrightarrow{} x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$$

سراسری تجربی ۹۰

$$\text{جواب کلی معادله مثلثاتی } \sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) - 2\sin(\pi-x) + 1 = 0, \text{ کدام است؟}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

$$2k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$2k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (2)$$

$$2k\pi - \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) - 2\sin(\pi-x) + 1 = 0 \xrightarrow{} (-\sin x)(-\sin x) - 2\sin x + 1 = 0$$

$$\sin^2 x - 2\sin x + 1 = 0 \xrightarrow{} (\sin x - 1)^2 = 0 \xrightarrow{} \sin x = 1 \xrightarrow{} x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

سراسری تجربی ۹۰ - خارج از کشور

$$\text{جواب کلی معادله مثلثاتی } (\sin x - \tan x) \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \cos \frac{4\pi}{3}, \text{ کدام است؟}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (4)$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (3)$$

$$k\pi + \frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$k\pi - \frac{\pi}{6} \quad (1)$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم : سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

روش اول :

$$(\sin x - \tan x) \tan\left(\frac{4\pi}{3} - x\right) = \cos \frac{4\pi}{3} \xrightarrow{\cos \frac{4\pi}{3} = \cos(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}}$$

$$(\sin x - \tan x) \cot x = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\cos x = \frac{1}{2}} \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \xrightarrow{x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}}$$

روش دوم :

$$(\sin x - \tan x) \cot x = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\cos x - 1 = -\frac{1}{2}} \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} \xrightarrow{\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}} (1), (4) \rightarrow \text{false}$$

$$x = -\frac{\pi}{3} \xrightarrow{\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}} (2) \rightarrow \text{false}$$

سراسری تجربی ۸۹

جواب کلی معادله مثلثاتی $\tan(x + \frac{\pi}{4}) + \tan(x - \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{3}$ ، به کدام صورت است ؟

$$k\pi + \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

$$k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \quad (1)$$

روش اول :

$$\frac{\tan x + 1}{1 - \tan x} + \frac{\tan x - 1}{1 + \tan x} = 2\sqrt{3} \xrightarrow{\frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x} = 2\sqrt{3}}$$

$$2\tan 2x = 2\sqrt{3} \xrightarrow{\tan 2x = \sqrt{3}} \tan \frac{\pi}{3} = \tan \frac{\pi}{3} \xrightarrow{2x = k\pi + \frac{\pi}{3}} x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$$

روش دوم :

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\tan(x + \frac{\pi}{4}) + \tan(x - \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{3} \xrightarrow{\frac{\sin(x + \frac{\pi}{4} + x - \frac{\pi}{4})}{\frac{1}{2} [\cos(x + \frac{\pi}{4} + x - \frac{\pi}{4}) + \cos(x + \frac{\pi}{4} - x + \frac{\pi}{4})]} = 2\sqrt{3}}$$

$$\frac{\sin 2x}{\frac{1}{2} \cos 2x} = 2\sqrt{3} \xrightarrow{2 \tan 2x = 2\sqrt{3}} \tan 2x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} \xrightarrow{x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}}$$

۱۹

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

سراسری تجربی ۸۹ - خارج از کشور

جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos(x + \frac{\pi}{3})\cos(x - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$ به کدام صورت است؟

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi - \frac{\pi}{3}$ (۱)

روش اول:

$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

$\cos(x + \frac{\pi}{3})\cos(x - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \left[\cos 2x + \cos \frac{2\pi}{3} \right] = -\frac{1}{2} \rightarrow \cos 2x - \frac{1}{2} = -1$

$\cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$

روش دوم:

$\cos(x + \frac{\pi}{3})\cos(x - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} \rightarrow \cos \frac{2\pi}{3} \cos 0 = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{True} \\ x = -\frac{\pi}{3} \rightarrow \cos 0 \cos(-\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{True} \end{cases}$

روش سوم:

$\cos(x + \frac{\pi}{3})\cos(x - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$

$\left[\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3} \right] \left[\cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3} \right] = -\frac{1}{2}$

$\left[\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right] \left[\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right] = -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \cos^2 x - \frac{3}{4} \sin^2 x = -\frac{1}{2}$

$\cos^2 x - 3 \sin^2 x = -2 \rightarrow 1 - \sin^2 x - 3 \sin^2 x = -2 \rightarrow 4 \sin^2 x = 3 \rightarrow \sin^2 x = \frac{3}{4} = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$

$\sin^2 x = \sin^2 \frac{\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$

سراسری تجربی ۸۸ - خارج از کشور

معادله $y = 4 \cos^3 x + 3 \cos x$ ، چند جواب در بازه $[0, 2\pi]$ دارد؟

۲ (۴)

۴ (۳)

۰ (۲)

۱ (۱)

۲۱

نکته: اگر در معادله درجه n ، مجموع ضرایب صفر شود ، قطعاً یکی از ریشه ها یک می باشد.

بسمه تعالیٰ

تهیّه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

$$\cos^3 x + 3\cos x - 4 = 0 \xrightarrow{\cos x=t} t^3 + 3t - 4 = 0 \xrightarrow{t=1} (t-1)(t^2 + t + 4) = 0$$

$$\begin{cases} t-1=0 \rightarrow t=1 \rightarrow \cos x=1 \rightarrow x=2k\pi \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x=0, 2\pi \\ t^2 + t + 4 = 0 \rightarrow \Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \end{cases}$$

سراسری تجربی ۸۷

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\sin(\pi-x)\cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right) + 3\cot x \sin(\pi+x) = 0$ ، کدام است؟

$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۳)

$2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ (۲)

$2k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۱)

۲۲

$$2\sin(\pi-x)\cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right) + 3\cot x \sin(\pi+x) = 0 \rightarrow 2\sin^3 x - 3\cos x = 0$$

$$2(1 - \cos^3 x) - 3\cos x = 0 \rightarrow 2\cos^3 x + 3\cos x - 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \text{True} \\ \cos x = -2 \notin [-1, 1] \end{cases}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

سراسری تجربی ۸۷ - خارج از کشور

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\cos 3x \sin(3\pi-x) - \sin 3x \cos(\pi+x) = \cos \frac{3\pi}{2}$ ، کدام است؟

$k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{k\pi}{2}$ (۲)

$\frac{k\pi}{4}$ (۱)

$$\cos 3x \sin(3\pi-x) - \sin 3x \cos(\pi+x) = \cos \frac{3\pi}{2} \rightarrow \cos 3x \sin x + \sin 3x \cos x = 0$$

$$\sin(3x+x) = 0 \rightarrow \sin 4x = 0 \rightarrow 4x = k\pi \rightarrow x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$$

سراسری تجربی ۸۶

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\sin^3 x = 3\cos x$ ، به کدام صورت است؟

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۱)

۲۴

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

$$2\sin^2 x - 3\cos x = 0 \longrightarrow (1 - \cos^2 x) - 3\cos x = 0$$

$$2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2}\cos \frac{\pi}{3} \longrightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = -2 \notin [-1, 1] \end{cases}$$

سراسری تجربی ۸۶ - خارج از کشور

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\tan x \cos^2 x = 1$ ، به کدام صورت است؟

$2k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۴)

$2k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۳)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۲)

$k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۱)

روش اول:

۲۵

$$2\tan x \cos^2 x = 1 \xrightarrow{x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}} 2 \times \frac{\sin x}{\cos x} \times \cos^2 x = 1 \longrightarrow 2\sin x \cos x = 1$$

$$\sin 2x = 1 \longrightarrow 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \longrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{4}$$

روش دوم:

$$2\tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \longrightarrow 2\tan x = 1 + \tan^2 x \longrightarrow \tan^2 x - 2\tan x + 1 = 0$$

$$(\tan x - 1)^2 = 0 \longrightarrow \tan x - 1 = 0 \longrightarrow \tan x = 1 = \tan \frac{\pi}{4} \longrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{4}$$

سراسری تجربی ۸۴ - خارج از کشور

۲۶

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\cos^2 x + 3\sin(\frac{\pi}{2} + x) + 2 = 0$ ، کدام است؟

$(2k+1)\pi$ (۴)

$\frac{k\pi}{2}$ (۳)

$2k\pi$ (۲)

$k\pi$ (۱)

$$\cos^2 x + 3\cos x + 2 = 0 \xrightarrow{b=a+c} \begin{cases} \cos x = -1 \rightarrow \text{True} \\ \cos x = -2 \notin [-1, 1] \end{cases}$$

$$\cos x = -1 \longrightarrow x = 2k\pi + \pi = (2k+1)\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

سراسری تجربی ۸۳

۲۷

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 0$ ، به کدام صورت است؟

$k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۳)

$k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۲)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۱)

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

روش اول:

$$\cos 2x = 0 \rightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = 0 \rightarrow \tan x = 1 \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{4} \quad (1)$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) \neq 0 \rightarrow x + \frac{\pi}{4} \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow x \neq k\pi + \frac{\pi}{4} \quad (2) \xrightarrow{(1),(2)} x = k\pi - \frac{\pi}{4}$$

روش دوم:

$$\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 0 \xrightarrow{\cos(x + \frac{\pi}{4}) \neq 0} \cos 2x = 0 \rightarrow 2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \quad (1)$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) \neq 0 \rightarrow x + \frac{\pi}{4} \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow x \neq k\pi + \frac{\pi}{4} \quad (2) \xrightarrow{(1),(2)} x = k\pi - \frac{\pi}{4}$$

سراسری تجربی ۸۱

جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\cos^2 x - \cos x - 3 = 0$ کدام است؟

$k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (4)$

$2k\pi - \frac{\pi}{2} \quad (3)$

$2k\pi + \pi \quad (2)$

$k\pi \quad (1)$

$$2\cos^2 x - \cos x - 3 = 0 \xrightarrow{b=a+c} \begin{cases} \cos x = -1 \rightarrow x = 2k\pi + \pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = \frac{3}{2} \notin [-1, 1] \rightarrow \text{false} \end{cases}$$

سراسری تجربی ۸۰

یکی از جواب‌های معادلهٔ $2\sin^2 x - 3\sin x - 2 = 0$ کدام است؟

$\frac{4\pi}{3} \quad (4)$

$\frac{7\pi}{6} \quad (3)$

$\frac{5\pi}{6} \quad (2)$

$\frac{2\pi}{3} \quad (1)$

$$2\sin^2 x - 3\sin x - 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} \sin x = 2 \notin [-1, 1] \rightarrow \text{false} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{True} \end{cases}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} = \sin(-\frac{\pi}{6}) \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi - \frac{\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \pi + \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{7\pi}{6} \xrightarrow{k=0} x = \frac{7\pi}{6} \end{cases}$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

$$\sin x = -\frac{1}{2} \rightarrow \begin{cases} x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \\ x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \end{cases}$$

سراسری تجربی ۷۹

جواب کلی معادله مثلثاتی $(1 + \tan^2 x) \cos(\pi + 2x) = 2$ به کدام صورت است؟

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi + \frac{\pi}{6}$ (۱)

روش اول:

۳۰

$$(1 + \tan^2 x) \cos(\pi + 2x) = 2 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} \times (-\cos 2x) = 2 \xrightarrow{\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1}$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} \times (1 - 2 \cos^2 x) = 2 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} - 2 = 2 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} = 4 \rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{4}$$

$$\cos^2 x = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \cos^2 \frac{\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

روش دوم:

۳۱

$$(1 + \tan^2 x) \cos(\pi + 2x) = 2 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} \times (-\cos 2x) = 2 \xrightarrow{\cos^2 x \neq 0} \cos 2x = -2 \cos^2 x$$

$$2 \cos^2 x - 1 + 2 \cos^2 x = 0 \rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{4} = (\cos \frac{\pi}{3})^2 \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

سراسری تجربی ۷۹

$\frac{1}{4}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$-\frac{1}{2}$ (۲)

$-\frac{1}{4}$ (۱)

$$\sin^2 \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \cos^2 \alpha = \sin \alpha \cos \alpha (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)$$

$$\frac{1}{2} \sin 2\alpha (-\cos 2\alpha) = -\frac{1}{4} \sin 4\alpha \xrightarrow{\alpha = 22/5^\circ} -\frac{1}{4} \sin 90^\circ = -\frac{1}{4}$$

سراسری تجربی ۷۹

۳۲

حاصل $(-1)^{\cos 40^\circ} (2 \cos 80^\circ - 1) \cos 40^\circ$ برابر کدام است؟

$\sin 20^\circ$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$-\sin 20^\circ$ (۲)

$-\frac{1}{2}$ (۱)

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\begin{aligned} \cos 40^\circ (2\cos 80^\circ - 1) &= 2\cos 80^\circ \cos 40^\circ - \cos 40^\circ = 2 \times \frac{1}{2} [\cos 120^\circ + \cos 40^\circ] - \cos 40^\circ \\ &= \cos 120^\circ = \cos(\pi - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

سراسری تجربی ۷۸

صورت کلی تمام قوس هایی که در معادله $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\cos(2\pi - x) = \sin^2 \frac{7\pi}{6}$ صدق کنند، کدام است؟

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۴)$$

$$k\pi + \frac{\pi}{3} \quad (۳)$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۲)$$

$$2k\pi - \frac{\pi}{3} \quad (۱)$$

$$\cos x \times \cos x = \frac{1}{4} \longrightarrow \cos^2 x = \cos^2 \frac{\pi}{3} \longrightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

سراسری تجربی ۷۸

معادله ی مثلثاتی $\tan 60^\circ \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = m - 1$ دارای جواب است، مجموعه مقادیر m کدام است؟

$$[-2, 4] \quad (۴)$$

$$[0, 2] \quad (۳)$$

$$[-3, 1] \quad (۲)$$

$$[-1, 3] \quad (۱)$$

$$\tan 60^\circ \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = m - 1 \longrightarrow \sqrt{3} \sin x + \cos x = m - 1$$

$$3 + 1 \geq (m - 1)^2 \longrightarrow -2 \leq m - 1 \leq 2 \longrightarrow -1 \leq m \leq 3$$

سراسری تجربی ۷۷

به ازای کدام مقادیر m ، معادله $m \tan x + \cot x = 4$ دو جواب متمایز در فاصله $(0, \frac{\pi}{2})$ دارد؟

$$0 < m < 4 \quad (۴)$$

$$m < 4 \quad (۳)$$

$$m > 0 \quad (۲)$$

$$-1 < m < 4 \quad (۱)$$

$$m \tan x + \cot x = 4 \longrightarrow m \tan x + \frac{1}{\tan x} = 4 \xrightarrow{\tan x \neq 0} m \tan^2 x - 4 \tan x + 1 = 0$$

$$\frac{b' = \frac{b}{2}}{\Delta' = b'^2 - ac} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta' > 0 \longrightarrow 4 - m > 0 \rightarrow m < 4 \\ \frac{c}{a} > 0 \longrightarrow \frac{1}{m} > 0 \rightarrow m > 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \longrightarrow \frac{4}{m} > 0 \rightarrow m > 0 \end{array} \right. \quad \cap \quad \Rightarrow 0 < m < 4$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

سراسری تجربی ۷۷

انتهای کمان جواب های معادله $\cos 2x = \sin x$ بر روی دایره مثلثاتی، رأس های کدام مثلث است؟

- ۱) قائم الزاویه ۲) متساوی الاضلاع ۳) متساوی الساقین ۴) مختلف الاضلاع

$$\cos 2x = \sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \longrightarrow 2x = 2k\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - x \longrightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$$

$$2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + x \longrightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = \frac{3\pi}{2}$$

۳۶

سراسری تجربی ۷۶

انتهای کمان های جواب های معادله $\cos 2x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 0$ بر روی دایره مثلثاتی، رأس های کدام

چند ضلعی است؟

- ۱) مثلث متساوی الاضلاع ۲) مثلث قائم الزاویه ۳) مستطیل ۴) مربع

$$\cos 2x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 0 \longrightarrow \cos 2x + \cos x = 0 \longrightarrow \cos 2x = -\cos x$$

$$\cos 2x = \cos(\pi - x) \longrightarrow 2x = 2k\pi \pm (\pi - x)$$

$$2x = 2k\pi + \pi - x \longrightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi$$

$$2x = 2k\pi - \pi + x \longrightarrow x = 2k\pi - \pi \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = \pi$$

۳۷

از معادله $(\cos 3x)(\cos \frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{2} - \cos^2 x$ چند جواب برای x در فاصله $(0, 2\pi)$ به دست می آید؟

۳ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۶ (۱)

$$(\cos 3x)\left(-\cos \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \cos^2 x \longrightarrow -\frac{1}{2} \cos 3x = \frac{1}{2} - \cos^2 x \xrightarrow{x \times (-2)}$$

$$\cos 3x = 2 \cos^2 x - 1 \longrightarrow \cos 3x = \cos 2x \longrightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + 2x \longrightarrow x = 2k\pi \\ 3x = 2k\pi - 2x \longrightarrow x = \frac{2k\pi}{5} \end{cases}$$

$$x \in (0, 2\pi) \xrightarrow{k=1,2,3,4} x = \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$$

۳۸

بسمه تعالیٰ

تهیّه و تنظیم: سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

مجموع جواب‌های متمایز معادله $\cos 2x + \cos^2 x + 4\sin x = 3$ در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟ π (۴) $\frac{5\pi}{4}$ (۳) 2π (۲) $\frac{3\pi}{2}$ (۱)

$$1 - 2\sin^2 x + 1 - \sin^2 x + 4\sin x - 3 = 0 \longrightarrow -3\sin^2 x + 4\sin x - 1 = 0 \xrightarrow{a+b+c=0}$$

$$\begin{cases} \sin x = 1 \longrightarrow x = \frac{\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{3} \longrightarrow \begin{cases} x = \theta \\ x = \pi - \theta \end{cases} \end{cases} \xrightarrow{\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}}$$

۳۹

$$\text{معادله مثلثاتی } \frac{\cos 2x + 4\sin x - 3}{\sin x - 1} = 3 \text{ در بازه } [0, 2\pi] \text{ چند جواب دارد؟}$$

 4 (۴) 3 (۳) 2 (۲)

۱ (۱)

$$\text{I) } \xrightarrow{\sin x \neq 1} \cos 2x + 4\sin x - 2 = 3\sin x - 2 \longrightarrow -2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0$$

$$\xrightarrow{a+b+c=0} \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \\ x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \end{cases}$$

۴۰

$$\text{II) } \cos 2x + \sin x = 0 \longrightarrow \cos 2x = -\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \longrightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} + x \\ 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} - x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \xrightarrow{\sin x \neq 1} \text{false} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \longrightarrow \begin{cases} k = 2 \longrightarrow x = \frac{7\pi}{6} \\ k = 3 \longrightarrow x = \frac{11\pi}{6} \end{cases} \end{cases}$$

معادله مثلثاتی ۵ $2\sin^2(x - \frac{\pi}{\lambda}) + 3\cos(x - \frac{5\pi}{\lambda}) = 5$ در بازه $[0, 2\pi]$ چند جواب دارد؟

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

$$2\sin^2(x - \frac{\pi}{\lambda}) + 3\cos(x - \frac{\pi}{\lambda} - \frac{\pi}{2}) = 5 \rightarrow 2\sin^2(x - \frac{\pi}{\lambda}) + 3\sin(x - \frac{\pi}{\lambda}) - 5 = 0$$

$$\sin(x - \frac{\pi}{\lambda}) = 1 \rightarrow x - \frac{\pi}{\lambda} = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{\lambda} \xrightarrow{k=0} x = \frac{5\pi}{\lambda}$$

۴۱

جواب معادله $\tan \frac{\pi}{\gamma} + \sin \frac{3\pi}{2} + \cos x + \tan \frac{6\pi}{\gamma} = 0$ کدام است؟

$(2k+1)\pi$ (۴) $\frac{k\pi}{2}$ (۳) $2k\pi$ (۲) $k\pi$ (۱) ۴۲

چون $\frac{\pi}{\gamma} + \frac{6\pi}{\gamma} = \pi$ بنابراین داریم: $\tan \frac{\pi}{\gamma} + \tan \frac{6\pi}{\gamma} = 0$ مکمل یکدیگر هستند پس

$$-1 + \cos x = 0 \rightarrow \cos x = 1 \rightarrow x = 2k\pi$$

یکی از جواب های معادله $\sin 2x + \sin 4x = 0$ کدام است؟

$\frac{k\pi}{3}$ (۴) $\frac{k\pi}{6}$ (۳) $\frac{k\pi}{4}$ (۲) $\frac{k\pi}{2}$ (۱) ۴۳

$$\sin 4x = -\sin 2x = \sin(-2x) \rightarrow \begin{cases} 4x = 2k\pi + (-2x) \rightarrow x = \frac{k\pi}{3} \\ 4x = 2k\pi + \pi - (-2x) \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

یکی از جواب های معادله $\cos 2x + \sqrt{3} \cos x = 2$ کدام است؟

$k\pi + \frac{\pi}{6}$ (۴) $2k\pi - \frac{\pi}{6}$ (۳) $2k\pi - \frac{\pi}{3}$ (۲) $2k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۱)

$$2\cos^2 x - 1 + \sqrt{3} \cos x - 2 = 0 \rightarrow 2\cos^2 x + \sqrt{3} \cos x - 3 = 0 \xrightarrow{\Delta=24}$$

$$\cos x = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{6} \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

۴۴

$$\cos x = \frac{-\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} = \frac{-4\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3} \notin [-1, 1]$$

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم : سید علی موسوی

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)

$$\text{مجموع جواب های معادله } \frac{\lambda \sin^2 x}{1 + \tan^2 x} + 3 \cos 2x = 0 \text{ کدام است؟}$$

۴π (۴)

۲π (۳)

6π (۲)

 $\frac{5\pi}{2}$ (۱)

$$\lambda \sin^2 x \cos^2 x + 3 \cos 2x = 0 \longrightarrow \lambda (\sin x \cos x)^2 + 3 \cos 2x = 0$$

$$\lambda \left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2 + 3 \cos 2x = 0 \longrightarrow 2 \sin^2 2x + 3 \cos 2x = 0 \longrightarrow 2(1 - \cos^2 2x) + 3 \cos 2x = 0$$

$$-2 \cos^2 2x + 3 \cos 2x + 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} \cos 2x = \frac{-3+5}{-4} = -\frac{1}{2} \\ \cos 2x = \frac{-3-5}{-4} = 2 \end{cases}$$

$$\cos 2x = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} \xrightarrow{\Delta=25} \begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{2\pi}{3} \longrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{3} \\ 2x = 2k\pi - \frac{2\pi}{3} \longrightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} = 4\pi$$

۴۵

(سید علی موسوی ۰۹۱۵۳۲۱۵۶۱۴)

دبير رياضي ناحيه ۴ مشهد

@dostaneriazi

بسمه تعالیٰ

تهییه و تنظیم :

(فصل ۲ - معادلات مثلثاتی)

سوالات ریاضی (۳)



همکاران و دانش آموزان عزیز ، تست هائی که در اختیار شما قرار گرفته است ، زحمات چندین ساله بندۀ می باشد ، به همین خاطر قبل از مطالعه هزینه این جزوّات را پرداخت کنید و هزینه آن یک صلوات و یک فاتحه برای روح پدر عزیزم است .

با تشکر : سید علی موسوی