

روانپزشکی_کودک_و_نوجوان

۱- در مورد رفتارهای اگرسیو در کودکان پیش دبستانی (preschoolers) عبارت صحیح را مشخص نمائید؟

الف) در کودکان خردسال پرخاشگری فیزیکی از دو سالگی شروع به کاهش می کند.

ب) پرخاشگری کلامی بین 2 تا 4 سالگی افزایش می یابد. ✓

ج) فراوانی تمام انواع رفتارهای خصمانه (کلامی و فیزیکی) در سن 5 یا 6 سالگی افزایش می یابد.

د) پرخاشگری کودکان خردسال بیشتر مرتبط با نیازها و موقعیت های اجتماعی است.

۲- رشد اخلاقی بر مبنای "دختر خوب" یا "پسر خوب" بودن و پیروی از قوانین برای جلب رضایت پدر و مادر از ویژگی های کدام گروه سنی بشمار می رود؟

الف) 2-5 سال

ب) 6-11 سال ✓

ج) 12-14 سال

د) 15-18 سال

۳- در مورد تاثیر رشدی شروع بلوغ زودتر یا دیرتر در مورد سازگاری پسران و دختران عبارت صحیح را مشخص نمائید.

الف) در پسران بلوغ زودتر خطر علائم درونی سازی و برونی سازی را کاهش می دهد.

ب) در پسران خطر اختلال سلوک و مصرف مواد در بلوغ زودتر بیشتر از بلوغ دیرتر است.

ج) در دختران با بلوغ زودتر مشکلات تطابقی کمتری دیده می شود.

د) در پسران بلوغ زودتر بر روی احترام به نفس و توانائی های هوشی تاثیر مثبت دارد. ✓

۴- کدامیک از گزینه های زیر بعنوان یک مهارت پیش نیاز برای تمایز دیداری بین مراقبین و افراد غریبه بشمار می رود؟

الف) A sense of inter-subjectivity

ب) Means-end reasoning

ج) Object permanence ✓

د) Stranger anxiety

۵- در ارزیابی روانپزشکی کودک یا نوجوان ناشنوا عبارت غلط را مشخص نمائید.

الف) در زمان ارزیابی برای ارتباط با کودک یا نوجوان ناشنوا حضور یک عضو خانواده ضروری است. ✓

ب) سوال از فرد ناشنوا که "آیا شما صداهائی را می شنوید؟" کمک کننده نیست.

ج) علائم درجه اول شنیداری در ناشنوایان قابل استخراج است.

د) استفاده از ضرب المثل ها در معاينه روانپزشکی افراد ناشنوا مفید نیست.

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۶- در درمان اختلالات روانپزشکی کودکان نابینا عبارت غلط را مشخص نمائید.

- (الف) "تعدیل رفتاری" در کودکان نابینا مفید بوده است.
- (ب) مطالعات از موفقیت در آموزش مهارت های اجتماعی به این کودکان حمایت می کند.
- ✓ (ج) رواندرمانی فردی برای کودکان نابینا کنتراندیکاسیون دارد.
- (د) گروه درمانی برای به اشتراک گذاشتن احساسات و تجارب می تواند مفید باشد.

۷- سبک فرزند پروری **Authoritative** با کدامیک از ویژگی های زیر مشخص می شود؟

- (الف) High warmth with low discipline
- (ب) Strict discipline without affection
- ✓ (ج) Warmth with reasonable control
- (د) Low warmth with low discipline

۸- احساس ها، افکار و خیالبافی های اروتیک یک فرد نسبت به افراد یک جنس، یا هر دو جنس، و یا هیچکدام، با کدامیک از اصطلاحات زیر معادل است؟

- (الف) Gender role
- (ب) Gender identity
- (ج) Sexual identity
- ✓ (د) Sexual orientation

۹- در مطالعه متآنالیز خود-آسیبی self-harm در نوجوانان، با بررسی مقالات در فاصله 1990-2015 که در سال 2018 منتشر شده است، کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

- (الف) شیوع کلی خود-آسیبی در طول عمر حدود 17 درصد است.
- (ب) روند خود-آسیبی تا سال 2015 رو به افزایش بوده است.
- ✓ (ج) احتمال خود-آسیبی در پسران بیشتر از دختران است.
- (د) "بریدن" شایعترین روش خود-آسیبی بوده است.

۱۰- شدت ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را در یک تحقیق چه می نامند؟

- (الف) Power
- (ب) Confidence Interval
- (ج) Significance
- ✓ (د) Effect Size

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۱۱- در مطالعه ای سه گروه از کودکان با تشخیص ADHD, ADHD+CD و کودکان نرمال از نظر توانایی کارکردهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفتند. کدام یک از روش های آماری زیر جهت این تحقیق مناسب تر است؟

الف) One-Way ANOVA ✓

ب) Linear Regression

ج) Paired T-test

د) Repeated measure

۱۲- به منظور ارزیابی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه SRS (Social Responsiveness Scale) در یک مطالعه آن را با Vineland Adaptive Behaviors (که ویژگی های روانسنجی آن انجام شده است) مقایسه می کنید. در این مطالعه کدام ویژگی از روایی (Validity) مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

الف) Criterion-Concurrent

ب) Content

ج) Convergent ✓

د) Discriminant

۱۳- می خواهید بررسی کنید که "آیا تغذیه نامناسب در دوران پره ناتال می تواند عامل خطری در بروز اسکیزوفرنیا در نوجوانان و جوانان باشد؟"، کدام یک از انواع مطالعه برای بررسی چنین سئوالی مناسب است؟

الف) Correlation

ب) Cross - Sectional

ج) Retrospective Cohort ✓

د) Ecologic

۱۴- به منظور ارزیابی مارکر ژنتیک در خانواده ای که پدر و تمامی فرزندان او مبتلا به اختلال تورت هستند، چه نوع مطالعه ای کاربرد دارد؟

الف) Linkage Analysis ✓

ب) Association Study

ج) Genome – Wide Association Study

د) Karyotyping

۱۵- در سندرم X شکننده از نظر ژنتیک تکرار چه نوکلئیدهایی مشاهده می شود؟

الف) CGA

ب) CGG ✓

ج) AGG

د) ATG

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۱۶- کدام یک از کارکردهای زیر مربوط به پروتئین ERK1/2 نمی باشد؟

الف) Stress-Induced Associated Learning ✓

ب) Long-Term Potentiation

ج) Reward Seeking Behavior

د) Long-Term Synaptic Plasticity

۱۷- در مطالعه طولی Stephen P. Becker (2018) در مورد ADHD (Inattentive) و Sluggish Cognitive Tempo (SCT) کدام یک از یافته های زیر نادرست است؟

الف) SCT به طور معناداری بروز انزوای اجتماعی و علائم افسردگی و اضطراب را پیش بینی می کرد.

ب) ADHD-IN به طور معناداری ضعف در ریاضی و سرعت پردازش شناختی را پیش بینی کرد.

ج) SCT به طور مشخص ضعف در توانایی خواندن را پیش بینی کرد.

د) ADHD-IN بروز رفتارهای Externalizing کمتری را پیش بینی کرد. ✓

۱۸- در مطالعه طولی William Mandy (2018) در مورد رشد Autistic Social Traits در دختران و پسران کدام یک از یافته های زیر نادرست است؟

الف) در سن 7 سالگی در پسران این علائم بیشتر است.

ب) این علائم در بین سنین 10 تا 7 سالگی کاهش نشان می دهد.

ج) علائم اوتیستیک در بین سنین 10 تا 16 سالگی افزایش می یابد.

د) علائم اوتیستیک در سن 16 سالگی در دختران بیش از پسران مشاهده می شود. ✓

۱۹- در مورد "مقیاس ارزیابی رفتاری نوزادان برازلتون Brazelton"، موارد زیر صحیح است بجز؟

الف) توانایی پاسخ به استرس زایمان و تطابق با محیط خارج رحم را می سنجد.

ب) این سنجش فقط برای نوزادان فول ترم قابل استفاده می باشد. ✓

ج) در اولین روز زندگی نوزاد قابل سنجش است.

د) هیجده رفلکس و پاسخ دهی به محرکات جاندار و بی جان سنجیده می شود.

۲۰- در استفاده از مدیا، کدامیک از موارد زیر عواقب مثبت و منفی تواما در کودک و نوجوان دارد؟

الف) اجازه دادن به کودک با اضطراب اجتماعی برای حفظ ارتباطات اجتماعی مجازی ✓

ب) تماشای برنامه آشپزی و علاقمندی بجه به غذاهای آسیایی

ج) گوش دادن به موزیک در سرویس مدرسه برای آرام کردن کودک

د) حفظ و تداوم رابطه دوستانه با دوستان کمپ

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۲۱- پسر ده ساله ای از چند ماه قبل تدریجاً دچار گوشه گیری، بی تفاوتی به درس و مدرسه، با خود صحبت کردن و محدودیت عاطفه شده است. کدام آزمایشات زیر را برای او درخواست می کنید؟

الف) انجام آزمایشات متابولیک

ب) اندازه گیری سرب سرم

ج) کشت گلو و تست سریع آنتی ژن

د) سرولوپلاسمین ✓

۲۲- یافته های زیر در مورد اعتبار ساختاری (Construct Validity) The child and Adolescent Psychiatric (CAPA) Assessment صحیح است بجز؟

الف) الگوهای سنی و جنسی اختلالات تشخیص داده شده با CAPA با سایر مصاحبه ها هماهنگ بود.

ب) با تغییرات فیزیولوژیک بلوغ تشخیص های مختلف براساس CAPA ثابت می ماند. ✓

ج) داشتن اختلال براساس CAPA در کودکان ، پیشگوی پیش آگهی منفی در زندگی می باشد.

د) تشخیص های علامتی همراه با اختلال سایکوسوشیال بود.

۲۳- در آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان از تست ریون استفاده شده است که گروهی از دانش آموزان آشنایی قبلی با آن داشتند و نمرات بالاتری نسبت به سایرین کسب کردند. کدام دلیل زیر می تواند علت این تفاوت نمره باشد؟

الف) Item content differences

ب) Practice effects ✓

ج) Floor and ceiling effects

د) Correlation between tests

۲۴- قرار است در یک شهرستان صدوپنجاه هزار نفری آزمونی از نظر " وجود یا عدم وجود سایکوپاتولوژی در زمان حال " از کودکان به عمل آید. کدام آزمون زیر مناسب است؟

الف) WASH-U-KSADS

ب) K-SADS- E ✓

ج) K-SADS-PL

د) K-SADS-P IVR

۲۵- در یک مطالعه اپیدمیولوژیک روی نوجوانان جهت انجام مصاحبه K-SADS از تعدادی پرسشگر بخوبی آموزش دیده غیر پزشک استفاده شده است. کدام مورد زیر صحیح می باشد؟

الف) در این روش پرسشگران اجازه هیچگونه انحرافی از متن سؤالات را ندارند.

ب) در این روش از یک واژه نامه و کتاب راهنمای دقیق استفاده می شود. ✓

ج) معمولاً پرسشگران قادر به قضاوت بالینی با قابلیت اطمینان بالا نیستند.

د) در این روش مطالعه از مصاحبه متکی بر پاسخ دهندگان استفاده می شود.

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۲۶- در مطالعه متانالیز لورنس و همکاران در مورد رابطه اضطراب و افسردگی والدین و اضطراب و افسردگی کودکان موارد زیر صحیح است بجز؟

- الف) شواهدی وجود دارد که بچه های والدین مبتلا به اضطراب در ریسک بالاتر برای همان اختلال اضطرابی می باشند. ✓
- ب) والدینی که اختلال اضطرابی داشتند فرزندان با ریسک بالاتر برای افسردگی داشتند.
- ج) والدین مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و پانیک بچه های با ریسک بیشتر برای اختلال اضطراب فراگیر داشتند.
- د) در بررسی سن و جنس یافته مشخصی گزارش نشد.

۲۷- در مطالعه طولی Natalie V. Miller (2019) در مورد ارتباط Temperament Reactivity در شیرخواران و نحوه مراقبت مادران، با بروز علائم ADHD در سن دبستان، کدام یک از یافته های زیر نادرست است؟

- الف) در پسران شیرخوار، فعالیت حرکتی زیاد، همراه با مراقبت ضعیف مادر، پیش بینی کننده ADHD در کودکان بود. ✓
- ب) در دختران شیرخوار، هیجان منفی، همراه با مراقبت ضعیف تر مادران، پیش بینی کننده ADHD بود.
- ج) در دختران شیرخوار، فعالیت حرکتی زیاد همراه با مراقبت قوی تر مادران، به طور منفی پیش بینی کننده ADHD بود.
- د) در دختران شیرخوار، وجود هیجان مثبت همراه با مراقبت قوی تر مادران، پیش بینی کننده علائم کمتر ADHD بود.

۲۸- کودک 10 ساله ای با والدین به کلینیک مراجعه نموده است والدین ذکر می کنند نامبرده کم توجه و بی دقت است ولی پر فعالیت نمی باشد. در ارزیابی های عصبی شناختی، نامبرده در بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات کند است. سطوح پایینی از گوش بزنگی (alertness) و مشکلات خفیفی در حافظه و جهت یابی دارد. کدام یک از پروفایل های نوروسایکولوژیک زیر بیشتر برای وی مطرح است؟

- الف) The deficit inhibitory control theory
- ب) The delay aversion theory
- ج) The sluggish cognitive tempo theory ✓
- د) The multiple pathway model

۲۹- کدام دسته از علائم اختلال سلوک در ابتدای نوجوانی با میزان بیشتری دیده می شود؟

- الف) Hitting
- ب) Stealing
- ج) Defiance
- د) Rebellion ✓

۳۰- پسر 12 ساله با علائم عصبانیت و بی قراری همراه والدینش به کلینیک مراجعه نموده است. والدین ذکر می کنند که نامبرده زود از کوره در می رود. بیشتر اوقات با بزرگترها جر و بحث می کند. از انجام دستورات و اجرای قوانین سر باز می زند و بخاطر اشتباهات خود، دیگران را سرزنش می کند. کدام یک از درمان های زیر برای این نوجوان در اولویت قرار نمی گیرد؟

- الف) شروع مداخلات رفتاری و روانی اجتماعی ساختار یافته
- ب) افزایش میزان مشارکت نوجوان در فعالیتهایی با حضور همسالان با عملکرد خوب
- ج) درگیر کردن خانواده در روند درمان نوجوان
- د) شروع درمان دارویی در مراحل ابتدایی مداخله ✓

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۳۱- کودک 5 ساله با تشخیص اختلال اوتیسم به کلینیک ارجاع شده است. والدین اظهار می دارند که نامبرده در درک موقعیتهای هیجانی ضعیف است، پاداش دادن و تشویق تأثیری بر عملکرد رفتاری وی ندارد. نقص کدامیک از مناطق مغزی در این کودک مرتبط با موارد فوق می باشد؟

الف) Superior temporal sulcus

ب) The fusiform gyrus

ج) The amygdale and limbic system ✓

د) The inferior parietal lobe

۳۲- پسر 7 ساله به همراه والدینش به کلینیک ارجاع شده است. در ارزیابی شیوه تعامل وی غیر عادی و یک سویه است. تأخیر تکلم داشته، مونوتون صحبت می کند، اکولالیا دارد و متوجه شوخی و ضرب المثل نمی شود. نامبرده کلکسیون های متعدد از اشیاء مختلف دارد و رفتارهای کلیشه ای در وی گزارش می کنند. کدام یک از موارد زیر پیش بینی کننده قوی تر پیش آگهی نهایی (ultimate outcome) این کودک خواهد بود؟

الف) Attached to an unusual object

ب) Problem with pragmatic language

ج) Eccentric interactive style ✓

د) Unusual sensory behaviors

۳۳- کودک 8 ساله دانش آموز کلاس اول، مبتلا به اختلال اوتیسم، با علائم بیقراری، بیش فعالی- نقص توجه و عدم همکاری در انجام تکالیف به کلینیک ارجاع شده است. همه داروهای زیر در بهبود علائم ADHD این کودک موثر شناخته شده اند بجز؟

الف) متیل فنیدیت

ب) کلونیدین

ج) اتوموکستین

د) ممانتین ✓

۳۴- پسر 6 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم، با علائم پرخاشگری و حملات تشنجی به کلینیک ارجاع شده است. کدام یک از داروهای آنتی اپی لپتیک زیر در کنترل علائم وی موثر گزارش شده است؟

الف) سدیم والپروات ✓

ب) لووتیراستام

ج) لاموتریژین

د) توپیرامات

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۳۵- کودک 4 ساله به کلینیک ارجاع شده است، والدین ذکر می کنند که نامبرده واکنشی به صدا زدن نامش ندارد، قادر به مشارکت دادن دیگران در علایق خود از طریق اشاره کردن (pointing) دادن (giving) و نمایش (showing) نمی باشد و متوجه مفاهیم غیر کلامی از میمیک صورت نمی شود. این نقایص در کودک مربوط به کدام یک از حوزه های زیر است؟

الف) Restricted behavior

ب) Social

ج) Communication ✓

د) Play

۳۶- کودک 10 ساله با والدینش به کلینیک مراجعه نموده است. والدین ذکر می کنند که نامبرده کم توجه و پرفعالیت می باشد. رفتارهای مهار گسیخته اجتماعی دارد. کودک مضطرب است و هیپراکوزیس دارد. در پروفایل شناختی، نامبرده از نظر توانایی های بازشناسی چهره، شنوایی، حافظه کوتاه مدت و زبان بیانی مشکل ندارد ولی در سازماندهی فضایی و هماهنگی حرکتی بینایی ضعیف است. کدام یک از سندرم های ژنتیکی زیر برای نامبرده مطرح است؟

الف) سندرم ویلیامز ✓

ب) سندرم پرادر ویلی

ج) سندرم فراژیل x

د) سندرم داون

۳۷- همه موارد زیر جزو Social risk factor در افراد باناتوانی ذهنی (ID) می باشد، بجز؟

الف) Poor assertiveness skills

ب) Aberrant personality styles ✓

ج) Stressful social interactions

د) Peer rejection and ostracism

۳۸- کودک 7 ساله، دانش آموز کلاس اول به کلینیک ارجاع شده است، در ارزیابی، کودک مشکل در شروع خواندن ندارد ولی در fluency ضعیف است. کدام لوب مغزی در این کودک بیشتر درگیر است؟

الف) پریتال

ب) اکسی پیتال

ج) فرونتال ✓

د) تمپورال

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۳۹- یک کودک 4 ساله با شکایت از لکنت زبان به کلینیک ارجاع شده است. مادر ذکر می کند که شروع تکلم فرزندش به موقع بوده است. لکنت نامبرده در زمان استرس تشدید می شود و کلمات یا جملات خود را تکرار می کند. زبان بیانی و درکی کودک متناسب با سنش می باشد. کدام یک از موارد زیر به نفع Normal dysfluency در مقایسه با persistent stuttering می باشد؟

الف) Sound prolongation

ب) Silent block

ج) Repetitions of word phrases ✓

د) Blinks or grimaces during speech

۴۰- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات کلاسیک زبان در کودکان اتیستیک می باشد؟

الف) Echolalia ✓

ب) Machine like

ج) Loudness deviances

د) Monotonous

۴۱- نوجوان پانزده ساله با شکایت از احساس غم و اندوه، مشکلات خواب و سستی بدن مراجعه کرده است. این علائم از دو ماه قبل شروع و منجر به احساس بی ارزشی و بی کفایتی در وی شده است. مناسب ترین شیوه روان درمانی در این بیمار چیست؟

الف) روان درمانی بین فردی (IPT)

ب) درمان شناختی - رفتاری (CBT) ✓

ج) رفتار درمانی (BT)

د) درمان متمرکز بر خانواده (FFT)

۴۲- کدامیک از خصوصیات زیر به نفع پاسخ کمتر به درمان شناختی رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی شدید می باشد؟

الف) سن بیمار

ب) سطح اضطراب بالا ✓

ج) فقدان افسردگی

د) خصوصیات جمعیت شناختی

۴۳- کودک هفت ساله ای از یک سال قبل به همراه خانواده اش به شهر دیگری نقل مکان کرده است. در این مدت در مدرسه از صحبت کردن پرهیز می کند ولی در خانه مشکلی ندارد. کدام یک از تکنیک های زیر را برای درمان این کودک توصیه می کنید؟

الف) Role Play

ب) Modeling

ج) Graduated Exposure ✓

د) Corrective Feedback

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۴۴- در برنامه Coping Cat برای درمان اختلالات اضطرابی کودکان، تمام اجزای زیر وجود دارد، بجز؟

الف) Cognitive Restructuring

ب) Relaxation Therapy

ج) Social Skills Training ✓

د) In vivo Exposure

۴۵- درمان شناختی رفتاری در افسردگی نوجوانان روی کدام یک از اجزای بیماری موثرتر است؟

الف) رفتاری

ب) شناختی ✓

ج) فیزیولوژیک

د) انطباقی

۴۶- تمام موارد زیر جزو اقدامات اصلی در سرویس های Wraparound می باشد، بجز؟

الف) توجه به ویژگیهای فرهنگی بیمار و خانواده

ب) درگیر کردن خانواده در برنامه ریزی درمان

ج) تنظیم دوز داروهای مصرفی بیمار ✓

د) توجه به نقاط قوت بیمار و خانواده

۴۷- همه موارد زیر از فاکتورهای اساسی در ارزیابی بیمار در درمان Milieu است ، بجز؟

الف) مصرف مواد

ب) توانایی ایجاد اتحاد درمانی

ج) فاکتورهای بحرانی قبل از بستری ✓

د) توانایی صدمه به خود یا دیگران

۴۸- در یک نوجوان 14 ساله که با علائم خجالتی بودن، مشکل در برقراری روابط اجتماعی و کم حرفی ارجاع شده است، برنامه درمان شناختی رفتاری او شامل قسمتهای زیراست بجز؟

الف) Social skills training

ب) Relaxation training

ج) Cognitive restructuring

د) Mood monitoring ✓

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۴۹- همه موارد زیر در اسکیزوفرنی با شروع در کودکی بیشتر از شروع در بزرگسالی دیده می شود، بجز؟

الف) سابقه خانوادگی اسکیزوفرنی

ب) سابقه خانوادگی اسکیزوافکتیو

✓ ج) ناهنجاری عصب - روانشناختی در همشیرها

د) ناهنجاری در حرکات چشمی

۵۰- دختری 16 ساله با BMI 28 از سال گذشته به مدرسه نمی رود و در منزل پرخاشگر است. حاضر به خوردن غذا در جمع نمی باشد. نسبت به مادر و پدر خود بدبین است و در سه ماهه اخیر با خود صحبت می کند و اصرار دارد که صدای همسایه ها را از پشت دیوار می شنود که در باره او صحبت می کنند. دوره خلقی واضحی ندارد. سابقه طولانی انزوای اجتماعی را داشته و عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته است. بیمار سابقه مصرف رسپریدون و الانزاپین با دوز و مدت کافی داشته که تغییر مشخصی در علائم او ایجاد نشده است. مناسب ترین انتخاب برای درمان کدام است؟

✓ الف) کلوزاپین همراه با مت فورمین

ب) هالوپریدول همراه با مت فورمین

ج) آریپیپرازول

د) فلوپنتکسول دیو

۵۱- پسر بچه ای 8 ساله همراه مادرش مراجعه نموده . مادر از عصبانیت ها و قشقرق های نامناسب او به ستوه آمده. کودک در دو سال گذشته، هفته ای 4 یا 5 بار قشقرق های تکرار شونده دارد و سایر اوقات مدام بی دلیل عصبانی و تحریک پذیر است. در مدرسه با همسالان ناسازگار است . احساس بی ارزشی ، عدم لذت و افکار خودکشی نداشته. مشکلات خواب و اشتها و بیماری طبی ندارد. محتمل ترین تشخیص شما چیست؟

الف) Major Depression Disorder

ب) Bipolar Disorder II

✓ ج) Disruptive Mood Dysregulation Disorder

د) Oppositional Defiant Disorder

۵۲- همه عوامل زیر پیش گویی کننده پاسخ ضعیف تر به درمان با ضد افسردگی در کودکان افسرده است بجز؟

الف) عدم احساس لذت

✓ ب) پرخوابی

ج) شدت بیماری

د) اختلال همراه

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۵۳- نوجوانی با بی خوابی، بی اشتها، احساس غمگینی، تحریک پذیری و عدم تمرکز که از شش ماه قبل ترک تحصیل کرده است. برای هشت هفته تحت درمان با سرتالین با دوز کافی بوده است و پاسخ نسبی به درمان داده است ولی همچنان از احساس افسردگی و بی حوصلگی شاکی است. کدام انتخاب مناسب تر است؟

الف) تغییر دارو به اس سیتالوپرام

ب) اضافه کردن لیتیوم ✓

ج) تغییر دارو به ونلافاکسین

د) الکتروشوک تراپی

۵۴- کدام یک از رفتار های جنسی زیر در پسر بچه دبستانی با تشخیص اختلال دوقطبی در فاز مانیا احتمالا دیده نمی شود؟

الف) استمناء کردن در ملاء عام

ب) لمس کردن نامناسب دیگران

ج) کشیدن تصاویر جنسی در نقاشی

د) ارتباطات جنسی با دخترها ✓

۵۵- کودکی با سابقه ADHD که تحت درمان ریتالین می باشد در شش ماهه اخیر به درمان دارویی پاسخ نمی دهد و علائم ADHD و افت تحصیلی بیمار شدت یافته است. همه علائم زیر به تشخیص اختلال خلقی دو قطبی همزمان کمک خواهد کرد بجز؟

الف) کاهش نیاز به خواب

ب) خلق تحریک پذیر ✓

ج) خودبزرگ بینی

د) خود ارضایی در جمع

۵۶- کدام یک از عوامل زیر پیش گویی کننده قوی تر برای اقدام به خودکشی در نوجوان است؟

الف) افسردگی

ب) اضطراب

ج) خودزنی مزمن ✓

د) تکانشگری

۵۷- نوجوانی 15 ساله از شش ماه قبل از شرکت در فعالیت های ورزشی امتناع می کند و نگران آن است که طپش قلب در حین ورزش منجر به اضطراب شدید او شود. گاهی شب ها با طپش قلب و بدنبال آن اضطراب شدید از خواب بیدار می شود که همراه با احساس فشار بر قفسه سینه ، تنگی نفس و تعریق بوده و چندین بار به اورژانس مراجعه کرده است. در ارزیابی های طبی مشکل خاصی ندارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) Sport phobia

ب) Somatic symptom disorder

ج) Generalized anxiety disorder

د) Panic disorder ✓

۵۸- کدامیک از اختلالات اضطرابی کودکی در همراهی با افسردگی بیشترین ریسک را برای خودکشی دارد؟

الف) Separation anxiety disorder

ب) Social phobia

ج) Generalized anxiety disorder ✓

د) Panic disorder

۵۹- کودک هشت ساله بدلیل مشکلات دوست یابی در مدرسه ارجاع شده است. در مصاحبه ارتباط چشمی دارد ولی تن کلامی آهسته و به سوالات کوتاه پاسخ می دهد. طبق گزارش مدرسه تنها یک دوست صمیمی دارد. از شرکت در فعالیت های جمعی کلاس خودداری کرده و امتحانات کتبی خود را بهتر از شفاهی می دهد. معلم از اختلال تمرکز و بی دقتی او شاکی بوده است. وسایل خود را اغلب جا می گذارد و علاقه ای به نوشتن ندارد و کارهای محوله را نیمه کاره رها می کند. در پارک و مهمانی حاضر به شرکت در بازی با کودکان نیست ولی در منزل و یا با بچه های آشنای فامیل بازی می کند. کدام درمان مناسب است؟

الف) سرتالین

ب) بوسپیرون

ج) اتوماکستین ✓

د) بوپروپیون

۶۰- کودکی 5 ساله با علائم مکرر شستن دست و صورت که به دنبال احساس کثیفی و آلودگی می باشد مراجعه کرده است. وی از چندین ماه قبل این علائم را داشته و دو ساعت را صرف این کار می کند. در ارزیابی رشد وی نرمال بوده و مشکل خاصی در خانواده یافت نشد. طبق شواهد کدام مداخله برای وی مناسب تر است؟

الف) exposure with response prevention ✓

ب) Flooding with response prevention

ج) Biofeedback

د) Habit reversal

۶۱- نوجوانی 14 ساله از یک سال پیش بدلیل تحریک پذیری و علایم اضطرابی نظیر ترس از بیماری والدین، نگرانی در باره اجرای تکالیف خود مراجعه کرده، اخیراً بدلیل ترس از حمله داعش و یا وقوع زلزله به سختی به خواب می رود و نسبت به سال گذشته افت تحصیلی کرده است. کدام یک از داروهای زیر در خط اول برای درمان مناسب تر است؟

الف) گاباپنتین

ب) بوسپیرون

ج) سرتالین ✓

د) کلونازپام

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۶۲- جوان 22 ساله ای از درمانگاه تخصصی پوست به دلیل کاهش موهای سر ارجاع داده شده است. ایشان بیان می کند که تحت تأثیر تنش شروع به کندن موی سر می کنم. در ارزیابی انجام شده مورد دیگری یافت نشد. براساس مطالعات در مقایسه با جمعیت نرمال کدام یک از موارد زیر در یافته های نروسایکولوژیکال تفاوت نشان می دهد؟

الف) Attention

ب) Memory

ج) Organization

د) Perseveration ✓

۶۳- در درمان داروئی مبتلایان به اختلال توره کدام مورد ارجحیت کمتری دارد؟

الف) الانزاپین

ب) ریسپریدون

ج) هالوپریدول

د) کلرپرومازین ✓

۶۴- طبق مطالعات انجام گرفته در بزرگسالان مبتلا به excoriation disorder، کدام مورد در درمان اثری نداشته است؟

الف) فلوکستین

ب) سیتالوپرام ✓

ج) ان استیل سیستئین

د) درمان شناختی-رفتاری

۶۵- نوجوانی 16 ساله با علائم پرخوری غیر قابل کنترل به دفعات مختلف در طی روز که از 6 ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. وی در حالی که گرسنه نیست مقدار زیاد غذا در تنهایی مصرف می کند تا زمانی که احساس ناراحتی شدید در معده می کند. خط اول درمان کدام مورد است؟

الف) روان درمانی بین فردی

ب) درمان شناختی رفتاری ✓

ج) رفتاردرمانی دیالکتیک

د) روان درمانی تحلیل گرا

۶۶- نوجوانی 17 ساله از بخش داخلی مورد مشاوره قرار گرفته است. وی با علائم کاهش وزن شدید و عدم غذا خوردن که منجر به ضعف و بی حالی شدید شده بستری شده است. او اظهار می دارد وزن من زیاد است و اصرار به نخوردن غذا دارد. BMI وی معادل 15 است. کدام مورد در بررسی آزمایشگاهی افزایش می یابد؟

الف) Cholesterol ✓

ب) Estrogen

ج) Triiodothyronine

د) Luteinizing Hormone

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۶۷- طبق معیارهای DSM-5 حداقل سن تشخیص گذاری برای PICA چند ماهگی است؟

- الف) 6
- ب) 12
- ج) 18
- د) 24 ✓

۶۸- سوء مصرف کدام یک از مواد زیر از نظر تأثیر پاداش reward effect با بقیه گزینه ها متفاوت است؟

- الف) Opiates
- ب) Cocaine
- ج) Amphetamines
- د) Steroids ✓

۶۹- در کودکی با علائم دوره های مکرر برخاستن از بستر در طول خواب و راه رفتن با چهره ی مات و خیره، دوره های راجعه بیدار شدن های ناگهانی همراه با ترس شدید، حرکات کلیشه ای تکراری کوتاه در تمام طول شب مراجعه کرده است. در کودک فوق کدام مورد به نفع تشخیص تشنج می تواند باشد؟

- الف) چهره مات و خیره
- ب) ترس شدید
- ج) راه رفتن در خواب
- د) حرکات کلیشه ای کوتاه ✓

۷۰- کودکی با علائم گرفتگی صدا در روز، حالت تنگی نفس روزانه و ویزینگ در ناحیه فوقانی قفسه صدی و تراشه مراجعه کرده است. کدام تشخیص برای وی محتمل تر است؟

- الف) Somatic cough syndrome
- ب) Vocal cord dysfunction ✓
- ج) Asthma
- د) Tic cough

۷۱- شناخته شده ترین ویروس در ارتباط با سندرم خستگی مزمن کدام است؟

- الف) هرپس سیمپلکس ۱
- ب) هپاتیت B
- ج) Rubella
- د) Epstein-Barr ✓

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۷۲- در یک مصاحبه انگیزشی درمانگر از نوجوان سوال می کند " بنظرت بدترین چیزی که ممکن است با ادامه مصرف تو اتفاق بیفتد چیست؟" این سوال در چه مرحله ای از مصاحبه انگیزشی بیان می شود؟

الف) evoking ✓

ب) engaging

ج) focusing

د) planning

۷۳- در یک مصاحبه انگیزشی درمانگر از نوجوان سوال می کند "بر اساس آنچه توضیح داده ای در مقایسه با دوستانت مشکلات زیادی را در ارتباط با مصرف مواد تجربه کرده ای" این سوال چه مرحله ای از مصاحبه انگیزشی را مطرح می کند؟

الف) focusing

ب) planning

ج) evoking

د) engaging ✓

۷۴- کاربرد فیلیال تراپی در همه موارد زیر موثر شناخته شده است، بجز؟

الف) کودکان پیش دبستانی

ب) انطباق نوجوان با بیماری جدی جسمی

ج) موارد اورژانس پزشکی در کودکان بزرگتر

د) نوجوان با اختلال افسردگی ✓

۷۵- در رواندرمانی فردی بیان هیجانان مرتب با مشکلات بخصوص در مورد ترومای روانی چه نام دارد؟

الف) Reenactment

ب) Abreaction ✓

ج) Clarification

د) Mentalization

۷۶- در همه موارد زیر استفاده درمانگر از دو تکنیک uncovering, coaching مناسب شناخته شده است بجز؟

الف) Habit disturbances

ب) Obsessive compulsive symptoms

ج) Phobias

د) Bipolar I disorder ✓

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۷۷- همه موارد زیر جزو فواید آموزش روانشناختی خانواده بصورت گروهی در مقایسه با تک خانواده می باشد بجز؟

الف) Development of support network

ب) Opportunity to talk other family

ج) Flexibility in scheduling ✓

د) Identifying with other family successes

۷۸- در کدامیک از تکنیک های آموزش روانشناختی زیر، از فعالیتهای لذت بخش و آرامبخش به منظور تنظیم حالات هیجانی کودکان استفاده می شود؟

الف) Toolkit ✓

ب) Mood chart

ج) Thinking, feeling, doing

د) Bibliotherapy

۷۹- پسر 4 ساله ای به علت عصبانیت، حملات قشقرق، کتک زدن بچه ها، از مهد کودک ارجاع شده است. تعامل والدین در جلسه پاتولوژیک می باشد، مادر افسرده و پدر پرخاشگر است. همه اقدامات درمانی زیر مناسب است بجز؟

الف) شروع جلسات آموزش فرزند پروری برای والدین ✓

ب) ارزیابی بیشتر کودک و در صورت لزوم تجویز دارو

ج) ارجاع والدین به جلسات زوج درمانی

د) ارزیابی انفرادی والدین جهت درمان

۸۰- در مقایسه با بزرگسالان در کودکان به دنبال کدام عمل جراحی شانس دلیریوم خیلی کمتر است؟

الف) Orthopedic surgery

ب) GI surgery

ج) Renal surgery

د) Post cardiomy ✓

۸۱- نوجوان 15 ساله ای که با تشخیص اختلال دو قطبی I فاز مانیک در بخش بستری است از 2 ساعت قبل روی یک پا در گوشه بخش ایستاده است و تکان نمی خورد. به سوالات معاینه کننده پاسخ نمی دهد، سکوت کرده است و در مقابل معاینه مقاومت نموده و همکاری نمی کند. کدام اقدام درمانی در اولویت قرار دارد؟

الف) انفوزیون وریدی لورازپام ✓

ب) تزریق عضلانی دیازپام

ج) انفوزیون وریدی هالوپریدول

د) انفوزیون وریدی فنوباربیتال

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۸۲- همه موارد زیر در خودانگاره منفی (Negative self image) کودکان مبتلا به بی اختیاری ادراری شبانه (Nocturnal enuresis) مطرح شده است به غیر از؟

الف) Male gender

ب) Age of onset of enuresis



ج) Primary enuresis

د) Frequency of wet nights

۸۳- پسر 7 ساله ای از 6 ماه قبل بی اختیاری مدفوع داشته و طبق اظهار والدینش ماهی چند بار مدفوع خود را در لباس و یا مکانهای نامناسب خانه دفع می کند. در بررسی طبی غیر از بیوست مشکل دیگری ندارد. روش درمانی خط اول برای وی کدام است؟

الف) Treatment with laxatives or mineral oil

ب) Behavioral modification + Biofeedback

ج) Education about bowel functioning



د) Behavioral modification + Cisapride

۸۴- در تستهای روانشناختی کودکان سن مدرسه که در آینده تشخیص Borderline Personality Disorder (BPD) خواهند گرفت، کدامیک از یافته های زیر دیده می شود؟

الف) مکانیسم دفاعی سرکوب

ب) نقص در محتوای تفکر

ج) نقص در توجه



د) آشفتگی در کارکرد سوپرایگو

۸۵- دختر 15 ساله با بی ثباتی خلقی، عصبانیت شدید، خودزنی های متعدد، روابط اجتماعی آشفته و ناپایدار، بی هدفی، احساس پوچی و نقص در هویت به درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان ارجاع شده است. کدامیک از درمان های روانی اجتماعی زیر برای ایشان مناسب است؟

الف) Family focused therapy

ب) Cognitive behavioral therapy

ج) Cognitive analytic therapy



د) Parent management training

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۸۶- در کودکانی که تشخیص نارضایتی جنسیتی (Gender dysphoria) دارند همبودی با کدام اختلال زیر شایع تر است؟

الف) نقص توجه - بیش فعالی

ب) طیف اوتیسم

✓ ج) اضطرابی

د) ایذایی

۸۷- از نظر ملاکهای تشخیصی DSM-5 برای نارضایتی جنسیتی کدام مورد زیر در کودکان در مقایسه با نوجوانان صحیح است؟

الف) طول مدت علایم در کودکان 12 ماه و در نوجوانان 6 ماه است.

✓ ب) تعداد علایم تشخیصی در کودکان حداقل 6 علامت و در نوجوانان 2 علامت است.

ج) در کودکان افت کارکرد اجتماعی جزو ملاکها نمی باشد.

د) در کودکان میل قوی برای ویژگی های ثانویه جنس مخالف جزء ملاکها نمی باشد.

۸۸- همه رفتارهای زیر در افرادی که تاریخچه سوء رفتار جنسی (Sexual Abuse) دارند در مقایسه با افراد فاقد چنین تاریخچه ای بیشتر دیده می شود بجز؟

الف) Talks about sexual acts

✓ ب) Stands too far to others

ج) Tries to look at nude pictures

د) Talks filirtatiously

۸۹- پسر بچه 6 ساله ای از سوی والدین ناتنی اش بدلیل بیش فعالی و رفتارهای اجتماعی نامناسب در مدرسه ارجاع شده است. در سن 4 سالگی به فرزندخواندگی آنها در آمده است و قبل از آن در یک مرکز نگهداری بهزیستی بود که در آنجا مراقبینش در شیفت های چرخشی کار می کردند. والدین ناتنی اش از اینکه نمی توانند با او ارتباط برقرار کنند سرخورده شده اند. کودک با بسیاری از بزرگسالان و کودکان ارتباط کلامی برقرار می کند او به همه علاقه نشان می دهد و اغلب غریبه ها را مشتاقانه دنبال می کند. اما وقتی دیگران دچار صدمه می شوند همدلی چندانی نشان نمی دهد. براساس معیارهای DSM-5 چه تشخیصی برای وی مطرح است؟

الف) Reactive attachment disorder emotionally withdrawn / inhibited

✓ ب) Disinhibited social engagement disorders

ج) Reactive attachment disorder indiscriminately social / disinhibited

د) Posttraumatic stress disorder preschool subtype

۹۰- علت بی بند و باری جنسی (Promiscuity) در دختر نوجوان با اختلال شخصیت مرزی و سابقه سوء رفتار جنسی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف) افزایش لذت جویی

✓ ب) احساس کنترل درماندگی حین سوء رفتار جنسی

ج) تکرار اجبار گونه تجربه سوء رفتار جنسی

د) احساس پوچی مزمن

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۹۱- کدامیک از رفتارهای زیر در کودکان با سابقه سوء رفتار جنسی شایع است ولی در افراد نرمال و سایر بیماران روانپزشکی نادر می باشد؟

- الف) Masturbate with hands ()
 ب) Talks about sexual acts ()
 ج) Put mouth on sex parts () ✓
 د) Stands too close to others ()

۹۲- در تنظیم دوز فلووکسامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس جبری کدامیک از عوامل زیر در نظر گرفته نمی شوند؟

- الف) سن ()
 ب) جنس ()
 ج) تداخلات دارویی ()
 د) سابقه خانوادگی () ✓

۹۳- کدام نوع از رسپتورهای نورونی است که در آن نوروترنسمیتر به رسپتور متصل شده و منجر به تغییر در نفوذپذیری کانال یونی ظرف چند هزارم ثانیه می شود و در نهایت باعث نفوذ یون هایی مثل کلسیم، فسفر و پتاسیم می شود؟

- الف) Ionotropic () ✓
 ب) G- Protein-coupled ()
 ج) Serotonergic ()
 د) Glutamatergic ()

۹۴- دختر 14 ساله ای با تشخیص اختلال دوقطبی فاز مانیا در بخش روانپزشکی بستری شده. در ECG به عمل آمده $QT = 0.46$ می باشد. در این بیمار کدامیک از آنتی سایکوتیک های زیر را تجویز می کنید؟

- الف) Risperidone ()
 ب) Olanzapine ()
 ج) Aasenapine () ✓
 د) Quetiapine ()

۹۵- دختر 7 ساله ای از حدود دو ماه پیش به دلیل اختلال اضطراب جدایی با فلوکستین 10 میلی گرم در روز تحت درمان بوده و علائمش کنترل شده. از دو هفته قبل به دلیل گاستریت تحت درمان با سایمتیدین نیز قرار گرفته است. در ده روز اخیر دچار بی قراری، بی خوابی، رفتارهای مهارگسیخته و پرخاشگری شده. برای این کودک چه مداخله ای انجام می دهید؟

- الف) قطع فلوکستین ()
 ب) قطع سایمتیدین () ✓
 ج) افزودن کلونازپام ()
 د) افزودن ریسپریدون ()

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۹۶- در داروهای سایکوتروپ با کینتیک غیر خطی (zero-order) ، میزان داروی حذف شده (eliminated) با کدامیک از گزینه های زیر قابل توضیح است؟

- (الف) متناسب با سطح پلاسمایی تغییر می کند.
 (ب) در یک واحد زمانی میزان ثابتی از دارو حذف می شود. ✓
 (ج) متناسب با میزان گردش دارو در جریان خون است.
 (د) متناسب با میزان استفاده از سیستم CYP450 است.

۹۷- Flue-like syndrome به دنبال قطع ناگهانی همه داروهای زیر اتفاق می افتد بجز؟

- (الف) سرتراپین
 (ب) ونلافاکسین
 (ج) فلوکستین ✓
 (د) فلووکسامین

۹۸- کنترل فشار خون در کودکانی که آنتی سایکوتیک مصرف می کنند، با چه فواصل زمانی باید انجام گیرد؟

- (الف) قبل از شروع دارو و سالی یک بار
 (ب) قبل از شروع دارو و هر 6 ماه یک بار تا یک سال و بعد سالی یک بار
 (ج) قبل از شروع دارو و هر سه ماه یک بار
 (د) قبل از شروع دارو و هر 3 ماه یک بار تا یک سال و بعد سالی یک بار ✓

۹۹- کدامیک از عوارض کلونیدین در کودکان کمتر شایع است؟

- (الف) Sedation
 (ب) Irritability
 (ج) Dry mouth ✓
 (د) Mid sleep awakening

۱۰۰- در یک نوجوان 15 ساله ای که به علت اختلال بیش فعالی/نقص توجه تحت درمان با 50 میلی گرم آتوماکستین روزانه می باشد، بروز علائم زیر هشدار برای قطع دارو می باشد، بجز؟

- (الف) پرخاشگری
 (ب) وسواس عملی ✓
 (ج) هیپاتیت
 (د) افکار خود کشی

اخلاق پزشکی

آزمون: روانپزشکی_کودک_و_نوجوان مدت آزمون: 140

۱۰۱- پزشک همکاران با شما تماس گرفته و اظهار می‌نماید که یکی از نزدیکان ایشان، برای گرفتن اطلاعاتی در مورد بیماری و وضعیت یکی از بیماران شما به ایشان مراجعه کرده است و قصد او ازدواج است. بیماران پسر 28 ساله‌ای است که مدت 2 سال است به دلیل بیماری التهابی روده تحت نظر شما بوده است. شما چه رویکردی را در پاسخ به این درخواست اتخاذ می‌نمایید؟

- ✓ الف) با توجه به اهمیت امر ازدواج، گفتن حقایق بیماری در این مورد مانعی نخواهد داشت.
- ب) اطلاعات خصوصی بیمار را به هیچ وجه به شخص ثالث حتی به پدر او ارایه نمی‌کنم مگر با رضایت مکتوب او.
- ج) اصرار در صورت درخواست دفتر ازدواج، با بیان وضعیت بیماری بیمارم موافقت می‌کنم.
- د) در صورت تعارض بین تعهد به رازداری و نفع فرد شخص ثالث، سعی می‌کنم منافع و مضرات نقض رازداری را ارزیابی کنم.

۱۰۲- در مورد پرداخت مالی ویژه، که ممکن است به صورت پول، درصدی از حق ویزیت، هدیه یا مانند آن، از سوی متخصصین پزشکی، آزمایشگاه‌ها، و پاراکلینیک‌ها به پزشکان پرداخت شود، کدام نکته صحیح است؟

- ✓ الف) باعث بهبود کار تیمی و افزایش کیفیت خدمات می‌شود.
- ب) ممکن است افزایش هزینه‌های پزشکی بیمار را به دنبال داشته باشد.
- ج) از تحمیل خدمات تشخیصی یا درمانی غیرضروری به بیمار جلوگیری می‌کند.
- د) یک جبران مادی در مقابل ارجاع بیمار است و مشکل اخلاقی ندارد.

سي و سومين دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي

مورخ ۱۳۹۸/۶/۷

رشته روانپزشكي كودك و نوجوان

نوجه ۱- رايانه فقط علامتهايي را كه به صورت [X] كامل پر شده باشد. مي پذيرد و ممكن است علامتهايي [] [] [] [] [] را نپذيرد.
۲- پاسخ سئوالاات فقط با مداد مشكي ترم (HB) بر مقابل سئوال مربوطه مطابق نمونه صحيح علامتگذارن شود. ۳- اگر اين دانشنامه منطبق به شما نيست مسئول جلسه را آگاه سازيد.

لطفاً در اين مستطيلها هيچگونه علامتي نزنيد.

Table with 6 columns and 50 rows of bubbles for marking answers. Each cell contains a question number and a set of bubbles for marking the correct answer.