



Zeynali's Biology®


(New edition . 2019- 2020)

تنظیم عصبی

زیست شناسی ۲ - فصل ۱

Bonne renommée vaut
mieux que ceinture dorée





یاخته های بافت عصبی

گفتار ۱

بافت عصبی:

کمترین وزن نسبت به سه بافت اصلی دیگردارد

شامل سلولهای عصبی (نورون) و سلولهای غیرعصبی (نوروگلیا یا پشتیبان می باشد

④ یاخته های عصبی یا نورون ها

یاخته های اصلی بافت عصبی محسوب می شوند

می توانند با سایر سلول های بدن ارتباط برقرار کنند

سلول هایی کاملاً تمایز یافته بوده و اغلب آنها پس از دوران جنینی قادر توان تقسیم می باشند

○ سه ویژگی اصلی نورون ها:

I. تاثیرپذیری: متاثر از محرك های گوناگون جریان عصبی تولید می کنند

II. هدایت جریان عصبی: سیر پیام عصبی از یک نقطه‌ی نورون به نقطه دیگر آن نورون

III. انتقال پیام عصبی: پیام عصبی را به سلول دیگری منتقل می کنند که الزاماً نورون نمی باشد

!
ویژگی های فوق منحصر به نورونها نبوده و در سلول های گیرنده‌ی حسی نیز مشاهده می شوند

▪ اساس ساختاری نورون ها

جسم سلولی حاوی هسته و اغلب اندامک ها می باشد

دارینه یا دندربیت (درخت مانند) پیام را دریافت و به جسم سلولی هدایت می کنند

آسه یا آکسون (محور مانند) پیام را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کنند

!
نمی توان گفت تمام متابولیسم سلولی در جسم سلولی روی می دهد


!
علاوه بر جسم سلولی در سایر قسمت های نورون نیز اندامک ها پراکنده هستند

!
دریافت پیام، علاوه بر دندربیت ها می تواند از جسم سلولی و سایر نواحی بدون میلین باشد

Learning By Test

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند، بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند، (سراسری ۹۲)

- ۱) برخلاف - دارای انشعابات فراوان می باشد.
- ۲) مانند - توسط غلافی از جنس لیپید پوشانده شده است.
- ۳) مانند - واجد شبکه آندوپلاسمی گسترده و هسته می باشد.
- ۴) برخلاف - می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های سیناپسی بپیوندد.



NEUROGLIAL CELL TYPE	ASTROCYTE	OLIGODENDROCYTE	MICROGLIAL CELL	EPENDYMAL CELL
FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> Anchor neurons and blood vessels Regulate the extracellular environment Facilitate the formation of the blood-brain barrier Repair damaged tissue 	<ul style="list-style-type: none"> Myelinate certain axons in the CNS 	<ul style="list-style-type: none"> Act as phagocytes 	<ul style="list-style-type: none"> Line cavities Cilia circulate fluid around brain and spinal cord Some secrete this fluid

سلولهای پشتیبان یا نوروگلیا

جزء بافت عصبی هستند اما سلول عصبی محسوب نمی شوند همگی هسته دار بوده و نسبت به نورونها فراوانتر اما کوچک تر می باشند داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند حفظ هم ایستایی مایع اطراف آنها مثل حفظ مقدار طبیعی یون ها موثر هستند

○ این سلول ها وظایف گوناگونی دارند:

- A. بعضی در تغذیه نورون ها و انتقال مواد از خون به آنها ایفای نقش می کنند
- B. بعضی محافظت و دفاع از نورون ها را برعهده داشته و می توانند فاگوسیتوز کنند
- C. بعضی به دور آکسون ها و نورونها پیچیده و با ایجاد غلاف میلین نورون را عایق بندی می کنند

هم ایستایی (هومئوستازی):

مجموعه اعمالی که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی بدن انجام می شود

از ویژگی های اساسی همهی موجودات زنده (تک یاخته و پر یاخته) است

محیط جانداران همواره در تغییر است اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد

دستگاه دفع ادرار، دستگاه درون ریز، دستگاه عصبی بیشترین نقش را در ایجاد و حفظ آن دارند

❗ بسیاری از بیماری ها در نتیجهٔ برهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند

صرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات: خیز

افزایش کربن دی اکسید و کاهش شدید اکسیژن: تهدید حیات

افزایش زیاد گلوکز خون: دیابت شیرین

افزایش اوریک اسید: نقرس

Learning By Test

همهی نوروگلیاها،..... هستند. (سراسری ۸۹)

- ۱) انتقال دهندهٔ پیام عصبی
- ۲) سلول های غیر عصبی هسته دار
- ۳) عایق کنندهٔ دندانیت ها و آکسون ها
- ۴) سلول های مؤثر در تغذیهٔ نورون ها

غلاف میلین:

سلول های پشتیبان خاصی برای تشکیل میلین دور آکسون یا دندریت می پیچند عایق بندی رشته های آکسون و دندریت نسبت به مایع میانبافتی و ایجاد نوعی نارسایی را موجب می شود

از جنس غشای سلوی و در اطراف بسیاری از نورون ها تشکیل می شود
نواحی میلین دار نمایی روشن تر نسبت به نواحی بدون میلین دارند

این غلاف در قسمت هایی از رشته قطع می شود که به این قسمت ها گره رانویه گفته می شود
در گره های رانویه تماس مستقیم غشای نورون با مایع میانبافتی و تبادل یونها ممکن می باشد
جهش پیام از یک گره به گره دیگر موجب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شود

سرعت هدایت پیام عصبی ارتباط مستقیم با قطر نورون و وجود میلین دارد!

رشته های دارای میلین، پیام عصبی را بسیار سریع تر از رشته های بدون میلین، اما هم قطر، هدایت می کنند
وجود میلین به خصوص در نورون هایی که مربوط به حرکات سریع بدن هستند، بسیار مفید است
می توان گفت وجود میلین سطح تماس غشای نورون و مایع اطراف را کاهش می دهد

③ مائتیپل اسکلروزیس MS: نوعی بیماری خود ایمنی

حاصل تهاجم دستگاه ایمنی به غلاف میلین سلول های عصبی مغز و نخاع(دستگاه عصبی مرکزی)



در این تهاجم سلول های پشتیبان میلین ساز آسیب می بینند و نه خود نورونها
با آسیب میلین، فعالیت سلول های عصبی(هدایت پیام) اختلال پیدا می کند

در مبتلایان، ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود

اختلال در تکلم، اختلال در بینایی و حرکت و نیز بی حسی و لرزش از علایم بیماری است



در تصویر برداری ها مناطق درگیر بخشی از ماده سفید هستند

در بدن مبتلایان پادتن های خاصی در نتیجه ای عملکرد نادرست لنفوسيت های B تولید می شود





Neuron Anatomy



نورون ها از نظر عملکرد

I. نورون های حسی :

اطلاعات را از سراسر بدن بویژه اندام های حسی به مغز و نخاع می رسانند

ویژگی های ظاهری نوع میلین دار :

خروج یک زائد از جسم سلولی که ما بین دو قطعه میلین قرار دارد

دندritیت بلندتر از آکسون بوده و هر دو میلین دار هستند

!
در شبکه چشم انواع بدون میلین با خروج دو زائد از جسم سلولی مشاهده می شود

!
در لوب بویابی انواعی با آکسون بلند تر از دندrit وجود دارند

!
برخی اعصاب محیطی شامل دندritهای بلند و برخی دیگر آکسونهای بلند هستند

II. نورون های حرکتی:

فرمان های مغز و نخاع را به ماهیچه ها و اندام های دیگر مانند غدد منتقل می کنند

ویژگی های ظاهری نوع میلین دار :

خروج چندین زائد از جسم سلولی که در یک سمت آن میلین وجود دارد

آکسون میلین دار و بلندتر از دندrit بدون میلین می باشد

III. نورون های رابط :

بین نورون های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می کنند

فقط در مغز و نخاع قرار دارند و در دستگاه عصبی محیطی مشاهده نمی شوند

ویژگی های ظاهری نوع بدون میلین :

خروج چندین زائد از جسم سلولی که در هیچ سمت ان میلین وجود ندارد

سلول هایی کوچک با آکسون بلندتر از دندrit که هر دو فاقد میلین هستند


!
هر سه نوع یاخته عصبی می توانند میلین دار یا بدون میلین باشند(چاپ ۹۸)




The Cell Membrane

(a) Membrane Phospholipids


Membrane phospholipids form bilayers, micelles, or liposomes. They arrange themselves so that their nonpolar tails are not in contact with aqueous solutions such as extracellular fluid.



(b) The Fluid Mosaic Model of Biological Membranes



(c) Concept Map of Cell Membrane Components



غشاء یاخته ای



اطراف یاخته های زنده را احاطه کرده و مرز بین درون یاخته و بیرون آن است

مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از غشا عبور کند

نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد و فقط برخی از مواد می توانند از آن عبور کند

از دو لایه مولکول های فسفولیپید تشکیل شده است که در آن پروتئین و کلسترول نیز قرار دارد

انواعی از کربوهیدرات ها به مولکول های فسفولیپیدی و پروتئینی متصل اند

④ فسفولیپید:

به صورت دولايه، سدی در برابر مولکول های آب و مواد محلول در آن، ایجاد می کند

سرهای آبدوست از یکدیگر دور و دم های آبگوییز به سمت یکدیگر می باشند

این بخش از غشا نسبت به آب کاملاً غیرقابل نفوذ نیست

مولکول های آب به علت کوچکی، می توانند به مقدار اندک از آن عبور کند

مولکول های لیپیدی و غیر قطبی به آسانی از این بخش غشا عبور می کند

⑤ کلسترول

نوعی استروئید بوده و فاقد اسید چرب و گلیسرول و گروه فسفات می باشد

واجد چهار حلقه ای آلی از قرار یک حلقه ی 5 ضلعی و سه حلقه ی 6 ضلعی می باشد

در ساختار غشای سلول های جانوری همراه با فسفولیپید ها شرکت دارد

می تواند در لایه فوقانی و تحتانی فسفولیپیدی حضور داشته باشد



⑥ کربوهیدرات

این مولکول ها فقط در سطح خارجی غشا حضور دارند

در تماس با ماده بین سلولی بوده و با سیتوسل ارتباطی ندارند

اگر به پروتئین ها متصل باشند گلیکوپروتئین شکیل می شود

اگر به لیپید ها متصل باشند گلیکولیپید تشکیل می شود



(a) Passive transport: facilitated diffusion

(b) Active transport

Learning By Test

چند مورد جمله‌ی زیر را به طور نادرستی تکمیل می‌کند؟ (سراسری ۹۲)

هر پروتئین غشایی.....

الف) برای ایفای نقش خود نیاز به حصرف انرژی دارد

ب) برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می‌کند

ج) حداقل با زنجیره‌ای از پلی ساکارید‌ها اتصال دارد

د) به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول‌ها کمک می‌کند

۴ ۳ ۲ ۱

۴ ۳ ۲ ۱

پروتئین‌های غشا:

A. سطحی:

در یکی از سطوح داخلی یا خارجی غشا قرار دارند

I. داخلی: در تماس با سیتوسول و پروتئین‌های اسکلت سلولی می‌باشند

II. خارجی: در تماس با مایع بین سلولی می‌باشند

!
فضایی برای عبور دادن مواد در ساختار خود ندارند

B. سراسری:

در تماس با نواحی آبدوست و آبگریز هر دو لایه فسفولیپیدی هستند

!
می‌توانند فضایی برای عبور دادن مواد در ساختار خود داشته باشند

I. کanalی

دارای عملکرد اختصاصی بوده و در انتشار تسهیل شده شرکت می‌کنند

نشتی: همیشه باز بوده و منافذ پر از آبی تشکیل می‌دهند

دریچه دار: با تغییر شکل متناوباً باز و بسته می‌شوند

!
کانالهای سدیمی و پتاسیمی و آکوایپورین‌ها از کانال‌های غشایی هستند

II. ناقل:

دارای عملکرد اختصاصی بوده و در انتقال فعال شرکت می‌کنند

نیازمند انرژی ATP یا الکترون‌های بر انگیخته یا انرژی انتشاری یونها می‌باشند

!
پمپ سدیم پتاسیم . پمپ H^+ در میتوکندری و کلروپلاست از ناقلين غشایی هستند

III. گیرنده‌ها

اساس کار دستگاه ایمنی و درون ریز را بر عهده دارند

عمدتاً ماده‌ای را از خود عبور نمی‌دهند

!



Learning By Test

هر پروتئینی، که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود، دارد. (سراسری ۹۵)

- (۱) سراسری - با بخش اب دوست مولکول های مجاور تماس سطحی - به ریز رشته های اسکلت سلولی اتصال
- (۲) سراسری - کanal تخصصی برای عبور مواد سطحی - با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال

۴ | ۳ | ۲ | ۱

GOLDEN NOTE

پروتئین های ناقل یا کanalی غشایی می توانند عملکرد آنزیمی نیز داشته باشند پمپ سدیم و پتاسیم نوعی پروتئین ناقل با فعالیت آنزیمی آبکافت ATP می باشد در غشای تیلاکوئید کلروپلاست و غشای داخلی میتوکندری پروتئین کanalی با توان آنزیمی تولید ATP وجود دارد کanal های دریچه دار می توانند گیرنده ای برای انتقال دهنده های عصبی باشند تغییر شکل دریچه ای کanal ها می توانند در اثر تعییر ولتاژ دوسوی غشا یا تاثیر نوعی ماده ای خاص روی دهد مولکول های آب به دلیل کوچک بودن می توانند از کanal های اختصاصی عبور کنند

نحوه انتقالات سلولی:

A. مولکول های کوچک

انتقال غیر فعال

می تواند به صورت انتشار ساده ، تسهیل شده و اسمز روی دهد

مواد به دلیل داشتن انرژی جنبشی جابجا شده و یا خته انرژی زیستی مصرف نمی کند

انتقال فعال



پروتئین های ناقل غشا با دریافت انرژی مواد را در خلاف شیب غلظت را جابجا می کنند

B. مولکول های بزرگ

آندوسیتوز و اکزوسیتوز

ذرات درشت بدون توجه به شیب غلظت به سلول جذب یا از آن ترشح می شوند

در این پدیده ها مصرف ATP در سیتوپلاسم بوده و توسط پروتئین های غشایی نمی باشد

**TIME****Simple Diffusion**

۸

انتشار ساده :

نوعی انتقال غیر فعال و پدیده ای فیزیکی بوده و با افزایش دما سرعت می یابد
در این روش ذرات از لایه لای فسفولیپید ها عبور می کنند نه از منافذ پروتئین ها ای غشایی
جريان ذرات بیشتر از جای پر غلظت به جای کم غلظت (در جهت شبی غلظت) می باشد
نتیجه انتشار هر ماده، یکسان شدن غلظت آن در دو سوی غشا و رسیدن به تعادل است

⚠ پس از رسیدن به تعادل همچنان جابجایی ذرات قابل انتظار می باشد اما تغییر غلظت روی نمی دهد

مثالهایی از انتشار ساده:

عبور مولکول های آب از لایه لای فسفولیپید ها
ورود اکسیژن به یاخته و خروج کربن دی اکسید از آن
جذب مواد لیپیدی و محلول در لیپید به سلول های روده ای باریک
جذب ویتامین های محلول در آب به جز B12

**⚠ در انتشار حرکت ذرات در هردو جهت شبی غلظت و خلاف شبی غلظت مشاهده می شود
⚠ مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند در همه ای جهات جابجا شوند**

انتشار تسهیل شده :


در این روش پروتئین های کانالی غشا، انتشار مواد را تسهیل می کنند
جريان ذرات بیشتر از جای پر غلظت به جای کم غلظت (در جهت شبی غلظت) می باشد

مثالهایی از انتشار تسهیل شده:


ورود سدیم به سلول و خروج پتاسیم از آن
خروج گلوکز و آمینواسید ها از سلول های پوششی روده ای باریک و ورود به مایع بین یاخته ای
عبور مولکول های آب از آکواپورین ها



① A Na^+/K^+ pump creates a concentration gradient of sodium ions.



② A carrier protein uses the potential energy of the sodium ion gradient to power the transport of glucose.



انتقال فعال: حرکت مواد در عرض غشای پلاسمایی از جای کم تراکم به جای بزرگ تراکم (در خلاف جهت شبک غلظت)

پروتئین های ناقل نیازمند صرف انرژی ATP یا الکترون های پر انرژی هستند

⚠ غلظت مولکول یا یون انتقالی به تعادل نمی رسد.

مثالهایی از انتقال فعال:

جذب موادی همچون آهن و کلسیم در روده

عملکرد پمپ سدیم پتاسیم در غشای سلول ها

هم انتقالی:

نوعی انتقال فعال که ثانویه نامیده میشود

انرژی زیستی مستقیماً مورد استفاده قرار نمی گیرد

از انرژی ذخیره شده به شکل اختلاف غلظت یون ها در دو طرف غشای سلول استفاده می شود

⚠ ایجاد شبک غلظت یونها حاصل انتقال فعال اولیه است.

مثال از هم انتقالی:

ورود گلوکز و بیشتر آمینواسید ها به سلول های پوششی روده به روش هم انتقالی با سدیم می باشد

Learning By Test

در انسان، به منظور ورود مولکولهای گلوکز به یاخته های پوششی بزر روده، چند مورد زیر ضروری است؟ (سراسری ۹۸)

الف) حضور مولکولهای ویژه ای پروتئینی در غشای یاخته

ب) فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم و پتاسیم

ج) انرژی حاصل از شبک غلظت سدیم

د) تشکیل کیسه های غشایی

۴(۴)

۳(۳)


۲(۲)

۱(۱)




MEMBRANE TRANSPORTERS

(a) Channel proteins create a water-filled pore.




can be classified


Gated channels
open and close in response to signals.



Open channels
or pores
are usually open.




(b) Carrier proteins never form an open channel between the two sides of the membrane.




can be classified


Uniport carriers
transport only one kind of substrate.




Symport carriers move two or more substrates in the same direction across the membrane.






Cotransporters
Antiport carriers
move substrates in opposite directions.







(b) Electron micrograph of exocytosis

Product being released by exocytosis
Exocytic vesicle



- ① Membrane of coated pit folds inward.
- ② Ligands bind to receptors in pit and membrane folds inward.
- ③ Vesicle forms and pinches off in the cytosol.
- ④ Once inside the endosome, the ingested products are
 - (a) returned to the plasma membrane,
 - (b) sent to a lysosome, or
 - (c) may exit out of the opposite side of the cell.



(a) Pinocytosis

(b) Receptor-mediated endocytosis

اگزوسیتوز یا برون رانی:

خروج ذرات درشت از سلول از طریق غشای سلولی همراه با تشکیل وزیکول و فعالیت اسکلت سلولی

پیوستن وزیکول به غشا منجر به افزایش سطح غشای سلول می شود

طی اگزوسیتوز وزیکول سلول را ترک نمی کند بلکه محتويات ان تخلیه می گردد

نیازمند مصرف ATP در سیتوپلاسم و گاهی وجود کلسیم می باشد

مثالهایی از اگزوسیتوز:

ترشح آنزیم های گوارشی، انتقال دهنده های عصبی، هیستامین

! هورمون کلسی تونین پاراتیروئیدی موجب تنظیم کلسیم خون می شود

! ویتامین D فعال برای جذب کلسیم در روده ای باریک ضروری می باشد

! هورمون های تیروئیدی برای تنظیم متابولیسم سلول ها ضروری می باشند

آندوسیتوز یا درون رانی:

ورود ذرات درشت به سلول از طریق غشای سلولی

همراه با تشکیل وزیکول و فعالیت اسکلت سلولی

تشکیل وزیکول از غشای سلول منجر به کاهش سطح آن می شود




نیازمند مصرف انرژی ATP در سیتوپلاسم می باشد

مثالهایی از آندوسیتوز:

فاغوسیتوز در سلول های بیگانه خوار و بلعیدن ذرات غذایی توسط برخی آغازیان

! در آندوسیتوز سطح داخلی وزیکول، ویژگی های سطح خارجی غشای سلول را دارد

! در آندوسیتوز و اگزوسیتوز شبیه غلظت مطرح نمی باشد



ایجاد پیام عصبی

مقدار یونها در دو سوی غشا، یکسان نیستند

تفاوت غلظت یونها موجب تفاوت بار الکتریکی دو سوی غشا یا خته عصبی می شود با وجود تفاوت بار الکتریکی بین دو سوی غشا، اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود می آید

پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یونها در دو سوی غشا یا خته عصبی ایجاد می شود

!
سدیم کاتیون اصلی خارج سلول ها و پتانسیم کاتیون اصلی داخل سلول ها می باشد

!
لایه فسفولیپیدی غشا اجازه عبور یونها بدون دخالت پروتئین های را نمی دهد

پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا:

تراکم یون پتانسیم در داخل سلول بیشتر است

تمایل به خروج از سلول در جهت شبی غلظت از طریق کانال های نشستی دارند

تراکم یون سدیم در خارج سلول بیشتر است

تمایل به ورود به سلول در جهت شبی غلظت از طریق کانال های نشستی دارند

!
نفوذ پذیری غشا نسبت به پتانسیم بیشتر از سدیم می باشد

$$\text{خروج } Na^+ < \text{ورود } K^+$$



با خروج بارهای مثبت بیشتر نسبت به ورود انها، منفی تر شدن داخل نسبت به خارج روی می دهد

$$\Delta V = -70 \text{ mV}$$

از علل نفوذپذیری بالای غشا نسبت به پتانسیم:

A. وجود کانال های نشستی (همیشه باز) بیشتر

B. وجود اختلاف غلظت بیشتر



پمپ سدیم پتاسیم: ⑧

نوعی پروتئین سراسری از نوع ناقل که ذرات را در خلاف جهت شیب جابجا می کند

حضور این پمپ در غشای انواع سلول ها برای تنظیم فشار اسمزی سلول ها ضروری می باشد
در نورون ها در پتانسیل آرامش و عمل با میزان فعالیت متغیر فعال می باشد
با انرژی یک مولکول ATP به ترتیب ۳ یون سدیم را از نورون خارج و ۲ یون پتاسیم را به وارد می کند

فعالیت نورون:

پتانسیل آرامش: زمانی که نورون در حال فعالیت عصبی نیست

بین دو سوی غشای نورون، اختلاف پتانسیلی معادل ۷۰ میلی ولت وجود دارد
به طوری که درون سلول نسبت به بیرون آن دارای بار الکتریکی منفی است

علل ایجاد پتانسیل آرامش:

A. نفوذپذیری بالای غشای سلول نسبت به یون های پتاسیم در مقایسه با یونهای سدیم

B. فعالیت پروتئین غشایی به نام پمپ سدیم پتاسیم

؟ در مورد پتانسیل آرامش درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید.

۱. ورود فعالانه ی یون سدیم به نورون روی میدهد. T or F

۲. ورود فعالانه یون پتاسیم به نورون روی میدهد. T or F


۳. ورود یون پتاسیم در جهت شیب غلظت به نورون روی میدهد. T or F

۴. خروج یون سدیم در خلاف جهت شیب غلظت از نورون روی میدهد. T or F

۵. ورود و خروج یون سدیم صورت می گیرد. T or F

۶. ورود و خروج یون سدیم صورت می گیرد. T or F

۷. کانال های دریچه دار یون سدیمی و پتاسیمی باز می باشند. T or F



به دنبال تحریک تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سوی غشا نورون در محل تحریک روی می دهد

در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن مثبت تر می شود و بلاfaciale به حالت اول خود برگردید

علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول: ورود ناگهانی Na^+ از طریق کانال های دریچه دار به داخل سلول

علت بازگشت به حالت آرامش: خروج ناگهانی K^+ از طریق کانال های دریچه دار ز سلول

فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتانسیم سبب می شود غلظت Na^+ و K^+ در دو سمت سلول به حالت اولیه خود برگردد!

نوع پروتئین سراسری نوع عمل جهت انتقال یون نوع یون انتقالی مصرف انرژی ATP فعال در پتانسیل آرامش فعال در پتانسیل عمل

کanal نشستی Na^+	انتشار	شدید	شیب غلظت	-	+	+	+
کanal نشستی K^+	انتشار	پتانسیم	شیب غلظت	-	+	-	+
کanal دریچه دار Na^+	انتشار	شدید	شیب غلظت	-	-	-	+
کanal دریچه دار K^+	انتشار	پتانسیم	شیب غلظت	-	-	-	+
پمپ سدیم پتانسیم	انتقال فعال	خلاف شیب غلظت	سدیم و پتانسیم	+	+	-	+

Learning By Test



بعضی از تارهای عصبی که به دستگاه عصبی حرکتی پیکری تعلق دارند، میتوانند..... (سراسری ۹۳ با تغییر)

(۱) به کمک پمپ سدیم پتانسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.

(۲) اطلاعات گیرنده های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند.

(۳) پیامهای عصبی را از جسم سلوی تا انتهای خود هدایت کنند.

(۴) به واسطه ای فعالیت نوعی سلولهای عصبی عایق بندی شوند.



GOLDEN NOTE

شروع پتانسیل عمل:

ایجاد تحریک روی می دهد

باز شدن کانالهای دریچه دار سدیمی

افزایش نفوذپذیری غشا نسبت به سدیم

بلافاصله پس از آن، داخل نسبت به خارج مثبت تر می شود

قلهٔ نمودار پتانسیل عمل:

تغییر وضعیت دریچه هاروی می دهد

بسته شدن کانالهای دریچه دار سدیمی

در لحظه‌ای تمام کانال‌های دریچه دار بسته هستند

باز شدن کانالهای دریچه دار پتانسیمی

بیشترین فشار اسمزی درون نورون

بلافاصله پس از آن، داخل نسبت به خارج منفی تر می شود

در طی پتانسیل عمل:

پمپ سدیم پتانسیم و کانال‌های نشتشی در حال فعالیت هستند


همچنان ورود و خروج یونها سدیم و پتانسیم روی می دهد

دو مرتبه پتانسیل داخل و خارج نورون برابر می شود

چهار مرتبه اختلاف پتانسیل ۲۵ میلی ولت می باشد

کمترین اختلاف پتانسیل صفر و بیشترین ۷۰ میلی ولت است

دامنهٔ تغییرات اختلاف پتانسیل ۱۰۰ میلی ولت می باشد





حالات کارکردی

جایگزینی

تغییر در پتانسیل

کانال های دریچه دار پتانسیل

کانال های دریچه دار پتانسیل

کامپوند

نحوه ایجاد

حالت آرامش	پتانسیل آرامش	بسه	بسه	بسه	فعال	-۷۰	منفی
اعمال تحریک	شروع پتانسیل عمل	بسه می مانند	باز می شوند	فعال	فعال	-۷۰	منفی
ورود ناگهانی Na^+	ورود ناگهانی Na^+	بسه	بسه	باز	فعال	سیر به سمت مثبت	کاهش می یابد
+۳۰	+۳۰	بسه می شوند	بسه می شوند	باز	فعال	سیر به سمت منفی	کاهش می یابد
خروج ناگهانی K^+	خروج ناگهانی K^+	بسه	بسه	باز	فعال	+۳۰	مثبت
ادامه ای خروج K^+	ادامه ای خروج K^+	بسه	بسه	باز	فعال	-۷۰	منفی
پتانسیل آرامش	پایان پتانسیل عمل	بسه می شوند	بسه بودند	فعالت ر می باشد	-۷۰	-۷۰	منفی

Learning By Test

کدام عبارت درمورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی صحیح است؟ (سراسری ۹۲)

۱) در ابتدای پتانسیل عمل کانالهای دریچه دار پتانسیمی باز می شوند

۲) بعد از پایان پتانسیل عمل تراکم پتانسیم داخل نورون شدیداً کاهش خواهد یافت


۳) با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به +۳۰ کانال های دریچه دار پتانسیمی بسته می شوند

۴) در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی پتانسیل داخل نورون نسبت به خارج منفی می شود

۱۶

A single channel shown during a phase means that the majority of channels are in this state.

Where more than one channel of a particular type is shown, the population is split between the states.



Learning By Test

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (سراسری ۹۸)

در یک سلول عصبی انسان فقط در شرایطی.....

۱) یونهای بار مثبت از کانال های دریچه دار عبور می کنند

۲) کانال های دریچه دار سدیمی و پتانسیمی به طور همزمان باز می گردند

۳) پمپ سدیم و پتانسیم یونهای سدیم بیشتری را به درون سلول وارد می نماید

۴) کانال های بدون دریچه ای پتانسیمی، خروج پتانسیم از درون سلول را ممکن می سازد



جریان نقطه به نقطه ی پتانسیل عمل پس از ایجاد در یک نقطه از یاخته عصبی، تا انتهای رشته عصبی پیام عصبی می نامند !

گره های رانویه چه نقشی در هدایت جهشی دارند؟ ▼

در محل گره ها میلین وجود ندارد و رشته عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط دارد

در گره ها، تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد، ولی در فاصله بین گره ها، این کانال ها وجود ندارند در محل رانویه پتانسیل عمل ایجاد و پیام عصبی درون رشته از یک گره به گره دیگر هدایت می شود

در این حالت به نظر می رسد پیام عصبی از یک گره به گره دیگر می جهد

! در ماهیچه های اسکلتی سرعت ارسال پیام اهمیت زیادی دارد

! نورون های حرکتی ماهیچه های اسکلتی میلین دارند و تغییر میزان میلین به بیماری منجر می شود

عوامل موثر در ایجاد پتانسیل عمل: ▼

هر محرك قادر به ایجاد پتانسیل عمل در نورون نمی باشد

محرك های ضعیف ممکن است تغییر مختصری در اختلاف پتانسیل دو سوی غشا ایجاد کنند



برای ایجاد پتانسیل عمل محرك باید به اندازه ای کافی قوی باشد


در صورت منفی تر شدن پتانسیل آرامش:

تحریک نورون دشوارتر و آستانه ای تحریک افزایش می یابد


در صورت مثبت تر شدن پتانسیل آرامش:

تحریک نورون راحت تر و آستانه ای تحریک کاهش می یابد



**Diffusion and Absorption**

Neurotransmitters diffuse away from the synaptic cleft and are returned to the presynaptic neuron.



سیناپس یا همایه

محل ارتباط (انتقال پیام عصبی) یک نورون با سلول دیگر در این محل نورون به سلول پس سیناپسی نمی چسبد فاصله‌ی کمی بین انها وجود دارد فضای سیناپسی مملو از مایع میانبافتی بوده، ترکیبات و آنزیم‌های گوناگونی در آن وجود دارد

۳) نحوه‌ی انتقال پیام در سیناپس:

پتانسیل عمل از طریق هدایت به پایانه‌ی آکسون یک نورون پیش سیناپسی می‌رسد و زیکول‌های موجود محتوى انتقال دهنده‌ی عصبی با غشای سلول آمیخته می‌شوند مولکول‌های انتقال دهنده با صرف انرژی و از طریق برون رانی به درون فضای سیناپسی آزاد می‌شوند ناقلين عصبی بدون نیاز به انرژی به گیرنده‌های خود در سطح سلول پس سیناپسی می‌رسند پروتئین گیرنده همچنین کانالی دریچه دار است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می‌شود ناقل عصبی با تغییر نفوذ پذیری غشای یاخته هدف به یون‌ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می‌دهد براساس اینکه ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد، یاخته هدف تحریک، یا فعالیت آن مهار می‌شود

۴) پاکسازی ناقل عصبی از فضای سیناپسی

پس از انتقال پیام، مولکول‌های ناقل باقی مانده، باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند این عمل از انتقال پیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام‌های جدید فراهم می‌کند



تخلیه فضای سیناپسی به دو روش انجام می‌گیرد:

I. جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی انجام می‌شود

II. تجزیه ناقل عصبی توسط آنزیم‌هایی که از یاخته‌ها ترشح می‌شوند

تعییر در میزان طبیعی ناقل‌های عصبی از دلایل ابتلا به بیماری و اختلال در کار دستگاه عصبی است.





Learning By Test

یک سلول عصبی با نوعی سلول غیر عصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد میتوکندری ها در این نورون، صرف کدام مورد نمی شود؟ (سراسری ۹۴ با تغییر)

- ۱) سنتز مولکول های انتقال دهنده عصبی
- ۲) اتصال انتقال دهنده عصبی به گیرنده ویژه اش
- ۳) برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
- ۴) آزاد سازی انتقال دهنده عصبی به فضای سیناپسی

انواع سیناپس از نظر تغییر فعالیت الکتریکی سلول پس سیناپسی:

تحریکی: ورود سدیم و مثبت تر شدن اختلاف پتانسیل

مھاری: ورود یونهایی با بار منفی یا خروج پتاسیم و منفی تر شدن اختلاف پتانسیل

انواع سیناپس از نظر سلول پس سیناپسی:

پایانه ای آکسونی یک نورون با

دندربوت ، جسم سلولی یا آکسون نورون دیگر

سلول ماهیچه ای اسکلتی ، ماهیچه ای قلبی ، بافت گرهی و ماهیچه ای صاف

غدد برون ریز و برخی غدد درون ریز

!
در اندام های حسی ویژه گیرنده ای حسی پیام عصبی را به نورون حسی منتقل می کند

!
انقباض هر سلول ماهیچه ای تحت تاثیر ناقل عصبی نمی باشد

!
هورمون اکسی توسین می تواند منجر به انقباض ماهیچه ای صاف رحم و غدد شیری شود

!
تنظیم تعداد کمی از ترشحات غدد درون ریز توسط دستگاه عصبی روی می دهد

!
در مورد سیناپس بین نورون ها صحیح با غلط بودن جملات زیر را تعیین کنید.

سیناپس یک نورون حسی با نورون حسی دیگری ممکن نیست. T or F

سیناپس یک نورون حرکتی با نورون حرکتی دیگری ممکن نیست. T or F

سیناپس یک نورون حسی با یک سلول غیر عصبی ممکن نیست. T or F

سیناپس یک نورون رابط با یک سلول غیر عصبی ممکن نیست. T or F

بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم بوده و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند برای رسیدن به سلول هدف و تغییر فعالیت آن وارد جریان خون نمی شوند
ناقل عصبی نمونه ای از پیک های کوتاه برد است

انتقال دهنده عصبی:

همانند هورمون ها نوعی پیک شیمیایی محسوب می شوند

در جسم سلولی نورون ها تولید شده و در پایانه ای آکسونی ذخیره و اگزوسيتوز می شوند
انواع گوناگونی دارند و در پاسخ به محرک های مختلف تولید و آزاد می شوند
برخی از آنها تحریک کننده و برخی مهارکننده ای سلول پس سیناپسی هستند
 Mogab تغییر نفوذ پذیری غشای یاخته پس سیناپسی نسبت به یون ها می شوند
در اثر تغییر نفوذ پذیری غشا، پتانسیل الکتریکی یاخته نیز تغییر می کند
دوپامین و استیل کولین و نوراپی نفرین نمونه هایی از این مولکولها هستند
○ **ناقلین عصبی برخلاف هورمون ها**

پیک شیمیایی از نوع کوتاه برد هستند

وارد خون نشده و به فضای سیناپسی رها می شوند
معمولًا سرعت اثر بیشتر و مدت اثر کمتری دارند

!**سلول های گیرنده حسی**

ممکن است نورون و یا سلول تغییر یافته ای دیگری باشند
 قادر به تولید ناقل عصبی هستند

Learning By Test

چند مورد از موارد نام بوده می تواند جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل نماید؟ (سراسری ۹۱)

به طور معمول انتقال دهنده‌ی عصبی
 (الف) در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری در خون طی می کند
 (ب) در پاسخ به محرک ها متفاوتی ساخته و آزاد می شوند
 (ج) پاسخ های سریع و کوتاه مدتی را سبب می شوند
 (د) متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند

۴ ۳ ۲ ۱

Learning By Test

کدام عبارت، درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیجه های بدن انسان درست است؟ (سراسری ۹۸)

(۱) پس از انتقال پیام، توسط آنزیمهایی تجزیه میگردد.
 (۲) در پایانه ای اکسون یاخته ای پیش سیناپسی تولید میگردد.
 (۳) به جایگاه ویژه ای خود در درون یاخته ای پس سیناپسی متصل می شود.
 (۴) از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث بازشدن آن میگردد.

۴ ۳ ۲ ۱



۱. از ویژگی های یاخته های عصبی محسوب نمی شود.
- (۱) تحریک پذیری نسبت به محركها
 - (۲) هدایت جریان الکتریکی
 - (۳) انتقال پیام عصبی به یاخته های دیگر
 - (۴) عایق بندی رشته های خارج شده از جسم یاخته ای
۲. چند جمله درست است؟
- (الف) رشته هایی از یاخته عصبی که پیام عصبی را به سمت جسم یاخته ای می بردند، دندربیت (دارینه) نام دارد.
 - (ب) پیام های عصبی هنوز نهاده از پایانه آکسونی آن به یاخته عصبی بعدی انتقال می یابد.
 - (ج) آسه هر یاخته عصبی، پیام عصبی را از جسم سلولی تا پایانه آکسون انتقال می دهد.
 - (د) بعضی از یاخته های عصبی توسط غلاف میلین عایق بندی شده اند.
 - (ه) یاخته های پشتیبان در حفظ هم استایی مابع اطراف نورون ها نقش دارند.
۳. نمی توان گفت یاخته های پشتیبان در یاخته های عصبی نقش ندارند.
- (۱) دفاع از بعضی از
 - (۲) حفظ هم استایی مابع اطراف همه
 - (۳) تسريع انتقال پیام عصبی هیچ کدام از
 - (۴) در محل گره های رانویه
۴. یاخته های عصبی از آکسون که غلاف میلین دارد، پمپ سدیم-پتانسیم وجود دارد.
- (۱) برخلاف پایانه دندربیت نورون حسی، کanal های سدیمی دریچه دار وجود دارد.
 - (۲) کanal های پتانسیمی بدون دریچه، این یون را به درون یاخته هدایت می کنند.
 - (۳) غشا با مابع خارج سلولی در تماس مستقیم قرار دارد.
۵. یاخته های عصبی یاخته های عصبی
- (۱) فاقد میلین، برخلاف - حرکتی، با گیرنده های حسی بدن سیناپس دارند.
 - (۲) حرکتی، برخلاف - رابط، نمی تواند دندربیت های منشعب داشته باشند.
 - (۳) رابط، همانند - حس، جسم سلولی پوشیده با غلاف میلین دارد.
 - (۴) فاقد میلین، دارای میلین، در جسم سلولی خود ناقل عصبی می سازند.
۶. در دو سوی غشای یاخته عصبی
- (۱) فقط اختلاف بار الکتریکی وجود دارد.
 - (۲) تنها اختلاف غلظت یون های سدیم و پتانسیم وجود دارد.
 - (۳) علاوه بر تفاوت در غلظت سدیم و پتانسیم، بار الکتریکی نیز متفاوت است.
 - (۴) اندازه گیری اختلاف پتانسیل با آمپرسنچ بسیار حساس امکان پذیر است.
۷. کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
- «پتانسیل آرامش یاخته عصبی»
- (۱) عددی همیشه منفی است.
 - (۲) با ولت مرتب بسیار حساس در یاخته عصبی بدون فعالیت عصبی قابل ثبت است.
 - (۳) با گذشت زمان مقداری ثابت است.
 - (۴) به وسیله کanal های گلیکوپروتئینی هدایت کننده سدیم و پتانسیم برقرار می شود.
۸. کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
- (۱) پیام عصبی در اثر وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشای یاخته های عصبی به وجود می آید.
 - (۲) در حالت آرامش مقدار یون های پتانسیم در بین غشای یاخته های عصبی بیشتر از درون آنها است.
 - (۳) یون های سدیم و پتانسیم از طریق کanal های همیشه باز به ترتیب به یاخته های عصبی وارد و از آنها خارج می شوند.
 - (۴) در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته های عصبی از خارج آنها بیشتر است.
۹. هنگام پتانسیل آرامش پمپ های سدیم-پتانسیم کanal های همیشه باز سدیمی یا پتانسیمی
- (۱) همانند - خاصیت آنژیمی دارند.
 - (۲) و- منفذ پراز آب دارند.
 - (۳) برخلاف - در برقراری حالتی که بار مثبت درون یاخته عصبی کمتر از بین آن است عمل می کنند.
 - (۴) و- از منابع انرژی متفاوتی برای عبور دادن یون ها بهره می گیرند.
۱۰. کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشا یک نورون حسی، صحیح است؟
- (۱) در ابتدای پتانسیل عمل، کanal های دریچه دار پتانسیمی باز می شوند.
 - (۲) بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتانسیم داخل یاخته شدیداً کاهش خواهد یافت.
 - (۳) با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به +۳۰ کanal های دریچه دار پتانسیمی بسته می شوند.
 - (۴) در پی بسته شدن کanal های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج منفی می شود.
۱۱. چند جمله نادرست است؟
- الف) در مرحله پتانسیل استراحت دریچه رو به سینتوپلاسم (میان یاخته) کanal سدیمی و لتاژی بسته است.
- ب) در هنگام ثبت شاخه بالا رونمایی پتانسیل عمل نفوذپذیری غشای یاخته عصبی نسبت به سدیم زیادتر از پتانسیل استراحت است.
- ج) در شاخه پایین رو منحنی پتانسیل عمل غشا نسبت به سدیم برخلاف پتانسیم نفوذپذیر نیست.
- د) در قله منحنی پتانسیل عمل دریچه های کanal های سدیمی و پتانسیمی هر دو در یک لحظه بسته هستند.
- ه) در شاخه پایین رو منحنی پتانسیل عمل دریچه کanal سدیمی بسته است.
۱۲. در بخشی از منحنی تغییر پتانسیل غشای یک نورون (پتانسیل عمل) اختلاف پتانسیل دو سوی غشا به صفر رسیده است. می توان گفت قطعاً
- (۱) در این لحظه، تعداد یون های سدیم و پتانسیم در داخل و خارج یاخته با هم برابر است.
 - (۲) پس از این لحظه، کanal های دریچه دار سدیمی باز می شوند.
 - (۳) پس از این لحظه، اختلاف پتانسیل دو سوی غشا مثبت تر و یا منفی تر می شود.
 - (۴) در این لحظه، پمپ سدیم-پتانسیم در حال خارج کردن یون های پتانسیم از یاخته است.



۱۸. در هر سیناپسی که یاخته..... است؛ یاخته..... است.
- پیش سیناپسی دارای آکسون هایی میلین دار- پس سیناپسی دارای ناقل عصبی
 - پس سیناپسی فاقد دندربیت هایی میلین دار- پیش سیناپسی فاقد آکسون هایی میلین دار
 - پس سیناپسی دارای آکسون هایی بدون میلین- پیش سیناپس دارای ناقل عصبی
 - پیش سیناپسی فاقد دندربیت هایی میلین دار- پس سیناپسی دارای دندربیت هایی میلین دار
۱۹. جمله..... جمله..... است.
- الف) در ابتدای آکسون یاخته عصبی برخلاف گره رانویه تراکم کانال های سدیمی کم است.
- ب) بعضی یاخته های پشتیبان فسفولیپیدها و پروتئین هایی را ترشح می کنند تا در اطراف رشته های عصبی غلاف میلین را بجاید.
- ج) پایانه آکسونی یک یاخته عصبی می تواند با دندربیت یا جسم سلولی نورون بعد سیناپس دهد.
- د) نورون های حرکتی که به ماهیچه های اسکلتی عصب دهنده می کنند، هدایت جهشی ندارند.
- الف، «ب» و «ج» برخلاف «د» درست
 - «ج»، تنها درست
 - «الف» و «ب»، برخلاف «ج» و «د» نادرست
 - ج همانند- الف دارای ایراد علمی
۲۰. بافرض این که در انسان، تراکم بین پتانسیم داخل نورون شدیداً کاهش یافته و سدیم درون یاخته انشاسته گردید، در برقاری پتانسیل آرامش اثر سوء دارد.
- (سراسری-۱۷)
- باز شدن کانال های دریچه دار پتانسیم
 - فعالیت پمپ سدیم- پتانسیم
 - بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی
 - فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ATP در غشا

۱ (۱) (۲) (۳) (۴)	۵ (۱) (۲) (۳) (۴)	۹ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۳ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۷ (۱) (۲) (۳) (۴)
۲ (۱) (۲) (۳) (۴)	۶ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۰ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۴ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۸ (۱) (۲) (۳) (۴)
۳ (۱) (۲) (۳) (۴)	۷ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۱ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۵ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۹ (۱) (۲) (۳) (۴)
۴ (۱) (۲) (۳) (۴)	۸ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۲ (۱) (۲) (۳) (۴)	۱۶ (۱) (۲) (۳) (۴)	۲۰ (۱) (۲) (۳) (۴)

۱۳. در هدایت پیام عصبی، از هدایت پیام به صورت است.

۱) جهشی- مصرف ATP کمتر- عادی

۲) نقطه به نقطه- سرعت هدایت پیام، بیش تر- جهشی

۳) جهشی- سرعت هدایت پیام، کمتر- نقطه به نقطه

۴) عادی- مصرف ATP، بیش تر- جهشی تار هم قطر خود

۱۴. با توجه به نمودار اختلاف پتانسیل دوسوی غشای یک یاخته عصبی، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

۱) در نقطه a، کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و اختلاف پتانسیل شروع به افزایش می کند.

۲) در نقطه b، پس از گذشت چندصد ثانیه از زمان شروع پتانسیل عمل، کانال های

دریچه دار سدیمی بسته می شوند.

۳) در نقطه c، با بسته شدن کانال های دریچه دار پتانسیمی، امکان خروج بون های پتانسیم

وجود ندارد.

۴) در نقطه d، فعالیت پمپ سدیم- پتانسیم، مقدار بون ها در دوسوی غشا را به حالت آرامش

بازگردانده است.

۱۵. کدام جمله نادرست است؟

۱) با وجود آن که یاخته های عصبی به یکدیگر در محل سیناپس نجسبیده اند، انتقال پیام عصبی بین آن ها صورت می گیرد.

۲) هنگام انتقال پیام عصبی در محل سیناپس، غلظت انتقال دهنده عصبی در آن سیناپس افزایش می یابد.

۳) همیشه در محل سیناپس، یاخته پیش سیناپسی پس از آزاد کردن ناقل عصبی، در یاخته عصبی پس سیناپسی پیام عصبی ایجاد می کند.

۴) در سیناپس نورون- نورون، انتقال دهنده عصبی پس از وارد شدن به فضای سیناپسی می تواند در غشا نورون پس سیناپسی تغییر پتانسیل ایجاد کند.

۱۶. چند ویژگی زیر را می توان برای ناقل عصبی در نظر گرفت؟

الف) تولید در جسم سلولی یاخته عصبی پیش سیناپسی

ب) رهایش به فضای سیناپسی به روش برون رانی

ج) قابلیت عبور از غشا یاخته پس سیناپسی

د) آزاد شدن از یاخته عصبی پیش سیناپسی با صرف انرژی زیستی

ه) ذخیره شدن در کیسه چه های سیناپسی

و) انتقال آزاد در طول آکسون به سمت پایانه آکسونی

۱) (۱) (۲) (۳) (۴)



۱۷. در سیناپس آکسون- دندربیت، گیرنده انتقال دهنده عصبی در غشا پس سیناپسی قطعاً.....

۱) جزئی از ساختار یک کانال بونی وابسته به ولتاژ است.

۲) پس از دریافت انتقال دهنده عصبی شرایط ورود آن را به یاخته فراهم می کند.

۳) غشا پس سیناپسی را نسبت به سدیم نفوذ پذیرتر می کند.

۴) پس از دریافت انتقال دهنده عصبی ویژه خود پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی را تغییر می دهد.



گفتار ۲ ساختار دستگاه عصبی

دو بخش اصلی عصبی:

دستگاه عصبی مرکزی:

شامل مغز و نخاع بوده که مراکز نظارت بر اعمال بدن می باشند
اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها در صورت لزوم پاسخ می دهد

دستگاه عصبی محیطی:

شامل تعداد زیادی عصب که از مغز یا نخاع منشعب شده اند
پیامهای قسمت های مختلف را به بخش مرکزی منتقل و فرامین آن را به اندام های حرکتی می رسانند

- تار عصبی:** آکسون ها، یا دندانهای بلند می باشند

- عصب:** مجموعه ای از آکسون ها، دندانهای بلند نورون های حسی می باشند که توسط غلاف پیوندی پوشیده شده اند

اعصاب محیطی سه نوع اند:

A. اعصاب حسی:

متشكل از آکسون ها یا دندانهای بلند نورون های حسی می باشند
پیام های عصبی را از اندام های مختلف به مغز می رسانند

B. اعصاب حرکتی:



متشكل از آکسون های نورون های حرکتی می باشند
دستورات حرکتی را از مغز و نخاع به ماهیچه ها یا غدد منتقل می کنند

C. اعصاب مختلط:

متشكل از هردو بخش حسی و حرکتی می باشند

!**دستگاه عصبی محیطی شامل ۱۲ جفت عصب مغزی و ۳۱ جفت عصب نخاعی می باشد**

!**اعصاب مغزی شامل هر سه نوع عصب می شوند اما تمام اعصاب نخاعی از نوع مختلط هستند**



دو بخش دستگاه عصبی مرکزی :

ماده‌ی خاکستری :

بیشتر محتوی جسم سلولی نورون‌ها می‌باشد

نورون‌های رابط می‌توانند به طور کامل در ماده‌ی خاکستری قرار گیرند

بخش‌های بدون میلین نورون حرکتی و حسی نیز می‌توان مشاهده کرد

ماده‌ی سفید :

اجتماع بخش‌های میلین دار نورون‌ها می‌باشد

!
در مخ و مخچه ماده‌ی خاکستری ماده‌ی سفید را احاطه کرده است

!
در مخ می‌توان در عمق ماده‌ی سفید توده‌هایی از ماده‌ی خاکستری مشاهده کرد

!
در نخاع ماده‌ی سفید متاده‌ی خاکستری را احاطه کرده است

پیک دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

مخ و نخاع درون استخوانهای جمجمه و ستون مهره قرار دارند

اعصاب محیطی بوبایی، بینایی و شنوایی - تعادلی درون جمجمه واقع شده‌اند

اعصاب مربوط به حس و حرکت صورت جز اعصاب مغزی می‌باشند

اعصاب مربوط به دست‌ها از ناحیه‌ی نخاع گردنی منشا می‌گیرند

اعصاب ناحیه‌ی سینه به طور تقریباً موازی در فضای بین دنده‌ای قرار دارند

نخاع در تمام طول ستون مهره وجود ندارد و در بالغین در ناحیه‌ی مهره دوم کمری ختم شده است




اعصاب مربوط به پاهای از نواحی پایین تر از محل اتمام نخاع از ستون مهره‌ها خارج می‌شوند

در نزدیکی نخاع برآمدگی‌هایی مربوط به جسم سلولی نورون‌های حسی مشاهده می‌شوند

هرچه سطح آسیب در نخاع بالاتر باشد سطح بیشتری از پیکر فرد در گیر می‌شود



Notice that in the lateral view, we can see all of the cranial bones and many of the facial bones. This is also the best view to see the bones that contribute to the zygomatic arch and how the temporal bone and mandible articulate.



محافظت از دستگاه عصبی مرکزی پستانداران:

جمجمه:

متشکل از چندین استخوان از نوع استخوانهای پهمن بوده و دارای مغز قرمز می باشد در قسمت خارجی دارای بافت استخوانی متراکم و در قسمت میانی دارای بافت استخوانی اسفنجی می باشد

استخوان ها به یکدیگر متصل و مفصل بین آنها از نوع بدون تحرک می باشد

در محل مفصل های ثابت، لبه های دندانه دار آنها در هم فرو رفته و محکم شده اند استخوانهای پیشانی، گیجگاهی، آهیانه و پس سری برخی از استخوانهای جمجمه می باشد

ستون مهره‌ای:

از قاعدهٔ جمجمه شروع می‌شود و در تمامی طول گردن و طول تنه امتداد دارد


استخوان های مهره ها از نوع نامنظم هستند و مابین آنها صفحهٔ غضروفی وجود دارد


بین مهره ها در نواحی خاصی سطوح مفصلی از نوع لغزنده تشکیل می شود

استخوانهای مهره ها دارای مغز استخوان قرمز بوده و دارای توان خونسازی هستند



تعدادی از مهره ها در انتهای ستون بهم متصل و استخوانهای خاجی و دنبالچه را تشکیل داده اند

شكل و اندازهٔ مهره ها در قسمت های مختلف ستون مهره با یکدیگر متقاوت هستند





(b) Dural folds and dural sinuses



پرده هایی منظر:

سه پرده از نوع بافت پیوندی که در محافظت از مغز و نخاع نقش مهمی ایفا می کنند

I. سخت شامه:

خارجی ترین پرده ای منظر از نوع بافت پیوندی محکم رشته ای می باشد

و اجد دو لایه ای داخلی و خارجی می باشد

لایه ای خارجی چسبیده به سطح داخلی استخوانها می باشد

لایه ای داخلی در چین خوردهای عمیق مخ قرار می گیرد

ما بین لایه ای خارجی و داخلی حفره های خونی دیده می شوند

II. عنکبوتیه:

زیر سخت شامه قرار داشته و زیر میکروسکوپ شبیه تار عنکبوت می باشد

III. نرم شامه:

داخلی ترین پرده ای منظر بوده و دارای مویرگ های خونی فراوان می باشد

نقش تغذیه بافت عصبی را بر عهده دارد

در تماس با ماده ای خاکستری مخ و ماده ای سفید نخاع می باشد

در شیار های عمیق مخ هر سه لایه ای منظر وجود دارد

مایع مغزی نخاعی:

فضای بین پرده های منظر را پر کرده است

مانند یک ضربه گیر، دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ضربه حفاظت می کند

این مایع به طور پیوسته در جریان است

! مایع مغزی نخاعی در بطن های مغز به فراوانی وجود دارد

! مایع مغزی نخاعی در مجرای مرکزی نخاع نیز وجود دارد

سدخونی مغزی . سدخونی نخاعی :

بافت پوششی دیواره ای مویرگ های مغزی، قادر منافذی هستند که در مویرگ های بافت های دیگر، دیده می شوند این ویژگی ناشی از فشرده‌گی زیاد و ویژگی خاص سلول های سنکفرشی ساده‌ی دیواره ای مویرگ ها می باشد بسیاری از مواد که در متابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند و نیز میکروب ها معمولاً نمی توانند وارد مغز شوند موادی چون گلوکز و اکسیژن می توانند به سرعت از این سد بگذرند و وارد سلول های مغزی شوند

مواد مخدر، نیکوتین، الکل و برخی دارو ها می توانند از سد خونی مغزی عبور کنند

این سیستم اطراف قسمت های مختلف مغز و نخاع وجود دارد و از آنها محافظت می کند

در مواردی همچون التهاب نفوذ پذیری سد خونی مغزی افزایش می یابد

انواع مویرگ های بدن

I. مویرگ های پیوسته

یاخته های بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند

در محل هایی که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم می شود وجود دارند

در ماهیچه ها، شش ها، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی یافت می شوند

سلول های پوششی و غشای پایه قادر منفذ می باشند

II. مویرگ های منفذدار

با داشتن منافذ زیاد در غشای سلول های پوششی همراه با غشای پایه ضخیم مشخص می شوند

در آن لایه پروتئینی، عبور مولکولهای درشت مثل پروتئین ها را محدود می کند

در کلیه ها، غدد درون ریز و روده وجود دارند

سلول های پوششی برخلاف غشای پایه ضخیم منفذدار می باشند


غضای پایه در گلومرول ها ضخامتی حدود ۵ برابر سایر مویرگ ها دارا می باشد

III. مویرگ های ناپیوسته

فاصله یاخته های بافت پوششی در این مویرگ ها آنقدر زیاد است که به صورت حفره هایی در دیواره مویرگ دیده می شود

در مغز استخوان، جگر و طحال یافت می شوند

فاصله ای بین سلول های پوششی زیاد و غشای پایه حفره دار می باشد



مرکز اصلی پردازش اطلاعات در بدن است

مغز شامل سه بخش اصلی است مخ، مخچه و ساقه مغزی باشد

تالاموسها، هیپوталاموس و دستگاه لیمبیک بخش‌های دیگری از مغز می‌باشند

③ مخ

بزرگ ترین بخش مغز است و توانایی یادگیری، حافظه، ادرار و عملکرد هوشمندانه را دارد

یک شیار طولانی در وسط، مخ را به دو نیمکره‌ی چپ و راست تقسیم می‌کند

شیارهای عمیق هر یک از نیمکره‌های مخ را به چهار لوب پس سری، گیجگاهی، آهیانه و پیشانی تقسیم می‌کنند

نیمکره‌های مخ از طریق رابطه‌ای سفیدرنگی به نام جسم پینه‌ای و سه گوش، به یکدیگر مرتبط می‌شوند

دو نیمکره به طور هم زمان از همه بدن، اطلاعات را دریافت و پردازش می‌کنند

به طور معمول، نیمکره‌ی چپ اطلاعات حسی را از سمت راست دریافت و حرکات آن را کنترل می‌کند بر عکس

هر یک از نیمکره‌ها، کارهای مخصوص به خود دارند

بخش‌هایی از نیمکره چپ به توانایی در ریاضیات و استدلال مربوط اند

نیمکره راست در مهارت‌های هنری تخصص یافته است

لوبهای مخ

دو نیمکره در مجموع دارای ۶ شیار عمیق و ۸ لوب می‌باشند




کوچکترین لوب مخ، لوب پس سری و بزرگترین لوب مخ، لوب پیشانی می‌باشد

لوب پس سری مرکز بینایی و لوب گیجگاهی مرکز شنوایی می‌باشد

لوب گیجگاهی و آهیانه با سه لوب دیگر یک نیمکره در تماس می‌باشند

لوب‌های پس سری و گیجگاهی در نزدیکی مخچه واقع شده اند

لوب‌های گیجگاهی از نمای بالایی نیمکره‌ها مشاهده نمی‌شود



▪ قشر مخ:

جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز است که نتیجه آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است

از مادهٔ خاکستری تشکیل و سطح وسیعی را با ضخامت چند میلی متر تشکیل می‌دهد

دارای چین خورده با برآمدگی‌ها و شیارهای بسیار می‌باشد

وییگی خاص آن باعث افزایش سطح شده و امکان جایگیری مغز درون جمجمه گردیده است

این بخش شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی است

بخش‌های حسی، پیام اندام‌های حسی را دریافت می‌کنند

بخشهای حرکتی به ماہیچه‌ها و غده‌ها، پیام می‌فرستند

بخش‌های ارتباطی بین بخش‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند

③ ساقهٔ مغز :

پایینترین قسمت مغز بوده و شامل مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع است

از یک سو به نخاع و از سوی دیگر، به نیمکره‌های مخ و مخچه منتهی شده است

مسیر پیام‌های بالارو(حسی) و پایین رو (حرکتی) می‌باشد

این ساختارها نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های بدن بر عهده دارند

مغز میانی

بالاترین بخش ساقهٔ مغز بوده و بالای پل مغزی قرار دارد

یاخته‌های عصبی آن، در شناوی، بینایی و حرکت نقش دارند

برجستگی‌های چهارگانه بخشی از مغز میانی اند که غده‌ای فیز بالاتر از آنها قرار دارد

پل مغزی

در تنظیم فعالیت‌های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد

Learning By Test

کدام مورد در ارتباط با قشر مخ انسان درست است؟ **(سراسری ۹۸)**

- ۱) در تنظیم همهٔ فعالیت‌های بدن نقش اصلی را دارد
- ۲) در تماس مستقیم با لایهٔ سخت شامهٔ منتهی قرار دارد
- ۳) توسط شبکهٔ گستردگی از نورون‌ها با مرکز تنظیم دمای بدن در ارتباط است
- ۴) مهم‌ترین مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است

۴ | ۳ | ۲ | ۱

Learning By Test

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟ **(سراسری ۹۸)**

- ۱) دارای شبکهٔ مویرگی ترشح کنندهٔ مایع مغزی نخاعی است
- ۲) یکی از اجزای سامانهٔ کنارهای (لیمبیک) محسوب می‌شود
- ۳) در مجاورت مرکز انعکاسهای عطسه و سرفه قرار دارد
- ۴) حاوی برجستگی‌های چهارگانهٔ مغزی است

۴ | ۳ | ۲ | ۱



پایین ترین بخش مغز است که در بالای نخاع قرار دارد

مرکز اصلی تنفس بوده و در تنظیم فشار خون و زنش قلب (اعمال حیاتی) ایفای نقش می کند

مرکز انعکاس هایی مانند بلع، استفراغ، عطسه و سرفه است

نقش بصل النخاع هنگام بلع

در زمان عبور غذا از حلق، مرکز بلع در این ناحیه فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می کند

در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می شود

ترشح بزاق

بزاق به شکل انعکاسی ترشح می شود

با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به غده های بزاقی می رساند

محرك هایی مانند دیدن، بوی غذا و حتی فکر کردن به آن باعث افزایش ترشح بزاق می شوند

مرکز تنظیم ترشح بزاق تحت تاثیر بینایی و بویایی قرار می گیرد

تنظیم تنفس

بصل النخاع

انقباض عضلات دمی، تحت دستور یاخته های عصبی حرکتی روی می دهد

مرکز صدور این دستور، یا مرکز تنفس، در بصل النخاع واقع است




با پایان یافتن دم، بازدم به صورت غیرفعال انجام می شود

بازدم بدون نیاز به پیام عصبی، با بازگشت ماهیچه ها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی شش ها روی می دهد

بل مغز

این مرکز با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع (نه مستقیماً عضلات)، دم را خاتمه می دهد

این مرکز عصبی می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند



گیرنده های مکانیکی شش ها

اگر شش ها بیش از حد پر شوند ماهیچه های صاف دیواره ی نایزه ها و نایزک ها بیش از حد کشیده می شوند که خطرناک است از ماهیچه ها پیامی توسط نورون های حسی به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال می شود که بلا فاصله ادامه ی دم را متوقف می کند

گیرنده های شیمیایی مرکزی و محیطی

افزایش کربن دی اکسید با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، آهنگ تنفس را افزایش می دهد

در خارج از مغز، گیرنده هایی شیمیایی وجود دارند که به کاهش اکسیژن حساس اند

این گیرنده ها بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگ های ناحیه یگردن که خون رسانی به سر و مغز را بر عهده دارند، واقع اند
چنانچه اکسیژن خون کاهش یابد، این گیرنده ها به بصل النخاع پیام عصبی ارسال می کنند

③ مخچه:

در پشت ساقه ی مغز قرار دارد و از دو نیمکره با سطح چین خورده تشکیل شده است

رابط دو نیمکره در وسط آنها بوده و بخشی به نام کرمینه می باشد



مهم ترین مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است

اطلاعاتی را از ماهیچه ها، مفصل ها، پوست، چشم ها و گوش ها دریافت می کند

بخش هایی از مغز و نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند، پیام هایی را به مخچه ارسال می کنند

مخچه با پیش بینی وضعیت بدن در لحظه ی بعد پیام هایی را برای مغز و نخاع می فرستد

باتصحيح و یا تغییر حرکت بدن موجب می شود ما بدون برخورد به موانع، راه خود را ادامه می دهیم





Learning By

کدام نادرست است؟ (سواسری ۹۱)

بافرض صدمه دیدن مخچه در انسان.....

- ۱) تصحیح برخی از فعالیت های حرکتی در فرد غیر ممکن می گردد
- ۲) همه ای اعمال بدن غیر ماهرانه و غیر دقیق انجام می شوند
- ۳) فرد از پیش بینی فاصله ای خود با موانع ناتوان می گردد
- ۴) اختلالی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه می مغز ایجاد می گردد

۴ ۳ ۲ ۱

باعث می شود که فرد هنگام راه رفتن تلوتو بخورد و در شیوه ای راه رفتن وی تغییر روی می دهد

فرد بعضی از اعمال خود را به طور غیر ماهرانه انجام دهد

فرد توانایی انجام حرکات دقیق را ندارد مثلاً نمی تواند یک خط مستقیم رسم کند

③ تalamus (نهنج):

دو توده از ماده خاکستری بالای ساقه مغزی که توسط رابطی بهم متصل هستند

پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی را بر عهده دارد

اگل اطلاعات حسی در تalamus گرد هم می آیند تا به بخش های مربوط در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند

! پیامهای حسی به غیر از بویایی و تعادلی در تalamus با نورونهای قشری سیناپس می دهند

④ هیپوکالموس (زیر نهنج):

در زیر تalamus و تقریباً هم سطح با مغز میانی قرار دارد

نسبت به تalamus اندازه ی کوچکتری دارد

مسؤول تنظیم دمای بدن، فشار خون، ضربان قلب، خواب، احساس گرسنگی و تشنجی می باشد

همراه با هیپوفیز تنظیم بسیاری از اعمال غدد درون ریز را بر عهده دارد


! متشکل از انواع مختلفی از نورونها می باشد


نورون های آکسون بلند

جسم سلولی آنها در هیپوتalamus قرار دارد

آکسون های آنها تا هیپوفیز پسین کشیده شده و پایانه ای آکسونی آنها در آنجا قرار دارد

○ این نورون ها هورمونهای اکسی توسمین و ضد ادراری را تولید و از هیپوفیز پسین آزاد می کنند





نورون های آکسون کوتاه

تا شبکه ی مویرگی ساقه کشیده شده اند

هرمونهای آزاد کننده و مهار کننده را تولید می کنند

- این هورمون ها ترشح هورمون های هیپوفیز پیشین را تحریک یا متوقف می کنند

ارتباط هیپوتالاموس با هیپوفیز

پیشین: از طریق رگ های خونی و خون می باشد


پسین: از طریق نورون ها و ارتباط درون سلولی می باشد

دستگاه لیمبیک:

شبکه ای از نورون ها که تالاموس و هیپوتالاموس را به قسمت هایی از مخ متصل می کند

نقش مهمی در حافظه، یادگیری و احساساتی مانند ترس، خشم و لذت بر عهده دارد

در ارتباط مستقیم با لوب های بویایی است



مراکز حافظه: مخ و لیمبیک

• اسبک مغز (هیپوکامپ)

یکی از اجزای سامانه لیمبیک است

در تشکیل حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت و یادگیری نقش دارد

آسیب هیپوکامپ یا برداشتن ان طی جراحی

حافظه این افراد دچار اختلال می شود

نام های جدید، حداقل فقط برای چند دقیقه در ذهن این افراد باقی می ماند

البته آنان برای به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی، مشکل چندانی ندارند



اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است

ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می آورد

مواد گوناگون مانند الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهقهه اعتیادآورند

اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به نظام پاداش، انگیزش، و حافظه را در مغز دچار اختلال می کند

اعتیاد سلامت جسمی و روانی فرد مصرف کننده و افراد دیگر اجتماع را به خطر می اندازد

نوعی بیماری برگشت پذیر می دانند که حتی سال ها پس از ترک مواد، فرد در خطر مصرف دوباره قرار دارد

۳ تاثیر مواد اعتیادآور بر مغز:

نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد اختیاری است

استفاده مکرر از این مواد، تغییراتی را در مغز ایجاد می کند که فرد دیگر نمی تواند با میل شدید برای مصرف مقابله کند

تغییرات حاصل بر روی مغز ممکن است دائمی باشند

تاثیر بر روی لیمیک:

با تاثیر بر بخشی از سامانه لیمیک، موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند

دوپامین در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند

با ادامه مصرف، دوپامین کمتری آزاد می شود و به فرد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی دست می دهد


برای رهایی از این حالت و دستیابی به سرخوشی نخستین، فرد مجبور است، ماده اعتیادآور بیشتری مصرف کند

تاثیر بر روی قشر مخ:

نتیجه ای تأثیراتی مواد، کاهش توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خود کنترلی فرد است

این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر است زیرا مغز آنان در حال رشد است

صرف مواد اعتیادآور ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری را در مغز ایجاد کند



صرف گلوکز در مغز

رنگ های آبی (سبز) تیره و روشن نواحی با مصرف کم گلوکز

رنگ های زرد و قرمز نواحی با مصرف بیشتر گلوکز

صرف گلوکز بعد از استفاده از کوکائین به شدت کاهش داشته است

بیشترین تاثیر کوکائین بر روی بخش پیشین بوده است

بهبود فعالیت مغز پس از آخرین مصرف به زمان طولانی نیاز دارد

بخش پیشین مغز بهبود کمتری را نشان می دهد

دربرخی نواحی حتی پس از ۱۰۰ روز تغییرات برگشت نداشته است

در بطن های مغزی مصرف گلوکز دیده نمی شود



Alcohol Use Disorder (AUD) in the U.S.

NIH - NIAAA "Alcohol Facts & Statistics" - Reported among 18+ year olds



Signs of Alcohol Addiction



استفاده از قلیان بیشتر از سیگار خطرناک است و منجر به اعتیاد و اثرات مخرب می‌گردد

فردحتی ممکن است با یک بار مصرف ماده اعتیادآور خاصی، معتمد شود

صرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد

اعتقاد بر اینکه مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می‌آیند، خطر چندانی ندارد، نادرست می‌باشد

آلکالوئیدها

از ترکیبات نیتروژن دار گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان مانند خشکاش به مقدار فراوانی وجود دارند

نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است

در ساختن داروهایی مانند مسکن‌ها، آرام بخش‌ها و داروهای ضد سرطان به کار می‌برند

بعضی آلکالوئیدها اعتیادآورند

الكل:

حتی مصرف کمترین مقدار الكل، بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد

این ترکیب در دستگاه گوارش به سرعت جذب می‌شود

چون در چربی محلول است و از غشای یاخته‌های عصبی عبور می‌کند، فعالیت‌های آنها را مختل می‌کند

علاوه بر دوبامین، بر فعالیت انواعی از ناقل‌های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می‌گذارد

نتیجه‌ی تاثیر الكل بر عملکرد فرد

کاهش فعالیت‌های بدنی

آرام سازی ماهیچه‌ها و ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن، اختلال تعادل و اختلال در گفتار

کاهش درد و اضطراب، خواب آلودگی

اختلال در حافظه، گیجی و کاهش هوشیاری

کندی فعالیت مغز و در نتیجه افزایش زمان واکنش فرد به محرک‌های محیطی

مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلند مدت آن است

▪ نتیجه‌ی اختلالات کبدی:

اختلال در تولید صفرا و بروز زردی

اختلال در هضم و جذب چربیها و مواد محلول در چربی مانند ویتامین‌های D.E.K.A

اختلال در انعقاد خون و ساختار استخوان‌ها

اختلال در تنظیم میزان قند ورودی به خون

▪ بسته شدن رگ‌های کرونری:


توسط لخته یا سخت شدن دیواره‌ی آنها (تصلب شرایین)

کاهش یا عدم خونرسانی به بخشی از قلب

ممکن است باعث سکته یا حمله‌ی قلبی شود

در این حالت به بخشی از ماهیچه‌ی قلب، اکسیژن نمی‌رسد و یاخته‌های آن می‌میرند

! یکی از دلایل تصلب شرایین رسبوپلیپروتئین LDL در آنها می‌باشد



! لیپوپلیپروتئین HDL می‌تواند کلسترولی که رسبوب در دیواره رگ را آغاز کرده است جذب نماید و مانع تصلب آنها شود

! به نبال سکته‌های مکرر و مرگ قسمت عمده‌ی ماهیچه‌ی قلب، فرد بیمار کاندید عمل پیوند قلب می‌شود

! برای تشخیص اختلالات رگ‌های کرونری از روش رگ‌نگاری (آنژیوگرافی) استفاده می‌شود

▪ اثر الکل بر روی میتوکندری‌ها :

الکل و انواعی از نقص‌های ژنی در عملکرد راکیزه در خنثی سازی رادیکال‌های آزاد مشکل ایجاد می‌کند

رادیکال‌های آزاد با حمله به DNA راکیزه، سبب تخریب آن می‌شوند


اثر مخرب آن در نهایت موجب مرگ یاخته‌های کبدی و بافت مردگی (نکروز) کبد می‌شوند

سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، تنفس و اضطراب، از علت‌های برگشت اسید معده به مری (ریفلاکس) هستند

کمبود ویتامین D و کلسیم غذا، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات با جلوگیری از رسبوب کلسیم در استخوان‌ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می‌شوند

پرتوها و مواد شیمیایی سرطان‌زا، موادغذایی دودی شده مثل گوشت و ماهی دودی، بعضی ویروس‌ها، قرص‌های ضدبارداری، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات از عوامل مهم سرطان‌زا بیانی اند

عوامل بیمار یزا و موادی مانند نیکوتین، کوکائین و الکل می‌توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء‌بگذارند



نخاع:

طناب عصبی پشتی در مهره داران می باشد

درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا مهره دوم کمردر بالغین امتداد دارد

اتصال مغز به دستگاه عصبی محیطی را بر عهده داشته و مسیر پیامهای حسی و حرکتی می باشد

مرکز برخی از انعکاس های بدن است

31 جفت عصب مختلط به آن متصل است

مادة خاکستری : جسم سلولی نورون های حرکتی و تعدادی نورون رابط

مادة سفید : محتوى اكسون و دندريت های ميلين دار نورون ها

▪ اجزای تشکیل دهنده ی اعصاب نخاعی

ریشه ی پشتی :

نورون های حسی ، انتقال اطلاعات از گیرنده های حسی به طناب نخاعی

ریشه ی شکمی :

اکسون نورون های حرکتی ، ارسال پاسخ حرکتی از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها

!
دندريت و جسم سلولی نورون حرکتی و نيز نورون رابط به طور كامل در ماده ی خاکستری نخاع مشاهده می شوند

!
در ریشه ی پشتی برآمدگی حاوی جسم سلولی نورون های حسی مشاهده می شود

!
در اعصاب مغزی تقسیم بندی ریشه ی شکمی و پشتی وجود ندارد

③ آسیب های نخاعی


آسیب در نواحی نزدیک به ساقه ی مغز منجر به مرگ می گردد

آسیب کامل در هر سطحی منجر به بروز اختلالات حسی و حرکتی در نواحی پایین تر از آسیب می شود

آسیب نواحی خلفی طناب نخاعی منجر به اختلالات حسی می شود


آسیب نواحی قدامی طناب نخاعی منجر به اختلالات حرکتی می شود

آسیب کامل یک عصب نخاعی اختلالات حسی و حرکتی در محدوده ی آن عصب در همان سمت ایجاد می شود



نخاع و اعصاب نخاعی

جسم سلولی نورون حسی خارج از نخاع در سطح پشتی قرار دارد
 جسم سلولی نورون حرکتی در ماده خاکستری داخل نخاع قرار دارد
 جسم سلولی نورون رابط در ماده خاکستری داخل نخاع قرار دارد
 آکسون نورون حسی مستقیماً وارد ماده خاکستری نخاع می‌شود
 در نخاع ماده سفید کاملاً ماده خاکستری را در بر نگرفته است
 در طول نخاع نورون‌های میلین داری تا مغز کشیده شده‌اند



دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی محیطی، مغز و نخاع را به قسمت‌های دیگر بدن ارتباط می‌دهد
 شامل ۳۱ جفت عصب نخاعی و ۱۲ جفت عصب مغزی است

بخش حسی :

اطلاعات اندام‌های حسی و سایر اندام‌ها را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می‌کند
 شامل گیرنده‌های حسی و نورون‌های حسی

بخش حرکتی :

ارسال پیام عصبی را به اندام‌های حرکتی بر عهده دارد و شامل دو دستگاه مستقل است
 شامل بخش پیکری و خودمختار



دستگاه عصبی پیکری:

شامل نورون های حرکتی که ماهیچه های اسکلتی را تحت کنترل آگاهانه و ارادی می قرار می دهند بعضی از فعالیت ها در این دستگاه، نظیر انعکاس های نخاعی غیرارادی اند

دستگاه عصبی خودمختار:

شامل نورون های حرکتی که ماهیچه های قلبی و صاف و نیز غده ها را به صورت غیر ارادی کنترل می کنند این بخش از دستگاه عصبی محیطی همیشه فعال و تمام فعالیت های آن غیر ارادی است

انعکاس :

فعالیتی خودکار یا غیرارادی که از طریق مدارهای عصبی نسبتاً ساده روی میدهد رفتارهایی غریزی اند که به طور معمول آموخته نمی شوند خاص مهره داران نمی باشند و در بی مهره ها نیز روی میدهد

- !
شاقایق دریایی و یا عروس دریایی با کوچک ترین تحریک مکانیکی، شاخک های حسی خود را منقبض می کنند
- !
عادی شدن ساده ترین نوع یادگیری و تغییر شکل رفتار بوده و در مورد انعکاس ها مشاهده می شود


انعکاس های نخاعی:

پاسخ های حرکتی مهره داران به محرک های محیطی بوده و برای حفظ حیات آنها انجام می شوند این انعکاس ها بسیار سریع اند، زیرا اغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی در گیرند و مغز نقشی ندارد انعکاس زردپی زیر زانو و عقب کشیدن دست، نمونه ای از این انعکاسها می باشند

انعکاس عقب کشیدن دست:

نوعی انعکاس نخاعی بوده و بدون دخالت مغز روی می دهد عضلات در گیر از نوع اسکلتی بوده که تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری قرار دارند با مشارکت دستگاه عصبی محیطی و مرکزی رخ می دهد





تأثیر حرارت شدید بر روى گیرنده های حسی:

تحریک گیرنده های دمای پوست

تحریک گیرنده های درد پوست

ارسال پیام حسی به دستگاه عصبی مرکزی:

ایجاد پتانسیل عمل در گیرنده های حسی در اثر باز شدن کانالهای دریچه دار سدیمی هدایت پیام به سمت جسم سولی و سپس تا پایانه ای آکسونی نورون حسی

! گیرنده های حسی پوست دندربیت تغییر یافته ای نورون حسی می باشند

! پیام درد و گرما توسط نورون های حسی دیگری به سمت مغز نیز ارسال می گردد

! محل درد و حرارت قشر مخ می باشد

مسیر پیام عصبی تا ماهیچه ای دوسر بازو:

سیناپس تحریکی پایانه ای آکسونی نورون حسی و دندربیت نورون رابط در ماده خاکستری

سیناپس تحریکی پایانه ای آکسونی نورون رابط و دندربیت نورون حرکتی دو سر بازو


سیناپس تحریکی پایانه ای آکسونی نورون حرکتی و تار های ماهیچه ای جلوی بازو

مسیر پیام عصبی تا ماهیچه ای سه سر بازو:

سیناپس تحریکی پایانه ای آکسونی نورون حسی و دندربیت نورون رابط

سیناپس مهاری پایانه ای آکسونی نورون رابط و نورون حرکتی پشت بازو

سیناپس غیر فعال پایانه ای آکسونی نورون حرکتی و ماهیچه ای سه سر بازو





Learning By

هر تار عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچه‌ی سر بازو ارتباط مستقیم دارد، (سراسوی ۹۶ با تغییر)

- (۱) سه - پیام‌های عصبی را به نخاع ارسال می‌نماید.
- (۲) دو - با نوعی نورون قادر می‌باشند سیناپس تحریکی دارند.
- (۳) دو - در فقدان اکسیژن قادر به تولید ATP نمی‌باشد
- (۴) سه - تحت تأثیر نورون حسی، پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می‌دهد.

۴ ۳ ۲ ۱

در مورد روند انعکاس عقب کشیدن دست به سوالات زیر پاسخ دهید:

چند نوع نورون مشاهده می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی در نخاع تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی خارج از نخاع تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی مابین نورون‌ها تشکیل می‌شود؟


چند ناحیه‌ی سیناپسی مابین نورون‌ها و میون‌ها تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی فعال تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی غیر فعال وجود دارد؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی مهاری تشکیل می‌شود؟

چند ناحیه‌ی سیناپسی تحریکی تشکیل می‌شود؟



نقش نخاع در تخلیه‌ی ادرار

افزایش حجم ادرار از حد مشخصی موجب کشیدگی دیواره‌ی مثانه و تحریک گیرنده‌های کششی آن می‌گردد

پیام عصبی حسی به نخاع ارسال و به این ترتیب انعکاس تخلیه‌ی ادرار فعال می‌شود

پیام حرکتی از دستگاه خودمختار (پاراسمپاتیک) به مثانه، ماهیچه‌های صاف دیواره‌ی آن را منقبض می‌کند

با افزایش شدت انقباض، ادرار از مثانه خارج و به میزراه وارد می‌شود


!
در محل اتصال مثانه به میزراه، بنداره‌ای قرار دارد که به هنگام ورود ادرار باز می‌شود

بنداره داخلی میزراه: از نوع ماهیچه‌ی صاف و غیرارادی است


بنداره خارجی میزراه: از نوع ماهیچه‌ی مخطط و ارادی است

!
بنداره‌ی خارجی تحت کنترل قشر مخ بوده و بنداره داخلی توسط نخاع فرما ندهی می‌شود

!
در نوزادان و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به طور کامل برقرار نشده است، تخلیه‌ی مثانه به صورت غیرارادی صورت می‌گیرد



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



اعصاب سمتیک(هم حس) و اعصاب پارا سمپاتیک(پادهم حس)

دو بخش دستگاه عصبی خودمختار هستند

با همکاری دستگاه درون ریز حالت پایدار بدن را حفظ می کنند

عمل این دو بخش به طور معمول بر خلاف یکدیگر است

فعالیت های حیاتی بدن را در شرایط مختلف تنظیم می کنند

! منشا اعصاب پارا سمپاتیک از ساقه ای مغز و بخش انتهایی نخاع می باشد

! منشا اعصاب سمتیک از بخش میانه ای نخاع می باشد

نکات مهم در زمینه فعالیت های سیستم عصبی خودمختار:

ایجاد ضربان قلب توسط گره سینوسی دهلیزی صورت می گیرد نه دستگاه عصبی خودمختار

فسار خون ارتباط مستقیم با برون ده قلبی و رابطه ای عکس با قطر رگ دارد

قطر رگ های نقاط مختلف بدن بسته به شرایط خاص تغییر می کند

اصلی ترین ماهیچه در تنفس آرام و طبیعی دیافراگم می باشد



ذخیره ای گلوکز در قالب گلیکوژن در کبد و ماهیچه انجام می شود

فعالیت های گوارشی شامل ترشحات گوارشی و حرکات ماهیچه های صاف آن می باشد

تغییر قطر مردمک توسط ماهیچه های صاف عنیبه روی می دهد

تغییر قطر عدسی توسط ماهیچه های صاف مژگی روی می دهد

دستگاه عصبی جانوران



سلول‌های عصبی جانوران مختلف، از نظر نحوهٔ عمل بسیار شبیه یکدیگرند

اما در سازمان عصبی جانوران مختلف، گوناگونی‌های بسیاری به چشم می‌خورد

③ هیدر

ساده‌ترین ساختار عصبی را دارد

سر و مغز ندارد و نیز تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی آن وجود ندارد

ساختار عصبی به شکل یک شبکه عصبی است و در دیواره تمام بدن جانور پخش شده است

تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح آن منتشر می‌شود

شبکه عصبی یاخته‌های ماهیچه‌ای بدن را تحریک می‌کند

④ پلاناریا

▪ بخش مرکزی

مغز مت蟠کل از دو گره عصبی در سر جانور

دو طناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شده‌اند

رشته‌های متصل کنندهٔ دو طناب به هم و که ساختار نربان مانندی را ایجاد می‌کنند

▪ بخش محیطی

رشته‌های جانبی متصل به بخش مرکزی

! در طناب‌های عصبی پلاناریا گره عصبی مشاهده نمی‌شود


! در طناب‌های عصبی پلاناریا مسیر پیام‌های عصبی دو طرفه می‌باشد

⑤ حشرات:

مغز آنها از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است

یک طناب عصبی شکمی در این جانوران در هر بند از بدن، دارای یک گره عصبی است

هر یک از این گره‌ها فعالیت ماهیچه‌های آن بند را کنترل می‌کنند



دستگاه عصبی مهره داران

در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن بر جسته شده و مغز را تشکیل می دهد طناب عصبی درون سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه ای غضروفی، یا استخوانی جای گرفته است در مهره داران نیز مانند انسان، دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است در بین مهره داران، اندازه ی نسبی مغز پستانداران و پرندگان (نسبت به وزن بدن) بیشتر از سایرین است

دستگاه عصبی جانوران

■ مشاهده ی رابط پینه ای:

قرار دادن مغز برای دیدن سطح پشتی آن

جدا کردن آرام دو نیمکره از محل شیار بین آنها با انگشتان شست

خارج کردن بقایای پرده های منظر از بین دو نیمکره برای دیدن نوار سفید رنگ رابط پینه ای

■ مشاهده ی رابط سه گوش:

جدا کردن نیمکره های مخ و ایجاد برش کم عمقی با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه ای

■ مشاهده رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای

دو طرف این رابط ها، فضای بطن های ۱ و ۲ مغز و داخل آنها، اجسام مخطط قرار دارند

شبکه های مویرگی که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کند نیز درون این بطن ها دیده می شوند

■ مشاهده ی تالاموس ها:

ایجاد برش طولی در رابط سه گوش تا در زیر آن، تالاموس ها مشاهده شوند



دو تالاموس با یک رابط به هم متصل اند و با کمترین فشار از هم جدا می شوند

! در عقب تالاموس ها، بطن سوم و در لبه پایین آنها، رومغزی (اپی فیز) را وجود دارد

! در عقب اپی فیز برجستگی های چهارگانه قرار دارند

■ مشاهده درخت زندگی و بطن چهارم

کرمینه مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره مخچه برش دهید





Learning By

کدام عبارت، در مورد تالاموس های مغز گوسفند صحیح است؟ (سراسری ۹۶)

- ۱) جزئی از مغز میانی به حساب می آیند.
- ۲) توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند.
- ۳) در دیواره ای بطن چهارم مستقر شده اند.
- ۴) توسط پرده ای سپتوم از یکدیگر جدا شده اند.

۴ | ۳ | ۲ | ۱

Learning By

چند مورد جمله‌ی زیر را به طور درستی تکمیل می‌کنند؟ (سراسری ۹۳ با تغییر)

هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لبها بوبایی به سمت بالا قرار دارند، میباشد

الف) درخت زندگی در بالای بطن ۱ و ۲ ب) ایفیز در پایین اجسام مخطط

ج) بطن ۴ درون نیمکره های مخ د) کیاسماهی بینایی بالای برجستگی ۴ گانه

۴ | ۳ | ۲ | ۱

Learning By

به طور معمول کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیکترند؟ (سراسری ۹۷)

- ۱) رابط سه گوش و بطن سه
- ۲) هیپوپاتالاموس و مجرای بین بطن ۳ و ۴
- ۳) رابط پیشه ای و مغز میانی
- ۴) برجستگی های چهارگانه و اپی فیز

۴ | ۳ | ۲ | ۱

Learning By

با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست، چند مورد، درباره ای نورون های رابطی که در ماده ای خاکستری نخاع یافت می شوند. درست است؟ (سراسری ۹۴)

الف) دارای دندانهای طویل می باشند.

ب) تنها با نورون های حرکتی ارتباط دارند.

ج) توسط سلول های پشتیبان پوشش دار می شوند.

د) در جایه جایی - یون ها در دو سوی غشای بعضی نورون ها نقش دارند.

۴ | ۳ | ۲ | ۱




۶. جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز انسان
 ۱) ضخامت معادل چند میلی متر دارد.
 ۲) فقط دارای دو بخش حسی و حرکتی است.
 ۳) محل تجمع جسم سلولی باخته‌های عصبی و رشته‌های میلین داریا بدون میلین است.
 ۴) در نتیجه فعالیت خود، یادگیری، تفکر و عملکرد ماهرانه را پردازش می‌کند.
- (مشابه سراسری ۹۱)
۷. نمی‌توان گفت در صورت صدمه دیدن مخچه در انسان،
 ۱) هماهنگ کردن حرکات بدن در حالات گوناگون مختلف می‌شود.
 ۲) شخص قادر به حفظ کامل تعادل خود نخواهد بود.
 ۳) دریافت پیام‌های ارسالی به پشت ساقه مغز دچار مشکل می‌شود.
 ۴) بررسی پیام عصبی خارج شده از گوش دچار مشکل نخواهد شد.
۸. کدام ساختارهای مغزی به ترتیب در ترشح براق، بلع و تنظیم فشار خون نقش دارند؟
 ۱) مغز میانی-پصل النخاع-پل مغزی
 ۲) پل مغزی-پصل النخاع-پل مغزی
 ۳) برجنستگی‌های چهارگانه-پل مغزی-مغز میانی
 ۴) پصل النخاع-مغز میانی-پل مغزی
۹. مرکز عصبی اصلی تنفس بر جستگی‌های چهارگانه مغز
 ۱) برخلاف- متعلق به ساقه مغز
 ۲) و در فعالیت‌های حرکتی نقش مهمی دارند.
 ۳) همانند- در ناحیه مغز میانی قرار گرفته است.
 ۴) و توسط پل مغزی، راه‌های عصبی ارتباطی دارند.
۱۰. نمی‌توان گفت هیبوتالاموس (زیرنهنج)
 ۱) از دزیر تalamوس (نهنج) قرار دارد و در حفظ هم ایستایی بدن نقش دارد.
 ۲) دمای بدن را تنظیم می‌کند.
 ۳) بر احساس تشنگی تأثیرگذار است.
 ۴) محل گردهمایی و تقویت اغلب پیام‌های حسی است.
۱۱. کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
 «ساختار مغزی که به طور پیوسته از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی پیام عصبی دریافت می‌کند و آن‌ها را برای تنظیم فعالیت‌های ماهیچه‌ای بدن برسی می‌کند.....»
 ۱) هنگام راه رفتن با چشمان بسته نمی‌تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.
 ۲) باعث حفظ تعادل ورزشکار هنگام ورزش می‌شود.
 ۳) دارای ماده سفید در میان ماده خاکستری است.
 ۴) نسبت به پل مغزی در فاصله بیشتری قرار گرفته است تا نسبت به رابطه گوش.

۱. جملات نادرست کدام‌اند؟
 الف) دستگاه عصبی مرکزی فقط به تغییر اطلاعات دریافتی از محیط می‌پردازد.
 ب) در مغز و نخاع هر دو نوع نورون میلین دار و بدون میلین وجود دارند.
 ج) ماده خاکستری و سفید مغز و نخاع جایگاهی مشابه یکدیگر دارند.
 د) اطلاعات حسی از درون بدن به مغز و نخاع مرسند.
- ۲) ب و د ۳) الف و د ۴) ب و ج
۲. ماده خاکستری نخاع ماده سفید مغز است.
 ۱) مانند- حاوی رشته‌های عصبی میلین دار
 ۲) برخلاف- تنها شامل جسم سلولی
 ۳) مانند- حاوی آکسون و دندریت نورون‌ها
 ۴) برخلاف- فاقد نورون‌های رابط
۳. کدام جمله برای کامل کردن عبارت رو به رو به درستی مناسب است؟ «مننژ»
 ۱) پرده‌ای سه لایه است که بعضی از لایه‌های آن را بافت پیوندی تشکیل داده است.
 ۲) از نخاع که تا انتهای ستون مهره‌ها امتداد یافته است، محافظت می‌کند.
 ۳) در مغز برخلاف نخاع، به ماده خاکستری متصل است.
 ۴) مایع مغزی-نخاعی را بین جمجمه و سطح خارجی مغز نگه می‌دارد.
۴. کدام، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
 «سد خونی-مغزی»
 ۱) عامل حفاظتی در مغز است که به هیچ میکروبی اجازه خروج از خون در مغز را نمی‌دهد.
 ۲) از خصوصیات یاخته‌های پوششی سنگفرشی یک لایه در جهت حفاظت از مغز استفاده می‌کند.
 ۳) از سلول‌هایی تشکیل شده است که به یکدیگر چسبیده‌اند و بین آن‌ها منفذی وجود ندارد.
 ۴) به آمینو اسیدها، گلوکز و اکسیژن اجازه عبور و ورود به مغز را می‌دهد.
۵. با توجه به عبارت‌های زیر، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) در انسان، قشر مخ بیشتر حجم مغز را تشکیل می‌دهد.
 ب) بخش‌هایی از نیم کره چپ مخ به توانایی‌های هنری و استدلال مربوط است.
 ج) نیم کره راست مخ برای حل مسائل ریاضی تخصص یافته است.
 د) دو نیم کره مخ با رشته‌های عصبی به هم متصل‌اند.
- ۱) (الف) همانند «ج» درست است.
 ۲) (ب) برخلاف «د» نادرست است.
 ۳) (ج) برخلاف (ب) درست است.
 ۴) (د) همانند «الف» نادرست است.



۱۹. با غیرفعال شدن اعصاب سمباتیک، بدن انسان به تمایل پیدامی کند.
- ۲) کاهش تعداد حرکات تنفسی
 ۱) افزایش برون ھ قلبی
 ۳) کاهش ترشح غدد زیرزاپانی
 ۴) افزایش خون رسانی به عضلات اسکلتی
۲۰. جانوری که ساده‌ترین ساختار عصبی را در پیکر خود دارد
 ۱) در هر گره عصبی مجموعه‌ای از جسم سلولی نورون‌ها را دارد.
 ۲) در هر بند از بدن، یک گره عصبی برای تنظیم فعالیت ماهیچه‌های همان بند دارد.
 ۳) دارای سینپس‌های فراوان در هر یک از بازووهای انقباضی خود است.
 ۴) در بخش محیطی دستگاه عصبی خود رشتتهای متصل به طناب‌های عصبی را دارد.



۱۲. در شکل رو به رو در صورت آسیب دیدن بخش به احتمال زیاد
 ۱) پردازش اطلاعات حسی دچار اختلال نخواهد شد.
 ۲) شخص در بی‌آوردن خاطرات گذشته مشکلی نخواهد داشت.
 ۳) درگ مزه اصلی غذاها دچار اختلال نخواهد شد.
 ۴) شخص در تنظیم ساعات خواب و بیداری مشکلی نخواهد داشت.

۱۳. چند جمله نادرست است؟
 الف) از نظر تشریحی، مرکز تنظیم ترشح اشک بالای برجستگی‌های چهارگانه قرار گرفته است.
 ب) مرکز تنظیم فشار خون و انکاس سرفه بلا فاصله در ساختاری عصبی در بالای نخاع قرار دارد.
 ج) آسیب جدی برجستگی‌های چهارگانه مغز ممکن است با وجود سلامت کامل چشم‌های فرد باعث نایینایی شود.
 د) محل پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی حرکتی بدن تالاموس است.
 ه) هر نوع از اطلاعات حسی قبل از رسیدن به محل پردازش نهایی در قشر مخ از تالاموس‌ها می‌گذرد.

۱۴. کدام یک از گزینه‌ها علت این که اعتیاد را یک بیماری برگشت‌پذیر می‌دانند بهتر توصیف می‌کند?
 ۱) مصرف مواد اعتیادآور ترشح برخی از انتقال دهنده‌های عصبی را افزایش می‌دهند.
 ۲) تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب موارد اختیاری نیست.
 ۳) مصرف مکرر مواد اعتیادآور تغییراتی دائمی در مغز و میل شدیدی برای مصرف آن‌ها ایجاد می‌کند.
 ۴) ترک مصرف مواد اعتیادآور مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می‌آورد.

۱۵. در مورد اعتیاد نمی‌توان گفت که
 ۱) وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است که مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می‌آورد.
 ۲) نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور، در همه افراد معتاد اختیاری است.
 ۳) استفاده مکرر از مواد اعتیادآور با ایجاد تغییر در مغز، فرد را در مقابله با میل شدیدی برای مصرف آن ماده ناتوان می‌کند.
 ۴) تغییرات مغزی که به دنبال دارد ممکن است دائمی باشند.

۱۶. وقتی نورون‌های دوپامین‌زیک سامانه لیمبیک تحت تأثیر مکرر ماده اعتیادآور قرار می‌گیرند دوپامین آزاد می‌کنند و به فرد احساس دست می‌دهد.

(۱) بیشتری-لذت (۲) کمتری-سرخوشی (۳) کمتری-بی‌حوالگی (۴) بیشتری-افسردگی

۱۷. در تشریح مغز گوسفندها، کدام یک نادرست است?
 ۱) تالاموس‌ها با یک رابطه به هم متصل هستند.
 ۲) اپی‌فیز در لبه پایین بطن سوم قرار دارد.
 ۳) در عقب هیپوفیز برجستگی‌های چهارگانه قرار دارد.

۱۸. در مسیر عصبی انکاس عقب کشیدن دست هنگام برخورد با جسم داغ
 ۱) جسم سلولی نورون حسی برخلاف جسم سلولی نورون حرکتی، در دستگاه عصبی محیطی قرار دارد.
 ۲) هر بخشی از آکسون نورون حسی از غلاف میلین پوشیده شده است.
 ۳) انکاس کاملاً نخاعی است و تعداد نورون‌های حسی و حرکتی در گیر در انکاس برابر هستند.
 ۴) نورون‌های رابطه به صورت جهشی پیام‌های عصبی را هدایت می‌کنند.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| <p>۶. چند ایراد علمی در متن زیر وجود دارد؟</p> <p>وقتی یاخته عصبی تحریک می شود در همه جای آن اختلاف پتانسیل دوسوی غشا به آهستگی تغییر می کند و داخل یاخته از بیرون آن مشتبث می شود. به این تغییر پتانسیل عمل می گویند. پس از مدت کوتاهی اختلاف پتانسیل دوسوی غشا دوباره به حالت آرامش بر می گردد.</p> <p>(۱) ۱۱
۲۰۲
۳۰۳
۴۴</p> | <p>(۱) نمی توان گفت.....</p> <p>۱) باز ماندن دریچه کanal های پتانسیمی ولتاژی علتی برای رسیدن ولتاژ غشا یاخته عصبی به پتانسیل ۷۰-میلی ولت است.</p> <p>۲) ولتاژ مثبتی وجود دارد که در آن دریچه کanal های سدیمی و پتانسیمی بسته اند.</p> <p>۳) دامنه ولتاژی که در آن دریچه کanal های پتانسیمی باز است برابر با این دامنه برای کanal های دریچه دار ولتاژی سدیمی است.</p> <p>۴) نفوذ پذیری غشا یاخته عصبی در پتانسیل عمل برای بون های سدیم و پتانسیم و در لحظاتی به صفر می رسد.</p> <p>(۲) برای رسیدن پتانسیل غشا نورون حسی از ۳۰+ میلی ولت به صفر می شوند.</p> <p>(۳) کanal های دریچه دار سدیمی باز</p> <p>(۴) کanal های دریچه دار سدیمی و پتانسیمی باز</p> <p>(۵) پمپ های سدیم-پتانسیم فعال تر</p> | <p>(۱) انتخاب طبیعی هدایت گهشی پیام عصبی را نسبت به هدایت معمولی در طول رشته عصبی ترجیح داده است چون مصرف ATP در پتانسیل آرامش یاخته عصبی همه وقایع مورد انتظار است به جز:</p> <p>(۱) نفوذ پذیری بیشتر غشا پلاسمایی به بون های پتانسیم نسبت به بون های سدیم</p> <p>(۲) انتقال فعال سه بون پتانسیم و دو بون سدیم توسط پمپ سدیم - پتانسیم در هر بار فعالیت آن انتشار تسهیل شده بون های سدیم از راه کanal های سدیم بدون دریچه آبرکاف ATP توسط پمپ سدیم - پتانسیم به دلیل خاصیت آنزیمی پمپ</p> <p>در یاخته های عصبی</p> <p>(۱) با هر بار فعالیت پمپ سدیم - پتانسیم، ۳ بون سدیم وارد یاخته و ۲ بون پتانسیم خارج می شود.</p> <p>(۲) در گره های رانویه تعداد زیادی کanal ولتاژی وجود دارد که بون ها را در جهت شبیه غلظت جابه جا می کنند.</p> <p>(۳) نفوذ پذیری غشا نسبت به پتانسیم بیشتر است؛ به همین دلیل کanal های دریچه دار، پتانسیم بیشتری وارد می کنند.</p> <p>(۴) انتقال پیام عصبی در رشتہ های میلین دار سریع تر از رشتہ های بدون میلین و به صورت چهشی صورت می گیرد.</p> | <p>چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟</p> <p>(الف) کanal های ولتاژی سدیمی در غشا یک یاخته عصبی بسته اند، نیست.</p> <p>(ب) سدیم قادر به خروج از یاخته</p> <p>(ج) پتانسیم قادر به خروج از یاخته</p> <p>(د) قطعاً اختلاف پتانسیل دوسوی غشا در حال کاهش</p> |
| <p>۷. چند ایراد علمی در متن زیر وجود دارد؟</p> <p>۱) باعثی یاخته عصبی در میان میلینیکی می باشد.</p> <p>۲) باعثی یاخته عصبی در میان میلینیکی می باشد.</p> <p>۳) همانند از نوعی بافت پیوندی سمت ساخته شده است.</p> <p>۴) همانند در ساختار خود مقدار فراوانه، مایع مغزی، بخاری دارد.</p> | <p>۸. انتخاب طبیعی هدایت گهشی پیام عصبی را نسبت به هدایت معمولی در طول رشته عصبی ترجیح داده است چون مصرف ATP در پتانسیل آرامش یاخته عصبی همه وقایع مورد انتظار است به جز:</p> <p>(۱) در آن و سرعت آن است.</p> <p>(۲) کمتر- کمتر</p> <p>(۳) بیش تر- بیش تر</p> <p>(۴) بیش تر- بیش تر</p> | <p>۹. هنگام آزاد شدن انتقال دهنده عصبی از پایانه نورون حرکتی در محل سیناپس با یاخته ماهیجه اسکلتی همه وقایع اتفاق می افتد به جز:</p> <p>(۱) هیدرولیز ATP و آزاد شدن بون فسفات معدنی</p> <p>(۲) افزایش مساحت غشا پیش سیناپسی</p> <p>(۳) هم جوشی غشا وزیکول سیناپسی و غشا پایانه آکسونی</p> <p>(۴) بسته بندی ناقل عصبی در کیسه چه های غشا پایانه آکسونی</p> | <p>۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵.</p> |
| <p>۱۰. هنگام آزاد شدن انتقال دهنده عصبی از پایانه نورون حرکتی در محل سیناپس با یاخته ماهیجه اسکلتی همه وقایع اتفاق می افتد به جز:</p> <p>(۱) هیدرولیز ATP و آزاد شدن بون فسفات معدنی</p> <p>(۲) افزایش مساحت غشا پیش سیناپسی</p> <p>(۳) هم جوشی غشا وزیکول سیناپسی و غشا پایانه آکسونی</p> <p>(۴) بسته بندی ناقل عصبی در کیسه چه های غشا پایانه آکسونی</p> | <p>۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵.</p> | <p>۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵.</p> | <p>۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵.</p> |



۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰

(خارج از کشور: ۹۱)

یادداشت نکات مهم فصل

۱۹. در مورد دستگاه عصبی محیطی همه موارد صحیح آند به جز:
- جفت عصب مغزی دارد که حسی یا حرکتی هستند.
 - جفت عصب نخاعی دارد که هر یک حامل پیام‌های حسی و حرکتی هستند.
 - ریشه پشتی عصب نخاعی برخلاف ریشه شکمی آن حامل پیام حسی است.
 - اعصاب پیکری آن پیام‌های حسی را به مغز و نخاع و اعصاب حرکتی آن پیام‌ها را به اندام عمل می‌برند.
۲۰. کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
- طناب‌های عصبی در یک حشره، در هر بند از بدن یک گره عصبی دارند که فعالیت ماهیچه‌های انتظامی می‌کند.
 - مغز پلاناریا از چند گره بهم جوش خورده حاوی جسم سلولی نورون‌ها تشکیل شده است.
 - تحریک گره‌های عصبی در شبکه عصبی هیدر، در همه سطوح بدنه منتشر می‌شود.
 - در بین مهره‌داران اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان از یقینه بیشتر است.

۱۳. در فردی که از قدرت استدلال بالایی برخوردار است.....

۱) رابط سه گوش در تبادل اطلاعات بین نیم‌کره‌های مخ ایفای نقش می‌کند.

۲) نیم‌کره راست سیناپس‌های گسترش‌های نسبت به نیم‌کره چپ برقرار کرده است.

۳) رشته‌های عصبی بدون میلین با اتصال دونیم کره مخ به یکدیگر در پردازش همزمان اطلاعات مؤثرند.

۴) نیم‌کره چپ نقش محدودتری در توانایی فرد برای یادگیری مسائل استدلالی ریاضی دارد.

۱۴. بخشی از مغز که در پشت ساقمه مغز قرار دارد..... مخ.....

۱) برخلاف در فعالیت هماهنگ بخش‌های مختلف بدن، نقش ندارد.

۲) همانند تاثیر نخاع قرار نمی‌گیرد.

۳) برخلاف در عملکردهای هوشمندانه فعالیت دارد.

۴) همانند از اندام‌های حس پیام‌هایی را دریافت می‌کند.

۱۵. چند مورد می‌تواند جمله زیر را به درستی تکمیل نماید؟

۱) در دستگاه عصبی انسان، می‌باشد.

الف) رابط پیشه‌ای، رشته‌های عصبی بین دونیم کره مخ

ب) نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزی و نیم‌کره‌های مخ

ج) میلین، مانعی در برابر تغییر پتانسیل غشای یاخته عصبی

د) سد خونی - مغزی، مانعی در برابر ورود بسیاری از مواد و میکروب‌ها به مغز

۴۴

۳۳

۲۲

۱۱

۱۶. مصرف مواد اعتیادآور با اثر بر بخش‌های از می‌دهند.

۱) قشر مخ، احتمال کسالت و افسردگی را افزایش

۲) سامانه لیمبیک، توانایی قضاوت فرد را کاهش

۳) سامانه لیمبیک، در نهایت آزاد شدن دوپامین را افزایش

۴) قشر مخ، توانایی تصمیم‌گیری و خودکنترلی فرد را کاهش

۱۷. در تشریح مغز گوسفند نمی‌توان گفت که

۱) بین رابط سه گوش و جسم پیشه‌ای فضای بطن‌های ۱ و ۲ مغز قرار دارند.

۲) اجسام مخلوط در داخل بطن‌های ۱ و ۲ مغز قرار دارد.

۳) رابط سه گوش در بالای جسم پیشه‌ای قرار دارد.

۴) شبکه‌های مویرگی درون بطن‌های ۱ و ۲ دیده می‌شوند.

۱۸. در انعکاس عقب کشیدن دست هنگام برخورد با یک خار تیز نمی‌توان گفت از شش سیناپس یک خط از مسیر عصبی

۱) دو سیناپس در دستگاه محیطی قرار دارد.

۲) پنج سیناپس فعال است و انتقال دهنده عصبی وارد فضای سیناپسی آن‌ها می‌شود.

۳) چهار سیناپس از نوع تحریکی است و پیام عصبی را از نورون پیش‌سیناپسی به پس سیناپسی منتقل می‌کند.

۴) دونورون رابط بین دونورون حسی و دونورون حرکتی قرار دارند.