

روانپزشکی کودک و نوجوان

۱- از چه سنی کودکان می‌توانند به بازی‌های تعاملی و مشارکتی بپردازند؟

2 سالگی

3 سالگی

4 سالگی

5 سالگی

۲- در مورد Bullying (قلدری و زورگویی) نوجوانان عبارت نادرست را مشخص نمایید؟

مسخره کردن و توهین نمودن نوعی از Bullying محسوب می‌شود.

پسران بیشتر از دختران احتمال دارد درگیر Bullying بشوند.

درگیر شدن در Cyber bullying پیشگویی کننده علایم افسردگی و فکر خودکشی است.

رابطه بین Bullying سنتی و افسردگی قویتر از رابطه بین Cyber bullying و افسردگی است.

۳- سطح رشد اخلاقی Conventional role - conformity در نظریه رشد اخلاقی کولبرگ مربوط به کدام گروه سنی است؟

پیش دبستانی

سال‌های میانه

اوایل نوجوانی

اواخر نوجوانی

۴- همه موارد زیر از ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک به شمار می‌روند، بجز:

سطح تری گلیسیرید بالا

سطح بالای آنزیم‌های کبدی

فشار خون

سطح بالای گلوکز خون ناشتا

۵- کودکان سنین مدرسه School - age children عموماً به دلیل کدام یک از علل زیر از رفتن به مدرسه امتناع می‌کنند؟

افسردگی

اضطراب جدایی

مشکلات یادگیری

ترس از حمله هم‌تاها

۶- برخی از مطالعات سندرم مرگ ناگهانی کودک را با مصرف کدام یک از مواد زیر توسط مادر مرتبط دانسته‌اند؟

سیگار

کوکائین

ماری جوآنا

هروئین

۷- در یک بچه 5 ساله نرمال انتظار می‌رود همه توانایی‌های زیر بدست آمده باشد، بجز:

- کپی کردن یک مربع
- بستن بند کفش
- شمردن ده شیء
- رسم شکل آدمک با سر و بدن و اندام‌ها

۸- در چه سنی کودک اجزا بدن خود را می‌شناسد؟

- 8-4 ماهگی
- 12-8 ماهگی
- 18-12 ماهگی
- 24-18 ماهگی

۹- در درمان چاقی عبارت نادرست را در مورد اورلیستات (orlistat) مشخص نمایید:

- از داروهای تایید شده توسط FDA برای استفاده طولانی مدت بشمار می‌رود.
- برخلاف اکثر داروهای کاهش وزن عوارض جانبی سیستم عصبی مرکزی را ندارد.
- دوز معمول روزانه 120 میلی گرم روزی سه بار می‌باشد.
- مکانیسم اثر آن مهار بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین می‌باشد.

۱۰- همه موارد زیر در کسب اطلاعات و هیجانات از کودکان دبستانی مفید است، بجز:

- multiple choice question
- draw a family
- open-ended questions
- indirect commentary

۱۱- کدام یک از وسایل زیر برای تسهیل بازی (play) در جریان مصاحبه مناسب است؟

- chess
- puppets
- Video games
- Elaborate toys

۱۲- موارد زیر نشانه‌های عصبی نرم است، بجز:

- asymmetry of gait
- learning disabilities
- nystagmus
- Poor balance

۱۳- برای شخصی که با سن کمتر از 18 سال عملکرد انطباقی کاملاً مختل و ضریب هوشی پایین تر از ۷۰ دارد، در عین حال علائم دمانس هم دارد، چه اصطلاحی بکار می‌رود؟

Intellectual Disability

Dementia

Intellectual disability plus dementia

Mental retardation

۱۴- کدام یک از موارد زیر مطابق با معیارهای تشخیصی برای بی‌اشتهایی عصبی بر اساس DSM-5 نمی‌باشد؟

محدودیت دریافت انرژی و کاهش وزن عمدی

ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن

طول مدت علائم و رفتارهای فرد حداقل بمدت 6 ماه

اختلال در ادراک فرد از وزن یا شکل بدن خود

۱۵- میکرودیلیلشن کروموزوم 7 در چه سندرمی دیده می‌شود؟

Prader-Willi syndrome

fragile X syndrome

Williams' syndrome

Rett syndrome

۱۶- موارد زیر انومالی فیزیکی مرتبط با عقب ماندگی ذهنی است، بجز:

multiple hair whorls

low-set ears

flattened philtrum

persistent Babinski reflex

۱۷- در سندروم ایکس شکننده تابلوهای بالینی زیر دیده می‌شود، بجز:

ADHD

ASD

LD

BMD

۱۸- compulsive eating Behavior, intellectual disability, hypogonadism, small stature, hypotonia, small hands and feet

موارد فوق در کدام سندروم مشاهده می‌شود؟

Prader-Willi syndrome

fragile X syndrome

Williams' syndrome

Rett syndrome

۱۹- در یک کودک 5 ساله، ضعف در کدام یک از موارد زیر نیاز به بررسی از نظر اختلال هماهنگی حرکتی دارد؟

بستن دگمه

استفاده از فیچی

شانه کردن مو

بازی فوتبال

۲۰- به طور معمول در چندسالگی کلام کودک به گونه‌ای است که توسط افراد غریبه هم قابل فهم است؟

2

3

4

5

۲۱- کودک ۴ ساله‌ای بیمار شماسست. او قادر به بیان عبارات کوتاه است اما به نظر می‌رسد کلمات جدید را یاد نمی‌گیرد. در تلفظ بعضی از حروف مشکل دارد. در گرامر نیز دچار مشکل است و شاخص‌های تکاملی اندکی تاخیر دارند. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

Expressive Language Deficits

Receptive Language Deficits

Social (pragmatic) Communication Disorder

Speech Sound Disorder

۲۲- تکامل زبان در کدام یک از موارد زیر غیر طبیعی است؟

Autism Spectrum Disorder

Speech Sound Disorder

Dysarthria

Serious hearing impairment

۲۳- Phonological approach در کدام یک از موارد اختلال تلفظ کاربرد دارد؟

زمانی که اختلال به نحو گسترده‌ای وجود دارد

زمانی که اختلال برای بعضی از حروف وجود دارد

زمانی که مشکل بلع همراه با اختلال وجود دارد

زمانی که اختلالات یادگیری همراه با اختلال وجود دارد

۲۴- اگر لکنت زبان محدود به شرایطی خاص نظیر کلاس درس و خرید از فروشگاه باشد در چه فازی قرار دارد؟

یک

دو

سه

چهار

۲۵- در طبقه بندی تشخیصی DSM 5 موارد زیر در طبقه تشخیصی اختلالات ارتباطی قرار می‌گیرد، بجز:

Autism Spectrum Disorders

Social (pragmatic) Communication Disorder

Speech Sound Disorder

Childhood onset Fluency Disorder

۲۶- برای رویکرد درمانی که **stuttering** را یک رفتار و نه یک علامت می‌پندارد چه اصطلاحی بکار می‌رود؟

Behavior modification

Relaxation training

Cognitive Behavior Therapy

Self therapy

۲۷- در کودک پسر ۳/۵ ساله ای که تا ۶ ماه قبل از نظر رشدی طبیعی بوده و سپس پسرقتی از نظر ارتباط اجتماعی، تکلم، مهارت های حرکتی و کنترل اسفنکتر پیدا کرده، کدام یک از اختلالات زیر بر اساس طبقه بندی DSM-IV-TR جهت وی مطرح است؟

Autistic Disorder

Rett Syndrome

PDD NOS

Childhood Disintegrative Disorder

۲۸- در پسر بچه 4 ساله ای که تأخیر در تکلم دارد و چند کلمه محدود بیان می‌کند. نشانه های زیر مطرح کننده اختلال طیف اوتیسم است، بجز:

اختلال در ارتباط غیرکلامی

مشکل در تلفظ حروف

ضعف در بازی های تخیلی

استفاده از اشاره

۲۹- در تشخیص افتراقی Social Communication Disorder, Autism Spectrum Disorder وجود کدام یک از علائم زیر به نفع تشخیص اختلال طیف اوتیسم است؟

ضعف در فهم قواعد اجتماعی زبان

مشکل در کاربرد عبارات اجتماعی در زبان

تأخیر در زبان بیانی

وجود رفتارها و علایق کلیشه ای

۳۰- در خانواده ای که دو کودک اوتیستیک دارد و برای فرزنددار شدن مشورت می‌خواهند، ریت بروز اوتیسم در فرزند بعدی را تا چه حد بیان می‌کنید؟

50 درصد

20 درصد

10 درصد

70 درصد

۳۱- شایع ترین سندرم ژنتیکی که با علائم اختلال طیف اوتیسم بروز می کند، کدام است؟

Down

Prader-Willi

Fragile X

Williams

۳۲- کدام یک از یافته های نوروبیولوژیک زیر در اختلال طیف اوتیسم مشاهده نشده است؟

افزایش حجم کلی مغزی بین سنین 5 تا 16 سال

کاهش فعالیت فرونتال چپ هنگام انجام تکالیف حافظه

رابطه مثبت افزایش حجم استریاتوم و رفتارهای کلیشه ای

افزایش برانگیختگی در آمیگدال

۳۳- در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی حرکتی خطر بروز کدام یک از مشکلات زیر کمتر مطرح شده است؟

چاقی

ناتوانی در دویدن

خودکشی

اختلالات قلبی - عروقی

۳۴- در کودک 10 ساله ای که به علت ADHD تحت درمان با آتوماکستین است، برای رفع علائم اضطراب اضافه کردن کدام یک از داروهای زیر را توصیه می کنید؟

Fluoxetine

Sertraline

Paroxetine

Imipramine

۳۵- کدام یک از داروهای مورد استفاده در درمان ADHD برای رسیدن به فرم فعال خود نیاز به متابولیسم روده ای دارد؟

Dexedrine

Vyvance

Adderall

Concerta

۳۶- بر اساس توصیه آکادمی روانپزشکی کودک و نوجوان امریکا، انجام کدام یک از اقدامات زیر قبل از شروع استیمولانت ها ضروری نیست؟

Blood Pressure

Pulse

Weight

ECG

آزمون: روانپزشکی کودک و نوجوان_ بهمن ماه 98 مدت آزمون: 120

۳۷- کدام یک از موارد زیر در مورد سیر اختلال ADHD درست است؟

اولین علامتی که بر طرف می شود، حواس پرتی می باشد.
حدود 25 درصد بیماران در بزرگسالی نیز علائم خواهند داشت.
بروز سوء مصرف موارد در نوجوانی بیش از ADHD به اختلال سلوک مرتبط است.
همراهی با افسردگی نقش تعیین کننده ای در استمرار علائم نخواهد داشت.

۳۸- کدام یک از یافته های بیولوژیک زیر در مورد ADHD نادرست است؟

رابطه ای بین ADHD و ژن 4 DRD یافت شده است.
کاهش فعالیت موج بتا در EEG، در تمام ساب تایپ های ADHD دیده شده است.
کاهش فعالیت در پره فرونتال، آنتریور و سینگولیت و مخچه مشاهده شده است.
در کودکانی که نارس به دنیا آمده اند، نرخ بالایی از بروز ADHD دیده می شود.

۳۹- در بین تثبیت کننده های خلق زیر کدام یک کمترین تاثیر را روی افزایش وزن دارد؟

لیتیوم
کاربامازپین
توپیرامات
اسید والپروئیک

۴۰- کودکان با اختلال یادگیری ریاضی، در کدام یک از مهارت های زیر کمتر مشکل دارند:

Coordination
Linguistic
Perceptual
Attentional

۴۱- در درمان سندرم خوردن شبانه (night eating syndrome) کدام یک از درمان های زیر نتایج مثبتی نشان داده است؟

SSRIs
Bright light therapy
CBT
Antipsychotics

۴۲- کدام یک از عبارات زیر در مورد اپیدمیولوژی اختلال خواندن نادرست است؟

بیش از 50 درصد از کودکان مبتلا، اختلال ADHD همزمان نیز دارند.
همراهی این اختلال با اختلال ریاضی تا 60 درصد گزارش شده است.
در نمونه های ارجاع شده به کلینیک پسران 3-4 برابر بیشتر از دختران مبتلا هستند.
کودکان مبتلا درصد بالایی از جمعیت عادی مبتلا به افسردگی خواهد بود.

۴۳- پسر 9 ساله‌ای ارجاع شده است، مادرش می‌گوید حرکات مکرر تنه‌ای دارد و احساس آرامش می‌کند. کدام تشخیص محتمل تر است؟

Tic Disorder

Stereotypic Movement Disorder

Obsessive Compulsive Disorder

Impulse Control Disorder

۴۴- پسر 7 ساله‌ای با پلک زدن از یکسال قبل، مراجعه نموده است. والدین در مورد پیش آگهی او سوال می‌کنند. توضیحات زیر صحیح است، بجز:

شروع بین 6 تا 8 سال پروگنوز را بهتر می‌کند

تیک ناحیه صورت است نه تنه و اندام‌ها و این علامت خوبی است

معمولاً تیک‌ها 4 تا 6 سال طول می‌کشند و ابتدای نوجوانی فروکش می‌کنند

درمان زودرس دارویی با آنتی سایکوتیک‌ها می‌تواند پیش آگهی را بهتر کند

۴۵- دختر 14 ساله‌ای به علت صداهای ناگهانی و غیرارادی از گلو از یکسال قبل، ارجاع شده است. شما در جلسه درمانی به او یاد می‌دهید که به محض احساس خارش در گلو به جای صدای گلو، با یک نفس عمیق این حس را سرکوب کند. نام این روش درمانی چیست؟

Habit Reversal

Relaxation Training

Self-Monitoring

Cognitive Behavioral Treatment

۴۶- پسر 14 ساله‌ای به علت تیک‌های صوتی و حرکتی ارجاع شده است. خانواده شاکی‌اند که او بنزین هم بو می‌کند. کدام اقدام پاراکلینیک را برای نامبرده درخواست می‌کنید؟

نوار مغز

سی تی اسکن مغزی

معاینه چشم

مطالعه ژنتیک

۴۷- بعد از کسب پاسخ خوب دارویی دراپیزود اول افسردگی کودکان، درمان چه مدت ادامه می‌یابد؟

شش ماه

یکسال

دو سال

پنج سال

۴۸- شایعترین اختلال خوردن کدام یک از موارد زیر است؟

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Binge eating disorder

Purging disorder

۴۹- تکنیک Over Correction در کدام اختلال زیر کاربرد دارد؟

- ناخن جویدن
- کندن موها
- خوردن مواد غیر خوراکی
- شب ادراری

۵۰- کودک 3 ساله‌ای اجتناب از غذا خوردن دارد که منجر به نرسیدن کودک به وزن مناسب شده است. مادر شدیداً نگران است و کودک را با موبایل سرگرم می‌کند و کمی غذا به او می‌خوراند. برنامه‌های درمانی زیر کاربرد دارد، بجز:

- درمان نگرانی مادر و بهبود روابط مادر - کودک
- استفاده از فرد دیگری جهت تغذیه کودک
- حذف محرکات و حواس پرتی هنگام غذا
- فواصل مناسب غذایی به صورت هر 6 ساعت

۵۱- در اختلال یادگیری نوشتن، ضعف در کدام یک از حوزه‌های زیر شایع‌تر است؟

- Grammar
- Spelling
- Hand writing
- Punctuation

۵۲- در تشخیص افتراقی بی‌اختیاری کنشی مدفوع از بیماری هیرشپرونک کدام یک بنفع بی‌اختیاری کنشی مدفوع است؟

- وجود رکتوم خالی
- عدم تمایل به دفع
- شروع علائم به فاصله کوتاه بعد از تولد
- فیشر آنال همراه

۵۳- در پیش آگهی بی‌اختیاری کنشی مدفوع کدام فاکتور زیر مطرح نشده است؟

- وجود سابقه خانوادگی مثبت
- طول مدت علائم (کرونوسیتی)
- وجود مشکل رفتاری همراه
- میزان تونیسیتی اسفنکتر آنال

۵۴- در یک مطالعه استفاده از ربوکستین (Reboxetine) در درمان انورزی کودکان، موارد زیر گزارش شد، بجز:

- دوز 4 تا 8 میلی گرم در موقع خواب استفاده شد
- اثرات توکسیک قلبی آن نگران کننده است
- 59 درصد کودکان کاملاً خشک شدند
- ربوکستین به تنهایی یا همراه با دسموپرسین استفاده شد

۵۵- حداقل سن کودک برای تشخیص گذاری Reactive attachment Disorder کدام است؟

- بدو تولد
- نه ماهگی
- دو سالگی
- پنج سالگی

۵۶- یافته‌های بیولوژیک در کودکان مبتلا به PTSD شامل موارد زیر است، بجز:

- حجم کرانیال کوچکتر
- حافظه قوی تر
- کوریوس کالوزوم کوچکتر
- بهره هوش کمتر

۵۷- کودک 7 ساله‌ای در زلزله‌ای مهیب شاهد بی‌خانمان شدن هزاران نفر بوده است. درمانگر در جلسه درمانی در حالیکه کودک را حمایت می‌کند از او می‌خواهد که ماجرا را تعریف کند و عواقب زلزله را بیان کند و از نقاشی و هنر نیز استفاده می‌کند. این تکنیک چیست؟

- Trauma Narrative
- Affective Expression
- Cognitive Coping
- Exposure and mastering

۵۸- دختر 12 ساله‌ای بدنال آتش سوزی در مدرسه دچار ترس، وحشت، تحریک‌پذیری و کابوس‌های شبانه شده است. برای کاهش کابوس‌ها و بهبود خواب او کدام داروی زیر را تجویز می‌کنید؟

- آگونیسست الفا دو آدرنژیک
- انتاگونیسست بتا آدرنژیک
- آنتی سایکوتیک نسل دوم
- بنزودیازپین‌ها

۵۹- پسر 9 ساله‌ای با شکایت از قشقرق به راه انداختن زیاد و پرخاشگری‌های شدید در خانه و مدرسه که حداقل 4-5 بار در هفته اتفاق می‌افتد، توسط والدین ارجاع شده است. در فواصل این دوره‌ها نیز بیشتر اوقات عصبانی و ناراحت است. این حالت‌ها از حدود 2 سال پیش شروع شده، علایمی به نفع خلق بالا در کودک وجود ندارد. با توجه به تشخیص احتمالی خود، در این کودک خطر پیشرفت به سمت همه اختلالات زیر خواهد بود، بجز:

- افسردگی ماژوز
- دیس تامیک
- دوقطبی
- اضطرابی

۶۰- در اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- نیمی از کودکان مبتلا چند سال بعد علایم اختلال را ندارند
- کودکان مبتلایی که در آن‌ها پرخاشگری بارز است به سمت اختلال سلوک می‌روند
- همبودی این اختلال با ADHD با احتمال شکل‌گیری اختلال سلوک در آینده ارتباطی ندارد
- تشخیص همزمان ODD با اختلال سلوک طبق معیارهای DSM-V امکان پذیر نیست

۶۱- شایع‌ترین همبودی با Disruptive Mood Dysregulation Disorder کدام است؟

ADHD

ODD

Anxiety Disorders

MDD

۶۲- بر اساس متاآنالیز مطالعات طولی مهم‌ترین عوامل خطر که اختلال سلوک را پیش‌بینی می‌کنند شامل همه موارد زیر است، بجز:

عملکرد تحصیلی پایین

سابقه افسردگی

سابقه سوء رفتار فیزیکی

نظارت پایین والدین

۶۳- درمان اولیه در اختلال نافرمانی مقابله‌ای کدام است؟

Aripiprazole

Family Intervention

Risperidone

Play therapy

۶۴- دختر 11 ساله‌ای که با تک والدش زندگی می‌کرده است یک ماه قبل مادر به علت لوسمی فوت می‌کند. دختر افکار تکراری در مورد مردن خودش و ملحق شدن به مادر دارد. بصورت گذرا صدای مادرش را می‌شنود. هنوز به مدرسه بازنگشته است و درجاتی از خلق پایین را دارد. تشخیص چیست؟

Major Depression

Psychosis NOS

Normal Bereavement

Adjustment Disorder

۶۵- براساس گروهی از مطالعات، اختلال بای پولار با شروع زودرس با کدام موارد زیر همراه نمی‌باشد؟

حملات میکس بیشتر

علائم سایکوز کمتر

پاسخ ضعیف‌تر به درمان پروفیلاکسی با لیتیوم

ارثی بودن بیشتر

۶۶- در مورد همبودی Comorbidity در کودکان بای پولار موارد زیر صحیح است، بجز:

درصد قابل توجهی از کودکان بای پولار کرایتریای کامل ADHD را دارند

در بیماران مبتلا به بای پولار خودکشی و مصرف الکل بیشتر است

در بیماران ADHD نوع بی‌توجهی نسبت به نوع ترکیبی (Combined) اختلال بای پولار کمتر است

همبودی بای پولار با اختلالات اضطرابی کمتر است

۶۷- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات اختلال اضطراب جدایی نمی‌باشد؟

استرسور جدایی از خانه یا مراقبت کننده اصلی عامل آشکارساز است
شکایات جسمی نظیر دل درد، سردرد و علائم گوارشی وجود دارد
در تشخیص افتراقی با اختلال پانیک با آگورافوبیا قرار می‌گیرد
طول مدت علائم در این اختلال باید حداقل 6 ماه باشد

۶۸- بر اساس مطالعه CAMS (Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study) کدام یک از عوامل زیر پیش بینی کننده بهبودی اختلالات اضطرابی در آینده است؟

همراهی با اختلال یادگیری
همراهی با اختلال افسردگی
سن پایین تر در شروع درمان
وجود اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان اختلال اولیه

۶۹- دختر 7 ساله‌ای علیرغم نوانایی صحبت کردن در خانه، از سال گذشته که کلاس اول رفته در مدرسه اصلاً با کسی صحبت نمی‌کند، تنها گاهی با ژست‌های غیر کلامی ممکن است ارتباط برقرار کند. در این کودک خط اول درمان کدام است؟

CBT
PMT
Sertraline
Aripiprazole

۷۰- در اختلال موتیسم انتخابی کدام یک از یافته‌های اپیدمیولوژیک زیر صحیح است؟

در پسران شایع تر از دختران است
اکثر کودکان با افزایش سن بطور خودبخودی بهبود می‌یابند
در کودکان با سنین بالاتر بیشتر دیده می‌شود
شیوع این اختلال 2-3 درصد کودکان می‌باشد

۷۱- Modified Family Focused Treatment یکساله در نوجوان بای پولار بهبود قابل توجهی را در جنبه‌های مختلف داشت، بجز:

خلق افسرده
هیپومانیا
مانیای حاد
بهبود عملکرد سایکوسوشیال

۷۲- در کودکان مبتلا به اختلال وسواس جبری همراه با اختلال تیک کدام یک از نشانه‌های زیر کمتر دیده می‌شود؟

Counting
Arranging
Washing
Ordering

۷۳- بر اساس گایدلاین‌های درمانی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به OCD خفیف تا متوسط کدام یک از موارد زیر خط مقدم درمان است؟

تجویز سرترالین با دوز پایین

تجویز کلومی پرامین با دوز پایین

درمان شناختی رفتاری

آموزش خانواده

۷۴- بر اساس مطالعات طولی، در مورد سیر و پیش آگهی در اختلال وسواس جبری در کودکان و نوجوانان همه موارد زیر صحیح است، بجز:

10-15 درصد از مبتلایان بهبودی قابل توجه پیدا می‌کنند

طول مدت بیماری در زمان ارزیابی، پیش بینی کننده تداوم اختلال است

بهترین پیامد در مواردی است که همبودی اختلال تیک و ADHD وجود ندارد

اغلب موارد سیر مزمنی در این اختلال وجود دارد

۷۵- در اتیولوژی Childhood-onset Schizophrenia همه موارد زیر صحیح است، بجز:

ارث پذیری این اختلال حدود 50% است

در بستگان درجه یک مبتلایان تا 8 برابر شیوع بیشتری دارد

نرم نشانگان عصبی در مبتلایان بیشتر دیده می‌شود

نقایصی در بهره هوشی مبتلایان قبل از شروع بیماری دیده می‌شود

۷۶- در اختلال اسکیزوفرنی با شروع در دوران کودکی نسبت به اسکیزوفرنی با شروع در بزرگسالی همه موارد زیر بیشتر دیده می‌شود، بجز:

تاریخچه قبلی طرد اجتماعی

تاریخچه ارتباط ضعیف با همسالان

مشکلات تحصیلی قبلی

سابقه قرار گرفتن در معرض سوء رفتار جنسی

۷۷- مصرف مکرر کدام یک از مواد زیر قوی‌ترین پیش‌بینی کننده مصرف کوکائین است؟

ماری جوانا

الکل

آمفتامین

ال - اس - دی

۷۸- در نوجوانانی که در برنامه درمانی سوء مصرف مواد شرکت کردند شایع‌ترین موادی که مصرف شده بود کدام است؟

Marijuana

Amphetamine

Opioids

Polydrugs

۷۹- پیش‌بینی کننده‌های مهم پیش آگهی بد در اختلال اسکیزوفرنی با شروع در دوران کودکی کدام یک از موارد زیر است؟

سابقه قبلی افسردگی

سابقه فامیلی اسکیزوفرنی

شروع حاد

سن بالاتر

۸۰- در یکی از فازهای Interfamilial sexual abuse، کودک گیج و ترسان است چون نمی‌داند که پدر والد اوست یا شریک جنسی‌اش، مادر صحبت‌های دخترش را باور نمی‌کند و از مقابله با همسرش خودداری می‌کند، کودک از خواهر و برادرش فاصله می‌گیرد، این فاز چه نام دارد؟

Engagement phase

Sexual interaction phase

Secrecy phase

Disclosure phase

۸۱- براساس مطالعات انجام شده در نوجوانان با و بدون اختلال یادگیری که با حملات تروریستی مواجه شده‌اند همه فاکتورهای زیر خطر پیشرفت به سمت اختلال استرس پس از سانحه را افزایش می‌دهد، بجز:

Personal exposure to terror

Post personal life threatening events

History of anxiety

History of depression

۸۲- در گروه درمانی کودکان و نوجوانان همه عوامل تئوریک زیر در اثر بخشی درمان نقش دارند، بجز:

Universality

Hope

Altruism

Improved cognitive functions

۸۳- استفاده از کدام یک از بنزودیازپین‌های زیر در اختلال اضطراب جدایی کودکان می‌تواند موثر باشد؟

آپرازولام

لورازپام

کلونازپام

اکسازپام

۸۴- کودک 6 ساله‌ای با علائم ناخن جویدن شدید که از 3 سال قبل شروع شده و باعث عفونت و زخم گردیده، ارجاع شده است. همه روش‌های درمانی زیر در درمان این کودک کاربرد خواهد داشت، بجز:

Habit reversal

Differential reinforcement

Haloperidol

Clonidine

۸۵- در پسر 14 ساله با پرخاشگری و تشخیص اختلال سلوک، همه داروهای زیر در کاهش پرخاشگری موثر بوده‌اند، بجز:

لیتیوم

کاربامازپین

ریسپریدون

آریپیپرازول

۸۶- در کودکان با تشخیص اختلال دوقطبی که تحت درمان با داروی لیتیوم کرنات است، کدام یک از عوامل زیر نسبت به بزرگسالان در دفع سریع‌تر دارو نقش دارد؟

قدرت عضلانی کمتر

بافت چربی بیشتر

فیلتراسیون گلومرولی بیشتر

ظرفیت کبدی کمتر

۸۷- در درمان کودک 5 ساله با علایم پرفعالیتی - نقص توجه، پس از آموزش والدین، کدام یک از داروهای زیر موثر و ایمن شناخته شده است؟

ریسپریدون

متیل فنیدیت

اتوموکستین

کلونیدین

۸۸- در مطالعه‌ای که 100 نوجوان 14-18 ساله با تشخیص‌های متفاوت تحت درمان براساس Mindfulness based stress reduction (MBSR) در مقایسه با درمان معمول (Treatment as usual) قرار گرفتند. کدام دسته علایم فقط در گروه تحت درمان با MBSR بهبود قابل ملاحظه‌ای نشان داد؟

علایم اضطرابی

علایم وسواسی

علایم افسردگی

علایم سوماتیزیشن

۸۹- در فردی که در دوران early childhood والدین خود را از دست داده است خطر کدام یک از موارد زیر در دوره نوجوانی، افزایش می‌یابد؟

اضطراب

افسردگی

سوء مصرف مواد

وسواس

۹۰- سطح خونی درمانی مناسب برای داروی دی والپروئکس در درمان اختلال دوقطبی نوجوانان کدام است؟

20-50^μ/ml

50-100^μ/ml

100-150^μ/ml

150-200^μ/ml

۹۱- در کودک 8 ساله مبتلا به اختلال یادگیری که دچار مشکلات توجه نیز می‌باشد، استفاده از متیل فنیدیت می‌تواند در بهبود همه کارکردهای زیر موثر باشد، بجز:

Psycholinguistic

Memory

Vigilance

Academic achievement

۹۲- براساس مطالعات انجام شده در نوجوانانی که در معرض سوء رفتار والدین بوده‌اند. کدام یک از خصوصیات زیر با بروز بیشتر خشونت مرتبط بوده است؟

High shame

High blaming of others

Low shame

Low blaming of others

۹۳- همه فاکتورهای زیر در گسیخته شدن فرزند خواندگی نقش دارند، بجز:

Younger age at placement

Report of being singled out

rejected by siblings

Greater degree of behavioral problems

۹۴- پدری دختر 8 ساله‌اش را مرتباً مورد توهین و ناسزا قرار می‌دهد، سرش داد می‌زند و او را در نزد دیگران تحقیر و سرزنش می‌کند. این رفتار والدین چه نوعی از abuse می‌باشد؟

Physical

Ritual

Psychological

Sexual

۹۵- در دختر 7 ساله که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است و دچار علائم اضطرابی، شکایات جسمی و علائم تجزیه‌ای شده است، کدام یک از علائم زیر در دسته واکنش‌های تجزیه‌ای قرار می‌گیرد؟

Fearfulness

Insomnia

Daydreaming

Headache

۹۶- کدام یک از موارد زیر درباره معیارهای تشخیصی Attenuated psychosis syndrome براساس DSM-5 صحیح است؟

علائم نباید باعث اختلال عملکرد شود.

وجود دو علامت هذیان و توهم برای تشخیص لازم است.

وجود یک علامت هذیان یا توهم برای تشخیص لازم است.

شدت علائم از دیگر اختلالات سایکوتیک بیشتر است.

۹۷- اگر مشکلات هویتی در نوجوانان برای مدت طولانی ادامه یابد، باعث افزایش خطر ابتلا به کدام یک از انواع اختلال شخصیت می‌گردد؟

بردلاین

آنتی سوشیال

هیستریونیک

پارانوئید

۹۸- شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی نوجوانان اقدام‌کننده به تجاوز جنسی شامل همه موارد زیر است، بجز:

اختلال سلوک

اختلال نقص توجه - بیش فعالی

اختلال تطابق یا سازگاری

اسکیزوفرنی

۹۹- خودباوری، احترام به نفس و حس مسئولیت اجتماعی در کودکان نتیجه کدام یک از سبک‌های فرزند پروری به شمار می‌رود؟

Authoritarian

Permissive

Neglectful

Authoritative

۱۰۰- در مورد همه گیر شناسی بی‌اشتهایی عصبی anorexia nervosa کدام گزینه نادرست است؟

شایعترین سن شروع بی‌اشتهایی عصبی در اواسط نوجوانی است.

میزان شیوع اختلال در دخترها 10 تا 20 برابر پسرها است.

اغلب در بین طبقات بالای اجتماعی و اقتصادی گزارش شده است.

این اختلال در ممالک توسعه یافته شایعتر است.

اخلاق پزشکی

۱۰۱- برای اخذ رضایت از بیمار قبل از جراحی، کدام عبارت نادرست است؟

اطلاعات کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

بیمار صلاحیت لازم را برای دادن رضایت داشته باشد.

تصمیم بیمار باید داوطلبانه باشد.

در موارد بدخیمی، توضیح دقیق علت جراحی لازم نیست.

۱۰۲- در کدام یک از موارد زیر، رعایت حقیقت گویی لازم نیست؟

بیمار تمایل خود را برای ندانستن حقایق، اعلام کرده باشد.

بیمار دچار بیماری روانی شدید باشد.

بیمار در سن بلوغ باشد.

بیان حقایق، باعث آسیب جدی شود.

کلید آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص - رشته روانپزشکی کودک و نوجوان

۱	ج	۵۱	ب	۱۰۱	د
۲	د	۵۲	د	۱۰۲	ج
۳	ب	۵۳	الف	۱۰۳	
۴	ب	۵۴	ب	۱۰۴	
۵	ب	۵۵	ب	۱۰۵	
۶	الف	۵۶	ب	۱۰۶	
۷	ب	۵۷	الف	۱۰۷	
۸	د	۵۸	الف	۱۰۸	
۹	د	۵۹	ج	۱۰۹	
۱۰	ج	۶۰	ب	۱۱۰	
۱۱	ب	۶۱	الف	۱۱۱	
۱۲	ب	۶۲	ب	۱۱۲	
۱۳	ج	۶۳	ب	۱۱۳	
۱۴	ج	۶۴	ج	۱۱۴	
۱۵	ج	۶۵	ب	۱۱۵	
۱۶	د	۶۶	د	۱۱۶	
۱۷	د	۶۷	د	۱۱۷	
۱۸	الف	۶۸	ج	۱۱۸	
۱۹	الف	۶۹	الف	۱۱۹	
۲۰	ج	۷۰	ب	۱۲۰	
۲۱	الف	۷۱	ج	۱۲۱	
۲۲	الف	۷۲	ج	۱۲۲	
۲۳	الف	۷۳	ج	۱۲۳	
۲۴	ج	۷۴	الف	۱۲۴	
۲۵	الف	۷۵	الف	۱۲۵	
۲۶	د	۷۶	د	۱۲۶	
۲۷	د	۷۷	الف	۱۲۷	
۲۸	ب	۷۸	د	۱۲۸	
۲۹	د	۷۹	ب	۱۲۹	
۳۰	الف	۸۰	ب	۱۳۰	
۳۱	ج	۸۱	د	۱۳۱	
۳۲	الف	۸۲	د	۱۳۲	
۳۳	ج	۸۳	الف	۱۳۳	
۳۴	ب	۸۴	د	۱۳۴	
۳۵	ب	۸۵	ب	۱۳۵	
۳۶	د	۸۶	ج	۱۳۶	
۳۷	ج	۸۷	ب	۱۳۷	
۳۸	ب	۸۸	ب	۱۳۸	
۳۹	ج	۸۹	ب	۱۳۹	
۴۰	الف	۹۰	ب	۱۴۰	
۴۱	الف	۹۱	د	۱۴۱	
۴۲	الف	۹۲	ب	۱۴۲	
۴۳	ب	۹۳	الف	۱۴۳	
۴۴	د	۹۴	ج	۱۴۴	
۴۵	الف	۹۵	ج	۱۴۵	
۴۶	الف	۹۶	ج	۱۴۶	
۴۷	ب	۹۷	الف	۱۴۷	
۴۸	ج	۹۸	د	۱۴۸	
۴۹	ج	۹۹	د	۱۴۹	
۵۰	د	۱۰۰	ج	۱۵۰	