

روانپزشکی کودک و نوجوان

۱- تولد نوزاد بعد از چند هفتگی، کاهش حساسیت ماده سفید را به آسیب های ناشی از هیپوکسی به دنبال دارد؟

26

28

30

32

۲- در نوزادی که بی‌قراری شدید و گریه و کاهش تمایل به تماس با انسان ها به چشم می خورد، مصرف کدام یک از مواد زیر در دوران بارداری محتمل تر است؟

الکل

کوکائین

نیکوتین

ماری جوانا

۳- کودکی که در سن 9 ماهگی جدایی طولانی از مادر را تجربه کرده است، به چه اختلالی، آسیب پذیری بیشتری دارد؟

بیش فعالی

اوتیسم

افسردگی

سلوک

۴- بر اساس نظریه مارگارت ماهر، در مرحله ای از رشد، وجود مادر حتی در زمانی که در معرض دید کودک نیست، می تواند باعث آرامش و اطمینان بخشی او شود. این مرحله چه نام دارد؟

Differentiation

Practicing

Object Constancy

Rapprochement

۵- کدام یک از تغییرات زیر در ابتدای دوره preschool در کودکان رخ می دهد؟

ابراز ناراحتی بصورت کلامی

درک احساس حقارت

شکل گیری وجدان اخلاقی

احساس گناه

۶- کودکی که در سن 30 ماهگی است، انتظار داریم کدام ویژگی را در بازی خود بروز دهد؟

نوبت گرفتن را رعایت کند

اسباب بازی خود را با دیگری به اشتراک می گذارد

به دنبال کودک دیگری بدود

در نقاشی انسان، انگشتان را بکشد

۷- پدر و مادری که در شیوه های فرزندپروری خود، قوانین محدودکننده زیادی برای کودک ندارند و در عین حال سخت گیری های غیرقابل پیش بینی دارند، کدام یک از شیوه های فرزندپروری را دارا هستند؟

Indulgent Permissive

Authoritarian

Indulgent Neglectful

Authoritative Reciprocal

۸- بر اساس نظریه کولبرگ، مرحله دوم رشد اخلاقی چگونه خود را در کودکان نشان می دهد؟

مبنای اخلاق، تنبیه والدین و اطاعت از ایشان است.

کودک سعی می کند با مطابقت دادن خود با دیگران، تأیید به دست آورد.

کودک استثناها را در قواعد اخلاقی درک می کند.

اطاعت از قوانین به طور ارادی و بر اساس اصول اخلاقی صورت می گیرد.

۹- برای بررسی علائم اضطرابی در یک کودک 7 ساله، بهترین فردی که باید مورد سوال قرار گیرد، چه کسی است؟

مادر

معلم

پدر

کودک

۱۰- در مصاحبه با یک کودک 10 ساله، استفاده از کدام یک از روش های زیر کارآیی بیشتری دارد؟

سئوالات کاملاً باز

سئوالات نیمه باز

سئوالات بسته

اسباب بازی و عروسک

۱۱- در کودک 7 ساله ای که نیاز به ارزیابی بیشتر در زمینه مشکلات هیجانی دارد و قصد دارید از یک ابزار تشخیصی Interviewer-Based استفاده نمایید، استفاده از کدام یک ابزارهای زیر مناسب تر است؟

DICA

CAPA

K-

SADS
NIMH-DISC

IV

۱۲- قصد دارید در منطقه ای یک بررسی از نظر وجود مشکلات رفتاری و هیجانی در کودکان به عمل آورید، کدام یک از ابزارهای زیر بدین منظور مناسب تر است؟

Child and Adolescent Psychiatric Assessment

Achenbach Child Behavior Checklist

Connors Abbreviated Rating Scale

Pictorial Diagnostic Instrument

۱۳- به منظور ارزیابی یک کودک 6 ماهه از نظر شاخص های رشدی، کدام یک از ابزارهای زیر مناسب است؟

Kaufman

Stanford-Binet

Vineland

Bayley

۱۴- به منظور ارزیابی توانایی های بصری - حرکتی یک کودک 4 ساله، کدامیک از تست های زیر مناسب است؟

Visual Motor Gestalt

Benton Visual Retention

Halstead - Reitan

Luria - Nebraska

۱۵- یک کودک 7 ساله بر اساس آزمون WISC-III-R نمره هوش کلی در حد 60 به دست آورده است. به منظور قطعی کردن توانایی های هوشی کودک، کدام یک از آزمون های زیر کاربرد دارد؟

Stanford - Binet

Wechsler Individual Achievement

Vineland Adaptive Behavior

Behavior Assessment System for Children

۱۶- نوجوان 17 ساله ای که تا کلاس دوم دبستان توانسته درس بخواند از نظر کلامی و اجتماعی می تواند ارتباط برقرار کند و در یک مغازه تحت نظارت صاحب آن کار می کند. از نظر توانایی هوشی در چه سطحی ارزیابی می شود؟

Borderline Intellectual Functioning

Mild Intellectual Disability

Moderate Intellectual Disability

Severe Intellectual Disability

۱۷- همراهی کدام یک از اختلالات زیر در کودکان مبتلا به ناتوانی هوشی خفیف، شایع تر است؟

Autism Spectrum Disorder

Schizophrenia

Bipolar Disorder

Disruptive Behavior Disorder

۱۸- در کودک 8 ساله ای که ناتوانی هوشی متوسط همراه با هایپرفازیا، رفتار وسواسی - جبری در خوردن و دستن کوتاه دارد، کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

Prader - Willi

Down

Fragile X

Lesch - Nyhan

۱۹- در سندرم ایکس شکننده، کدام یک از اختلالات روانپزشکی زیر شایع تر است؟

سلوک

بیش فعالی

افسردگی

وسواس

۲۰- به منظور ارزیابی کروموزومی جنین، استفاده از آمینوسنتز در چند هفتهگی بارداری انجام می شود؟

هشت

ده

پانزده

بیست

۲۱- موارد زیر در تعدادی از مبتلایان به **Speech sound disorder** دیده می شود، بجز:

Soft neurological sign

Depressed vestibular responses

EEG abnormalities

Wide lateral ventricles

۲۲- پسر 7 ساله‌ای ارجاع شده که با جملات کوتاه صحبت می‌کند، نمی‌تواند به خوبی داستان تعریف کند. به جای نام برخی اشیاء کلمه «چیژ» را به کار می‌برد. دستورات را می‌فهمد، هوش و شنوایی او خوب است. تشخیص چیست؟

Expressive language disorder

Autism spectrum disorder

Mixed expressive- receptive language disorder

Intellectual disability

۲۳- دختر 4 ساله‌ای ارجاع شده است. دستورات ساده را نمی‌فهمد، تاکنون صحبت نکرده است، نیازهایش را با اشاره نشان می‌دهد، شنوایی نرمال است، از پارک و بازی لذت می‌برد و مشکل عاطفی و رفتاری ندارد. اقدام درمانی شما شامل موارد زیر است، بجز:

آموزش زبان بیانی

افزایش ارتباطات اجتماعی

مشاوره خانواده

روان‌درمانی

۲۴- شایعترین اختلال همبود با **Speech sound language disorder** کدام است؟

اختلالات توجه

اختلالات ویژه یادگیری

شب ادراری

اختلالات زبان

۲۵- پسر 8 ساله کلاس دوم دبستان با اشکالات تلفظی متعدد مراجعه نموده است. او به جای کلمه «بکنم» میگوید «بتونم» و به جای کلمه «آذر» میگوید «آد». همکلاسیهایش او را مسخره می کنند و باعث انزوای کودک شده اند. اقدامات درمانی شما موارد زیر است، بجز:

تقویت فعالیت های Prosocial کودک

جلسات با پاتولوژیست زبان - گفتار

توصیه به معلم جهت برگزاری امتحانات کتبی به جای شفاهی

مشاوره والدین جهت مانیتور ارتباط کودک و همسالان

۲۶- کودک 5 ساله ای با تکرار و کشیدگی کلام ارجاع شده است. برنامه Lid comb's برای درمان او کدام مورد زیر می باشد؟

تشویق کودک در مواقع غیر لکنت و مداخله در مواقع لکنت برای تصحیح کلام خود

بیان هر سیلاب در یک زمان و با یک ریتم مشخص

آموزش آرامسازی تصویری و تکرار در خانه

تکنیک های تعدیل گفتاری هدایت شده

۲۷- اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک) با اختلالات زیر همبودی دارد، بجز:

نقص توجه/ بیش فعالی

اختلالات خواندن و نوشتن

اختلالات بی اختیاری ادرار و مدفوع

اختلالات زبان بیانی/ پذیرا

۲۸- عبارات زیر در مورد Cluttering صحیح است، بجز:

در دوسوم موارد در ابتدای نوجوانی، بهبود خودبخودی می یابد

اختلال می تواند به صورت کشیدگی کلام یا تکرار باشد

بیشتر بین کودکان دو تا هشت ساله رخ می دهد

معمولاً همراه با اختلالات یادگیری و سایر اختلالات ارتباطی است

۲۹- در مورد نقش ژنتیک در پاتوژنز اتیسم موارد زیر صحیح است، بجز:

هتروژن بودن علایم در خانواده با طیف اتیسم پیشنهادکننده الگوهای متعدد ژنتیک است.

افزایش ریسک اتیسم (بیش از 50 درصد) در خانواده های با 2 یا بیشتر بچه اتیسم دیده می شود

در همشیرهای کودک اتیسم اختلال مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتر دیده می شود

تا ده درصد بچه های طیف اتیسم توبروس اسکروزیس دارند

۳۰- یافته های نورولوژیک در مبتلایان به اتیسم شامل موارد زیر است، بجز:

32-4 درصد بچه های اتیسم تشنج گراندمال دارند

الگوی نوار مغز اختصاصی برای اتیسم وجود دارد

25-20 درصد مبتلایان بطن های طرفی بزرگ در سی تی اسکن مغز دارند

نوار مغز غیر طبیعی در 10 تا 83 درصد بچه های اتیسم وجود دارد

۳۱- خصوصیات فیزیکی بچه های اتیسم شامل موارد زیر است، بجز:

- تأخیر در برتری طرفی در دست‌ها
- الگوهای غیر طبیعی شیارهای پوستی انگشتان
- اختلالات فیزیکی مینور
- وجود نشانه‌های فیزیکی بارز نمایانگر اختلال اتیسم

۳۲- بچه 8 ساله، کلاس اول با اختلال در تعامل‌های اجتماعی، تماس چشمی محدود، مشکلات تکلمی و رفتارهای تکراری در انگشتان ارجاع شده است. یافته‌ها در آزمون‌های روان‌شناختی او شامل موارد زیر است، بجز:

- اشکال شدید در Verbal sequencing
- ضعف در مهارت‌های Visuospatial
- توانایی در مهارت‌های Rote memory
- اختلال در Abstraction skills

۳۳- دختر 5 ساله با میکروسفالی، تأخیر کلامی، الگوی غیرطبیعی تنفسی، اتاکسی، گاز گرفتن انگشتان و تشنج ارجاع شده است. اقدامات درمانی زیر مؤثر است، بجز:

- درمان‌های رفتاری جهت اختلالات نظم تنفسی
- رفتار درمانی جهت رفتارهای خودآزارانه
- داروهای ضد تشنج جهت کنترل تشنج
- فیزیوتراپی جهت کنترل حرکات کلیشه‌ای

۳۴- فاکتورهای رشدی زیر در ایجاد اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی عنوان شده است، بجز:

- عفونت مادری حین بارداری
- ماه دسامبر به عنوان بیک تولد
- تروما در طی اوائل شیرخوارگی
- زایمان زودرس و پرمچوریتی

۳۵- کدام نوع تشنج کمتر شبیه اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی می‌باشد؟

- پتی مال
- کمپلکس پارشیال
- گراندمال
- صرع لوب تمپورال

۳۶- پسر 2.5 ساله‌ای با شکایت والدین از بی‌توجهی به آموزش‌های والدین، تحرک زیاد، پرت کردن اشیاء و عجول بودن، ارجاع شده است. کدام اقدام درمانی مناسب است؟

- مشاوره والدین و جلسات فرزندپروری
- مصرف دکستر و آفتماین 5-2.5 میلی‌گرم روزانه
- جلسات رفتار درمانی برای کودک
- مصرف کلونیدین 0.05 میلی‌گرم شب‌ها

۳۷- پسر 4 ساله‌ای با علائم شدید نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه نموده است. کدام داروی زیر مصوب FDA برای درمان این کودک می‌باشد؟

- Ritalin
- Aderall XR
- Dexedrine
- Atomoxetine

۳۸- خطر جدی مصرف مدافینیل در درمان ADHD کدام مورد زیر است؟

- Tardive dyskinesia
- Cardio Vascular Effect
- Weight gain
- Stevens-Johnson

۳۹- در مورد سیر Adult ADHD موارد زیر صحیح است، بجز:

- اضطراب، افسردگی و مصرف مواد در آن‌ها بیشتر است
- کودکان مبتلا به ADHD به بزرگسالان Inattentive type تبدیل می‌شوند
- اختلالات یادگیری این مبتلایان در مقایسه با جمعیت عمومی تفاوتی ندارد
- حداقل نیمی از کودکان و نوجوانان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی تبدیل به Adult ADHD می‌شوند

۴۰- دختر 9 ساله، سوم دبستان با تشخیص اتیسم با کارکرد بالا به علت بی‌خوابی ارجاع شده است. اقدامات شما شامل موارد زیر است، بجز:

- تعدیل و تصحیح رفتار والدین قبل و در زمان خواب
- استفاده از ماساژ درمانی قبل خواب
- استفاده از داستان‌خوانی و صحبت با کودک قبل خواب
- تجویز ملاتونین سریع اثر یک میلی‌گرم یا چهار میلی‌گرم با اثرات کنترل شده

۴۱- پسر 10 ساله‌ای به علت نداشتن تماس چشمی مناسب، اشکال در تظاهرات عاطفی و شناخت چهره‌ها و رفتارهای کلیشه‌ای ارجاع شده است. جهت بهبود تماس چشمی او کدام روش زیر مناسب‌تر است؟

- Cognitive behavioral therapy
- Behavior therapy
- Virtual Reality
- Neuro feedback

۴۲- کدام ماده قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده مصرف کوکائین در آینده در نوجوانان می‌باشد؟

- ماری جوانا
- مت آمفتامین
- اوپیوئید
- LSD

۴۳- نوجوان 16 ساله به علت مصرف دوز بالای ماده ای با علائم افزایش فشارخون و هیپرترمی به اورژانس مسمومین ارجاع شده است. در معاینه مردمک‌ها دیلاته، ضربان قلب افزایش یافته و افکار پارانوئید دارد. احتمال مسمومیت با کدام یک از مواد زیر برای وی مطرح است؟

نیکوتین

کوکائین

هروئین

LSD

۴۴- نوجوان 18 ساله به علت محرومیت از ماده‌ای پس از 48 ساعت با علائم بیقراری، دردهای عضلانی و استخوانی، بیخوابی، اسهال، استفراغ و حرکات پرشی اندام‌ها به اورژانس مسمومین ارجاع شده است. با توجه به علائم مذکور شروع کدامیک از درمان‌های زیر در کنترل علائم نامبرده کمک کننده است؟

بوپروپیون

برچسب نیکوتین

متادون

کلرودیازپوکساید

۴۵- اگر اختلال هویت در نوجوانان طولانی شود در ارتباط با خطر ابتلا به کدام یک از انواع اختلال شخصیت است؟

بردرلاین

آنتی سوشیال

هیستریونیک

پارانوئید

۴۶- کدام یک از موارد زیر درباره معیارهای تشخیصی Attenuated psychosis syndrome براساس DSM-5 صحیح است؟

وجود دو علامت هذیان و توهم برای تشخیص لازم است

وجود یک علامت هذیان یا توهم برای تشخیص لازم است

شدت علائم از دیگر اختلالات سایکوتیک بیشتر است

علائم نباید باعث اختلال عملکرد شوند

۴۷- در مطالعات کارآزمایی بالینی کنترل شده، استفاده از Yoga به عنوان درمان کمکی در همه موارد زیر موثر شناخته شده است، بجز:

Mild depression

Sleep disturbance

Attention problem

Eating problem

۴۸- کاربرد تمرینات mindfulness meditation در کدام یک از اختلالات روانی زیر موثر شناخته شده است؟

Chronic pain disorder

Psychotic disorder

Conduct disorder

Sleep disorder

۴۹- در گروه درمانی کودکان و نوجوانان، همسالان دیگر در گروه به هم کمک می‌کنند و با حمایت یکدیگر و شناخت مشکلاتشان می‌توانند باعث بهبود اعتماد به نفس کودک و نوجوان و کمک به آن‌ها در کسب احساس قدرت بر روی مسائل خودشان باشند. این فاکتور چه نام دارد؟

Imparting Information

Hope

Universality

Altruism

۵۰- Day treatment برای کدام یک از گروه‌های زیر اندیکاسیون دارد؟

کودکان با اقدام به خودکشی

کودکان با آتش افروزی

کودکان با عقب ماندگی ذهنی

کودکان آسیب رسانی به دیگران

۵۱- کدامیک از داروهای زیر برای اختلال پانیک در کودکان و نوجوانان توصیه می‌شود؟

کلونازپام

آلپرازولام

بوسپیرون

پروپرانولول

۵۲- در مصرف همزمان اتوموکستین با کدام یک از داروهای SSRI زیر به علت کاهش متابولیسم، باید دوز اتوموکستین کاهش یابد؟

پاروکستین

سرتالین

فلوکسامین

سیتالوپرام

۵۳- در درمان یک پسر 13 ساله با اختلال سلوک و علائم ADHD که رفتارهای پرخطرانه پرخطر دارد کدام دسته دارویی باعث کنترل سریعتر علائم می‌شود؟

آنتی سایکوتیک‌ها

تثبیت کننده‌های خلق

محرك‌ها

آلفا آگونیست‌ها

۵۴- همه موارد زیر با بالاترین خطر خودکشی در بین نوجوانان غیر سایکوتیک همراه است، بجز:

ناتوانی در ایجاد دلبستگی پایدار

وجود رفتارهای تکانشی

مصرف الکل یا سایر مواد

بهره هوشی پایین

۵۵- سطح سرمی درمانی مناسب برای داروی دی والپروئیکس در درمان اختلال دوقطبی نوجوانان چند میکروگرم بر میلی لیتر است؟

20-40

40-60

50-100

100-150

۵۶- پسر 7 ساله با راه رفتن در خواب و کابوس های شبانه به کلینیک ارجاع شده است. کدام یک از داروهای زیر در درمان وی کمک کننده است؟

کلونیدین

کلومی پر آمین

بوسپیرون

ریسپریدون

۵۷- بر اساس مطالعه صورت گرفته، قربانیان کدام یک از انواع Bullying، دو برابر سایر نوجوانان اقدام به خودکشی می کنند؟

Physical

Relational

Verbal

Cyberbullying

۵۸- در دختر 8 ساله که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است دچار کابوس های شبانه، بی خوابی، ترس های مرضی شده است. این علائم در کدام دسته قرار می گیرد؟

Depression

Dissociative reaction

Anxiety symptom

Somatic complaints

۵۹- همه موارد زیر جزء ریسک فاکتورهای کودک در آزار فیزیکی محسوب می شود، بجز:

Prematurity

Intellectual disability

Physical handicap

Social isolation

۶۰- پدری دختر 8 ساله اش را مرتباً مورد توهین و ناسزا قرار می دهد، سرش داد می زند و او را در نزد دیگران تحقیر و سرزنش می کند. این رفتار والدین چه نوعی از

abuse می باشد؟

Physical abuse

Ritual abuse

Psychological abuse

Sexual abuse

۶۱- در یکی از فازهای **Interfamilial sexual abuse**، کودک گیج و ترسان است چون نمی‌داند که پدر و والد اوست یا شریک جنسی‌اش، مادر صحبت‌های دخترش را باور نمی‌کند و از مقابله با همسرش خودداری می‌کند، کودک از خواهر و برادرش فاصله می‌گیرد، این فاز چه نام دارد؟

Engagement phase

Sexual interaction phase

Secrecy phase

Disclosure phase

۶۲- در مورد اپیدمیولوژی **Rumination Disorder** کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

در دختران بیشتر دیده می‌شود

تداوم اختلال، ارتباطی با میزان هوش افراد ندارد

اغلب در سنین زیر یک سال شروع می‌شود

بزرگسالان مبتلا دچار کاهش وزن می‌شوند

۶۳- کودک 3 ساله‌ای با شکایت از امتناع از غذا خوردن از دوران شیرخوارگی آورده شده، کودک فقط بعضی غذاها را و آن هم به مقدار خیلی کم می‌خورد و در نتیجه مدتی است که وزنش ثابت مانده و زیاد نشده است. رفتارهای لجبازی و ریتم نامنظم خواب نیز از قبل وجود داشته است. مادر نگران وضعیت کودک است. کدامیک از توصیه‌های زیر برای این کودک مناسب است؟

دفعات تغذیه کودک هر 6 ساعت یک بار باشد

در میان وعده‌ها میوه و شیر داده شود

در هنگام غذا دادن از محرک‌هایی مانند تلویزیون برای پرت کردن حواس کودک استفاده شود

غذا خوردن توسط خود کودک صرف نظر از میزان غذایی که خورده تشویق شود

۶۴- کدامیک از جملات زیر در مورد **پیکا نادرست** است؟

سن کودک هنگام این رفتار باید حداقل 2 سال باشد

انسداد روده از عوارض آن می‌تواند باشد

در اغلب موارد تا 7 سالگی بهبود می‌یابد

در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد

۶۵- بر اساس مطالعات آینده‌نگر، کدام یک از موارد زیر از عوامل خطر برای شکل‌گیری **PTSD** در کودکان نیست؟

وجود اختلالات اضطرابی قبلی

سابقه فامیلی با افزایش خطر اختلالات افسردگی

مشکلات رفتاری برونی‌سازی قبلی

IQ بالاتر از 115

۶۶- در مورد **Pica** کدام یک از جملات زیر غلط است؟

در نوجوانان مبتلا تعداد زیادی علائم افسردگی نشان می‌دهند.

تمایل زیاد به خوردن یخ همراه با کمبود روی گزارش شده است.

در اکثر موارد چندین سال به طول می‌انجامد.

در بعضی موارد بدرفتاری شدید والدین با کودک گزارش شده است.

۶۷- در بی‌اختیاری مدفوع (encopresis with constipation and overflow) تجویز کدام یک از موارد زیر برای درمان در کودک 10 ساله توصیه می‌شود؟

1 g/kg PEG

25 mg Imipramine

2.5 mg olanzapine

2 mg Diphenoxilate

۶۸- کودک 1/5 ساله‌ای هنگام دیدن غریبه‌ها اضطرابی ندارد و حتی دنبالشان می‌رود و بغلشان می‌کند بدون این که اضطرابی پیدا کند. کودک در 6 ماهگی مادرش را از دست داده و زمانی که پدر سرکار است، توسط همسایه‌ها نگهداری می‌شود. در کودک نشانه‌های سوء تغذیه نیز وجود دارد و شواهدی مبنی بر حرکات تکراری گزارش نشده است. کدام یک از اختلالات زیر در تشخیص این کودک مطرح می‌شود؟

Autism Spectrum Disorder

Reactive Attachment Disorder

Disinhibited Social Engagement Disorder

Infantile Depression

۶۹- برای تشخیص **Reactive Attachment Disorder**، حداقل سن کودک چند ماه باید باشد؟

9

12

18

24

۷۰- برای کودکی که با تشخیص **disinhibited social engagement disorder** مورد ارزیابی قرار گرفته، شک به **abuse** وجود دارد و محیط خانه به نظر، پر استرس می‌آید. سوء تغذیه نیز در کودک مشهود است. اولین اقدام درمانی شما چیست؟

بستری کردن

تحویل دادن کودک به یک فامیل نزدیک

تحویل دادن کودک به بهزیستی

ماندن کودک در منزل و شروع آموزش والدین

۷۱- اختلال خواندن با کدامیک از اختلالات زیر همبودی بیشتری دارد؟

اختلال ریاضی

اختلال زبانی

اختلال بیش‌فعالی/ کمبود توجه

اختلال سلوک

۷۲- کدامیک از جملات زیر در مورد اختلال خواندن نادرس است؟

معمولاً در سن 7 سالگی تشخیص داده می‌شود

اغلب در درک مطلبی که می‌خوانند مشکلی ندارند

در سال‌های اولیه مدرسه با استفاده از حافظه خود این نقص را به طور ظاهری جبران می‌کنند

اشکال در توالی حروف و کلمات دارند

۷۳- کودکی 9 ساله در دروس ریاضی و روخوانی ضعیف است. کدامیک از خصوصیات زیر به نفع وجود Intellectual Disability است؟

تاخیر در همه شاخص‌های رشد ذهنی، کلامی و حرکتی

تاخیر کلامی

نقایص جسمی

تاخیر حرکتی

۷۴- کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به اختلال نوشتن نیست؟

poor handwriting

micrography

grammatical errors

poor paragraph organization

۷۵- در یک کودک 9 ساله، کدامیک از علائم زیر به نفع تشخیص Developmental Coordination Disorder نمی‌باشد؟

اشکال در دوچرخه سواری

اشکال در لی لی کردن

قدرت عضلانی طبیعی

اشکال در دوختن با سوزن

۷۶- در افتراق stereotypic movement disorder از اختلال تیک ، کدامیک از موارد زیر کمک‌کننده است؟

حرکات کلیشه‌ای بیشتر اسپاسمودیک هستند

میزان حرکات کلیشه‌ای در زمان تنهایی و در هنگام بازی تفاوتی ندارند

تیک‌ها از نظر زمانی حرکات طولانی‌تری هستند

تیک‌ها کیفیت ریتمیک بیشتری دارند

۷۷- کودک 1 ساله‌ای روزی دو تا سه بار سرش را با حرکات ریتمیک به تختش می‌کوبد و تا جایی این کار را ادامه می‌دهد تا به خواب رود. در مورد این کودک کدامیک از تشخیص‌های زیر صحیح است؟

Temper Tantrum

Seizure

Stereotypic Movement Disorder

Sleep Disorder

۷۸- در مورد سیر و پیش‌آگهی اختلال تورت همه موارد زیر صحیح است، بجز:

در اکثر موارد در اوایل بزرگسالی بهبود پیدا می‌کنند

نوع تیک‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند

در موارد شدید اختلال افسردگی عمده نیز دارند

معمولاً در دوره نوجوانی شروع می‌شود

۷۹- به پسر 12 ساله‌ای که تیک پلک زدن دارد، می‌گویید: هر بار که احساس می‌کند تیک‌ها شروع می‌شوند، ده ثانیه پلک خود را با فشار ببندد. در اینجا از چه تکنیکی استفاده کرده‌اید؟

- awareness training
- competing response training
- exposure response prevention
- relaxation training

۸۰- برای استفاده از **alarm therapy** در اختلال **enuresis** سن کودک باید حداقل چند سال باشد؟

- ده
- دوازده
- پنج
- هفت

۸۱- کدامیک از جملات زیر در مورد تظاهرات بالینی و معیارهای تشخیصی **enuresis** صحیح است؟

- سن کودک باید حداقل 4 سال باشد
- حداقل دو بار در هفته به مدت 6 ماه متوالی بی‌اختیاری رخ می‌دهد
- خطر بالاتری برای ADHD در این کودکان وجود دارد
- همراهی با بی‌اختیاری مدفوع نادر است

۸۲- در اسکیزوفرنی کودکان ضریب هوشی با کدامیک از توهمات زیر مرتبط است؟

- شنوایی
- لمسی
- بویایی
- بینایی

۸۳- وجود اضطراب که منحصر به حضور بزرگسالان نباشد و در جمع همسالان هم دیده شود برای تشخیص کدام اختلال اضطرابی ضروری است؟

- Separation Anxiety Disorder
- Social Anxiety Disorder
- Generalized Anxiety Disorder
- Obsessive Compulsive Disorder

۸۴- در اختلال افسردگی اساسی کودکان عبارتهای زیر صحیح است، بجز:

- ممکن است با خلق تحریک پذیر بجای خلق افسرده بروز کند
- معمولا شامل anhedonia می‌گردد
- توهمات شنوایی با شیوع کمتر نسبت به بزرگسالان وجود دارد
- به دنبال وقوع سوگ قابل تشخیص نیست

۸۵- کودک در چند هفتگی می‌تواند بدون ارتباط با محرک خارجی لبخند بزند؟

4

8

12

16

۸۶- کدامیک از داروهای زیر برای درمان افسردگی کودکان (زیر 14 سال) مورد تایید FDA قرار گرفته است؟

فلوکستین

سیتالوپرام

سرتالین

پاروکستین

۸۷- کدامیک از روان‌درمانی‌های زیر براساس کاراز مایی‌های بالینی از شواهد تجربی در درمان افسردگی نوجوانان برخوردار است؟

روان‌درمانی تحلیلی

روان‌درمانی بین فردی

روان‌کاوی

طرح‌واره درمانی

۸۸- اضطراب جدایی نرمال معمولاً حوالی چند ماهگی به اوج می‌رسد؟

9-6

18-9

6-3

8-4

۸۹- علائم جسمی زیر در اختلال اضطرابی منتشر کودکان شایع است، بجز:

گوارشی

سردرد

بی‌اختیاری ادرار

تپش قلب

۹۰- در موتیسم انتخابی کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

سن شروع بین ۲ تا ۳ سالگی است

بندرت خارج از محیط خانه اتفاق می‌افتد

نحوه شروع میتواند ناگهانی یا تدریجی باشد

با قشقرق به راه انداختن مرتبط نیست

۹۱- کدامیک از عبارات زیر درباره وسواس کودکان نادرسنت است؟

- در میان بستگان درجه یک شیوع بیشتری دارد
- علایم تحت بالینی در بستگان درجه یک وجود دارد
- با کروموزم ۲۱ ارتباط وجود دارد
- همراهی با اختلال تورنت شیوع بالایی دارد

۹۲- همگی علایم منفی سایکوز محسوب می‌شوند، بجز:

- apathy
- Disorganized thinking
- avolition
- Poverty of thought

۹۳- در اختلال دو قطبی که پیش از بلوغ آغاز شود کدامیک از اختلالات همراه زیر شایع‌تر مشاهده می‌شود؟

- ADHD
- GAD
- ODD
- OCD

۹۴- در اختلال دوقطبی با شروع زودرس کدامیک از مداخلات زیر بکار می‌رود؟

- Family focused treatment
- Schema therapy
- Dynamic psychotherapy
- Behavior therapy

۹۵- در اختلال دو قطبی همراهی با کدامیک از اختلالات زیر احتمال خودکشی را افزایش می‌دهد؟

- ADHD
- Anxiety disorders
- ASD
- Eating disorders

۹۶- شیوع کدامیک از اختلالات زیر در نوجوانان بیشتر است؟

- اوتیسم
- اسکیزوفرنی
- دوقطبی
- وسواس

۹۷- کدامیک از اختلالات زیر همراه با اختلال کروموزومی یا جهش ژنی در مسیر تکامل سیستم عصبی است؟

Early-onset schizophrenia

Obsessive compulsive disorder

Early-onset bipolar disorder

Tourett's disorder

۹۸- براساس کارآزمایی‌های بالینی، اثربخشی کلومی پرامین در سواس کودکان پس از چند هفته مشاهده شده است؟

4-6

6-8

8-10

10-12

۹۹- شایعترین اختلال اضطرابی در کودکان کدام است؟

GAD

SAD

OCD

PTSD

۱۰۰- CALM Program در درمان اضطرابی کدام سنین بکار می‌رود؟

7-2 سالگی

15-13 سالگی

18-15 سالگی

12-7 سالگی

اخلاق پزشکی - گروه 2

۱۰۱- جوانی جهت معاینه و صدور گواهی سلامت، توسط یک شرکت هواپیمایی برای شغل خلبانی معرفی شده است. پزشک حین معاینه متوجه کور رنگی وی می‌گردد. درخواست متقاضی رازپوشی و عدم افشای بیماری می‌باشد. بهترین تصمیم در این مواجهه چیست؟

صرفاً بیمار بودن وی را بدون ذکر عنوان بیماری اعلام می‌کنیم.

بیماری کوری رنگ به سازمان مربوطه اعلام می‌شود.

با توجه به اصل اتونومی و راز پوشی، بیماری را اعلام نمی‌کنیم.

بیمار را به پزشک دیگری ارجاع داده و پاسخی اعلام نمی‌شود.

۱۰۲- آقای 25 ساله در حالت شوک به اورژانس آورده می‌شود. علت شوک، تصادف و ضربه به شکم بوده و سونوگرافی FAST خون فراوان در شکم را نشان می‌دهد. بیمار هشیاری درستی نداشته و همراه ندارد. در خصوص اخذ رضایت جراحی، صحیح‌ترین گزینه کدام است؟

باتوجه به شرایط بیمار نیازی به اخذ رضایت نیست.

بیمار را احیاء نموده و منتظر رسیدن همراهان وی می‌شویم.

به قاضی کشیک اطلاع می‌دهیم و با اجازه وی بیمار را عمل می‌کنیم.

برای تشخیص علت خونریزی درخواست سی‌تی‌اسکن داده و بسته به جواب آن تصمیم می‌گیریم.

کلید اولیه پذیرش فوق تخصص_گروه روانپزشکی

ب	۱۰۱	الف	۵۱	د	۱
الف	۱۰۲	الف	۵۲	ب	۲
		ج	۵۳	ج	۳
		د	۵۴	ج	۴
		ج	۵۵	الف	۵
		ب.ب	۵۶	ج	۶
		د	۵۷	الف	۷
		ج	۵۸	ب.ب	۸
		د	۵۹	د	۹
		ج	۶۰	ب.ب	۱۰
		ب.ب	۶۱	ج	۱۱
		ج	۶۲	ب.ب	۱۲
		د	۶۳	د	۱۳
		ج	۶۴	الف	۱۴
		د	۶۵	ج	۱۵
		ج	۶۶	ج	۱۶
		الف	۶۷	د	۱۷
		ج	۶۸	الف	۱۸
		الف	۶۹	ب	۱۹
		الف	۷۰	ج	۲۰
		الف	۷۱	د	۲۱
		ب	۷۲	الف	۲۲
		الف	۷۳	د	۲۳
		ب.ب	۷۴	د	۲۴
		د	۷۵	ج	۲۵
		ب.ب	۷۶	الف	۲۶
		ج	۷۷	ج	۲۷
		د	۷۸	ب.ب	۲۸
		ب.ب	۷۹	د	۲۹
		د	۸۰	ب.ب	۳۰
		ج	۸۱	د	۳۱
		د	۸۲	ب.ب	۳۲
		ب.ب	۸۳	د	۳۳
		د	۸۴	ب.ب	۳۴
		الف	۸۵	ج	۳۵
		الف	۸۶	الف	۳۶
		ب.ب	۸۷	ج	۳۷
		ب.ب	۸۸	د	۳۸
		ج	۸۹	ج	۳۹
		ج	۹۰	ج	۴۰
		ج	۹۱	ج	۴۱
		ب.ب	۹۲	الف	۴۲
		الف	۹۳	ب.ب	۴۳
		الف	۹۴	ج	۴۴
		ب.ب	۹۵	الف	۴۵
		د	۹۶	ب.ب	۴۶
		الف	۹۷	د	۴۷
		ج	۹۸	الف	۴۸
		الف	۹۹	د	۴۹
		الف	۱۰۰	ج	۵۰