

۱۳۵- گزینهی «۱»

(شمارش)

تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه‌ی n عضوی برابر 2^n است. اگر تعداد اعضای مجموعه‌ی A را به صورت $n(A)$ و تعداد اعضای مجموعه‌ی B را به صورت $n(B)$ در نظر بگیریم، داریم:

$$2^{n(B)} = 2^2 \times 2^{n(A)} = 2^{2+n(A)} \Rightarrow n(B) = n(A) + 2$$

$$\frac{2^{n(A)+2}}{2^{n(B)}} = \frac{4 \times 2^{n(A)}}{4 \times 2^{n(A)}} = 2$$

۱۳۶- گزینهی «۲»

(شمارش)

اعداد طبیعی بین ۱۰۰ و ۲۰۰ همگی در صدگان ۱ مشترک هستند و رقم‌های یکان و دهگان آن‌ها می‌تواند بین ۰ تا ۹ متغیر باشد. مطابق صورت سؤال مجموع ارقام اعداد مطلوب برابر ۱۵ است و چون صدگان برابر ۱ است، پس مجموع یکان و دهگان باید برابر ۱۴ باشد. اگر یکان را b و دهگان را a در نظر بگیریم، داریم:

$$\begin{cases} a = 9 \Rightarrow b = 6 \text{ یا } 7 \text{ یا } 8 \text{ یا } 9 \\ a = 8 \Rightarrow b = 7 \text{ یا } 8 \text{ یا } 9 \\ a = 7 \Rightarrow b = 8 \text{ یا } 9 \\ a = 6 \Rightarrow b = 9 \end{cases}$$

در نتیجه اعداد مطلوب به صورت ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۱۶۹ هستند که تعداد آن‌ها برابر ۱۰ می‌باشد.

۱۳۷- گزینهی «۱»

(مماسبات عددی)

قیمت فروش کالا را P_f ، قیمت تمام شده را P_t و قیمت نهایی فروش رفته را P_n در نظر می‌گیریم. آن‌گاه داریم:

$$P_f = \frac{120}{100} P_t$$

$$P_n = \frac{95}{100} \times P_f = \frac{95}{100} \times \frac{120}{100} P_t = \frac{114}{100} P_t$$

ملاحظه می‌شود که سود فروش این کالا برابر با ۱۴ درصد قیمت تمام شده‌ی کالا است.

۱۳۱- گزینهی «۴»

(مماسبات عددی)

$$\frac{13}{333} = 0.039039039\dots$$

ملاحظه می‌شود که رقم نهم بعد از ممیز ۹ می‌باشد.

۱۳۲- گزینهی «۳»

(مماسبات عددی)

$$\frac{11-6\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}} = \frac{(3-\sqrt{2})^2}{(1-\sqrt{2})^2}$$

بنابراین جذر عدد فوق به صورت قدرمطلق عدد $\frac{3-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ می‌باشد.

از آن‌جا که مخرج این کسر منفی و صورت آن مثبت می‌باشد، باید این عدد را در -1 ضرب کرد. سپس داریم:

$$\frac{3-\sqrt{2}}{-1+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}-2}{-1-2\sqrt{2}+\sqrt{2}+4} = \frac{3\sqrt{2}-2}{+3-\sqrt{2}}$$

حال باید مخرج کسر فوق را گویا کنیم.

$$\frac{3\sqrt{2}-2}{3-\sqrt{2}} \times \frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}} = \frac{9+9\sqrt{2}-2\sqrt{2}-6}{9-2} = \frac{7\sqrt{2}}{7} = \sqrt{2}$$

۱۳۳- گزینهی «۲»

(مماسبات عددی)

$$4 \times 2^{10} - 9 \times 3^4 = 4 \times 1024 - 9 \times 81 = 4096 - 729 = 3367$$

$$3367 \div 7 = 481$$

$$3367 \div 13 = 259$$

$$3367 \div 37 = 91$$

ملاحظه می‌شود عدد ۳۳۶۷ بر ۷، ۱۳ و ۳۷ بخش‌پذیر است ولی بر ۱۱ بخش‌پذیر نیست.

۱۳۴- گزینهی «۱»

(مماسبات عددی)

در هر تقسیم، مقسوم برابر است با مجموع باقی‌مانده با حاصلضرب خارج‌قسمت در مقسوم‌علیه. طبق صورت سؤال در این تقسیم، مقسوم برابر a و مقسوم‌علیه برابر ۱۵ است. حال اگر باقی‌مانده را r و خارج‌قسمت را q در نظر بگیریم داریم:

$$\begin{cases} a = 15q + r \\ q + r = 5 \end{cases} \Rightarrow a = 15q + 5 - q \Rightarrow a = 14q + 5$$

$$\Rightarrow a - 5 = 14q$$

در نتیجه عدد $a - 5$ بر ۱۴ بخش‌پذیر می‌باشد.

ملاحظه می‌شود که آب استخر طی مدت $۵۵/۵۵...$ شبانه‌روز تخلیه می‌شود. در نتیجه در میانه‌ی روز ۵۶ ام آب استخر نصف می‌شود.

۱۴۱- گزینه‌ی «۳»

(قضیه تالس)

مطابق قضیه‌ی تالس داریم:


$$\frac{5}{x} = \frac{2x+3}{4} \Rightarrow 20 = 2x^2 + 3x \Rightarrow 2x^2 + 3x - 20 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 3^2 - 4(2)(-20) = 9 + 160 = 169 \Rightarrow x = \frac{-3 \pm 13}{4}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2/5 \\ x_2 = -4 \end{cases}$$

۱۴۲- گزینه‌ی «۴»

(هنر سه مسطحه)



در مثلث ABC زاویه‌ی B همان زاویه‌ی شش‌ضلعی منتظم است. در نتیجه معادل 120° درجه می‌باشد. از آنجا که ضلع AB و BC هر دو معادل 12 واحد می‌باشد، با رسم ارتفاع وارد بر قاعده در این مثلث متساوی‌الساقین، دو مثلث قائم‌الزاویه با زاویه‌های 30° ، 60° و 90° تشکیل خواهد شد. می‌دانیم در چنین مثلث قائم‌الزاویه‌ای ضلع روبه‌روی زاویه‌ی 30° نصف وتر و ضلع روبه‌روی زاویه‌ی 60° ، $\frac{\sqrt{3}}{2}$ وتر است. بنابراین داریم:



ملاحظه می‌شود که طول پاره‌خط AC برابر $12\sqrt{3}$ است. به طریق مشابه طول پاره‌خط CE و AE نیز برابر همین مقدار می‌باشد. در نتیجه در مثلث متساوی‌الاضلاع ACE داریم:

۱۳۸- گزینه‌ی «۱»

(معارلات بیبری)

حجم مکعب را V_1 ، حجم کره را V_2 و حجم استوانه را V_3 در نظر می‌گیریم. آن‌گاه داریم:

$$\begin{cases} 2V_1 + 2V_2 = 2V_3 \Rightarrow V_1 = V_3 - \frac{1}{2}V_2 & * \\ 2V_1 + 7V_2 = 5V_3 & ** \end{cases}$$

با جاگذاری * در ** داریم:

$$2V_3 - \frac{1}{2}V_2 + 7V_2 = 5V_3 \Rightarrow \frac{5}{2}V_2 = 2V_3$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_3} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{5} = 1/25$$

۱۳۹- گزینه‌ی «۲»

(معارلات بیبری)

عرض مستطیل را a و طول آن را b در نظر می‌گیریم. طبق صورت سؤال $b = 3a$ می‌باشد. پس از افزودن 6 واحد به ابعاد مستطیل، عرض مستطیل معادل $a+6$ و طول مستطیل معادل $3a+6$ خواهد بود. آن‌گاه در محاسبه‌ی مساحت مستطیل داریم:

$$S_{\text{مستطیل جدید}} = S_{\text{مستطیل قدیم}} + 252$$

$$\Rightarrow (b+6)(a+6) = ba + 252$$

$$\Rightarrow (3a+6)(a+6) = 3a^2 + 252$$

$$\Rightarrow 3a^2 + 18a + 6a + 36 = 3a^2 + 252 \Rightarrow 24a = 216$$

$$\Rightarrow a = 9, b = 27$$

$$\Rightarrow S_{\text{اولیه}} = 9 \times 27 = 243$$

۱۴۰- گزینه‌ی «۳»

(مسابقات عدری)


$$V = 4 \times 10 \times 12 \text{ m}^3 = 48 \times 10^6 \text{ cm}^3$$

مدت زمانی که طول می‌کشد تا نصف آب استخر تخلیه شود معادل است با:

$$t = \frac{24 \times 10^6}{50} = 4/8 \times 10^6 \text{ s}$$

عدد به‌دست آمده بر حسب ثانیه است و برای این که بر حسب شبانه‌روز محاسبه شود، باید آن را بر عدد 24×3600 تقسیم کرد.

$$t = \frac{4/8 \times 10^6 \text{ s}}{24 \times 3600} = \frac{1000}{18} = 55/55...$$



مساحت ناحیه‌ی هاشور خورده به صورت دو برابر تفاضل مساحت ناحیه‌ی محدود بین دو دایره از مساحت هر یک از دایره‌ها محاسبه می‌شود.

$$S_{\text{هر دایره}} = \pi$$

$$\Rightarrow S_{\text{هاشورخورده}} = 2 \times \left(\pi - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \times \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$$

۱۴۴- گزینه‌ی «۳»

(هنر سه فضایی)

مطابق شکل، ۱۲ پاره‌خط همان یال‌های مکعب هستند و قطر هر کدام از ۶ وجه مکعب نیز رسم شده است. در نتیجه در مجموع ۱۸ پاره‌خط در شکل مشاهده می‌شود.

۱۴۵- گزینه‌ی «۲»

(هنر سه مسطحه)

مساحت ناحیه‌ی هاشورخورده به صورت تفاضل مساحت نیم‌دایره‌ی بزرگ از مجموع مساحت‌های دو نیم‌دایره‌ی دیگر و مثلث قائم‌الزاویه محاسبه می‌شود.

$$\text{وتر مثلث قائم‌الزاویه} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow \text{شعاع نیم‌دایره‌ی بزرگ} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$


$$S_{\text{مثلث قائم‌الزاویه}} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$$

$$S_{\text{نیم‌دایره‌ی بزرگ}} = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{\sqrt{13}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \pi \frac{13}{4} = \frac{13}{8} \pi$$

$$S_{\text{نیم‌دایره‌ی کوچک}} = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{2}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \pi \times 1 = \frac{1}{2} \pi$$

$$S_{\text{نیم‌دایره‌ی متوسط}} = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \pi \times \frac{9}{4} = \frac{9}{8} \pi$$

$$S_{\text{هاشورخورده}} = \frac{1}{2} \pi + \frac{9}{8} \pi + 3 - \frac{13}{8} \pi = 3$$



$$S_{\text{شش‌ضلعی منتظم کوچک}} = \frac{6}{9} S_{ACE} = \frac{6}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{4} (12\sqrt{3})^2 = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 144 \times 3 = 72\sqrt{3}$$


$$S_{\text{شش‌ضلعی منتظم بزرگ}} = \frac{6\sqrt{3}}{4} (12)^2 = \frac{6\sqrt{3}}{4} \times 144 = 216\sqrt{3}$$

$$S_{\text{ناحیه‌ی محدود بین دو شش‌ضلعی}} = 216\sqrt{3} - 72\sqrt{3} = 144\sqrt{3}$$


۱۴۳- گزینه‌ی «۳»

(هنر سه مسطحه)

ابتدا مساحت ناحیه‌ی مشترک بین دو دایره را محاسبه می‌کنیم.



در صورتی که وتر مشترک دو دایره رسم شود دو هلال مساوی ایجاد می‌گردد که در شکل فوق یکی از هلال‌ها رنگی شده است. مساحت هلال به صورت تفاضل مساحت یک مثلث از مساحت یک قطاع دایره محاسبه می‌شود.



مطابق شکل طول پاره‌خط‌های OA، OB و OO' برابر شعاع دایره و معادل یک واحد می‌باشد. در نتیجه مثلث AOO' یک مثلث متساوی‌الاضلاع می‌باشد که هر زاویه‌ی آن برابر ۶۰° است. بنابراین زاویه‌ی O برابر ۱۲۰° است و قطاع OAO'B یک سوم سطح دایره می‌باشد.


مساحت هلال ABO'A به صورت تفاضل مثلث OAB از قطاع OAO'B محاسبه می‌شود.

$$S_{\text{هلال}} = \frac{1}{3} \pi (1)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} (1)^2 = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{\text{ناحیه‌ی محدود بین دو دایره}} = 2 \times S_{\text{هلال}} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

۱۴۹- گزینهی «۱»


(هندسه مسطحه)



طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع را a و طول ضلع لوزی را b در نظر می‌گیریم. از آن‌جا که محیط مثلث با محیط لوزی برابر است داریم:

$$3a = 4b \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{3}{4}$$

مساحت لوزی را به صورت ۴ برابر مساحت مثلث قائم‌الزاویه‌ی زیر محاسبه می‌کنیم.



در مثلث قائم‌الزاویه با زاویه‌ی 15° ، ارتفاع وارد بر وتر معادل $\frac{1}{4}$ وتر می‌باشد. در نتیجه مساحت لوزی برابر است با:


$$S_{\text{لوزی}} = 4 \times \frac{1}{2} b \times \frac{b}{4} = \frac{b^2}{2}$$

$$\frac{S_{\text{لوزی}}}{S_{\text{مثلث}}} = \frac{\frac{b^2}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{4} a^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{9}{16} =$$

$$\frac{9}{8\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{8 \times 3} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

۱۵۰- گزینهی «۴»

(امیام هندسی و تشابه)




از آن‌جا که صفحه به صورت موازی هرم را قطع کرده است، در نتیجه هرم کوچک و هرم بزرگ متشابه می‌باشند به طوری که نسبت تشابه آن‌ها برابر

$\frac{1}{4}$ است. بنابراین نسبت حجم هرم کوچک به هرم بزرگ برابر $\frac{1}{8}$

و نسبت حجم قطعه‌ی بزرگ‌تر به هرم بزرگ برابر $\frac{7}{8}$ است.

۱۴۶- گزینهی «۲»

(امیام هندسی)



ارتفاع هرم را رسم می‌کنیم. مطابق شکل یک مثلث قائم‌الزاویه تشکیل می‌شود که وتر آن همان ارتفاع وجه جانبی هرم است. طبق قضیه‌ی فیثاغورس داریم:


$$h^2 = (4\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{3})^2 = 16 \times 3 - 4 \times 3 = 36$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{36} = 6$$

$$V_{\text{هرم}} = \frac{1}{3} S \times h = \frac{1}{3} (4\sqrt{3})^2 \times 6 = 96$$

۱۴۷- گزینهی «۳»


(هندسه مسطحه)



$$S_{\text{MENF}} = S_{\text{MNF}} + S_{\text{MNE}} = \frac{1}{2} \times 8 \times 1 + \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 12$$

۱۴۸- گزینهی «۲»

(هندسه مسطحه)



$$\frac{S_{\text{AHC}}}{S_{\text{ABHD}}} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times 2}{AD \times 3} = \frac{1}{3}$$

۱۵۱- گزینهی «۲»

(هندسه‌ی مسطحه)

در شکل ۶ شش ضلعی منتظم کوچک مشاهده می‌شود. در نتیجه داریم:

$$\frac{\text{مثلث کوچک } 6 \times 6 \times S}{\text{مثلث کوچک } 22 \times S} = \frac{\text{شش ضلعی های منتظم داخل شکل } 6 \times S}{\text{کل شکل } S}$$

$$= \frac{36}{22} = \frac{18}{11}$$

۱۵۲- گزینهی «۱»

(هوش و فلاقیت)

۸ مکعب کوچکی که در ۸ گوشه‌ی مکعب واقع شده‌اند همان مکعب‌هایی می‌باشند که سه وجه آن‌ها رنگ‌آمیزی می‌شود. از طرفی در هر وجه مکعب نیز یک مکعب مرکزی وجود دارد که فقط یک وجه آن‌ها رنگ‌آمیزی می‌شود. به این ترتیب تعداد مکعب‌هایی که فقط یک وجه آن‌ها رنگ‌آمیزی می‌شود به تعداد وجوه مکعب است که ۶ می‌باشد. بنابراین نسبت مطلوب به صورت $\frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ محاسبه می‌شود.

۱۵۳- گزینهی «۴»

(هوش و فلاقیت)

در شکل هشت مربع 1×1 ، سه مربع 2×2 ، دو مربع 3×3 ، چهار مربعی که در چهار گوشه مربع بزرگ قرار گرفته‌اند و همچنین یک مربع بزرگ دیده می‌شود. بنابراین تعداد مربع‌ها برابر است با:

$$8 + 3 + 2 + 4 + 1 = 18$$

۱۵۴- گزینهی «۴»

(تقارن)

در مرکز شکل یک هشت ضلعی منتظم مشاهده می‌شود که هشت محور تقارن و یک مرکز تقارن دارد. از آن‌جا که سایر اجزای شکل به‌صورت متقارن و متوازن حول مرکز تقارن هشت ضلعی منتظم قرار گرفته‌اند پس شکل نهایی نیز دارای هشت محور تقارن و یک مرکز تقارن است.

۱۵۵- گزینهی «۳»

(هوش و فلاقیت)

شکل از ۵ مثلث مجزا، یک ۱۰ ضلعی منتظم، یک ستاره‌ی ۵ پر و یک دایره تشکیل شده است.

۱۵۶- گزینهی «۱»

(فیزیک - وادرها)

واحد نجومی همان فاصله‌ی سیاره‌ی زمین تا خورشید است.

۱۵۷- گزینهی «۴»

(فیزیک - عرس‌ها)

هر عدسی دو کانون دارد که فاصله‌ی آن‌ها تا وسط عدسی را فاصله‌ی کانونی می‌نامند.

۱۵۸- گزینهی «۲»

(فیزیک - حرکت)

$$v_1 = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 36 \times \frac{10}{36} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2 = 108 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 108 \times \frac{10}{36} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30 - 10}{5} = 4$$

۱۵۹- گزینهی «۳»

(فیزیک - نیرو)

از آن‌جا که $BC = 7AB$ است. بنابراین قطعه‌ی AB ، $\frac{1}{8}$ جرم میله و قطعه‌ی BC ، $\frac{7}{8}$ جرم میله را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این که اهرم در وضعیت تعادل قرار دارد، می‌توان نوشت:

بازوی مقاوم \times نیروی مقاوم = بازوی محرک \times نیروی محرک

$$\Rightarrow (m + \frac{2}{8}) \times AB = \frac{14}{8} \times BC \Rightarrow (m + \frac{2}{8}) \times 1 = \frac{14}{8} \times 7$$

$$\Rightarrow m + \frac{2}{8} = \frac{98}{8} \Rightarrow m = \frac{96}{8} = 12 \text{ kg}$$

۱۶۰- گزینهی «۴»

(فیزیک - قوانین نیوتون)

از آن‌جا که در هر دو حالت نیروی خالص وارد بر جسم ثابت است در نتیجه مطابق قانون دوم نیوتون داریم:

$$m_1 a_1 = m_2 a_2 \Rightarrow 4m_1 = 5(m_1 - 0/2)$$

$$\Rightarrow 4m_1 = 5m_1 - 1 \Rightarrow m_1 = 1$$

$$\Rightarrow F = m_1 a_1 = 1 \times 4 = 4 \text{ N}$$