

- ۱ - در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه کدامیک از مشکلات زیر در معاینه نورولوژیک مشاهده نمی‌شود؟
- الف) Overt signs of auditory disorders
ب) Difficulty in right-left discrimination
ج) Rapid alterative movements problems
د) Reflex asymmetries
- ۲ - همه عوامل زیر پیش‌بینی کننده تداوم اختلال بیش فعالی در آینده ذکر شده است، بجز:
- الف) سابقه فامیلی مثبت
ب) اتفاقات ناگوار زندگی
ج) همبودی با اختلالات اضطرابی
د) بهره هوشی بالا
- ۳ - مشکلات طبی که ممکن است با علائم ADHD هم‌پوشانی داشته باشند کدام است؟
- الف) هیپرگلیسمی
ب) مشکلات قلبی
ج) ناهنجاری‌های تیروئیدی
د) صرع گرندمال
- ۴ - نوجوان ۱۴ ساله‌ای از کودکی به دلیل پر تحرکی، پر خاشگری، مشکلات تحصیلی و حواس‌پرتی مراجعه به روانپزشک داشته و علائم هنوز ادامه دارند. در این نوجوان با وجود همبودی کدامیک از موارد زیر احتمال سوء مصرف مواد بیشتر می‌شود؟
- الف) اختلال سلوک
ب) اختلالات اضطرابی
ج) اختلال افسردگی
د) مشکلات جسمی
- ۵ - پسر ۱۰ ساله‌ای مبتلا به ADHD تحت درمان با متیل فنیدیت طولانی اثر می‌باشد و علائم تحت کنترل است ولی شب‌ها دیر خوابش می‌برد. برای کنترل بی‌خوابی همه داروهای زیر مناسب هستند، بجز:
- الف) ترازودون ۲۵ میلی‌گرم
ب) دیفن هیدرامین ۲۵ میلی‌گرم
ج) کلونیدین ۰/۰۵ میلی‌گرم
د) میرتازاپین ۷/۵ میلی‌گرم
- ۶ - قبل از شروع داروهای استیمولانت در کودکان مبتلا به ADHD کدامیک از ارزیابی‌های زیر ضروری است؟
- الف) عملکرد کبدی ب) عملکرد تیروئید ج) فشار خون د) هورمون رشد
- ۷ - کدامیک از جملات زیر در مورد اختلال خواندن صحیح است؟
- الف) اغلب با اختلال بیش فعالی همبودی وجود دارد.
ب) معمولاً در کلاس سوم شناسایی می‌شوند.
ج) کودکان با بهره هوشی بالاتر زودتر تشخیص داده می‌شوند.
د) ۴۰ درصد از کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مشکلات خواندن دارند.

۸ - برای تشخیص اختلال خواندن ارزیابی کدامیک از موارد زیر کمک کننده نمی باشد؟

الف) functional MRI

ب) systematic observation of behavioral variables

ج) the adequacy of pencil use

د) design copying

۹ - مهارت‌های اصلی که در اختلال ریاضی ضعیف می‌باشند شامل موارد زیر است، بجز:

الف) Linguistic skills

ب) Perceptual skills

ج) Attention skills

د) Motor skills

۱۰ - کدامیک از جملات زیر در مورد اختلال ریاضی صحیح است؟

الف) در پسران شایع‌تر از دختران است.

ب) از هر دو کودک مبتلا به اختلال یادگیری یک نفر اختلال ریاضی دارد.

ج) مبتلایان در معرض خطر بالاتری برای اختلال هماهنگی تکاملی (DCD) هستند.

د) شیوع در کودکان سنین مدرسه ۱۰ درصد است.

۱۱ - کودک ۷ ساله‌ای با شکایت از اینکه دیکته‌اش ضعیف است به شما ارجاع شده، دیکته‌ها در خانه و مدرسه علی‌رغم آموزش مناسب معلم اشتباهات زیادی دارند: گاهی کلمات را به می‌چسباند، نقطه‌های آخر جملات را نمی‌گذارد و یا معکوس می‌نویسد. در ارزیابی بهره هوشی ۱۰۰ گزارش شده است. در این کودک همه جملات زیر صحیح است، بجز:

الف) نیاز به روزی ۲ ساعت مداخلات آموزشی اصلاحی دارد.

ب) انگیزه کودک در اثربخشی درازمدت درمان نقش دارد.

ج) به مشکلات رفتاری کودک نیز باید توجه کرد.

د) کلاس‌های آموزشی گروهی نسبت به انفرادی موثرتر است.

۱۲ - پسری ۹ ساله کارهای شخصی خود را نمی‌تواند بخوبی انجام دهد مانند بستن دگمه‌ها، بستن بند کفش و مهارت پایین در دویدن و پریدن و... همچنین دستخط خوبی نیز ندارد. یافته نورولوژیک بارزی در ارزیابی‌ها به دست نیامده است. در مورد خصوصیات این کودک همه موارد زیر صحیح است، بجز:

الف) در تست هوش نمره عملکرد (performance) پایین‌تر از نرمال است.

ب) رشد تکاملی حرکتی ۳ سال اول زندگی طبیعی است.

ج) همبودی با اختلال بیش فعالی نقص توجه قویا وجود دارد.

د) اختلالات زبانی در این کودکان بیشتر است.

۱۳ - کدامیک از موارد زیر از علائم اختلال هماهنگی حرکتی در یک کودک ۵ ساله می‌باشد؟

الف) ناتوانی در دوچرخه سواری

ب) ناتوانی در غذا خوردن با قاشق و چنگال

ج) ناتوانی در استفاده از قیچی

د) ناتوانی در سشوار کردن

۱۴ - در سیر اختلالات حرکتی کلیشه‌ای همه جملات زیر صحیح است، بجز:

- الف) علائم در طول زمان شدت و ضعف پیدا می‌کند.
 ب) در ۸۰-۶۰ درصد از کودکان ۳-۱ سال این حرکات تا ۴ سالگی از بین می‌روند.
 ج) مواردی که با آسیب به خود همراه است پیش آگهی بدتری دارد.
 د) ناخن جویدن اغلب به مرور شدید می‌شود.

۱۵ - همه داروهای زیر در درمان اختلالات حرکتی کلیشه‌ای استفاده می‌شوند، بجز:

- الف) فلوکستین ب) هالوپریدول ج) ریسپریدون د) کلونیدین

۱۶ - شایع‌ترین علامت اولیه در اختلال تورت کدام است؟

- الف) Coprolalia
 ب) Eye-blinking
 ج) Facial grimacing
 د) Arm jerking

۱۷ - نوجوان ۱۴ ساله‌ای با شکایت از تیک‌های صوتی، حرکتی که از ۸ سالگی شروع شده مراجعه نموده است. بر اساس

گایدلاین‌های بالینی اروپا خط اول درمان کدام است؟

- الف) Habit reversal
 ب) Haloperidole
 ج) TMS
 د) Risperidone

۱۸ - وزن بیمار در کدامیک از اختلالات زیر نرمال است؟

- الف) Anorexia Nervosa
 ب) Bulimia Nervosa
 ج) Binge Eating Disorder
 د) Avoidant Restrictive Food Intake Disorder

۱۹ - کودکانی که قادر به کنترل مدفوع خود هستند ولی در مکان‌های خاصی دفع مدفوع (با قوام طبیعی) دارند احتمالاً

دچار چه مشکلی هستند؟

- الف) Hirschsprung syndrome
 ب) preexisting neurodevelopmental problems
 ج) severe stress
 د) severe constipation

۲۰ - رفتارهای جبرانی مثل استفراغ، مشخصه اصلی کدامیک از اختلالات خوردن می‌باشد؟

- الف) binge eating disorder
 ب) anorexia nervosa
 ج) bulimia nervosa
 د) night eating syndrome

۲۱ - تمام رفتارهای زیر می تواند مرتبط با **pica** باشد، بجز:

- الف) انگشت مکیدن
 ب) ناخن جویدن
 ج) تأخیر گفتار و رشد روانی اجتماعی
 د) علائم انورکسیا نوروزا

۲۲ - در **Rumination disorder** کدامیک صحیح است؟

- الف) در دختران شایع تر است.
 ب) به مشکلات گوارشی مرتبط نمی باشد.
 ج) در کودکان مبتلا به ناتوانی ذهنی قابل تشخیص نیست.
 د) در صورتی که عملکرد قبلی کودک نرمال باشد نمی توان تشخیص داد.

۲۳ - کدامیک از اختلالات زیر همراه با **enuresis** بیشتر دیده می شود؟

- الف) ADHD ب) GAD ج) MDD د) OCD

۲۴ - کدامیک از داروهای زیر در درمان **enuresis** موثرتر است؟

- الف) venlafaxine
 ب) duloxetine
 ج) paroxetine
 د) reboxetine

۲۵ - مهمترین ریسک فاکتور خانوادگی خودکشی کدام است؟

- الف) neglect
 ب) physical abuse
 ج) sexual abuse
 د) parental alcoholism

۲۶ - کدامیک از علائم زیر در افسردگی کودکان شایع تر است؟

- الف) کندی روانی حرکتی
 ب) ناامیدی
 ج) هذیان
 د) علائم جسمی

۲۷ - زمان لازم برای تاثیر رواندرمانی در موارد متوسط افسردگی کودکان و نوجوانان حداقل چند ماه است؟

- الف) ۳ ب) ۶ ج) ۹ د) ۱۲

۲۸ - کدامیک از داروهای زیر برای درمان افسردگی نوجوانان مورد تایید FDA است؟

- الف) paroxetine
 ب) citalopram
 ج) escitalopram
 د) sertraline

۲۹ - سن شروع کدامیک از اختلالات زیر در دوران کودکی و معمولاً زیر ۲ سالگی است؟

الف) anorexia nervosa

ب) bulimia nervosa

ج) binge eating disorder

د) avoidant/ restrictive food intake disorder

۳۰ - کدامیک از رفلکس‌های زیر در دوران جنینی شکل می‌گیرد؟

الف) Rooting

ب) Plantar

ج) Knee

د) Moro

۳۱ - کدامیک از توضیحات زیر در مورد **pruning** صادق است؟

الف) مرگ برنامه‌ریزی شده نرون‌ها در طول رشد

ب) آسیب به ماده سفید مغز در دوران جنینی

ج) حذف برنامه‌ریزی شده دندریت و آکسون در طول رشد

د) تحریک بیش از حد رسپتورها با آمینو اسیدهای تحریکی

۳۲ - نوزادی که با وزن کم متولد شده و گریه زیاد همراه ترمور و استفراغ دارد، مشکوک به چه اختلالی است؟

الف) علائم ترک ماری جوانا

ب) سندرم ترک الکل

ج) علائم ترک نیکوتین

د) سندرم ترک کوکائین

۳۳ - کودک در چه بازه سنی می‌تواند به این سوال پاسخ دهد؟ "وقتی سردت میشه چکار می‌کنی؟"

الف) ۱۲-۲۴ ماهگی

ب) ۲۴-۳۶ ماهگی

ج) ۳۶-۵۴ ماهگی

د) ۵۵ ماهگی به بعد

۳۴ - بر اساس مراحل مارگارت ماehler در **separation individuation** کودکی که از مادر دقایقی دور می‌شود و مجدد

برای اطمینان بخشی به طرف مادر باز می‌گردد، در کدام مرحله قرار دارد؟

الف) Differentiation

ب) Practicing

ج) Object constancy

د) Rapprochement

۳۵ - در کدامیک از مراحل رشد، کودک می‌تواند نشانه‌های دوست داشتن مثل بوسیدن و بغل کردن والدین را نشان دهد؟

الف) Infancy

ب) Toddler

ج) Preschool

د) Middle years

۳۶ - کودکان در چند سالگی در بازی‌های گروهی و تعاملی درگیر می‌شوند و اسباب بازی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

- ۳۷ - والدینی که در تربیت فرزندان خود قواعد سخت و غیرقابل انعطافی دارند، کدام شیوه فرزندپروری برای آنها مطرح است؟
 الف) Authoritarian
 ب) Indulgent-permissive
 ج) Indulgent-neglectful
 د) Authoritative-reciprocal
- ۳۸ - تمامی موارد زیر جزو شایع ترین اختلالاتی است که در juvenile sex offenders مشاهده می شود، بجز:
 الف) ADHD
 ب) Specific phobia
 ج) OCD
 د) Conduct
- ۳۹ - کودک یا نوجوانی که سعی می کند با انجام کارهای مطلوب اجتماعی تایید دیگران را به دست آورد، در کدام مرحله از رشد اخلاقی کولبرگ است؟
 الف) Preconventional morality
 ب) Conventional role-conformity
 ج) Self-accepted moral principles
 د) Concrete operational
- ۴۰ - مهمترین عاملی که همبستگی با self-esteem در نوجوانان دارد کدام است؟
 الف) ظاهر جذاب
 ب) موفقیت تحصیلی
 ج) توانمندی ورزشی
 د) هوش بالا
- ۴۱ - در مصاحبه با یک کودک ۷ ساله، برای پی بردن به خلق تحریک پذیر وی، استفاده از کدام یک از جملات زیر مناسب تر است؟
 الف) می بینم خیلی عصبانی هستی، درست حدس زدم؟
 ب) چه احساسی داری؟ خوشحالی، ناراحتی یا عصبانی هستی؟
 ج) چه مشکلی در خانه یا مدرسه داری؟
 د) من اینجا هستم که هر چی دلت می خواد بگویی
- ۴۲ - به منظور ارزیابی روانپزشکی یک کودک ۶ ساله، قصد دارید از یک ابزار interviewer based استفاده کنید. کدام ابزار مناسب تر است؟
 الف) CAPA
 ب) DICA
 ج) ChIPS
 د) K-SADS
- ۴۳ - به منظور ارزیابی هوشی یک کودک ۲ ساله کدامیک از ابزارهای زیر مناسب تر است؟
 الف) Stanford-Binet
 ب) Kaufman
 ج) Wechsler
 د) Peabody

- ۴۴ - در یک کودک 5 ساله با احتمال **Intellectual disability** برای ارزیابی عملکرد ارتباط کلامی، مهارت‌های فردی و اجتماعی در زندگی روزمره، استفاده از کدام ابزار مناسب‌تر است؟
- الف) Behavior Problem Inventory
ب) Children's Apperception Test
ج) Vineland Adaptive Behavior
د) Goodenough Test
- ۴۵ - کودکان مبتلا به کدامیک از سندرم‌های زیر بیش از بقیه **sociable** هستند؟
- الف) Fragile X
ب) Tuberos Sclerosis
ج) Angelman
د) Williams
- ۴۶ - در مصاحبه با کدامیک از گروه‌های سنی استفاده از سوالات باز مناسب‌تر است؟
- الف) کودکان نوپا
ب) کودکان پیش دبستانی
ج) کودکان دبستانی
د) نوجوانان
- ۴۷ - کودکان در چند سالگی متوجه می‌شوند که رؤیاهای آنها واقعی نیستند؟
- الف) ۴ (ب) ۵ (ج) ۶ (د) ۷
- ۴۸ - شایع‌ترین اختلال اضطرابی در کودکان و نوجوانان کدامیک از موارد زیر است؟
- الف) اختلال اضطراب جدائی
ب) اختلال اضطراب اجتماعی
ج) اختلال اضطراب منتشر
د) اختلال پانیک
- ۴۹ - طول مدت علائم در همهٔ اختلالات اضطرابی زیر در کودکان حداقل ۶ ماه است به غیر از:
- الف) اختلال اضطراب منتشر
ب) فوبی اختصاصی
ج) اختلال اضطراب جدائی
د) اختلال اضطراب اجتماعی
- ۵۰ - شایع‌ترین سن بروز اختلال اضطراب جدائی در کودکان و نوجوانان برابر کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
- الف) سنین پیش دبستانی
ب) اوائل مدرسه ابتدائی
ج) اواخر مدرسه ابتدائی
د) اوائل نوجوانی

۵۱ - در درمان اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان که به درمان با SSRIs و CBT به تنهایی و یا ترکیبی پاسخ مساعد نداده است، افزودن همه داروهای زیر به درمان می تواند مناسب باشد، به غیر از:

الف) Memantine

ب) Riluzole

ج) D-Cycloserine

د) Imipramine

۵۲ - مطالعات تصویربرداری عصبی (neuroimaging) در نوجوانان با علائم اضطرابی، افزایش فعالیت در کدامیک از نواحی مغزی را نشان داده است؟

الف) آمیگدال

ب) هیپوکامپ

ج) تالاموس

د) هیپوتالاموس

۵۳ - در مورد سیر و پیش آگهی موتیسم انتخابی در کودکان عبارت غلط را مشخص نمائید:

الف) بسیاری از کودکان با موتیسم انتخابی زود آغاز با درمان یا بدون آن بهبود پیدا می کنند.

ب) درمان با فلوئوکستین روی سیر بیماری تاثیری نداشته و بهبود را افزایش نمی دهد.

ج) حدود نصف کودکان مبتلا به موتیسم انتخابی در طی ۵ تا ۱۰ سال بهتر می شوند.

د) کودکانی که تا سن ۱۰ سالگی بهتر نمی شوند پیش آگهی بدتری دارند.

۵۴ - در کودکان مبتلا به اختلال وسواسی جبری به همراه اختلال تیک، الگوی علائم بالینی وسواس اکثراً شامل موارد زیر است، به غیر از:

الف) counting

ب) arranging

ج) washing

د) ordering

۵۵ - در مطالعات تصویربرداری عصبی همه موارد زیر در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی جبری نشان داده شده است، به غیر از:

الف) حجم کوچک تر گانگلیون های بازال

ب) کاهش ماده خاکستری در ناحیه قشری پاریتال - فرونتال

ج) کاهش ماده خاکستری در گانگلیون های بازال

د) افزایش حجم تالاموس

۵۶ - داروهای زیر دارای تاییدیه FDA برای درمان اختلال وسواسی جبری در کودکان و نوجوانان هستند، به غیر از:

الف) فلوئوکستین

ب) سرتالین

ج) کلومیپرامین

د) سیتالوپرام

۵۷ - اصطلاح Early-Onset Schizophrenia برای اسکیزوفرنی در کدام گروه سنی بکار می رود؟

الف) زیر ۶ سال

ب) زیر ۱۳ سال

ج) زیر ۱۸ سال

د) بین ۱۳-۱۸ سال

- ۵۸ - براساس DSM-5 برای تشخیص Attenuated Psychosis Syndrome (APS) حداقل یکی از علائم زیر باید وجود داشته باشد، به غیر از:
- الف) Delusions
ب) Hallucinations
ج) Negative symptoms
د) Disorganized speech
- ۵۹ - همه داروهای زیر برای درمان اسکیزوفرنی در گروه سنی ۱۷-۱۳ سال دارای تاییدیه FDA می‌باشند، به غیر از:
- الف) ریسپریدون
ب) آریپرازول
ج) مولیندون
د) کوئتیاپین
- ۶۰ - خطر شروع زود هنگام مصرف مواد قبل از سنین ۱۱ سالگی عمدتاً با کدام عامل خطر ربط داده شده است؟
- الف) low parental supervision
ب) family conflict
ج) parent modeling of substance use
د) academic difficulties
- ۶۱ - علائم ترک یا محرومیت به دنبال قطع ناگهانی ماری جوآنا در نوجوانان مصرف‌کننده دوزهای بالای آن، چند ساعت بعد از آخرین مصرف شروع می‌شود؟
- الف) ۳
ب) ۱۲
ج) ۲۴
د) ۴۸
- ۶۲ - همهٔ مواد مورد سوء مصرف زیر بی‌رنگ، بی‌بو و بدون طعم هستند و ممکن است بدون اینکه مشخص شود، برای مقاصد خاص داخل نوشیدنی افراد دیگر ریخته شوند، به غیر از:
- الف) ketamine
ب) flunitrazepam
ج) GHB
د) LSD
- ۶۳ - در مورد کدامیک از مواد مورد سوء مصرف زیر، بروز flashbacks تا فاصله یک سال بعد از مصرف آن مطرح شده است؟
- الف) LSD
ب) کوکائین
ج) ماری جوآنا
د) GHB
- ۶۴ - اصطلاح "gateway drug" در مورد کدامیک از مواد زیر بکار رفته است؟
- الف) هروئین
ب) کراک
ج) مواد استنشاقی
د) ماری جوآنا
- ۶۵ - در مورد درجه‌بندی شدت ناتوانی ذهنی جملات زیر صحیح است، بجز:
- الف) به کودکان بالای چهار سال با احتمال کندذهنی و مشکل ارزیابی هوش Unspecified ID گفته می‌شود
ب) تقسیم‌بندی DSM5 براساس عملکرد انطباقی است نه نمره هوش
ج) حداقل نمره هوش در فرم خفیف ۵۰ می‌باشد
د) در فرم متوسط توانایی آموزشی حداکثر تا پایه‌ی دوم یا سوم مدرسه استثنایی را دارند
- ۶۶ - پسر ۲۰ ساله‌ای به دنبال تصادف با موتور و ضربه مغزی نمره هوش طبیعی او به ۵۰ افت کرده است. تشخیص او چیست؟
- الف) کم توان ذهنی
ب) کم توان ذهنی و دمانس
ج) دمانس
د) کم توان ذهنی unspecified

۶۷ - کدامیک از موارد زیر پیشگیری اولیه محسوب نمی‌شود؟

- (الف) آزمایش خون نوزاد از نظر میزان فنیل آلانین
 (ب) تشویق به عدم مصرف الکل حین بارداری
 (ج) مشاوره ژنتیک
 (د) استفاده از سمک و عینک

۶۸ - دختر ۹ ساله‌ای با توانایی‌های هوشی پایین و عدم ارتباط با محیط پیرامون و حملات خشم شدید ارجاع شده است. بیماری ارگانیک ندارد. کدام داروی زیر برای کنترل رفتاری او مناسب‌تر است؟

- (الف) کلونیدین (ب) ریسپریدون (ج) پروپرانولول (د) اتوموکستین

۶۹ - پسر ۶ ساله‌ای در سنجش ورود به مدرسه نمره کافی کسب نکرده است. به علت مشکلات یادگیری و ناشنوایی ارجاع شده است. از نظر کم توانی ذهنی در کدام دسته قرار دارد؟

- (الف) Mild (ب) Unspecified (ج) Severe (د) Moderate

۷۰ - پسر ۶ ساله‌ای با زبان بیانی ضعیف و اشکالات تلفظی حروف ارجاع شده است. شنوایی و فهم کلامی او نرمال است، راه حل شما چیست؟

- (الف) جلسات گفتاردرمانی
 (ب) آموزش والدین
 (ج) تمرینات لازم دهانی
 (د) رواندرمانی جهت بهبود مشکلات عاطفی

۷۱ - شایع‌ترین اختلال همراه در اختلالات زبان کدام است؟

- (الف) اضطراب
 (ب) بیش‌فعالی / نقص توجه
 (ج) اختلال رفتاری ایذایی
 (د) اختلال خواندن

۷۲ - در کودکان مبتلا به اختلال زبانی پذیرا - بیانی کدام اقدام زیر ابتدا باید انجام شود؟

- (الف) ادیومتری
 (ب) نوار مغز
 (ج) تست تصویربرداری مغزی
 (د) تست هوش و کسلر

۷۳ - کودک ۶ ساله‌ی اول دبستان با اشکال در تلفظ برخی حرف (ش به جای س) و کلمه (آذ به جای آذر) ارجاع شده است. احتمالاً از چه سنی (سال) به بعد کودک بهبود خود به خودی پیدا نمی‌کند؟

- (الف) ۹ (ب) ۴ (ج) ۶ (د) ۱۲

۷۴ - در مورد اپیدمیولوژی Speech Sound Disorder جملات زیر صحیح است، بجز:

- (الف) در پسران شایع‌تر است.
 (ب) در نوجوانان ۱۷ ساله شیوع ۲ درصدی دارد.
 (ج) در خانواده درجه یک مبتلا، شیوع این اختلال بیشتر است.
 (د) در فرزندان زیر سه سال خانواده نمی‌توان این تشخیص را داد.

- ۷۵ - پسر ۱۰ ساله چهارم دبستان به علت لکنت زبان و اجتناب از حرف زدن در جمع، غمگینی و از دست دادن علایق ارجاع شده است. اقدامات لازم درمانی شامل موارد زیر است، بجز:
- الف) درمان شناختی-رفتاری
ب) جلسات رواندرمانی بینشی
ج) مصرف آنتی دپرسانت مهارکننده بازجذب سروتونین
د) جلسات گفتاردرمانی
- ۷۶ - خصوصیات زیر مربوط به فاز چندم ایجاد لکنت زبان در کودکان می باشد.
- «کودک بصورت اپی زودیک خصوصاً در موقع هیجان و حرف زیاد دچار لکنت است.»
- الف) فاز یک (ب) فاز دو (ج) فاز سه (د) فاز چهار
- ۷۷ - در مبتلایان به Cluttering (اختلال میزان و ریتم کلام) حدود ۷۰ درصد موارد تا چه سنی بهبود خودبخودی حاصل می شود؟
- الف) پیش دبستانی (ب) کودکی (ج) نوجوانی (د) بزرگسالی
- ۷۸ - در مورد نقش ژنتیک در اختلال طیف اوتیسم موارد زیر صحیح است، بجز:
- الف) در خانواده های دارای دو یا بیشتر فرزند اوتیسم میزان این اختلال در همشیرها بیشتر از ۵۰ درصد می باشد.
ب) در همشیره های کودک با اختلال اوتیسم، ریسک اختلال در مهارت های اجتماعی و ارتباطی بالاتر است.
ج) تا ۳۰ درصد بیماران طیف اوتیسم موتاسیون ژنی شناخته شده دارند.
د) در اکثر موارد اوتیسم با اختلال ژنتیک، بیان Expression ژنی وابسته به ژن های متعدد است.
- ۷۹ - بیومارکرها در اختلال طیف اوتیسم شامل موارد زیر است، بجز:
- الف) افزایش سروتونین در خون و پلاکتها
ب) افزایش کلی حجم مغز در بچه های زیر چهار سال
ج) کاهش اندازه آمیگدال و استریاتوم در سال های ابتدای عمر
د) تمرکز بر دهان به جای چشم و تمرکز بر خصوصیات فردی صورت فرد در fMRI
- ۸۰ - کودک چهار ساله ای با اختلال کیفی در تعاملات اجتماعی و رفتارهای تکراری و عدم تکلم ارجاع شده است. روش انتخابی برای درمان او استفاده از تصاویر و حمایت بینایی است. کدام روش درمانی انتخاب شده است؟
- الف) LOVAAS (ب) TEACCH (ج) CBT (د) DENVER
- ۸۱ - پسر ۹ ساله کلاس سوم با هوش طبیعی اما علایق محدود و اشکالات کیفی کلامی ارجاع شده؛ معلم از نقص واضح توجه و بی قراری حرکتی او شاکی است. طبق تایید FDA داروهای زیر در نقص توجه او اثربخش است، بجز:
- الف) اتوموکستین
ب) متیل فنیدیت
ج) گوانفاسین طولانی اثر
د) ریسپردون
- ۸۲ - در نوزادان با اختلال دلبستگی واکنشی همه موارد زیر در معاینه و یافته های پاراکلینیک به چشم می خورد، بجز:
- الف) سن استخوانی تاخیر دارد.
ب) سطح هورمون رشد، نرمال یا افزایش یافته است.
ج) دور سر در حد متوسط برای سن نوزاد است.
د) سطح هورمون کورتیزول بالاتر از کودکان نرمال است.

۸۳ - همه موارد زیر جزو مداخلات سرویس‌های حمایتی روانی-اجتماعی برای کودک دچار اختلال دلبستگی واکنشی است، بجز:

الف) Hiring a homemaker

ب) Obtaining adequate housing

ج) Family or marital therapy

د) Decreasing family isolation

۸۴ - در یک کودک ۷ ساله که به دنبال ربه شده قادر به یادآوری قسمت‌هایی از واقعه تروماتیک نمی‌باشد، چه علامتی مطرح است؟

الف) فراموشی سایکولوژیک

ب) بی‌حسی (کرختی) سایکولوژیک

ج) احساس کوتاه شدن آینده

د) تغییرات منفی خلقی

۸۵ - **childhood PTSD** مرتبط با افزایش میزان سایر اختلالات زیر است، بجز:

الف) اختلالات اضطرابی

ب) اختلالات افسردگی

ج) سوء مصرف مواد

د) اختلالات سایکوتیک

۸۶ - در درمان شناختی رفتاری مبتنی بر شواهد: از کودک خواسته می‌شود که داستان واقعه تروماتیک و پیامدهایش را در طی زمان بگوید و درمانگر با استفاده از تکنیک‌های ترسیم کلمات، هنر و دیگر شکل‌های خلاقیت به وی کمک می‌کند. این تکنیک چه نام دارد؟

الف) Trauma narrative

ب) Mastery of trauma

ج) Affective modulation

د) Relaxation

۸۷ - براساس مطالعات انجام شده در کودکانی که دچار سوختگی شده‌اند کدام یک از دسته‌های دارویی زیر در پیشگیری از PTSD کمک‌کننده است؟

الف) آنتی سایکوتیک (ب) آلفا دو اگونیست (ج) SSRI (د) بتا انتاگونیست

۸۸ - در کودک ۸ ساله که به دنبال تنبیه فیزیکی شدید توسط برادر بزرگش، دچار علائم تکانشگری، بی‌قراری، هیپراروزال و یادآوری مکرر خاطرات تنبیه است، کدام داروی زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

الف) ریسپردون (ب) سرتالین (ج) کلونیدین (د) لورازپام

۸۹ - مارک‌های آسیب‌پذیری کودکان به PTSD که به عنوان پیامد بیماری نیز محسوب می‌گردد شامل موارد زیر است، بجز:

الف) ضریب هوشی پایین‌تر

ب) ترشح افزایش یافته متابولیت دوپامینرژیک

ج) نقایص حافظه

د) بزرگتر بودن اندازه کورپوس کالوزوم

۹۰ - در فاز افسردگی اختلال دو قطبی در نوجوانان، همه علائم زیر وجود دارد، بجز:

الف) Family history of bipolar I

ب) Psychosis

ج) Hypersomnia

د) Psychomotor agitation

۹۱ - شایع ترین اختلال همراه در بین نوجوانان با **early onset bipolar I disorder** کدام است؟

الف) ADHD

ب) Conduct disorder

ج) Anxiety disorder

د) Eating disorder

۹۲ - در مطالعات انجام شده در درمان اختلال دو قطبی یک با علائم فاز مانیا کدام یک از داروهای زیر سرعت اثر بالاتر و

کاهش بیشتری در علائم نهایی اختلال ایجاد می کند؟

الف) ریسپریدون ب) سدیم والپرات ج) لیتیوم کربنات د) کاربامازپین

۹۳ - کدام یک از موارد زیر در مطالعات FMRI انجام شده در اختلال **bipolar I** قبل از درمان، پیش بینی کننده پاسخ

ضعیف و مقاومت به درمان است؟

الف) افزایش فعالیت کورتکس دورسولترال پره فرونتال

ب) کاهش فعالیت کورتکس و نترولترال پره فرونتال

ج) افزایش فعالیت آمیگدال

د) افزایش فعالیت استریاتوم

۹۴ - همه موارد زیر جزء کرایتریای **DSM 5** در اختلال **Disruptive mood Dysregulation** می باشد، بجز:

الف) وجود فوران های خشم (طغیان خشم) سه بار یا بیشتر در هفته

ب) نامناسب بودن شدت پرخاشگری با سطح تکاملی کودک

ج) شروع علائم در دو موقعیت مجزا برای حداقل ۶ ماه

د) وجود خلق تحریک پذیر پایدار در فاصله بین طغیان های خشم

۹۵ - در مطالعات طولی مشخص شده که افراد با **Disruptive mood Dysregulation** در کودکی، در ریسک بالای

پیشرفت به طرف همه اختلالات زیر هستند، بجز:

الف) اختلال افسردگی اساسی

ب) اختلال دیس تایمیک

ج) اختلال اضطرابی

د) اختلال سوء مصرف مواد

۹۶ - در مواردی که اختلال **Disruptive mood Dysregulation** از نظر پاتوفیزیولوژی به افسردگی تک قطبی و اختلال

اضطرابی شباهت دارد کدام دسته دارویی زیر کمک کننده است؟

الف) استیمولانت ها

ب) مهارکننده های بازجذب سروتونین

ج) آنتی سایکوتیک ها

د) تثبیت کننده های خلقی

۹۷ - در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله جویانه همه خصوصیات زیر دیده می شود، بجز:

الف) High self-esteem

ب) Poor frustration tolerance

ج) Depressed mood

د) Temper out bursts

۹۸ - الگوی **parental discipline** در خانواده مبتلایان به اختلال سلوک به اشکال زیر می تواند باشد، بجز:

الف) Harshness

ب) Excessive strictness

ج) Inconsistency

د) Supervision / control

۹۹ - در برنامه پیشگیری از ابتلا به اختلال سلوک (**fast track preventive intervention**) در کودکان با پرخاشگری

کدام یک از تکنیک های زیر استفاده می شود؟

الف) Emotion regulation

ب) Self-talk

ج) Home visiting

د) Problem solving

۱۰۰ - در نوجوان ۱۵ ساله مبتلا به اختلال سلوک با رفتارهای پرخاشگری، بی قراری و نوسانات خلقی، کدام یک از داروهای

زیر در الویت انتخاب است؟

د) فلوکستین

ج) کلونیدین

ب) سدیم والپرات

الف) ریسپریدون

اخلاق پزشکی

۱۰۱ - به علت همه گیری کرونا، لازم است در معاینه بیماران در درمانگاه دستورالعمل های ویژه بهداشتی رعایت شود. شما

پزشک مسئول درمانگاهی هستید که ۲۰ بیمار برای ویزیت تخصصی توسط شما در آن تعیین نوبت شده اند. احتمال

ابتلای بعضی از آنها به بیماری کرونا بسیار قوی است. در درمانگاه امکانات حفاظتی عادی موجود است. مناسب ترین

تصمیم کدام است؟

الف) درخواست تعطیل نمودن درمانگاه از طریق کمیته اخلاق بیمارستان

ب) بدون ملاحظه شرایط، با فاصله مطمئن تر نیمی از بیماران ویزیت شوند

ج) ویزیت بیماران مظنون به بیماری کرونا لغو و سایر بیماران ویزیت شوند

د) با اعمال دستورالعمل های ویژه بهداشتی، همه بیماران ویزیت شوند

۱۰۲ - مرد ۴۹ ساله دیابتیک، با تشخیص کارسینوم معده، کاندید گاسترکتومی است. وی که قبلا دستورات درمانی دیابت

را اجرا نکرده، و از مراجعه به روانپزشک برای کنترل عوارض روانی نیز امتناع نموده است، درمان پیشنهادی برای

کنترل بیماری معده را نمی پذیرد. مناسب ترین روش برای تصمیم گیری در مورد ظرفیت بیمار کدام است؟

الف) تصمیم گیری قانونی - حقوقی

ب) تصمیم بر اساس مشاوره پزشکی

ج) تصمیم به استناد رضایت بیمار

د) تصمیم به استناد رضایت همراه بیمار

موفق باشید

کلید اولیه - آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی - دی ماه ۱۴۰۰

رشته: روانپزشکی کودک و نوجوان

توجه! اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سئوالات باید با مداد مشکی نرم و پررنگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح ● غلط ○

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی نزنید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰