

به نام خدا

**www.KONKUR.IN**

# سایت گنکور



هر آنچه در دوران تحصیل به آد نیاز دارید

**Forum.Konkur.in**

پاسخ به همه سوالات شما در تمامی مقاطع تحصیلی، در انجمن گنکور

مدیریت سایت گنکور : آراز و فراز رهبر

۱۰۱- اگر  $A \cap C = \emptyset$  و  $A \cap B = \emptyset$  ، آنگاه کدام نتیجه گیری درست است؟

$$A \cap (B - C) \neq \emptyset \quad (۱)$$

$$A \cap (B \cup C) = \emptyset \quad (۲)$$

$$B \cap C \neq \emptyset \quad (۳)$$

$$B \cap C = \emptyset \quad (۴)$$

$$A \cap C = \emptyset \quad , \quad A \cap B = \emptyset \xrightarrow{U} (A \cap B) \cup (A \cap C) = \emptyset \cup \emptyset \rightarrow A \cap (B \cup C) = \emptyset$$

۱۰۱- گزینه ۳

۱۰۲- حاصل  $(x + \frac{2}{x-3}) \times (1 - \frac{1}{x-2})$  کدام است؟

$$2x+1 \quad (۱)$$

$$x+2 \quad (۲)$$

$$x+1 \quad (۳)$$

$$x-1 \quad (۴)$$

$$(x + \frac{2}{x-3}) \times (1 - \frac{1}{x-2}) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-3} \times \frac{x-2-1}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2)}{x-3} \times \frac{x-3}{x-2} = x-1$$

۱۰۲- گزینه ۱

۱۰۳- در تقسیم عبارت  $(x^2 - 2)(x^2 + 1)$  بر دو جمله‌ای  $x + 2$  مجموع ضرایب در خارج قسمت آن کدام است؟

$$6 \quad (۱)$$

$$5 \quad (۲)$$

$$4 \quad (۳)$$

$$3 \quad (۴)$$

۱۰۳- گزینه ۴

$$(x^2 - 2)(x^2 + 1) = x^4 - 2x^2 + x - 2 \quad |x+2$$

$$\begin{array}{r} -x^3 + 2x^2 \\ \hline -4x^3 + x \\ \hline +4x^2 - 8x \\ \hline 9x \end{array}$$

مجموع ضرایب خارج قسمت

⋮

۱۰۴- حاصل عبارت  $\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{12}}$  کدام است؟

$$0 \quad (۱)$$

$$-1 \quad (۲)$$

$$-2 \quad (۳)$$

$$-3 \quad (۴)$$

$$\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{12}} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \times \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{(1-\sqrt{2})^2}{1-2} - \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{1-2\sqrt{2}+2}{-1} - \frac{4}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -3 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = -3$$

۱۰۴- گزینه ۱

$$\frac{3x-5}{2} - \frac{2x-4}{3} > \frac{1}{2} \text{ و } \frac{4x-1}{3} > 3x-2 \quad \text{به کدام صورت است؟}$$

$$-4 < x < 2 \quad (۱)$$

$$-2 < x < 1 \quad (۲)$$

$$-4 < x < 1 \quad (۳)$$

$$-2 < x < 2 \quad (۴)$$

۱۰۵- گزینه ۲

$$\frac{4x-1}{3} > 3x-2 \xrightarrow{x^3} 4x-1 > 9x-6 \Rightarrow x < 1$$

$$\frac{3x+5}{2} - \frac{2x-4}{3} > \frac{1}{2} \xrightarrow{x^6} 9x+15-4x+8 > 3 \Rightarrow -4 < x$$

اشتراک دو بازه برابر با گزینه ۲ است.

۱۰۶- در کدام مورد عمل سرشماری انجام نشده است؟

(۱) تمام افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرد.

(۲) نمونه برابر جامعه آماری

(۳) نمونه، زیرمجموعه جامعه آماری

(۴) اندازه‌ی نمونه برابر اندازه جامعه

۱۰۶- گزینه ۴

در سرشماری همه افراد مورد مطالعه قرار می‌گیرند و زیرمجموعه‌ای از آن نادرست می‌باشد.

۱۰۷ - جدول زیر درصد فراوانی تجمعی در گروههای سنی کمتراز، در یک جامعه است. در نمودار دایره‌ای زاویه مربوط به سطح گروه سنی بین ۲۰ و ۳۰ چند درجه است؟

کران بالای سن	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۱۲۰
درصد فراوانی تجمعی	۱۷	۳۶	۵۱	۷۰	۱۰۰
کران بالای سن	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۱۲۰
درصد فراوانی	۱۷	۱۹	۱۵	۱۹	۳۰

۵۴ (۲)      ۴۸ (۱)  
۶۰ (۴)      ۵۶ (۳)

۲- گزینه ۱۰۷

$$\alpha_{\beta} = \frac{f_{\beta}}{n} \times 360 = \frac{15}{100} \times 360 = 54$$

۱۰۸ - در نمودار جعبه‌ای آماری، میانگین داده‌های دنباله سمت چپ ۱۲ و سمت راست ۲۱ می‌باشد. اگر میانگین داده‌های داخل و روی

جعبه ۱۵ باشد، میانگین کل این داده‌ها، کدام است؟

$$\bar{x}_l = 12, \bar{x}_r = 15, \bar{x}_{\text{میان}} = 21$$

$$\bar{x} = \frac{7(12) + 17(15) + 7(21)}{31} = \frac{486}{31} = 15.67$$

۱۵/۴۵ (۱)

۳- گزینه ۱۰۸

۱۰۹ - در تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{-2x^3 + 8x + 7}$ ، مقدار  $f(2 - \sqrt{3})$  کدام است؟

$$f(2 - \sqrt{3}) = \sqrt{-2(2 - \sqrt{3})^2 + 8(2 - \sqrt{3}) + 7} = \sqrt{-2(4 - 4\sqrt{3} + 3) + 16 - 8\sqrt{3} + 7} = \sqrt{9} = 3$$

۱ (۱)

۳- گزینه ۱۰۹

۱۱۰ - خط گذرنده از دو نقطه  $(2, 5)$  و  $(-1, 3)$ ، خط به معادله  $y + x + 3 = 0$  را در نقطه‌ای با کدام عرض قطع می‌کند؟

۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)

$$m = \frac{5 - 3}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}; \quad y - 5 = \frac{2}{3}(x - 2) \rightarrow 3y - 15 = 2x - 4 \rightarrow 3y - 2x - 11 = 0$$

۱ (۱)- گزینه ۱۱۰


$$\begin{cases} 3y - 2x - 11 = 0 \\ y + x + 3 = 0 \xrightarrow{x+2} 2y + 2x + 6 = 0 \end{cases} \xrightarrow{+} 5y - 5 = 0 \Rightarrow y = 1$$

۱۱۱ - در معادله  $\frac{x^2}{x-4} - \frac{2x+8}{x-4} = 2x$ ، تفاضل معکوس جواب از خود جواب، کدام است؟

$\frac{5}{2} (4)$        $\frac{7}{4} (3)$        $\frac{3}{2} (2)$        $\frac{5}{4} (1)$

$$\frac{x^2}{x-4} - \frac{2x+8}{x-4} = 2x \rightarrow \frac{x^2 - 2x - 8}{x-4} = 2x \rightarrow \frac{(x+2)(x-4)}{x-4} = 2x \rightarrow x+2=2x \rightarrow x=2; \quad 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

۲- گزینه ۱۱۱



۱۱۲ - معادله سه‌می شکل روبرو، کدام است؟

$$y = 2x^2 + x - 1 \quad (2)$$

$$y = x^2 - x - 3 \quad (1)$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2} \quad (4)$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2} \quad (3)$$

۱۱۲- گزینه ۴ - چون دهانه سه‌می رو به بالا است پس ضریب  $x^2$  مثبت است و گزینه ۳ حذف می‌شود. از طرفی  $x=1$  طول رأس سه‌می است

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-1)}{2(\frac{1}{2})} = 1$$

که فقط در گزینه ۴ صدق می‌کند.

۱۱۲- پنج حرف از ۸ حرف کلمه BUSINESS را با جایگشت‌های متمایز در کنار هم قرار می‌دهیم. تعداد گروه‌هایی که هر سه S در آنها باشد کدام است؟

(۱) ۱۵۰      (۲) ۱۶۰      (۳) ۲۰۰      (۴) ۲۴۰

۱۱۳- گزینه ۳ ابتدا از ۵ حرف غیر تکراری، دو تای آنها را انتخاب می‌کنیم. سپس جایگشت آن دو، با سه حرف S که برابر! است را محاسبه،

$$\binom{5}{2} \times \frac{5!}{3!} = 10 \times 20 = 200$$

و بر! ۳ (به علت تکراری بودن حروف S) تقسیم می‌کنیم.

۱۱۴- شخص در ماه اول A ریال پس‌انداز کرده، در هر ماه به اندازه  $\frac{1}{20}$  بیشتر از ماه قبل پس‌انداز می‌کند، تا مقدار پس‌انداز یک ماه آن به

دو برابر پس‌انداز ماه اول برسد. اگر در این زمان مجموع پس‌انداز وی ۶۳۰۰۰ تومان باشد، او لین پس‌انداز وی چقدر بوده است؟

(۱) ۱۶۰۰      (۲) ۲۰۰۰      (۳) ۲۲۰۰      (۴) ۲۴۰۰

$$A, A + \frac{1}{20}A, A + \frac{2}{20}A, \dots, A + \frac{n-1}{20}A \quad ; \quad 2A = A + \frac{n-1}{20}A \rightarrow n = 21$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2A + (n-1)d) \rightarrow S_{21} = 63000 \rightarrow \frac{21}{2}(2A + 20(\frac{1}{20}A)) = 63000 \rightarrow \frac{63}{2}A = 63000 \Rightarrow A = 2000$$

۱۱۵- در دنباله مثلثی ۱, ۳, ۶, ۰۰۰ مجموع جملات دهم و یازدهم، کدام است؟

(۱) ۱۲۱      (۲) ۱۲۷ (۲)      (۳) ۱۲۲      (۴) ۱۴۴

۱۱۶- گزینه ۱ هر جمله دنباله مثلثی از رابطه  $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$  بدست می‌آید. داریم:

$$a_{10} = \frac{10(10+1)}{2} = 55 ; a_{11} = \frac{11(11+1)}{2} = 66 \rightarrow a_{10} + a_{11} = 55 + 66 = 121$$

۱۱۶- خلاصه شده‌ی عبارت  $\log ۳۵ + ۲\log ۲\sqrt{۷} - \log ۲۰۰ - ۲\log ۷$  ، کدام است؟

(۱)  $-\frac{3}{2}$       (۲)  $-۲$       (۳)  $-\frac{5}{4}$       (۴)  $-۱$

$$\log ۳۵ + ۲\log ۲\sqrt{۷} - \log ۲۰۰ - ۲\log ۷ = \log ۳۵ + \log(۲\sqrt{۷})^2 - \log ۲۰۰ - \log ۷^2 = \log \frac{۳۵ \times ۲۸}{۲۰۰ \times ۴۹} = \log \frac{1}{10} = -۱$$

۱۱۷- از یک جسم فسیلی ۲۸/۷ درصد از کربن معمولی آن باقیمانده است. اگر نیم عمر کربن ۵/۵ قرن باشد، قدمت این جسم فسیلی چند قرن است؟ ( $\log ۲ = ۰/۲۰۱$ ،  $\log ۲/۸۷ = ۰/۴۵۸۲$ )

(۱) ۹/۹      (۲) ۱۰/۸      (۳) ۱۱      (۴) ۱۲

۱۱۷- گزینه ۱

$$(\frac{1}{2})^T = \frac{28/7}{100} \Rightarrow (2)^{-T} = \frac{2/87}{10} \xrightarrow{\text{log}} T(-\log 2) = \log(2/87) - \log 10 \Rightarrow T = \frac{0/4582 - 1}{-0/301} = \frac{-0/5418}{-0/301} = 1/8$$

$$t = 5/5 \times T \rightarrow t = 5/5 \times 1/8 \Rightarrow t = 1/9$$

۱۱۸- اگر x تعداد واحد کالا و تابع درآمد به صورت  $R(x) = 240x - \frac{1}{20}x^2$  و تابع هزینه به صورت  $C(x) = 36000 + 40x$  باشد، ماکزیمم

سود چقدر است؟

(۱) ۱۳۲,۰۰۰      (۲) ۱۴۴,۰۰۰      (۳) ۱۵۶,۰۰۰      (۴) ۱۶۴,۰۰۰

$$P(x) = R(x) - C(x) \rightarrow P(x) = 240x - \frac{1}{20}x^2 - (36000 + 40x) \rightarrow P(x) = -\frac{1}{20}x^2 + 200x - 36000$$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-200}{2(-\frac{1}{20})} = 2000 ; P(2000) = -\frac{1}{20}(4000000) + 200 \times 2000 - 36000 = 164000$$


۱۱۹- در پرتاب دو تاس، با کدام احتمال اعداد ۵ یا ۶ یا هر دو ظاهر می‌شود؟

$$\frac{11}{18} \quad (4)$$

$$\frac{5}{9} \quad (3)$$

$$\frac{4}{9} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$



$$n(S) = 6 \times 6 = 36 ; \quad n(A) = 20 \Rightarrow P(A) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$$

۱۱۹- گزینه ۳

۱۲۰- هر یک از ارقام ۹,۱۰,۱۲,۰۰۰,۱۵ کارت یکسان نوشته شده است، یک کارت به تصادف از بین آنها برداشته و رقم آن را یادداشت می‌کنیم، دوباره داخل کارت‌ها قرار می‌دهیم، کارت دیگری بیرون کشیده رقم آن را در سمت راست رقم قبلی می‌نویسیم با کدام احتمال عدد دو رقمی حاصل مضرب ۵ می‌باشد؟

$$0/20 \quad (4)$$

$$0/19 \quad (3)$$

$$0/18 \quad (2)$$

$$0/16 \quad (1)$$

$$n(S) = 10 \times 10 = 100 ; \quad n(A) = 9 \times \frac{\{0,5\}}{2} \rightarrow n(A) = 18 \longrightarrow P(A) = \frac{18}{100} = 0/18$$

۱۲۰- گزینه ۲