


الا بذكر الله تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



(روانپزشکی کودک و نوجوان)

بهمن 1396

تعداد سوالات: 102

تعداد صفحات: 18

زمان پاسخگویی: 120 دقیقه

مشخصات داوطلب

نام و نام خانوادگی:

شماره کارت:

شماره دانشجویی:

سایت کنکور

تذکرات مهم:

- برای هر سوال تنها گزینه ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.

- این آزمون نمره منفی ندارد.

- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و حروف گروه پاسخنامه خود را با حروف گروه دفترچه (الف و ب) مطابقت دهید. در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر اینصورت پس از پایان آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

## روانپزشکی کودک و نوجوان (تعداد 100)

- ۱) در بررسی اختلالات ژنتیک کودکان در دوران بارداری مادر استفاده از کدامیک از روش های زیر با خطر بالاتر سقط جنین همراه است؟
- الف) Amniocentesis
  - ب) Fetoscopy
  - ج) X-ray studies
  - د) Chorionic villus sampling
- ۲) توانائی یادآوری در کودکان 8-12 ماهه برای کدام دوره زمانی است؟
- الف) یک هفته
  - ب) دو هفته
  - ج) یک ماه
  - د) سه ماه
- ۳) کدامیک از گزینه های زیر از ابعاد رفتاری نه گانه مزاج (temperament) ارائه شده توسط چس و تامس بشمار نمی رود؟
- الف) Activity level
  - ب) Distractibility
  - ج) Quality of mood
  - د) Persistence
- ۴) آغاز بازیهای با تعاملات واقعی و رعایت نوبت همدیگر از کدام سن در بچه ها دیده می شود؟
- الف) 2 سالگی
  - ب) 4 سالگی
  - ج) 6 سالگی
  - د) 8 سالگی
- ۵) رشد مهارت های مفهومی و تفکر منطقی و سازمان دهی شده از چه دوره سنی آغاز می شود؟
- الف) پیش دبستانی
  - ب) دبستانی
  - ج) اوائل نوجوانی
  - د) اواسط نوجوانی
- ۶) از نظر سالیوان کدامیک از موارد زیر می تواند یکی از علایم اولیه اسکیزوفرنی در دوران دبستان باشد؟
- الف) نداشتن دوست در این دوران
  - ب) پرخاشگری فراوان در این دوران
  - ج) تاخیر در رسیدن به تفکر انتزاعی
  - د) داشتن دوستان خیالی متعدد

۷) کدام گزینه در مورد کودک هشت ساله ایی که گاهاً در اطاقش سرگرم صحبت با عروسکه‌هایش می‌شود و با آنها رابطه دوستی برقرار می‌کند درست می‌باشد؟

الف) در پی جبران بی‌مهری‌های والدین است.

ب) نمادی از پرخاشگری نهفته در کودک است.

ج) دوره نهفته یک اختلال خلقی می‌تواند باشد.

د) راهی جهت کاهش تنهایی و اضطراب و نگرانی کودک است.

۸) بچه‌ها از چه سنی می‌توانند نصایح والدین در مورد ارزشهای اخلاقی و اطلاق خوب و بد به رفتارشان را درک نمایند؟

الف) 3 سالگی

ب) 6 سالگی

ج) 9 سالگی

د) 12 سالگی

۹) تا چه سنی کودک باید توانائی رسم شکل قابل تشخیص آدم شامل سر، تنه و اندامها را بدست آورده باشد؟

الف) 3 سالگی

ب) 4 سالگی

ج) 5 سالگی

د) 6 سالگی

۱۰) به منظور ارزیابی مشکلات روانپزشکی یک کودک 5 ساله کدام یک از روش‌های زیر صحیح است؟

الف) برای ارزیابی ابتدا با خود کودک مصاحبه می‌کنیم.

ب) جهت ارزیابی ترس و اضطراب سوال از کودک معتبرتر است.

ج) زمان شروع علائم را کودک می‌تواند توضیح دهد.

د) به منظور ارزیابی توهم شنوایی، گفته‌های والدین معتبرتر است.

۱۱) در مصاحبه با یک کودک 8 ساله کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) از سوالات کاملاً باز در مصاحبه استفاده می‌کنیم.

ب) می‌توان از کودک سوال کرد که بهترین و بدترین رویداد زندگی را توضیح دهد.

ج) استفاده از عروسک در بدست آوردن اطلاعات از کودک روش مفیدی است.

د) استفاده از نقاشی خانواده کمکی به جریان مصاحبه نمی‌کند.

۱۲) به منظور غربالگری مشکلات روانپزشکی در یک جمعیت نرمال کودکان و نوجوانان، کدام یک از ابزارهای زیر مناسب تر است؟

الف) Conners Parent Rating Scale (CPRS)

ب) CAPA

ج) Achenbach Child Behavior Checklist

د) K-SADS

۱۳) نوجوانی که می تواند ارتباط کلامی برقرار کند و تا کلاس سوم بیشتر نتوانسته درس بخواند و از نظر اجتماعی نیاز به حمایت دارد، بر اساس DSM-V در چه درجه ای از Intellectual Disability قرار دارد؟

الف) Mild

ب) Moderate

ج) Severe

د) Profound

۱۴) در کودکان با Mild Intellectual Disability شایع ترین اختلالات روانپزشکی همراه چیست؟

الف) Disruptive Behavioral Disorders

ب) Schizophrenia

ج) Anxiety Disorders

د) Autism Spectrum Disorder

۱۵) پسر 10 ساله ای با علائم پرتحرکی، اختلال در خواندن ارجاع می شود. نامبرده در ظاهر دارای سر کشیده، گوش های بلند و لاغر اندام می باشد. کدام یک از سندرم های زیر جهت وی محتمل تر است؟

الف) Down

ب) Prader – Willi

ج) Tuberous Sclerosis

د) Fragile X

۱۶) در کدام یک از سندرم های زیر اختلال در مهارت های زبانی و اجتماعی همراه با اختلالات حرکتی از جمله آتاکسی، اسکولیز و هیپرونتیلیاسیون مشاهده می شود؟

الف) Angelman

ب) Rett

ج) Smith-Magenis

د) Williams

۱۷) آزمون Vinland Adaptive Behavior Scale تمام حوزه های زیر را ارزیابی می کند، بجز:

الف) Expressive Language

ب) Problem Solving

ج) Fine Motor

د) Interpersonal Relationship

۱۸) در ارزیابی اختلالات زیر اندازه گیری آنزیم یا اسید آمینه مورد نیاز است، بجز:

الف) Lech-Nyhan Syndrome

ب) Hunter's Syndrome

ج) Neurofibromatosis

د) Maple Syrup

۱۹) کودک 7 ساله ای که نمی تواند کلمات مناسب را در کنار هم مرتب نماید و جمله مناسبی بسازد، در کدام بخش زبان مشکل دارد؟

الف) Phonological

ب) Grammar

ج) Semantics

د) Pragmatics

۲۰) کودکی 8 ماهه به دلیل اجتناب از شیر خوردن توسط والدین نزد روانپزشک آورده شده است. مشکل وی در 2 ماه اخیر تشدید یافته و روال افزایش وزن را در او کند کرده است. روانپزشک براساس مجموعه شواهد برای وی تشخیص Avoidant food intake Disorder را مطرح نموده است. فرزند قبلی این زوج سابقه هرنی هیاتال داشته و والدین بر اساس ناراحتی کودک در هنگام بلع، نگرانند که وی نیز مشکل مشابهی داشته باشد. اقدام اولویت دار بعدی شما چیست؟

الف) آموزش تحلیل رفتار به والدین (شامل پیش آینده ها و پس آینده های اجتناب از خوردن)

ب) اطمینان بخشی به والدین و مانیتور منحنی رشد وی در یک ماه آینده

ج) ارزیابی ویدیو فلوروسکوپیک شیرخوار

د) انجام آزمایشات خونی شامل عملکرد تیروئید و الکترولیت ها

۲۱) پسر 11 ساله ای که در کلاس پنجم دبستان تحصیل می کند ضعف در فهم شوخی های دوستانش را دارد، معمولاً نمی تواند در موقعیت های خاص اجتماعی صحبت مناسبی داشته باشد و دیگران خیلی راحت او را فریب می دهند. علامت خاص دیگری گزارش نمی شود. کدام یک از تشخیص های زیر جهت وی محتمل تر است؟

الف) Autism Spectrum Disorder

ب) Pragmatic Communication Disorder

ج) Intellectual Disability

د) Receptive and Expressive Language Deficits

۲۲) کدام یک از ویژگی های زیر مخصوص فاز 2 شکل گیری لکنت می باشد؟

الف) قبل از سن مدرسه شروع می شود و به صورت دوره ای بروز می کند.

ب) اوایل مدرسه شروع می شود و معمولاً به صورت مزمن است.

ج) از سن 10 سالگی به بعد شروع می شود و دوره های بهبودی در آن دیده می شود.

د) در سنین نوجوانی شروع می شود و وابسته به موقعیت های صحبت کردن می باشد.

۲۳) کاهش ریت تکلم و آبریزش از دهان در کدام یک از اختلالات زبانی بیشتر مشاهده می شود؟

الف) Speech Sound Disorder

ب) Stuttering

ج) Expressive Language Deficit

د) Dysarthria

۲۴) شایع ترین شکل بروز Speech Sound Disorder کدام یک از موارد زیر است؟

الف) Distortion

ب) Dyspraxia

ج) Omission

د) Substitution

۲۵) در کدام یک از اختلالات زیر Inner Language معمولاً مشاهده نمی شود؟

الف) Autism Spectrum Disorder

ب) Selective Mutism

ج) Receptive Expressive Language Deficit

د) Hearing Impairment

۲۶) والدین دختری 12 ماهه از 3 ماه قبل متوجه شده اند که وی پس از خوردن، انگشتش را به دهان می برد، غذا را به دهان می آورد و به بیرون تف می کند. منحنی رشد او نرمال است. اولویت اقدام بعدی شامل کدام یک از موارد زیر است؟

الف) مشاوره جراحی اورژانس برای ارزیابی استنوز پیلور

ب) ارزیابی رفتاری تعامل والد-کودک

ج) ارزیابی سایکودینامیک والدین

د) بررسی سطح روی در خون

۲۷) همه موارد زیر جزء ریسک فاکتورهای (peri natal) اختلال طیف اوتیسم می باشد، بجز:

الف) birth trauma

ب) fetal distress

ج) gestational bleeding

د) low birth weight

۲۸) کودک 6 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم از سه ماه پیش تحت درمان با ریسپریدون با دوز 1 میلی گرم روزانه قرار گرفته و بیقراری کودک کنترل شده است ولی والدین از شدت حرکات تکراری و کلیشه ای وی شاکی هستند. کدام یک از درمان های زیر در الویت می باشد؟

الف) اضافه کردن فلوکستین

ب) اضافه کردن والپروات

ج) اضافه کردن اس سیتالوپرام

د) افزایش دوز ریسپریدون

۲۹) کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به برنامه درمانی let's face it برای کودکان طیف اختلالات اوتیسم است؟

الف) این برنامه به والدین آموزش می دهد با کودکان چگونه برخورد کنند.

ب) یک برنامه آموزشی گروهی چهره به چهره برای کودکان این طیف است.

ج) یک بازی کامپیوتری برای کمک به کودکان در شناسایی حالات چهره است.

د) برنامه ای براساس فعالیت الکتریکی مغز برای تقویت توجه و تمرکز است.

۳۰) براساس طبقه بندی ICD 10، کدام یک از موارد زیر جزء معیارهای سندرم اسپرگر می باشد؟

الف) مهارتهای برتر در زمینه های خاص

ب) گفتن کلمات مجزا حداکثر تا 3 سالگی

ج) ناهنجاری های کیفی در تعامل اجتماعی متقابل

د) تأخیر مراحل تکامل حرکتی

۳۱) همه جملات زیر درباره نشانگرهای زیستی (Biomarker) اختلالات طیف اوتیسم صحیح است بجز؟

- الف) دور سر کودکان ASD در هنگام تولد بیشتر از کودکان طبیعی است.
- ب) سایز استریاتوم در کودکان ASD با میزان رفتارهای تکراری آنها همبستگی مثبت دارد.
- ج) مبتلایان به ASD به جای چشم‌ها بر دهان افراد تمرکز می‌کنند.
- د) سطح سروتونین در پلاکتهای مبتلایان به ASD بالاتر است.

۳۲) کودکی 3 ساله با تأخیر تکلم برای ارزیابی روانپزشکی ارجاع شده است. کدام یک از موارد زیر بیشتر می‌تواند افتراق دهنده اختلالات زبان از اختلالات طیف اوتیستیک باشد؟

- الف) سابقه خانوادگی تأخیر تکلم
- ب) سطح هوشی کودک
- ج) استفاده از ژستهای غیرکلامی
- د) مشکلات در تلفظ حروف (Articulation)

۳۳) کدام یک از موارد زیر جزء مشکلات ضعف gross motor در کودکان دبستانی می‌باشد؟

- الف) Difficulty riding bikes
- ب) Difficulty building with blocks
- ج) Difficulty drawing
- د) Difficulty using scissors

۳۴) همه موارد زیر در مورد اتیولوژی اختلال بیش‌فعالی - کم‌توجهی (ADHD) صحیح است بجز؟

- الف) در 75% موارد انتقال از طریق ژنتیک و وراثت مطرح شده است.
- ب) ارتباط بین ژن DAT1 با اختلال ADHD مطرح شده است.
- ج) کاهش فعالیت امواج تتا در EEG مبتلایان به اختلال دیده شده است.
- د) در MRI مبتلایان کاهش حجم نواحی پره فرونتال دیده شده است.

۳۵) شکل‌گیری اختلالات سوء مصرف مواد در مبتلایان به اختلال بیش‌فعالی - کم‌توجهی در دوره نوجوانی بیشتر مرتبط با کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی به تنهایی
- ب) همراهی با اختلال conduct
- ج) social disability
- د) chaotic family factor

۳۶) والدین با فرزند 11 ساله خود به کلینیک روانپزشکی کودک مراجعه نموده و از پرتحرکی، تکانشگری، عدم توجه و تمرکز و افت عملکرد تحصیلی وی شاکی هستند. در مصاحبه با کودک متوجه علائم اضطرابی و افسردگی در کودک می‌شوید. کدام یک از موارد زیر در اولویت شروع درمان برای نامبرده می‌باشد؟

- الف) ایمنی پرامین
- ب) ریتالین طولانی اثر
- ج) انوموکستین
- د) فلوکستین

۳۷) والدین با کودک 8 ساله خود به کلینیک روانپزشکی کودک مراجعه و ذکر می کنند که از 2 ماه پیش با مصرف ریتالین، علائم بیش فعالی و کم توجهی کودک کنترل شده ولی از بیخوابی وی همچنان شاکی هستند. کدامیک از داروهای زیر در بهبود این مشکل در اولویت نمی باشد؟

- الف) دیفن هیدرامین
- ب) ترازودون
- ج) گوانفاسین
- د) اولانزاپین

۳۸) در والدین بیولوژیک کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی (ADHD) کدام اختلال اختصاصا دیده می شود؟

- الف) سوء مصرف مواد
- ب) رفتارهای مخرب
- ج) نقص یادگیری
- د) افسردگی اساسی

۳۹) محققین کدام یک از تئوری های زیر را به عنوان علت احتمالی اختلال یادگیری خواندن بیشتر مورد حمایت قرار داده اند؟

- الف) scotopic sensitivity syndrome
- ب) allergies
- ج) encoding processes and working memory
- د) cerebellar vestibular system

۴۰) همه موارد زیر در خصوص اختلال یادگیری ریاضی صحیح است بجز؟

- الف) اختلال به تنهایی در حدود 1 درصد کودکان سنین مدرسه ظاهر می شود.
- ب) در پسران بیشتر از دختران دیده می شود.
- ج) همراهی زیادی با نقایص خواندن و نوشتن دارد.
- د) پره ماچوریتی به عنوان ریسک فاکتور اختلال مطرح شده است.

۴۱) همه موارد زیر جزو grammatical mistakes در اختلال بیان نوشتاری می باشد، بجز:

- الف) forgetting word in sentences
- ب) using incorrect tenses
- ج) inverted letters
- د) placing words in the wrong order

۴۲) همه موارد زیر بعنوان اختلال همراه در کودکان با اختلال خواندن مطرح شده اند، بجز:

- الف) Attention deficit hyperactivity disorder
- ب) Oppositional defiant disorder
- ج) Conduct disorder
- د) Psychotic disorder



۴۳) همه موارد زیر در مورد اختلال تورت صحیح است، بجز:

- الف) سن متوسط شروع تیکها بین 4-6 سالگی است.
- ب) بعضی شواهد انتقال از طریق اوتوزوم غالب را مطرح نموده است.
- ج) شروع تیکها در ابتدا از ناحیه تنه و بازوها است.
- د) اختلال همراهی بالایی با ADHD و OCD دارد.

۴۴) کودک 8 ساله با تیکهای صوتی و حرکتی از دو ماه پیش به کلینیک روانپزشکی کودک مراجعه نموده است. والدین از پرحرفی، پرخاشگری و نقص توجه و حواس پرتی وی در انجام تکالیف شاکی هستند. کدام یک از داروهای زیر برای این کودک می تواند مناسب تر باشد؟

- الف) ریسپریدون
- ب) کلونیدین
- ج) اتوموکستین
- د) فلوکستین

۴۵) پسر 12 ساله ای با تیکهای صوتی مزمن به کلینیک روانپزشکی کودک مراجعه نموده است. والدین از شدت و تکرار تیکهای وی که منجر به افت عملکرد درسی دانش آموز شده، شاکی هستند، کدام یک از اقدامات زیر را ابتدا توصیه می کنید؟

- الف) habit reversal
- ب) relaxation training
- ج) bio feedback
- د) self monitoring

۴۶) در یک کودک 5 ساله مبتلا به Developmental coordination disorder، کدامیک از تظاهرات بالینی از نشانه های این اختلال در این گروه سنی می باشد؟

الف) نمی تواند لی لی کند.

ب) نمی تواند زیپ شلوارش را بالا بکشد.

ج) نمی تواند توپ را در هوا بگیرد.

د) نمی تواند از قیچی استفاده کند.

۴۷) در مورد اختلالات حرکتی استریوتایپیک کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) سر کوبیدن از دو سالگی و به دنبال قشقرق شروع می شود.

ب) سر کوبیدن در بیشتر موارد تا دوران اواسط کودکی ادامه می یابد.

ج) ناخن جویدن از یک سالگی شروع و تا 12 سالگی وقوع آن افزایش می یابد.

د) اکثر کودکان مبتلا به ناخن جویدن از ناتوانی ذهنی شدید رنج می برند.

۴۸) کدامیک از اختلالات زیر از کوموربیدیتی های شایع با Developmental coordination disorder نمی باشد؟

الف) اختلال بیش فعالی کمبود توجه

ب) اختلال خواندن

ج) اختلالات زبانی

د) اختلالات حرکتی استریوتایپیک

۴۹) کودک 2.5 ساله ای به علت دل درد شدید و نداشتن اشتها به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده است. در معاینه رنگ پریده، لاغر و گوشه گیر به نظر می رسد. به گفته مادر، کودک علاقه به جویدن روزنامه و پلاستیک دارد و برای وی تشخیص مسمویت با سرب داده شده است. در این کودک کدامیک از اقدامات زیر در اولویت نمی باشد؟

الف) از نظر وجود اختلال اوتیسم بررسی شود.

ب) از نظر سوء رفتار با کودک ارزیابی شود.

ج) از نظر سطح هوشی، کودک بررسی شود.

د) از نظر فرستادن به مهد کودک ارزیابی شود.

۵۰) کدامیک از جملات زیر در مورد **rumination disorder** صحیح است؟

الف) تشخیص در صورتی که کودک وزن طبیعی داشته باشد داده نمی شود.

ب) شروع اختلال قبل از 7 سالگی می باشد.

ج) در موارد شدید می تواند کشنده باشد.

د) حداقل شش ماه بعد از یک دوره عملکرد طبیعی گوارشی باید ایجاد شود.

۵۱) در کودکان مبتلا به **Avoidant/Restrictive food intake disorder** سیر و پیش آگهی چگونه است؟

الف) 20% شیرخوارانی که در یک سال اول زندگی بطور مداوم از خوردن غذا امتناع می کنند در دوران کودکی نیز مشکلات خوردن دارند.

ب) تشخیص و درمان در سال اول زندگی از تاخیر رشدی و سوء تغذیه در آینده جلوگیری می کند.

ج) شروع اختلال در سن 2 تا 3 سالگی تاثیری در رشد و تکامل ندارد.

د) در دوره نوجوانی این اختلال معمولا در فعالیت های اجتماعی تاثیر نمی گذارد.

۵۲) کدامیک از اقدامات زیر را در درمان **Enuresis** در اولویت نمی باشد؟

الف) تجویز ایمی پرامین

ب) استفاده از تشکچه زنگ دار

ج) تجویز ریاکستین

د) برطرف کردن بیبوست

۵۳) در مورد **encopresis** کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) در افراد با هوش طبیعی از سن 10 سالگی به بعد دیده نمی شود.

ب) در دختران و پسران با نسبت مساوی دیده می شود.

ج) یک ارتباط قوی بین این اختلال و **enuresis** دیده می شود.

د) 50% از موارد مزمن این اختلال اتیولوژی فانکشنال دارد.

۵۴) در مورد انجام **ECT** در نوجوانان کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) یکی از درمانهای اصلی در درمان افسردگی می باشد.

ب) در این گروه سنی بندرت استفاده می شود.

ج) در کارآزمایی های بالینی اثربخشی آن در درمان افسردگی گزارش شده است.

د) در گزارشات موردی در اختلالات خلقی شدید اثربخشی نداشته است.

۵۵) کودک 4 ساله ای است که تا به حال در چند مرکز بهزیستی زندگی کرده و اخیراً توسط یک خانوادۀ به فرزندخواندگی پذیرفته شده، در حال حاضر قد و وزنی زیر پرستایل 5 دارد. والدین از این شکایت دارند که او راحت به طرف غریبه ها رفته، روی پای آنها می نشیند و هیچ اضطرابی هنگام جدا شدن از والدین ندارد. با همسالان خود در مهد کودک نمی تواند ارتباط برقرار کند. در مورد این کودک، چه اختلالی را تشخیص می دهید؟

الف) Reactive Attachment Disorder

ب) Disinhibited Social Engagement Disorder

ج) Intellectual Disability

د) Autism Spectrum Disorder

۵۶) کدامیک از موارد زیر از عوامل خطر برای شکل گیری PTSD در کودکان نمی باشد؟

الف) وجود اختلال اضطرابی قبلی

ب) وجود اختلال افسردگی قبلی

ج) داشتن بهره هوشی بالا

د) داشتن مشکلات حافظه

۵۷) برای پیشگیری از PTSD در کودکان بعد از سوختگی، کدامیک از داروهای زیر ممکن است موثر باشد؟

الف) فلوکستین

ب) ریسپریدون

ج) پروپرانولول

د) گاباپنتین

۵۸) کدامیک از نشانه های زیر در کودکان زیر 6 سال مبتلا به PTSD دیده نمی شود؟

الف) sense of foreshortened future

ب) negative alteration in cognition

ج) negative alteration in mood

د) difficulty in falling asleep

۵۹) در صورت وجود پرخاشگری همراه با ODD احتمال وقوع کدام اختلال بیشتر است؟

الف) ADHD

ب) Conduct Disorder

ج) Bipolar Mood Disorder

د) Depressive Disorder

۶۰) عوامل زیر از ریسک فاکتورهای ابتلا به اختلال سلوک محسوب می شود بجز:

الف) Harsh parenting

ب) Divorce

ج) Chaotic home

د) Negligence

۶۱) بر اساس معیارهای DSM 5 کدامیک از علایم زیر در تشخیص DMDD دیده می شود؟

الف) Distractibility

ب) Physical restlessness

ج) Intrusiveness

د) Temper outbursts

۶۲) در کودکان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی قبل از سن بلوغ کدامیک از نشانه های زیر نسبت به نوجوانان مبتلا بیشتر است؟

الف) psychomotor agitation

ب) anhedonia

ج) hopelessness

د) delusion

۶۳) همبودی کدامیک از اختلالات زیر با اختلال DMDD شیوع بیشتری دارد؟

الف) ADHD

ب) ODD

ج) Anxiety Disorder

د) Depressive Disorder

۶۴) در مورد سیر و پیش آگهی اختلال افسردگی اساسی در کودکان کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف) احتمال ابتلا به اختلال دوقطبی در آینده نسبت به بزرگسالان افسرده بیشتر است.

ب) متوسط زمان یک اپیزود درمان نشده 2 تا 3 سال است.

ج) پیش آگهی در کودکان بهتر از نوجوانان می باشد.

د) وجود اختلالات کوموربید در پیش آگهی تاثیری ندارد.

۶۵) مرد جوانی به علت بی خوابی شبانه، تحت درمان دارویی قرار گرفته ولی مدتی پس از آن به طور مکرر شب ها از خواب بیدار می شود و

به مقدار زیادی غذا می خورد. به نظر شما این مساله ناشی از کدامیک از داروهای زیر می تواند باشد؟

الف) کلرپرومازین

ب) زولپیدم

ج) کوئتیاپین

د) ترازودون

۶۶) یک کودک به طور طبیعی تا چند سالگی می تواند حداقل اسم یک رنگ را بگوید؟

الف) 1.5

ب) 2

ج) 3

د) 4

۶۷) مطالعات تصویربرداری کارکردی مغزی افزایش فعالیت کدامیک از قسمت‌های مغز را در اختلال اضطرابی نوجوانان نشان می‌دهد؟

الف) Hippocampus

ب) Amygdala

ج) Prefrontal

د) Striatum

۶۸) در درمان اضطراب کودکان کدامیک از داروهای زیر بواسطه تأثیر بر سیستم گابرژیک بصورت augmentative نقش دارد؟

الف) Memantine

ب) Cycloserine

ج) Riluzole

د) Buspirone

۶۹) در کودکی که اضطراب در موقعیتهای performance به حداکثر می‌رسد کدام اختلال مطرح است؟

الف) Separation anxiety

ب) Social anxiety

ج) Panic disorder

د) Generalized anxiety

۷۰) در کودکی که ترس از گم شدن، ربنده شدن و نداشتن دسترسی به خانواده دارد احتمال کدام تشخیص بیشتر است؟

الف) Separation anxiety

ب) Social phobia

ج) Specific phobia

د) Generalized anxiety

۷۱) خانم 26 ساله با حملات پرخوری حدود دو ساعته طی شب و به دنبال آن احساس ناراحتی و گناه و استفراغ عمدی، مراجعه کرده است. حملات وی از حدود 1 سال قبل و 1 الی 2 بار در هفته تکرار می‌شود. BMI و وزن بیمار در محدوده طبیعی قرار دارد. به نظر شما کدامیک از موارد زیر جزو درمان خط اول برای وی محسوب نمی‌شود؟

الف) تغییر باورهای وی در مورد غذا

ب) تغییر مفهوم خود (self-concept)

ج) ارزیابی مکانیسم دفاعی فرافکنی

د) قطع کردن چرخه پرخوری و رژیم غذایی

۷۲) شایعترین **obsession** در خردسالان کدام است؟

الف) symmetry

ب) doubting

ج) ordering

د) contamination

۷۳) در همراهی تیک با اختلال وسواسی-جبری کدامیک شیوع کمتری دارد؟

الف) ordering

ب) counting

ج) washing

د) arranging

۷۴) خانم جوانی به دلیل آمنوره مورد مشاوره روانپزشکی قرار گرفته است. او با وجود BMI کمتر از نرمال (حدود 16) همچنان اصرار به ادامه رژیم غذایی کم کالری خود داشته و از چاقی خود شکایت دارد. در شرح حال و معاینه یافته ای به نفع القاء استفراغ، مصرف مسهل یا داروی مدر وجود ندارد. کدامیک از نتایج آزمایشات زیر در این بیمار کمتر قابل انتظار است؟

الف) لکوپنی

ب) افزایش آنزیم های کبدی

ج) آنمی

د) کاهش کلسترول خون

۷۵) کاهش قشر خاکستری مغز در اسکیزوفرنی کودکان از کدام منطقه شروع می شود؟

الف) Frontal

ب) Parietal

ج) Temporal

د) Occipital

۷۶) مزیت استفاده از کلوزاپین در مقایسه با اولانزاپین در درمان اسکیزوفرنی با شروع زودرس کدام است؟

الف) اثربخشی کلی بیشتر

ب) تأثیر بیشتر بر علائم منفی

ج) تأثیر بیشتر بر علائم مثبت

د) تأثیر بیشتر بر علائم شناختی

۷۷) مصرف الکل در نوجوانان می تواند به کاهش حجم کدام منطقه مغزی منجر شود؟

الف) Amygdala

ب) Hippocampus

ج) Cerebellum

د) Thalamus

۷۸) تفاوت مهم کوکائین با متیل فنیدیت از نظر ایجاد وابستگی:

الف) میزان اتصال به رسپتورهای دوپامینی

ب) تأثیر بر مناطق مختلف مغزی

ج) سرعت عبور از سد خونی مغزی

د) سرعت متابولیزه شدن و دفع از بدن

۷۹) شیوع کدامیک از اختلالات همراه روانپزشکی در آنورکسیا نروزا، در نوع محدود کننده بیشتر از نوع پرخوری / پاکسازی می باشد؟

- الف) اختلال وسواسی جبری
- ب) اختلال افسردگی متناوب
- ج) اختلال فوبیا
- د) اسکیزوفرنی

۸۰) کدامیک از موارد زیر در نوجوانان دچار intolerance of uncertainty بیشتر دیده می شود؟

- الف) افسردگی
- ب) وسواس
- ج) سایکوز
- د) اضطراب

۸۱) درباره Attenuated Psychosis Syndrome کدامیک صحیح است؟

- الف) عملکرد اجتماعی مناسب است.
- ب) علائم هذیان و توهم وجود ندارد.
- ج) در جریان مصاحبه امکان جهت دادن به بیمار وجود دارد.
- د) شخص مبتلا نسبت به تغییرات روانی خویش آگاهی و بصیرت ندارد.

۸۲) منظور از Eclectic در رواندرمانی چیست؟

- الف) ایجاد Working relationship بین درمانگر و کودک
- ب) ترکیب روشهای مختلف درمانهای سایکوسوشیال
- ج) جانبداری درمانگر از کودک در مدرسه و سازمانهای اجتماعی
- د) ترکیب مداخلات دارو درمانی با درمانهای گروهی

۸۳) در تکنیک های مصاحبه با نوجوان کدام مورد زیر کمتر بکار می رود؟

- الف) اجازه دادن به نوجوان برای بیان ماجرا بدون قطع کلام او
- ب) استفاده از بازیهای رومیزی (تخته) برای تحریک حرف زدن نوجوان ساکت
- ج) استفاده از واژه ها و استعارات کلامی نوجوان توسط درمانگر
- د) سوال نکردن جزئیات در مورد مصرف مواد، خودکشی و تجربیات جنسی

۸۴) در کودکان دارای اختلال اضطرابی، فواید دریافت Clinic-Plus-Internet CBT در مقایسه با روشهای کلینیکی قبلی شامل موارد زیر است بجز:

- الف) بعد درمان کاهش بیشتری در علائم اضطرابی داشتند.
- ب) بهبود به دست آمده تا دو سال پابرجا بود.
- ج) این روش قابل قبول خانواده ها بوده و میزان ریزش حداقل بوده است.
- د) می تواند کمبود درمانگرهای آموزش دیده را جبران کند.

۸۵) اجزای اصلی "Yoga" یوگا در درمان اختلالات روانپزشکی کودکان شامل موارد زیر است بجز:

الف) Keep relaxation

ب) Physical Postures

ج) Controlled Breathing

د) Cognitive restructuring

۸۶) کمک به سایر همسالان در گروه، حمایت از همدیگر برای بهبود اعتماد بنفس و غلبه بر مشکلات با کدام اصل گروه درمانی یالوم (Yalom) مطابقت دارد؟

الف) Universality

ب) Altruism

ج) Imparting Information

د) Improved Social Skills

۸۷) در مورد سطح سرمی داروها در کودکان کدام صحیح در مورد سطح سرمی داروها در کودکان کدام صحیح نمی باشد؟

الف) سطح سرمی نسبتاً پایین هالوپریدول برای پاسخ مناسب در اختلال تورت کفایت می کند.

ب) نسبت غلظت لیتیم در بزاق به سرم بطور متوسط سه به چهار می باشد.

ج) سطح سرمی ریتالین با پاسخ درمانی کودک همبستگی ندارد.

د) در شب ادراری سطح سرمی تری سیکلیک ها با پاسخ درمانی مرتبط نیست.

۸۸) در نوجوان غیرسایکوتیک، بالاترین ریسک فاکتورهای خودکشی شامل موارد زیر است بجز:

الف) سابقه خودکشی در والدین

ب) رفتارهای تکانشگری

ج) مصرف الکل و سایر مواد

د) از دست دادن والدین در ابتدای کودکی

۸۹) پدیده قلدری در مدارس مشخصاً در حوزه های زیر دیده می شود بجز:

الف) Verbal

ب) Physical

ج) Cyber

د) Medical

۹۰) براساس یک مطالعه کدام یک از الگوهای رفتاری زیر در نوجوانان با احتمال بیشتری از رفتارهای آزار والدین همراه بوده است؟

الف) Low Shame , Low blaming of others

ب) Low Shame , High blaming of others

ج) High Shame , Low blaming of others

د) High Shame , High blaming of others



۹۱) پدری که دخترش را مورد آزار جنسی قرار می دهد و او را تهدید می کند که به دیگران نگوید، در کدام مرحله قرار دارد؟

الف) Engagement

ب) Secrecy

ج) Suppression

د) Sexual interaction

۹۲) School Bullying مشخصاً در حوزه های زیر دیده می شود بجز:

الف) Verbal

ب) Physical

ج) Cyber

د) Medical

۹۳) در مقایسه Foster Children توسط مادرزرگها با «سیستمهای نگهداری» کدام صحیح نمی باشد؟

الف) در مراقبت توسط مادرزرگ احساس هویت و تعلق کمتر گسیخته بود.

ب) نیازهای بهداشت روان، طبی و تحصیلات اختصاصی کودک نزد مراقبین مادرزرگ بیشتر بود.

ج) معمولاً مادرزرگهای مادری و با تحصیلات پایین و در آمد پایین مراقب کودک بودند.

د) کودکان توجهات مثبت و با ثبات تری توسط مادرزرگها را گزارش می کردند.

۹۴) فاکتورهایی که بطور مستقل ریسک گسیختگی فرزند خواندگی را زیاد می کنند شامل موارد زیر است بجز:

الف) درجات بیشتر مشکلات رفتاری

ب) طول مدت مراقبت

ج) گزارش طرد شدن توسط همشیرها

د) سن کمتر کودک هنگام فرزند خواندگی

۹۵) پدر معتادی پسر 9 ساله اش را وادار به حمل و جابجایی و فروش مواد مخدر می کند. این اقدام پدر چه نوع سوء رفتاری در کودک

محسوب می شود؟

الف) فیزیکی Physical

ب) هیجانی Emotional

ج) جنسی Sexual

د) آداب و رسومی Ritual

۹۶) خصوصیات والدین آزاردهنده کودک شامل موارد زیر است بجز:

الف) ابراز هم حسی با کودک آزاردیده

ب) تاریخچه آزاردیدن در سالهای ابتدای زندگی

ج) انتظارات غیرواقعی داشتن از کودک

د) رابطه دلبستگی مختل والد - کودک

۹۷) در تجویز آتوموکستین کدام صحیح نمی باشد؟

الف) با دوز نیم میلیگرم به ازاء کیلوگرم شروع می شود.

ب) در تجویز همزمان با فلوکستین باید دوز آتوموکستین کاهش یابد.

ج) تحریک پذیری رفتاری و گیجی عوارض جانبی شایع آن است.

د) افزایش فشار خون و ضربان قلب با این دارو بطور معمول مشاهده می شود.

۹۸) خانم جوانی با غمگینی، خلق افسرده، عدم لذت، بیداری سحرگاهی، کاهش تمرکز، احساس گناه و افکار خودکشی به درمانگاه روانپزشکی مراجعه کرده است. وزن بیمار زیاد و BMI وی حدود 32 می باشد و بیماری طبی شناخته شده ای ندارد. با توجه به BMI وی از کدامیک از درمان های زیر بهتر است اجتناب شود؟

الف) دوکسپین

ب) ایمی پرامین

ج) آمی تریپتیلین

د) میرتازاپین

۹۹) یک پپتید دارای 28 اسید آمینه که به طور اولیه از معده ترشح شده و نورون های نوروپپتید Y را در هیپوتالاموس فعال می کند و باعث تحریک غذا خوردن می شود، کدامیک از موارد زیر می تواند باشد؟

الف) Melanocortin

ب) Ghrelin

ج) Tubby Protein

د) Leptin

۱۰۰) سطح کدامیک از هورمون های زیر در آنورکسیا نروزا افزایش می یابد؟

الف) Luteinizing hormone (LH)

ب) Growth hormone (GH)

ج) Triiodothyronine (T3)

د) Somatomedin C

اخلاق پزشکی (تعداد 2)

۱۰۱) اتونومی در پزشکی به چه معنی است؟

الف) اختیار پزشک

ب) اختیار بیمار

ج) خدمات خودکار پزشکی با ابزارهای فنی

د) خدمات پزشکی خاص

۱۰۲) در هنگام رازداری پزشکی کدام یک از مصالح زیر، نزد پزشک، واجد اهمیت کمتری نسبت به بقیه است؟

الف) مصلحت بیمار

ب) مصلحت اطرافیان

ج) مصلحت پزشک

د) مصلحت جامعه

موفق باشید

دانشجویان گرامی می توانند از روز پنجشنبه مورخ 95/11/6 (پس از اعلام کلید اولیه آزمون) لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 13/6/95 اعتراضات خود را صرفاً از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان به آدرس [sanjeshp.kmu.ac.ir](http://sanjeshp.kmu.ac.ir) ارسال نمایند. بدیهی است که پذیرش اعتراضات بعد از زمان اعلام شده مقدور نخواهد بود.



سایت کنکور

# سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

## رشته روانپزشکی کودک و نوجوان

نوجه!

۱- رایانه فقط علامتهایی را که به صورت  کامل پر شده باشد، می پذیرد و ممکن است علامتهای    را نپذیرد.  
۲- پاسخ سوالات فقط با مداد مشکی نرم (HB) در مقابل سؤال مربوطه مطابق نمونه صحیح علامتگذاری شود. -۳- اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست مسئول جلسه را آگاه سازید.

لطفاً در این مستطیل‌ها هیچگونه علامتی نزنید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰