

۱۵۶) افزایش فشار ریه ای سبب افزایش خروج قطرات آب می شود. نرینه ۱

۱۵۷) شدت پیرنگان و خفاش توانایی پرواز دارند که ریزوز در این سلول ها از دو جنبه نابرابر سبب شود. نرینه ۴

۱۵۸) سلول های پانکراس تحت تاثیر عوامل عصبی و هورمونی قرار می گیرند. پروتئین های پانکراس در روده خفاش تولید می شود. استولین سبب سافت گلوپالین در سلول های مایه می ای می شود. نرینه ۴

۱۵۹) بافت های مقدماتی حاصل از تبار سلول های دلفی با سوسپانسیون هیدروکسیل در ویتامین E. سلول می شود. نرینه ۱

۱۶۰) دریافت و تقویت اطلاعات می نقش اساسی تالاموس است به دلیل انجام گریه ی ۲

۱۶۱) گلیسیدهای قطعی از لحاظ عدد نوکلئیدی تقطیر سانسور و قطره سانسور می شود. از نظر میزان DNA و همین. سلول تولید می کنند. نرینه ۳

۱۶۲) نرینه ۳

۱۶۳) در موزوم های هسته ای تنگاتنگ سلول پیکری تعیین می شود. سلول غده ی پستانی در محیط متوقف کننده عمل گرفت و تقویت ابتدای دراز باشد. نرینه ۳

۱۶۴) مندل پس از رابین بود. نرینه ۱

۱۶۵) رفتار زنبور طار بر به طور مستقیم سبب بقا آن می شود. علاوه بر رفتار دنا (حاصل عمر انجام می شود). رفتار غریزی هر گونه تمسک است. رفتار بخار باره در جنبه مشاهده می شود. نرینه ۲

مدرضا صدیقی رتبه ی ۲. کنکور سراسری طالع و در ارتباط علم می

۱۴۷) در صین دم رنده ها بالا وصلو دریا خراگم صطوح می شود همین باز دم نیز صناع به عقب رنده ها
پایین و عقب دریا خراگم کنجا شکی می شود گنیه ۴

(۱۶۸) صفرا دارای ۲ ماده اکبریه لغت و معنی می باشد این ماده در کبد تولید شود در روده
مقاومت می کند و بواسطه پوسیدگی هاضم می گردد و از روده دفع می شود.

$x_H y \neq A O R_r$
 $\alpha_H x_H \neq B O R_r$

$\frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \frac{r}{E} = \frac{r}{128}$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 نوزده $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی
 نوزده $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی $\downarrow$ بی

(۱۷) ۵۰ میلیون سال پس از پیدایش نخستین مهر در این سالن قسمی زمین انقباضی روهی شش برگه گزیده!

۱۹۱) تفصیل مورد آخذ در سنا است مثال نقیض سایر موارد سلول های حاصل از میوز یا (این میوز) تزیین ۱

(۱۷۲) ملکی یوں دین جانوران است کہ با انقباض متناوب ماہی کی دو سی سون مہو ملک میں نوز
نوزہ ۳

(۱۷۳) پاپ k-ah صبح گاه میام رفاغ می کند یون سیم از کمال پتاسی عبور می کند و عبور سیم از کمال بدون در مقیاس به صورت دلی خواهد بود سینه ۴

(۱۷۴) رشتا و تبارش ژن در صفت های مختلف تاثیر بسیاری دارند و بر سازش خود تاثیر می گذارند
صفتها حامل اصل تغییر خوارگی نیستند

محمد رضا صدیق رشتہ برائے شہزادہ طابع و وزیر اعلیٰ ہند

(۱۷۵) شبه نوعی هسته پورن و فاقد اسلکت درونی می باشد گزینه ۲

(۱۷۶) در یکایوت ها کدومند (برعکس متصل نیست RNA پس مرز با دو کردن سر رشته می تواند
ریبونوکلئیک اسید را محال بر رشته ای است و هر دو در هسته گزینه ۴

(۱۷۷) تشکیل پیوند هیدروژنی در RNA + پروتئین نیاز به اکسیم است گزینه ۴

(۱۷۸) رشد پس از هویج که نوعی گیاه علفی است نیز صورت می گیرد. گزینه ۱

(۱۷۹) فتوسنتز کتده ها از نوعی فتوسنتز تیولبات یکی دیگر از می سازند آب منبع H_2O که اکسیژن هیدروژن
و منبع CO_2 وابسته به نور نیست پس اگر در این واکنش ها ضایع تولید $NADPH$ اگر از اس شود گزینه ۲

(۱۸۰) بیتریکس لوزان چرخش پیش می آید، گپک مخاطی پلاسموگومی به توره ها مقدار تبیین می شود
زئوسور تقسیم می شود نه رشد گزینه ۳

(۱۸۱) پیرات درون میتوکندری اسایش یافته در CO_2 اگر می کند در این مسیر NAD^+ مصرف می شود
گزینه ۴

(۱۸۲) آنیم کدور لنده نوعی آنیم بالدریایی است که می تواند ژن را از DNA تریکرب جدا کند گزینه ۱

(۱۸۳) معده چین خوردگی ها مقدار موقت دارد. کمپوات آن توسط انقباض استفاغ مجده می شود گزینه ۳

(۱۸۴) ترپسین باعث جلائی و تولید سیاه های بعد از آن می شود گزینه ۴

مردن عروق آبی ۲. لنگور ساری طالع در استار قلم می

(۱۸۵) گشای قائمه مترو و ضلع مستقیم در این اهری که در ضلع دارند گزینۀ ۳

(۱۸۶) گزینۀ ۱ مورد جـ درست است

(۱۸۷) ارتفاع پاره قبل از استخوان رگابی است گزینۀ ۲

(۱۸۸) در هاستیون که نوعی بیماری اتوزد (خواب است) صفت عضلات فلوسوس ریده می شود
تروفیت خرد [به صورت ۸۸ بوده در صفت از دولج با فرس (۸۹) به افعال ۵/۳ سام است
گزینۀ ۴

(۱۸۹) گزینۀ ۱ کامیوریتس را عضله می مانند که نوعی انگاری است

(۱۹۱) صفت مضاعف ششی سید افزایش خود را در کوروزمانی شود گزینۀ ۳

(۱۹۵) خارج هاضوی از لکنت هاضمه این جانداران مترو تروف- توانایی تبدیل مواد معدنی را می
نقار گزینۀ ۴

(۱۹۲) ماستویت های بافتی و بازوفیل ها هیستامین ترشح می کنند که آنها هضم دارند که برای شرن
پرست مگس باشد گزینۀ ۲

(۱۹۳) سرفه های کوکب نقص اهری در تغیر ضلع بافتی را دارند تحت تأثیر عوامل محیطی
و صورتی می باشد گزینۀ ۴

(۱۹۴) در پرزده ی مقلد با انتریش مقدار از استایکس نگامس این کلمه می شود گزینۀ ۱

مدرضا صدیق ربه ۲ گنگر سدری طالع و در استار حده می

گزینه ۲

P: $\frac{2}{3}$ W $\frac{1}{3}$ SS
F: $\frac{2}{3}$ W $\frac{1}{3}$ BS

BB $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$

BS سفید ۲ سیاه ۲

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

بال بلند
پر هاستی
تفاوت در رنگ

(۱۹۶) اولین جنش مقرون بودن می باشد که تفاوت در رنگ داریم گزینه ۴

(۱۹۷) گامت ها در بیه لقاح می یابند در حالی که در پروتوزوای تک سلولی می شود گزینه ۱

(۱۹۸) گزینه ۲

(۱۹۹) در هی سرفی ها و جویا گامت تر دارای شارک می باشد گزینه ۴

(۲۰۰) تمام مورد الف درست است در ارتباطی این دو ترف حول ماهیچه هم می شود در تجزیه ی کامل لوز لاکتیک اسید تولید می شود همین طول رشته ها است و میورین هیچگاه کوتاه نمی شود گزینه ۱

(۲۰۱) در گیاهان CAM تثبیت CO₂ در یک نوع سلول انجام می شود در حالی که در گیاهان C₄ این فرآیند در سلول های میانی و علف اکونیتا صورت می گیرد گزینه ۴

(۲۰۲) همه ی حرکت دارای گمت تاخیر جنش پیگیری بوده و این بخش فاقد نقص در کنترل خود می باشد گزینه ۱

(۲۰۳) بازنیومیت ها دارای بازنیو ها می باشد که بین از ادغام سلول های هاپلویت سلول دیپلویت می شود گزینه ۴

(۲۰۴) غده ی مورد نظر لید است نه نقص اساسی انگلر گزینه ۳

(۲۰۵) پلازمیدها چه آن مقاوم به آنتی بیوتیک داشته باشد چه نداشته باشد می تواند مستقل از سلول میزبان باشد
گزینه ۲

ماده ها صیقلی است به لکوسیت ها و وراثت هم می