www.konkur.in

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور ۹۸ - تجربی نظام جدید   دفترچه A

۲۲۶) گزینه ۴   عنصر مورد نظر $_{22}Ti$ است که همراه با نیکل در ساخت آلیاژ نیتینول به کار می‌رود. آلیاژ Ti جهت ساخت استنت در رگ‌ها به کار می‌رود. لازم به ذکر است که Ti، ۴ ظرفیت دارد.

---

۲۲۷) گزینه ۴   موارد آ و پ صحیح است - مورد ب رابطه عکس دارد - در مورد ت طول موج نور باید کوتاه‌تر باشد.

---

۲۲۸) گزینه ۱ - در یک گروه از جدول دوره‌ای، شعاع اتمی به علت افزایش لایه‌های الکترونی اشغال شده از بالا به پایین زیاد می‌شود.

---

۲۲۹) گزینه ۲   سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن $^{3}_{1}H$ است که یک پروتون و ۲ نوترون دارد. بنابراین:

$$\frac{N}{P}=\frac{2}{1}=2$$

---

۲۴۰) گزینه ۳   واکنش داده شده یک مول اکسیژن که معادل ۱۶ گرم جرم دارد تولید کرده است، بنابراین به ازای تولید ۳۲ گرم گاز اکسیژن به اندازه $2\times 1.4\times10^{-4} = 2.8\times10^{-4}\,g$ افت جرم خواهیم داشت:

$$E=mc^2 = 2.8\times10^{-7}\times 9\times10^{16} = 2.52\times10^{10}\,J = 2.52\times10^{7}\,kJ$$

---

۲۴۱) گزینه ۲

$$\theta(^\circ C) = -6-2\sqrt{4} = -10^\circ C$$

$$\theta(K) = -10+273 = 263\,K$$

---

۲۴۲) گزینه ۴

آ) $TiCl_4 + 4LiH \rightarrow Ti + 4LiCl + 2H_2(g)$

ب) $PCl_5 + 4H_2O \rightarrow 5HCl(g) + H_3PO_4$

جمع ضرایب استوکیومتری:
آ: ۱+۴+۱+۴+۲ = ۱۲
ب: ۱+۴+۵+۱ = ۱۱

در واکنش دوم تغییر عدد اکسایش صورت نمی‌گیرد و با آزاد شدن HCl، pH کاهش می‌یابد. واکنش آ، دو مول گاز و واکنش ب ۵ مول گاز تولید می‌کند.

گروه آموزش شیمی هدایت - بهرام همایون‌فر

Scanned by CamScanner
forum.konkur.in

www.konkur.in

۲۴۳) گزینه ۱

$$N_2O_5 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3$$

$$\frac{7.2 \times ?}{108} = \frac{0.2 \times 0.5}{2} \Rightarrow ? = 0.75 \rightarrow 75\%$$

---

۲۴۴) گزینه ۱

$$\frac{0.8 \times 1}{1} = \frac{?}{130} \longrightarrow \text{جرم مولی استر} \Rightarrow ? = 104\,g$$

---

۲۴۵) گزینه ۲

$$SiO_2 + 3C \longrightarrow SiC + 2CO$$

$$\frac{10^3}{40} = \frac{?}{2 \times 22.4} \Rightarrow ? = 1120$$

---

۲۴۶) گزینه ۴ زنجیر هیدروکربنی شوینده غیرصابونی داده شده کوتاه بوده، بنابراین جاذبه کمی با لکه چربی نسبت به شوینده‌های صابونی ایجاد می‌کند و نمی‌تواند آن را به خوبی پاک کند.

---

۲۴۷) گزینه ۲ زیرا در C_3H_7OH (پروپانول) بخش قطبی الکل بر بخش ناقطبی آن چیره بوده و بنابراین پیوندهای هیدروژنی در آن بر نیروهای واندروالسی بخش ناقطبی غلبه می‌کند.

---

۲۴۸) گزینه ۱

$$2AgNO_3 + MgCl_2 \longrightarrow 2AgCl + Mg(NO_3)_2$$

$$\frac{0.02}{2} = \frac{?}{95} \Rightarrow ? = 0.95$$

[illegible]

---

۲۴۹) گزینه ۳

Mg^{2+} $\qquad$ Na^{+}

$$\frac{72}{24} = \frac{m_2}{120} \qquad \frac{184}{46} = \frac{m_1}{142} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{184 \times 142 \times 24}{46 \times 120 \times 72} = 1.58$$

---

۲۵۰) گزینه ۱

$$\frac{1360}{10^6} = \frac{?}{100} \Rightarrow ? = 0.136 \text{ درصد جرمی}$$

$$\frac{1.36}{1 \times 40} = M \Rightarrow M = 0.034$$

---

۲۵۱) گزینه ۲ موارد ۲ و ۳ صحیح است.
در واکنش‌های گرماده، گرما از سامانه به محیط جریان می‌یابد و سطح انرژی فرآورده‌ها پایین‌تر از سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها است.

گروه آموزشی شیمی مولر

Scanned by CamScanner

forum.konkur.in

www.konkur.in

۲۸۳) گزینه ۴

$$\frac{۷\times۱۰^{۵}}{۵\times۴\times ?} = \frac{۷}{۲۵} \Rightarrow ? = ۱۲۵۰۰۰$$

---

۲۸۴) گزینه ۲

$$۱۵۶۰ + (-۱۷۸۰) + ۲۸۶ = +۶۶$$

واکنش ۳: عکس $\times \frac{۱}{۲}$ — واکنش ۲: $\times ۲$ — واکنش ۱: عکس $\times \frac{۱}{۲}$

---

۲۸۵) گزینه ۴

$$\frac{۱۰}{۱} = \frac{۱۰,۱۸ \times ۴,۲ \times ? \times ۵}{۲۲۸} \Rightarrow ? = ۱۰,۴۴$$

---

۲۸۶) گزینه ۳ — تشکیل شده‌ها ـ شکسته شده‌ها

$$\Delta H = \text{تشکیل شده‌ها} - \text{شکسته شده‌ها}$$

$$\Delta H = ۶۱۳ - ۲(۲۴۸) = -۸۴$$

نکته: در اثر شکستن یک پیوند دوگانه، ۲ پیوند یگانه C–C تشکیل می‌شود.

---

۲۸۴) گزینه ۱ — تغییر جرم ناشی از خروج گاز NO است.

$$\frac{۲۰۳ - ۲۰۰}{۶۰} = \frac{?}{۱۰۰} \Rightarrow ? = \Delta M = ۰,۵$$

واکنش تا دقیقه ۱۵ ادامه دارد.

---

۲۸۷) گزینه ۱ — ترکیب آلی است و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب دارد.

شمار اتم‌های کربن در ترکیب آلی حلقه بنزن‌دار برابر ۶ عدد است. از آن‌ها در گفته یک اسید استفاده می‌شود. عدد یک بیش از ۵ متفاوت است.

---

۲۸۸) گزینه ۴ — جرم فراورده‌ها، خارج از خروج مولکول آب کمتر از جرم واکنش‌دهنده‌ها است.

آمین

۲) وارد شده نوعی استر است. انحلال‌پذیری استر به علت بی‌قطبی‌تر بودن پیوند حلقه‌ای با آب کمتر است و خاصیت آبگیزی آن افزایش می‌یابد (مورد ۳)

---

۲۸۹) گزینه ۱ — ب و پ صحیح است.

---

۲۹۰) گزینه ۴ — ۱۱

$$۱۴ - ۳ = ۱۱$$

۳) آلکن‌ها با سکیو آلکان‌ها هم‌کربن از دو عنصر

۴) $C_۲H_۴Br_۲$ و $CH_۳Br$

(3)

Scanned by CamScanner

forum.konkur.in

www.konkur.in

۲۴۱) گزینه ۲

دی اسید	دی آمین
$C_2O_4H_2$	N_2H_4
۹۰	۳۲

$۹۰ - ۳۲ = ۵۸$

---

۲۴۲) گزینه ۴

$$\frac{10^{-x} \times 0.5}{1} = 2 \Rightarrow x = pH = 2.4$$

$$\frac{[H^+]}{[OH^-]} = \frac{10^{-2.4}}{\frac{10^{-14}}{10^{-2.4}}} = 1.4 \times 10^{9}$$

---

۲۴۳) گزینه ۴

$$K_a = \frac{(5.5 \times 10^{-4})^2}{2.5 \times 10^{-2}} = 1.21 \times 10^{-5}$$

---

۲۴۴) گزینه ۲

با توجه به تمرینات دوره آ فصل ۲ شیمی دوازدهم

Zn با هیدروژن، Ag_2O اکسنده

---

۲۴۵) گزینه ۴

Cr^{3+}	Ag^+
$\frac{1}{3} = \frac{?}{52}$	$\frac{?}{108} = \frac{1}{1} \Rightarrow ? = 108 - 17.32 = 90.68$

---

۲۴۶) گزینه ۳

$$\frac{10^{-2} \times 0.5}{18 \times 2} = \frac{?}{3 \times 22.4} \Rightarrow ? = 9.24$$

---

۲۴۷) گزینه ۴

هواردسب ترپ

---

۲۴۸) گزینه ۳

$S = \overset{\delta+}{C} = S$ $\quad$ $O = \overset{\delta+}{C} = O$

$\mu = 0$ $\quad$ $\mu = 0$

$r_S > r_O \Rightarrow$ نیروهای بین مولکولی

---

۲۴۹) گزینه ۲

NH_4^+ : جفت آ پیوند دهنده ۰

SO_4^{2-} : جفت آ پیوند هر دو آ ۴

---

۲۵۰) گزینه ۱

تلگرام: @moler_pub

گروه آموزشی شیمی مولر

مدرس مشاور - مؤلف طراح سوالات

۰۹۱۹۵۹۲۰۴۲۹

۰۲۱۸۸۹۹۱۰۸۶ - ۰۲۱۸۸۹۹۱۰۸۶ نشر مولر

Scanned by CamScanner

forum.konkur.in