



پاسخنامه شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ - دکتر میثم کوثری

با توجه به جایگاه عناصر A ، M ، E و X در جدول تناوبی و آرایش الکترونی اتم آنها، در کدام گزینه تشکیل هر دو ترکیب، ناممکن است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)



چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

(الف) هر زیرلایه با اعداد کوانتمی n و ۱ مشخص می‌شود.

(ب) ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها، تنها به عدد کوانتمی اصلی وابسته است.


(پ) از رابطه $a = 4l + 2$ ، گنجایش الکترونی زیرلایه‌ها (a) را می‌توان معین کرد.

(ت) در اتم Cu ، نسبت شمار الکترون‌های دارای $l = 0$ به $l = 2 = 1$ برابر $7/1$ است.

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

گزینه ۳ « مواد «الف»، «ب» و «ت» درست هستند.

«ب» ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها علاوه بر n ، به اعداد کوانتمی فرعی (l) نیز بستگی دارد.



$$\text{نسبت} = \frac{7}{1} = 7/1$$


آرایش الکترونی بیرونی ترین زیرلایه یون‌های تک اتمی A^{2-} ، D^{3+} ، E^{3+} ، $3p^6$ و $3d^5$ ختم می‌شود. کدام مطلب درباره آنها درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

(۱) عنصر E در گروه ۷ و عنصر D در گروه ۱۳ جدول تناوبی جای دارند.


(۲) واکنش پذیری عنصرهای E و D، بیشتر از واکنش پذیری فلز قلیایی هم دوره آنها است.

(۳) ویژگی‌های شیمیایی عنصر A، مشابه عنصر هم دوره خود در گروه ۱۸ جدول تناوبی است.


(۴) عدد اتمی یکی از عنصرهای هم گروه عنصر A، با شماره گروه آنها در جدول تناوبی یکسان است.



عنصر A متعلق به گروه ۱۶ جدول دوره ای است و در این گروه عنصر گوگرد



با عدد اتمی ۱۶ وجود دارد.




۱) آهن در گروه ۸ و اسکاندیم در گروه ۳ جای دارند.


۲) فلزات واسطه در مقایسه با فلزات قلیایی هم دوره، همواره واکنش پذیری کمتری دارند.

۳) فلزات نجیب در گروه ۱۸ فعالیت شیمیایی ناچیز دارند. سلنیم از گروه ۱۶ است و واکنش پذیر است.


با توجه به قاعده هشت تایی، ساختار لوئیس کدام مولکول‌های زیر درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)




۴) پ، ت




۳) الف، ت



۲) ب، پ



الف، ب




۳) ب

گزینه ۳ « ب »

کدام مطلب در مورد عنصر قبل از کربیتون (^{26}Kr) ، در دوره چهارم جدول تناوبی درست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)

- (الف) با عنصر Ar ، در جدول تناوبی هم گروه است.
 (ب) شعاع اتمی آن از شعاع اتمی عنصر Xe ، بزرگ‌تر است.
 (پ) خاصیت نافلزی آن در مقایسه با عنصر Mg کمتر است.
 (ت) حالت فیزیکی آن با حالت فیزیکی عناصرهای واسطه هم دوره خود متفاوت است.
 (ث) شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتمی $n=1$ اتم آن، برابر شماره گروه آن در جدول تناوبی است.

(۱) الف ، ت (۲) ب ، پ (۳) الف ، ب ، ث (۴) پ ، ت ، ث



عنصر مورد نظر برم است با عدد اتمی ۳۵ که در گروه ۱۷ (هالوژن‌ها) قرار دارد.

در گروههای نافلزی از بالا به پایین، خصلت نافلزی کاهش می‌یابد. بنابراین خصلت نافلزی کلریستیر از برم است.

فلزات واسطه هم دوره برم حالت جامد دارند، در حالی که برم در دمای اتاق مایع است. برم ۱۷ الکترون در زیرلایه p خود دارد.

«الف» عنصر A در گروه ۱۶ جای دارد. «ب» در هر دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می‌یابد. پتانسیم شعاع بزرگتری نسبت به برم دارد.

گزینه «۴»

فرمول شیمیایی چند ترکیب یونی زیر درست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)

ب) مس (II) سولفید: Cu_2S	ب) گالیم کلرید: GaCl_3	الف) منیزیم نیترید: Mg_2N_2
ج) روی فسفات: $\text{Zn}_2(\text{PO}_4)_2$	ث) باریم سیانید: $\text{Ba}(\text{CN})_2$	ت) کبالت (III) سولفات: $\text{CO}_2(\text{SO}_4)_2$
۶	۵	۴

گزینه «۱» موارد «الف» ، «ث» و «ج» درست هستند.

گالیم کلرید: GaCl_3 مس (II) سولفید: Cu_2S

اتم‌های موجود در یک مکعب به ابعاد ۴ سانتی متر از فلز منگنز، به تقریب دارای چند مول الکترون ظرفیتی است؟ (جرم هر سانتی متر مکعب از فلز منگنز را برابر $7/5$ گرم در نظر بگیرید). (ریاضی ۱۳۰۰)

$$\text{۶۷/۲} \quad \text{۶۵/۸} \quad \text{۶۱/۱} \quad \text{۵۷/۵}$$

گزینه «۲» جرم فلز منگنز $= 64 \times 75 = 480 \text{ g}$

$$\frac{480 \text{ g}}{55 \text{ g/mol}} = 8.72 \quad \text{۲۵ Mn : [Ar] } 3d^5 / 4s^2 \quad \text{مول الکترون ظرفیتی} = 8/72 \times 7 = 61/1$$

فلز A با هالوژن X ، ترکیبی با فرمول AX_2 تشکیل می‌دهد. این ترکیب بر اثر گرما مطابق واکنش $2\text{AX}(s) + \text{X}_2(g) \rightarrow 2\text{AX}(s) + \text{X}_2(g)$ —————

تجزیه می‌شود. هر گاه $1/12$ گرم از AX_2 بطور کامل تجزیه شود و $72/25$ میلی لیتر گاز X_2 تشکیل شود، جرم اتمی هالوژن X ، چند برابر جرم اتمی فلز A است؟ (حجم مولی گازها را برابر $28/5$ در نظر بگیرید). (ریاضی ۱۳۰۰)

$$\text{۱/۷۵} \quad \text{۱/۵} \quad \text{۱/۲۵} \quad \text{۱/۱۵}$$

$$\frac{7125 \text{ L X}_2}{28/5 \text{ L} \times 1} = \frac{7125 \text{ g X}_2}{M \text{ g} \times 1} \Rightarrow \text{جرم مولی X} = 160 \Rightarrow \text{جرم مولی A} = 80$$

$$\frac{7125 \text{ L X}_2}{28/5 \text{ L} \times 1} = \frac{7125 \text{ g AX}}{M \text{ g} \times 2} \Rightarrow \text{جرم مولی A} = 144 \Rightarrow \text{جرم مولی X} = 64 \quad \text{نسبت} = \frac{80}{64} = 1/25$$

گزینه «۲»



کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)

الف) در مواد مولکولی ناقطبی، با افزایش جرم مولی، نیروهای بین مولکولی افزایش می‌یابد.

ب) با این که جرم مولی گازهای N_2 و CO برابر است، CO زودتر از N_2 به مایع تبدیل می‌شود.

پ) آب و هیدروژن سولفید، هر دو مولکول‌های خمیده، قطبی و نقطه جوش نزدیک به هم دارند.

ت) چون جرم مولی F_2 از جرم مولی HCl بیشتر است، نقطه جوش آن از نقطه جوش HCl بالاتر است.

(۴) ب، ت

(۳) ب، پ

(۲) الف، ت

(۱) الف، ب

گزینه «۱»

با افزایش جرم مولی در مواد ناقطبی، نیروی بین مولکولی در آنها و در نتیجه دمای جوش آنها افزایش می‌یابد.

گرین مونوکسید یک ترکیب قطبی است و در مقایسه با نیتروژن که ناقطبی است، دمای جوش بالاتری دارد و زودتر می‌یعنان می‌شود.

«پ» چون آب توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد، دمای جوش آن به اندازه ۱۶۰ درجه بالاتر از دمای جوش هیدروژن سولفید است.

«ت» هیدروژن کلرید قطبی است و در مقایسه با فلوئور که ناقطبی است، دمای جوش بالاتری دارد.

یک نمونه ناخالص، دارای ۸۸ درصد جرمی Na_2SO_4 و ۱۰ درصد جرمی آب است. بر اثر جذب رطوبت، مقدار آب آن به ۲۰ درصد می‌رسد. درصد جرمی تقریبی این نمک در شرایط جدید کدام است و اگر جرم نمونه اولیه ۳۵/۵ گرم باشد، از واکنش کامل آن با باریم کلرید، چند گرم ماده محلول در آب تشکیل می‌شود؟ ($\text{Ba} = ۱۳۷, \text{O} = ۱۶, \text{Na} = ۲۳, \text{S} = ۳۲ \text{ g/mol}$) (ریاضی ۱۳۰۰)



۵۱/۲۶, ۷۴/۹ (۲)

۵۱/۲۶, ۷۸/۲ (۱)

۸۵/۲۲, ۷۴/۹ (۴)

۸۵/۲۲, ۷۸/۲ (۳)

گزینه «۱»

$$20 = \frac{10 + x}{100 + x} \times 100 \Rightarrow x = 12/5 \text{ g}$$

$$\frac{88 \text{ g}}{112/5 \text{ g}} \times 100 = 78/2$$

$$\frac{25/5 \text{ g} \times 88 \text{ Na}_2\text{SO}_4}{142 \text{ g} \times 100 \times 1} = \frac{\text{g BaSO}_4}{222 \text{ g} \times 1} \Rightarrow \text{g BaSO}_4 = 51/26$$

معادله «انحلال پذیری- دما» برای نمک A در آب بصورت: $S = ۰/۹۷\theta + ۳۵$ است. اگر نسبت اتحلال پذیری نمک A به نمک B در دمای ۰°C و ۴۰°C به ترتیب برابر ۱ و ۲/۴۶ باشد، نسبت غلظت مولار محلول سیرشده B به غلظت مولار محلول سیرشده A در دمای ۵۰°C به تقریب کدام است؟ (جرم مولی نمک A و B به ترتیب ۳۲۰ و ۱۱۰ گرم در نظر گرفته شود). (ریاضی ۱۳۰۰)

۲/۵۱ (۳)

۱/۶۵ (۳)

۱/۰۳ (۲)

۰/۶۹ (۱)

گزینه «۲»

$$\begin{cases} \text{نمک A} \\ S(\cdot) = ۰/۹۷(\cdot) + ۲۵ = ۲۵ \\ S(۴۰) = ۰/۹۷(۴۰) + ۲۵ = ۷۲/۸ \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{نمک B} \\ S(\cdot) = \frac{۳۵}{1} = ۳۵ \\ S(۴۰) = \frac{۷۲/۸}{۲/۴۶} = ۲۰ \end{cases}$$

$$\text{نمک A} \quad S(۵۰) = ۰/۹۷(۵۰) + ۲۵ = ۸۲/۸ \div ۲۲۰ = ۰/۲۵ \text{ mol}$$

$$\text{معادله نمک B} \quad S = -۰/۱۲۵\theta + ۲۵$$

$$\text{نمک B} \quad S(۵۰) = -۰/۱۲۵(۵۰) + ۲۵ = ۲۸/۷۸ \div ۱۱۰ = ۰/۲۶ \text{ mol} \Rightarrow \text{نسبت} = \frac{۰/۲۶}{۰/۲۵} = ۱/۰۲$$

۱۰ میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با ۲۱۰ میلی گرم منیزیم کربنات واکنش کامل می‌دهد. جرم اسید در ۱۰۰ میلی لیتر محلول آن، چند گرم و غلظت آن چند مولار است؟ ($\text{H} = ۱, \text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{S} = ۳۲ \text{ g/mol}$) (ریاضی ۱۳۰۰)



۰/۵, ۲/۴۵ (۲)

۰/۲۵, ۲/۴۵ (۱)

$$\frac{۰/۲۱ \text{ g Mg}}{۲۴ \text{ g} \times ۱} = \frac{۰/۱ \text{ L} \times X \text{ mol/L}}{۱} \Rightarrow X = ۰/۲۵ \text{ mol/L}$$

۰/۵, ۴/۹ (۴)

۰/۲۵, ۴/۹ (۳)

$$\text{جرم اسید} = ۰/۲۵ \text{ mol/L} \times ۰/۱ \text{ L} \times ۹۸ = ۲/۴۵ \text{ g}$$



دوره	۱	۲
گروه		A
D		
G		
X		

۱۶	۱۷
D	
G	
Z	

۴

۳

۴


۱)

گزینه «۲» موارد «الف» و «پ» درست هستند.

حصلت فلزی در جدول دوره ای ، از چپ به راست و از پایین به بالا کاهش می یابد. و شعاع اتمی در جدول تناوبی ، از بالا به پایین و از راست به چپ افزایش می یابد.

«ب» در یک گروه از بالا به پایین ، حصلت نافلزی یا همان تمایل به گرفتن الکترون و تشکیل آئیون ، افزایش می یابد.

«ت» در دوره های جدول تناوبی ، شعاع اتمی از چپ به راست کاهش می یابد. پس شعاع اتمی X از شعاع اتمی Z بزرگ تر است.



کدام موارد از مطالب زیر، درباره آلکانی با ساختار زیر درست است؟ (H=1, C=12 g/mol) (ریاضی ۱۰۰)

الف) نام آن -۲- اتیل -۷- متیل نونان است.

ب) جرم مولی آن ۴/۱۵ برابر جرم مولی پروپن است.

پ) فرمول مولکولی آن با فرمول مولکولی -۳- اتیل دکان یکسان است.

ت) شمار گروه های CH₂ در مولکول آن، ۱/۵ برابر شمار گروه های CH₃ است.

۴) ب، پ، ت

۳) الف، ب، پ

۲) پ، ت

۱)

گزینه «۲»

آلکان مورد نظر دارای یک زنجیره ۱۰ کربن است که دو گروه متیل به کربن های شماره ۲ و ۸ متصل اند. «۲ و ۸- دی متیل دکان» فرمول عمومی آن C₁₂H₂₆ بوده و جرم مولی آن ۱۷۰ گرم است. جرم مولی پروپن (C₃H₆)، ۴۰ گرم است.

$$\frac{170}{40} = 4.25$$

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (H=1, C=12, Br=80 g/mol) (ریاضی ۱۰۰)

الف) متان، سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

ب) ۲۵۰ مول از هر آلکن با ۴۰ گرم برم، واکنش کامل می دهد.

پ) در مولکول آلکن ها، دو اتم وجود دارند که هر یک، به سه اتم دیگر متصل اند.

ت) جرم مولی دومین عضو خانواده آلکان ها، ۷۵/۰ جرم مولی دومین عضو خانواده آلکین هاست.

۴)

۳)

۲)


۱)

گزینه «۳» موارد «ب»، «پ» و «ت» درست هستند.

الف) گاز اتن به علت وجود پیوند دوگانه در ساختار آن، توانایی انجام واکنشهای مختلف را دارد. به همین علت این ماده سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

ب) یک مول از هر آلکن با یک مول برم مایع (۱۶۰ گرم) واکنش می دهد. پس ۲۵۰ مول از یک آلکن با ۴۰ گرم برم واکنش می دهد.

پ) ۵ درست

ت) اتان (C₂H₆) دومین عضو آلکان ۲۰ گرم و پروپن (C₃H₆) دومین عضو آلکین ها ۴۰ گرم جرم دارند. $\frac{20}{40}$ نسبت

مراحل انجام یک واکنش کلی عبارت اند از :

ΔH این واکنش کلی برابر چند کیلوژول است؟

(آنتالپی پیوندهای N≡O, H-H, N≡N و میانگین آنتالپی پیوند H-O به

ترتیب برابر ۹۴۴, ۴۲۶, ۶۰۷ و ۴۶۳ کیلوژول است. (ریاضی ۱۰۰)

+ ۲۱۶ (۲)

- ۷۱۰ (۴)

+ ۷۱۰ (۳)

گزینه «۴» با جمع واکنش ها بر طبق قانون هس معادله کل بصورت رو برو است :

$$\Delta H = [2(N=O) + 2(H-H)] - [4(O-H) + 1(N≡N)]$$

$$= [2(607) + 2(426)] - [4(463) + 1(944)] = -710 \text{ kJ}$$

اگر $24/6 \text{ کیلوگرم اتانول} / 5 \text{ درجه سانتی گراد بررسد}$, گرمای ویژه آن چند $\text{J/g}^{\circ}\text{C}$ است و با همین مقدار گرما, به تقریب چند گرم گاز اکسیژن را می‌توان به اوزون تبدیل کرد؟ ($\Delta H = 295 \text{ kJ/mol}$). (ریاضی ۲۰۰) (۱۶)

$2/70, 24/6 (4) \quad 2/70, 24/6 (3) \quad 2/70, 24/6 (2) \quad 8/00, 24/6 (1)$

$$Q = mc\Delta\theta \quad 24/6 \text{ kJ} = 0.1 \text{ Kg} \times c \times (29 - 19) \Rightarrow c = 24/6 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$$

$$2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{O}_2(g) \quad \frac{g\text{ O}_2}{22 \text{ g} \times 2} = \frac{24/6}{295} \Rightarrow g\text{ O}_2 = 8/0$$


در مورد دو واکنش، چند مورد از مطالعه زیر درست است؟ (ریاضی ۲۰۰) (۱۶) (H=۱, C=۱۲, O=۱۶, Na=۲۳ g/mol)



(II) $\text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{HCl(aq)} \longrightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O(l)}$

- الف) مطابق واکنش (I), از سوختن یک مول اتانول، $44/8$ لیتر گاز در شرایط STP تولید می‌شود.
 ب) اگر از واکنش $2/5$ مول اسید، $6/0, 25$ گرم آب تشکیل شود، بازده واکنش برابر 90 درصد است.
 پ) به ازای جرم برابر از واکنش دهنده کربن دار، نسبت مولی CO_2 در واکنش (I) به واکنش (II)، برابر $4/6$ است.
 ت) اگر از واکنش 100 گرم Na_2CO_3 ناخالص، $1/5$ مول نمک تشکیل شود، درصد خلوص آن، برابر $79/5$ است.

۴ (۴) $\quad 3 (3) \quad 2 (2) \quad 1 (1)$




الف) از سوختن هر مول اتانول، 2 مول ($44/8$ لیتر) گاز CO_2 حاصل می‌شود.

$$\frac{1/5 \text{ mol HCl} \times 2 \text{ بازده}}{100 \times 2} = \frac{60/75 \text{ g H}_2\text{O}}{18 \text{ g} \times 1} \Rightarrow \text{بازده} = \% 90$$

$$\frac{m \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}}{46 \text{ g} \times 1} = \frac{\text{mol CO}_2}{2} \quad \frac{m \text{ g Na}_2\text{CO}_3}{106 \text{ g} \times 1} = \frac{\text{mol CO}_2}{1} \quad \text{نسبت} = \frac{106}{22} = 4/6$$

$$\frac{100 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \times \text{خلوص}}{106 \text{ g} \times 100 \times 1} = \frac{1/5 \text{ mol NaCl}}{2} \Rightarrow \text{خلوص} = \% 79/5$$

اگر 1 مول KClO_3 در گرما و در مجاورت کاتالیزگر در یک ظرف 5 لیتری، با سرعت ثابت 0.1 mol/s , مطابق واکنش زیر تجزیه شود، واکنش پس از چند ثانیه کامل می‌شود و نمودار تغییرات غلظت مولار O_2 نسبت به زمان کدام است؟ (ریاضی ۲۰۰)



برای تجزیه یک مول پتاسیم کلرات 10 ثانیه زمان لازم است.


$$\text{KClO}_3 = \frac{\Delta n}{\Delta t} \quad 0.1 = \frac{1 \text{ mol}}{\Delta t} \quad \Delta t = 10 \text{ s}$$

$$\frac{1 \text{ mol KClO}_3}{2} = \frac{\text{mol O}_2}{2} \Rightarrow \text{mol O}_2 = 0.5 \quad [\text{O}_2] = \frac{0.5 \text{ mol}}{5 \text{ L}} = 0.1 \text{ mol/L}$$

در 10 ثانیه می‌بایست غلظت آن از صفر به 0.1 مول بر لیتر بررسد.



کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)




ب) نسبت شمار جفت الکترون ناپیوندی به پیوندی در ساختار مونومر سازنده تفلون، برابر ۲ است.

پ) ناخن و پوست بدن، از پلیمرهای طبیعی با گروههای عاملی دارای اتمهای C و N تشکیل شده اند.

ت) میانگین جرم مولی پلی اتن حاصل از پلیمری شدن اتن، مستقل از مقدار کاتالیزگر مورد استفاده است.


(۱) الف ، ب

«گزینه ۳»



(۴) ب ، ت

مونومر تفلون دارای ساختار مقابل است که تعداد جفت الکترون ناپیوندی و پیوندی آن به ترتیب ۱۲ و ۶ می باشد.



ناخن و پوست انسان از پلی آمید طبیعی ساخته شده است، که در ساختار آن اتمهای کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن وجود دارد.


«الف» ساختار عمومی پلی استرها بصورت مقابل است.

«ت» «کاتالیزگرهای به کار رفته در فرایند تولید پلی اتن بر طول رشته و میانگین جرم مولی این ترکیب موثر است.


(۲) الف ، ت

«گزینه ۴»


در چند مورد زیر، دو ترکیب با یکدیگر همپارанд؟ (ریاضی ۱۳۰۰)




(الف)



۴ (۴)



(۳)



۲ (۲)

(۱)

«گزینه ۳»

موارد الف، ب و پ دارای فرمول مولکولی پکسان و ساختار متفاوت هستند، پس ایزومر یکدیگر محسوب می شوند.

در مورد ساختارهای ت، یکی از ساختارهای ۶ و دیگری ۷ کربن دارد.


(۲) (۲)

«گزینه ۴»

با توجه به نمودار زیر، که تغییرات لگاریتم غلظت مولار A را در یک واکنش فرضی در دمای معین نشان می دهد،

اگر ضریب استوکیومتری A در معادله واکنش، برابر ۲ باشد، نسبت سرعت واکنش در ۲۰ ثانیه آغازی به سرعت

متوسط مصرف A در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۰ کدام است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)



(۱) ۰/۴۲۷ (۲) ۰/۷۸۵ (۳) ۰/۷۷۵ (۴) ۰/۸۷۵

«گزینه ۴»

$$10^{0.15} = 2 \quad 10^{0.45} = 2 \quad 10^{0.125} = 7$$

$$\bar{R}_A = \frac{2 - 7}{20} = -0.25 \quad \text{واکنش} \quad \bar{R}_A = \frac{0.125}{2} = 0.0625 = 0.125$$

$$\bar{R}_A = \frac{2 - 2}{20 - 13} = 0.142 \quad \text{نسبت} \quad \frac{0.125}{0.142} = 0.875$$

درباره محلول هیدروکلریک اسید (محلول ۱) و محلول هیدرفلوئوریک اسید (محلول ۲)، با حجم، دما و pH یکسان، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

- (الف) شمار مول های آغازی دو اسید، برای تشکیل دو محلول، نابرابر است.
- (ب) شمار مولکول ها در محلول ۲ از شمار مولکول ها در محلول ۱ بیشتر است.
- (پ) شمار آنیون های حاصل از یونش دو اسید و رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است.
- (ت) مجموع شمار گونه های موجود در محلول ۱، از مجموع شمار گونه های موجود در محلول ۲، کمتر است.


۱) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

گزینه «۴» همه موارد درست است.

HCl یک اسید قوی و HF یک اسید ضعیف است. از آنجا که pH دو محلول و در نتیجه غلظت یون H^+ آنها با هم برابر است بنابراین مقدار HF باید بیشتر از مقدار HCl در محلول آنها باشد. درنتیجه تعداد آنیون های آنها نیز با هم برابر است.

از آنجا که تفکیک اسیدهای ضعیف در آب بصورت کامل انجام نمی شود و قسمت عمده آنها بصورت مولکول در محلول باقی میماند، بنابراین شمار گونه های محلول ۲ بیشتر از محلول ۱ میباشد.

درباره مولکول فرضی با ساختار رویرو، کدام مطلب درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)



- (۱) شمار اتم های کربن در آن، ۴/۵ برابر شمار اتم های اکسیژن است.
- (۲) دارای گروه عاملی هیدروکسیل و واحد تکرار شونده تشکیل پلی آمید است.
- (۳) شمار پیوندهای یکانه بین اتم های آن، ۵/۴ برابر شمار پیوندهای دوگانه بین آنها است.
- (۴) شمار اتم های هیدروژن، ۱/۲۵ برابر شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها در آن است.

گزینه «۲»

فرمول مولکولی ۱۵/۶ شده، فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3$ است. دارای گروه های عاملی هیدروکسیل و آمید میباشد.

«۱» شمار اتمهای کربن ۴ برابر شمار اتمهای اکسیژن است.

«۲» در این ترکیب ۲۸ پیوند یگانه و ۵ پیوند دوگانه قرار دارد یعنی ۵/۶ برابر.

«۴» در این ترکیب ۱۶ اتم هیدروژن و ۸ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، پس نسبت خواسته شده برابر با ۲ است.

کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

(الف) شربت معده و شیر، مخلوط هایی ناهمگن از نوع سوسپانسیون اند.

(ب) مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون، به یک کلوئید پایدار تبدیل میشوند.

(پ) پخش کردن نور، ناهمگن بودن و ته نشین شدن، از ویژگی های کلوئیدها به شمار می آید.

(ت) ذرات سازنده محلول ها، یون ها و مولکول ها، اما ذرات سازنده کلوئیدها، توده های مولکولی اند.

۱) الف ، پ (۲) الف ، ب ، پ (۳) ب ، ت (۴) ب ، پ ، ت

گزینه «۳»

«الف» شربت معده نوعی سوسپانسیون و شیر نوعی کلوئید است.

«پ» کلوئیدها مخلوطهایی پایدار بوده و ته نشین نمی شوند.

با توجه به نقشه های پتانسیل الکترواستاتیکی پروپان و دی متیل اتر، کدام مطلب درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

۱) تبدیل پروپان به مایع، دشوارتر است.

۲) در هر دو، اتم مرکزی بار جزئی مثبت دارد.

۳) نقشه های پتانسیل الکترواستاتیکی مشابهی دارند.

گزینه «۱»

۵) متیل اتر یک ترکیب قطبی بوده و نقطه ذوب و جوش بیشتری نسبت به پروپان که ناقطبی است، دارد. بنابراین زودتر به مایع تبدیل می شود.

۶) در هر دو ترکیب، اتمهای مرکزی بار جزئی منفی دارند.

۷) نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی پروپان به دلیل ناقطبی بودن با دی متیل اتر متفاوت است.

۸) پروپان برخلاف دی متیل اتر ناقطبی است و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند.



پروپان

دی متیل اتر

اگر در دمای اتاق، به ۱۲۵ میلی لیتر آب مقطر، ۷/۰ گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود، چند مورد از مطالب زیر درباره محلول حاصل، درست است؟
 (Riyazi ۱۳۰۰) $H=1, K=39, O=16 \text{ g/mol}$

الف) ۲۵۰ میلی لیتر آن، $2/5 \times 10^{-2}$ مول HCl را به طور کامل خنثی می کند.

ب) غلظت مولار یون OH^- (aq) در آن 10^{12} برابر غلظت مولار یون H^+ (aq) است.

پ) در ۵۰ میلی لیتر از این محلول، در مجموع $1/0$ مول از کاتیون و آئیون وجود دارد.

ت) اگر به این محلول، $1/1$ گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود، غلظت OH^- در آن 3 برابر می شود.

۴ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{حجم محلول} \times \text{جرم مولی مولاریته}} = \frac{1/7 \text{ g}}{56 \text{ g} \times 1/125 \text{ L}} = 1/1 \text{ mol/L}$$

گزینه «۴» همه موارد درست است.



$$\text{«ب» } [\text{OH}^-] = [\text{KOH}] = 1/1 \text{ mol/L} \quad [\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{[\text{OH}^-]} = \frac{10^{-14}}{1/1} = 10^{-13} \quad \frac{[\text{H}^+]}{[\text{OH}^-]} = \frac{1/1}{10^{-13}} = 10^{12}$$

«پ» $[\text{H}^+] = [\text{Cl}^-] = 1/1 \text{ mol/L} \times 1/0.5 \text{ L} = 1/0.5 \text{ mol} \quad \text{مجموع یون ها} = 1/0.1 \text{ mol}$

«ت» با اضافه کردن $1/4$ گرم به مقدار اولیه ($1/0$ گرم)، مقدار ماده موجود در محلول 2 برابر می شود. بنابراین غلظت محلول 2 برابر می شود.

محلول اسیدهای ضعیف HA و HD به ترتیب با درصد یونش 12 و $2/5$ و با pH برابر، در دو ظرف جداگانه موجود است. نسبت $[\text{HD}]/[\text{HA}]$ به $[\text{HA}]/[\text{HD}]$ بیش از یونش کدام و اگر $[\text{HA}]$ برابر 0.005 mol/L باشد، pH محلول دو اسید کدام است؟ (Riyazi ۱۳۰۰)

۳/۹۱، ۵/۶ (۴) ۲/۲۲، ۵/۶ (۳) ۳/۹۱، ۴/۸ (۲) ۲/۲۲، ۴/۸ (۱)

گزینه «۱» جون pH دو اسید با هم برابر است، پس $[\text{H}^+]$ در آنها برابر است.
 $n \times \alpha \times [\text{HA}] = n \times \alpha \times [\text{HD}] \quad \frac{[\text{HD}]}{[\text{HA}]} = \frac{12}{2/5} = 4/8$

$$1 \times 12 \times [\text{HA}] = 1 \times 2/5 \times [\text{HD}] \quad [\text{H}^+] = n \times \alpha \times [\text{HA}] = 1 \times 12 \times 1/0.005 = 6 \times 10^{-4}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 6 \times 10^{-4} = -(\log 6 + \log 10^{-4}) = -(0.78 + 0.2 - 4) = 2/22$$

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (Riyazi ۱۳۰۰)

الف) یکی از معایب فرایند هال، انتشار گاز گلخانه ای است.

ب) آلومینیم، یک فلز فعال و اکسید آن، چسبنده و متراکم است.

پ) در سلول الکترولیتی، کاتد و آند می توانند از یک جنس باشند.

ت) قوی ترین عنصرهای اکسیده، در سمت راست جدول تناوبی جای دارند.

ث) از کاربردهای برقکافت، استخراج فلزاتی مانند آلومینیم و تهیه گازهایی مانند هیدروژن است.

۵ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

گزینه «۴» همه عبارتهای بیان شده درست هستند.

الف) در فرایند هال گاز گلخانه ای کردن دی اکسید تولید می شود.




ب) آلومینیم، همانند سدیم و منیزیم یک فلز فعال است. اکسید آلومینیم نیز یک ماده متراکم و چسبنده است و از خوردگی این فلز جلوگیری می کند.

پ) در سلول های الکترولیتی چون ولتاژ بیرونی وجود دارد، الزامی به یکسان نبودن تیغه ها نیست.

ت) قوی ترین عناصر اکسیده، فلورور و اکسیژن هستند که در سمت راست و بالای جدول دوره ای قرار دارند.

ث) با استفاده از برقکافت آب و آلومینیم اکسید مذاب به ترتیب، گاز هیدروژن و فلز آلومینیم تولید می شود.

تفاوت مجموع ضرائب استوکیومتری مواد در معادله واکنش های a و d پس از موازنہ کدام است و چند نوع واکنش از نوع اکسایش - کاهش است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)




۲، ۲۴ (۲)

۲، ۱۴ (۴)

۲، ۱۴ (۱)

۲، ۱۴ (۳)

گزینه «۲»



واکنشهای a و c از نوع اکسایش - کاهش هستند.

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)

$E^\circ(\text{Mn}^{7+}/\text{Mn}) = -1/18 \text{ V}$

$E^\circ(\text{Pt}^{7+}/\text{Pt}) = +1/20 \text{ V}$

الف) اکسایش هیدروژن در سلول سوختی، بازدهی نزدیک به ۶۰ درصد دارد.

ب) در واکنش انجام شده در سلول های گالوانی، فراورده ها از واکنش دهنده ها پایدار ترند.

پ) در سلول گالوانی «منگنز - پلاتین»، در الکترود منگنز، عمل اکسایش انجام می گیرد.

ت) در هر واکنش اکسایش - کاهش، اتم های فلزی اکسایش و یون های فلزی کاهش می یابند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

گزینه «۳» موارد «الف»، «ب» و «پ» درست هستند.


سوژاندن گاز هیدروژن در موتور درون سوز بازدهی نزدیک به ۲۰ درصد دارد در حالی که اکسایش آن در سلول سوختی بازده را تا سه برابر (۶۰ درصد) افزایش می دهد.

واکنش های انجام شده در سلول های گالوانی گرماده هستند یعنی فراورده ها پایدارتر از واکنش دهنده ها هستند.

با مقایسه پتانسیل احیا بین منگنز و پلاتین، چون منگنز مقدار کوچکتری دارد، آن است و اکسایش می یابد.

«ت» در همه واکنشهای اکسایش - کاهش لزوماً اتمها و یونهای فلزی حضور ندارند.

با توجه به نمودارهای زیر، کدام مطلب نادرست است؟ (ریاضی ۱۳۰۰)



I

II

I

II

۱) در صورت تامین $a \text{ kJ}$ انرژی، هر دو واکنش I و II انجام پذیرند.

۲) گرمایی که به ازای مصرف ۱ مول $E(g)$ آزاد می شود، برابر $\frac{b}{3} \text{ kJ}$ است.

۳) در واکنش II، در مقایسه با واکنش I، فراورده ها (های) نسبت به واکنش دهنده ها (های)، پایدار ترند.

۴) گرمای آزاد شده به ازای تشکیل ۲ مول $AD(g)$ از گرمای واکنش به ازای یک مول $X(g)$ بیشتر است.

گزینه «۴»

آنالیپی واکنش II بیشتر از آنالیپی واکنش I است، پس گرمای حاصل از تشکیل ۲ مول AD کمتر از گرمای تشکیل یک مول گاز X است.

نسبت شمار آنیون به کاتیون در چند ترکیب زیر، برابر نسبت شمار آنیون به کاتیون در کروم (III) سولفید است؟

پ) آلمینیم سولفات

الف) کلسیم فسفات

ج) آهن (III) نیترات

ت) گالیم کربنات

۵ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

گزینه «۲» موارد «ب»، «پ» و «ت» درست هستند.

Cr_2S_3

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$



Sc_2O_3

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

$\text{Ga}_2(\text{CO}_3)_3$


Zn_2SiO_4

$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$



$X_2 \infty$
 $Y_2 \infty$
 $Z \infty$

$$(i) \quad K = \frac{[Z]^2}{[X_2][Y_2]} = \frac{(0.1)^2}{(0.1)(0.1)} = 1$$



شکل (ا) مخلوط در حال تعادل برای واکنش: $X_2(g) + Y_2(g) \longrightarrow 2Z(g)$ را نشان می دهد. هنگامی که واکنش در شکل (ب) به تعادل برسد، به ترتیب چند مول از گازهای X_2 و Y_2 و Z در ظرف واکنش وجود دارد؟ (هر ذره نشان دهنده ۱/۰ مول و حجم ظرف برابر $2/25$ لیتر است). (ریاضی ۱۴۰۰)

- (۱) $0.1, 0.1, 0.1$
 (۲) $0.1, 0.1, 0.2$
 (۳) $0.2, 0.3, 0.3$
 (۴) $0.3, 0.2, 0.2$

گزینه «۱»

$$K = \frac{[Z]^2}{[X_2][Y_2]} \quad 1 = \frac{(2X)^2}{(0.1 - X)(0.1 - X)} \Rightarrow X = 0.1$$

X_2	Y_2	Z
0.1	0.1	0.1

کدام مطلب زیر درست است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)

- (۱) ترفتالیک اسید، اسیدی دو عاملی است که در تهیه پلیمر PET مصرف می شود.
 (۲) در شرایط مشابه، انحلال پذیری ترفتالیک اسید در آب، کمتر از پارازایلن است.
 (۳) بنزن، اتیلن گلیکول و گازوتیل، از فرایند تقطیر نفت خام به دست می آیند.
 (۴) زنجیره مولکولی پلی پروپن، مانند پلی اتن بدون شاخه است.

گزینه «۱»

- «۲» ترفتالیک اسید به دلیل داشتن دو عامل اسیدی، انحلال پذیری بیشتری نسبت به پارازایلن دارد.
 «۳» برای تهیه اتیلن گلیکول باید گاز اتن را با محلول آبی و واقعی پتانسیم پرمونگنات واکنش داد.
 «۴» زنجیره مولکولی پلی پروپن در هر واحد تکرارشونده خود یک شاخه متیل دارد.