

به نام خالق هستی بخش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

سی و هفتمین دورهٔ آزمون دانشنامه تخصصی
رشته:

بیماری‌های دهان، فک و صورت

۱۴۰۰/۱۱/۱۹

تعداد سوالات: ۱۰۰
تعداد صفحات: ۱۸
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

مشخصات داوطلب:

نام:
نام خانوادگی:
شماره کارت:
شماره دانشجویی:

تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه‌ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از پایان آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۱ - آقای ۵۸ ساله با ضایعات وزیکولی راجعه از ۲۴ ساعت پیش بر روی لب‌ها و بینی، مراجعه نموده است. وی سابقه مصرف دیگلوکسین نیز دارد. تجویز کدام ترکیب دارویی برای وی ارجح است؟

- الف) قرص آسیکلوویر
- ب) قرص فامسیکلوویر
- ج) قرص والاسیکلوویر
- د) سوسپانسیون آسیکلوویر

Burket's Oral Medicine 2015

۲ - در بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی تحت درمان با تاکرولیموس، بهترین درمان موضعی برای التهاب گوشه لب ناشی از کاندیدیازیس، کدام است؟

- الف) کلوتریمازول
- ب) مایکونازول
- ج) موپیروسین
- د) پترولاتوم

Burket's Oral Medicine 2015

۳ - بهترین دارو برای کاهش درد بعد از عمل جراحی دندان عقل نهفته در بیماری که از Dabigatran استفاده می‌کند، کدام است؟

- الف) سلکوکسیب
- ب) ایبوپروفن
- ج) دگزامتازون
- د) استامینوفن

Burket's Oral Medicine 2015

۴ - کدامیک از داروها را به صورت سیستمیک در دوران حاملگی می‌توان تجویز نمود، ولی زمان شیردهی منع مصرف دارد؟

- الف) ایبوپروفن
- ب) دیفن هیدرامین
- ج) دگزامتازون
- د) آزیترومايسين

Burket's Oral Medicine 2015

۵ - خانم ۵۵ ساله با اروزيون‌های منتشر دهان همراه با ژنژیویت دسکواماتیو از یک ماه قبل مراجعه نموده که اکنون کوئرنکتیویت و ضایعات مخاط تناسلی نیز ظاهر شده است. تجویز کورتون موضعی جهت ضایعات دهانی پاسخ درمانی نداشته است. انتخاب بعدی درمان کدام است؟

- الف) سیکلوسپورین
- ب) پردنیزولون
- ج) داپسون
- د) مینوسیکلین

Burket's Oral Medicine 2015

۶ - محتمل‌ترین عامل بروز زخم نکروزه در لثه بعد از درمان دندانپزشکی در فرد با ایمنی نرمال، کدام مورد است؟

- الف) CMV
- ب) HSV
- ج) Candida
- د) Prevotella

Burket's Oral Medicine 2015

۷ - واکسیناسیون افراد مسن با واکسن VZV زنده ضعیف شده، موجب کاهش تمام موارد می‌شود به جز:

- الف) احتمال بروز زونا
- ب) بروز نورالژی پست هرپتیک
- ج) شدت عفونت عود کننده
- د) علائم بالینی عفونت اولیه

Burket's Oral Medicine 2015

۸ - خانم ۶۳ ساله با آروزیون‌های منتشر دهانی همراه با ژنژیویت دسکوآم و پاپول‌های خارش دار در ناحیه تنه، دست و پاها مراجعه نموده است. ضایعات به استروئید سیستمیک پاسخ نمی‌دهند. نتیجه بیوپسی، ارتشاح غالب نوتروفیلها در داخل تاول‌ها و شکاف تحت اپی تلیالی را نشان داده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) درماتیت هرپتی فرم
- ب) بیماری IgA خطی
- ج) اپیدرمولیز بولوز اکتسابی
- د) اریتم مالتی فرم

Burket's Oral Medicine 2015

۹ - کدام دارو جهت کاهش زخم‌های دهانی عود کننده در فرد مبتلا به بیماری بهجت که به کورتیکو استروئید و آزاتیوپرین پاسخ مناسب نمی‌دهد، باید تجویز گردد؟

- الف) داپسون
- ب) کلشی سین
- ج) اینفلکسی ماب
- د) تالیدوماید

Burket's Oral Medicine 2015

۱۰ - تجویز پماد کلوبتازول در درمان آفت می‌تواند موجب کاهش بروز تمام موارد گردد به جز:

- الف) تعداد زخم
- ب) زمان التیام
- ج) اندازه زخم
- د) شدت ضایعه

Burket's Oral Medicine 2015

۱۱ - نحوه گسترش موکورمایکوزیس در بدن فرد مبتلا، کدام مورد می‌باشد؟

- الف) تهاجم به شریان
- ب) اپی تلیوم تنفسی
- ج) گسترش لنفاوی
- د) تهاجم عصبی

Burket's Oral Medicine 2015

۱۲ - میزان شیوع کدام نوع کاندیدیازیس دهانی در بیماران مبتلا به عفونت HIV کمتر است؟

الف) گلوستیت لوزی شکل میانی

ب) فرم غشای کاذب

ج) شقاق گوشه لب

د) فرم پلاک مانند مزمن

Burket's Oral Medicine 2015

۱۳ - پلاک سفید کراتوتیک به قطر ۱ سانتی متر در مخاط لب آقای ۶۰ ساله مشاهده شده است که غالب سطح آن را برآمدگی‌های پاپیلری تشکیل می‌دهد. اندازه آن در طول یک سال اخیر تغییری نداشته و در نمای هیستوپاتولوژیک "دیسپلازی خفیف" مشاهده شده است. مناسب ترین تشخیص چیست؟

الف) پرولیفراتیو وروکولکوپلاکیا

ب) لکوپلاکیای وروکوز

ج) وروکوز کارسینوما

د) وروکا وولگاریس

Burket's Oral Medicine 2015

۱۴ - خانم ۵۵ ساله مبتلا به Desquamative Gingivitis است و خطوط سفید ظریفی با شکل رتیکولار نیز در مخاط باکال دو طرف مشاهده می‌شود. پس از تایید تشخیص با نمونه برداری، تمام رویکردهای درمانی مطرح است به جز:

الف) دهانشویه حاوی استروئید

ب) درمان‌های اولیه پریودنتال

ج) ژل استروئید با تری پیش ساخته

د) تزریق استروئید در لثه‌ها

Burket's Oral Medicine 2015

۱۵ - مرد ۶۴ ساله با تاریخچه مصرف Chutta و شکایت از سوزش دهان از ۲ ماه پیش مراجعه نموده است. در کام نرم پچ قرمز با حدود مشخص که در یک قسمت زخمی شده همراه با پاپول‌های سفید مشاهده شد. محتمل ترین تشخیص چیست؟

الف) کاندیدیازیس اریتماتوز

ب) اریتروپلاکیا

ج) واکنش لیکنوئید

د) فیبروز تحت مخاطی

Burket's Oral Medicine 2015

۱۶ - برای خانمی با ضایعات اریتماتوز منتشر بر روی لثه‌ها همراه با پاپول‌ها و خطوط سفید در مخاط باکال، دهانشویه سیکلوسپورین تجویز شده که پس از مدتی مصرف منجر به افزایش حجم لثه گشته است. برای ادامه درمان چه دارویی می‌توان جایگزین کرد؟

الف) تاکرولیموس

ب) مایکوفنولات مفتیل

ج) آزاتیوپرین

د) داپسون

Burket's Oral Medicine 2015

۱۷ - کمبود ویتامین B₁₂ در پاتوژنز کدامیک از انواع کاندیدیازیس نقش دارد؟

الف) گلوستیت میانی لوزی شکل

ب) التهاب گوشه لب

ج) فرم پسودومامبرانوز

د) فرم مزمن پلاک شکل

Burket's Oral Medicine 2015

۱۸ - افزایش پاتولوژیک سطح سرمی کدام یک موجب پیگمانتاسیون آبی - خاکستری در کام می‌گردد؟

الف) کاروتن

ب) لیکوپن

ج) بیلی روبین

د) آهن

Burket's Oral Medicine 2015

۱۹ - کدام بیماری زمینه‌ای ممکن است در پاتوژنز ملاسمای ناشی از بارداری مؤثر باشد؟

الف) هیپوتیروئیدیسم

ب) دیابت ملیتوس

ج) عفونت HIV

د) لوپوس اریتماتوز

Burket's Oral Medicine 2015

۲۰ - خانم ۴۲ ساله با شکایت از پیگمانتاسیون منتشر دهانی و تیره شدن پوست صورت همراه با ضعف و خستگی مراجعه نموده است. وی دارویی مصرف نمی‌کند. درخواست کدامیک از تست‌های آزمایشگاهی جهت تشخیص لازم است؟

الف) بیلی روبین مستقیم و غیر مستقیم

ب) کورتیزول، سدیم و پتاسیم

ج) آلکالین فسفاتاز، کلسیم و فسفر

د) فریتین، آهن سرم و TIBC

Burket's Oral Medicine 2015

۲۱ - محتمل‌ترین عامل عفونت، در بیمار تحت شیمی درمانی با شکایت از درد، سوزش و تغییرات چشایی همراه با نواحی از اپی تلیوم برهنه، کدام است؟

الف) باکتری بی هوازی

ب) ویروس

ج) قارچ

د) باکتری هوازی

Dental Management in the Medically compromised Patient

۲۲ - ندول ارغوانی با دیاسکوپبی منفی در کام بیمار مبتلا به ایدز از سه ماه قبل بروز کرده است. بررسی بافت شناسی، پرولیفراسیون نئوپلاستیک سلول‌های اندوتلیال را نشان می‌دهد. تجویز کدام مورد، بهترین درمان است؟

الف) جراحی رادیکال

ب) وین بلاستین داخل ضایعه

ج) متوتروکسات سیستمیک

د) رادیوتراپی با دوز بالا

Burket's Oral Medicine 2015

۲۳ - آقای ۶۸ ساله سیگاری، دو سال پس از پرتو درمانی SCC در ناحیه مندیبل، با عود مجدد ضایعه مراجعه کرده است. درمان انتخابی چیست؟

الف) Radiation Therapy

ب) Surgical Resection

ج) Targeted Therapy

د) Chemotherapy

Burket's Oral Medicine 2015

۲۴ - بیمار مبتلا به مالتیپل میلوما بدون سابقه پرتو درمانی در ناحیه سر و گردن که در حال مصرف آلدرونیت می‌باشد با اکسپوز استخوان آلوئول در ناحیه پرمولر به همراه درد و عفونت مراجعه کرده است. بهترین درمان چیست؟

الف) جراحی و دبریدمان استخوان

ب) اکسیژن هایپرباریک

ج) آنتی بیوتیک تراپی

د) کورتون سیستمیک

Burket's Oral Medicine 2015

Dental Management in the Medically compromised Patient

۲۵ - بهترین روش ارزیابی لنف نود بزرگ شده از دو ماه پیش در ناحیه لترال گردن بیمار ۵۴ ساله، کدام است؟

الف) Open Biopsy

ب) Fine Needle A.

ج) Exfoliative Cyto.

د) Nuclear CT

Burket's Oral Medicine 2015

۲۶ - آقای ۵۷ ساله با شکایت از درد، تورم ناگهانی و تریسموس سمت راست صورت مراجعه نموده است. در معاینه افزایش حجم غده پاروتید مشاهده می‌شود. غده در لمس سفت و دردناک و پوست ناحیه گرم می‌باشد. با اعمال فشار در مسیر مجرا اگزودای سفید از مدخل مجرا خارج می‌شود. حساس‌ترین و شایع‌ترین روش تصویربرداری کدام است؟

الف) CT با ماده حاجب

ب) سیالوآندوسکوپی

ج) اولتراسونوگرافی

د) MRI

Burket's Oral Medicine 2015

۲۷ - کشاورز ۶۸ ساله با شکایت از تورم لب پایین از حدود یک سال پیش، مراجعه نموده است. چندین ندول قابل لمس در مخاط داخل لب پایین که با فشار بر روی آنها اگزودای کدری خارج می‌گردد، مشاهده می‌شود. همه موارد در درمان این ضایعه مطرح می‌باشد به جز:

الف) کرم لب و ضد افتاب

ب) استروئید موضعی

ج) کولینرژیک‌های سیستمیک

د) آنتی بیوتیک سیستمیک

Burket's Oral Medicine 2015

۲۸ - داروی اختصاصی (FDA Approved) برای تسکین خشکی دهان ناشی از رادیوتراپی سرطان‌های سر و گردن چیست؟

- الف) پیلوکارپین
- ب) برم هگزین
- ج) سویمیلین
- د) آنتول تریتیون

Burket's Oral Medicine 2015

۲۹ - کدام روش تشخیص جهت ارزیابی اولیه ضایعات غدد بزاقی در کودک ۹ ساله ارجح است؟

- الف) Ultrasound
- ب) MRI
- ج) Sialography
- د) CT Scan

Burket's Oral Medicine 2015

۳۰ - خانم ۳۳ ساله با شکایت از خشکی دهان مراجعه کرده است. در بیوپسی غده بزاقی، گرانولوم‌های غیرکازنوز دیده شد. کدام یک از آزمایشات تکمیلی جهت بررسی بیشتر توصیه می‌شود؟

- الف) Anti-SSB
- ب) Amylase
- ج) ACE
- د) IL-6

Burket's Oral Medicine 2015

۳۱ - کدام عضله موقعیت گونه را طی حرکات جویدن، حفظ می‌نماید؟

- الف) بوکسیناتور
- ب) دیگاستریک
- ج) تمپورالیس
- د) تریگوئید خارجی

Burket's Oral Medicine 2015

۳۲ - بیمار مبتلا به لوپوس با سابقه مصرف طولانی مدت کورتون و شکایت از قرمزی و تورم یک طرفه مفصل، درد شدید در باز کردن و عدم توانایی در روی هم قرار دادن دندان‌ها مراجعه کرده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) کندروماتوز سینوویال
- ب) آرتریت پسوریاتیک
- ج) آرتریت عفونی
- د) سندرم رایتز

Burket's Oral Medicine 2015

۳۳ - در کدام بیماری، تغییرات مفصل گیجگاهی فکی با تشکیل کیست‌های تحت غضروفی (Subchondral Cysts) همراه است؟

- الف) استئو آرتریت
- ب) آرتریت روماتوئید
- ج) اسپوندیلو آرتروپاتی
- د) آرتریت نقرسی

Burket's Oral Medicine 2015

۳۴ - شایع‌ترین دفرمیتی فکی در جوانان دچار آرتریت ایدیوپاتیک کدام می‌باشد؟

- الف) ماکروگناسی
- ب) انکیلوز TMJ
- ج) اپن بایت قدامی
- د) کراس بایت خلفی

Burket's Oral Medicine 2015

۳۵ - کدام نورالژی برای بیمار با شکایت از درد یک طرفه، تیز، شدید، به مدت یک دقیقه در قاعده زبان همراه با سرفه‌های غیر قابل کنترل، مطرح می‌باشد؟

- الف) Glossopharyngeal
- ب) Pretrigeminal
- ج) Classical Trigeminal
- د) Post traumatic Trigeminal

Burket's Oral Medicine 2015

۳۶ - تمامی داروها در بیمار فاقد اختلال موضعی و سیستمیک که با شکایت از سوزش زبان، کام سخت و لب‌ها مراجعه نموده است کاربرد دارد به جز:

- الف) Paroxetine 20mg
- ب) Sertraline 50mg
- ج) Clonazepam 2mg
- د) Gabapentin 300mg

Burket's Oral Medicine 2015

۳۷ - بهترین تشخیص حملات درد یک طرفه با شدت متوسط تا شدید در اطراف دهان به مدت چند دقیقه تا چند ساعت که گاهی با ریزش اشک و حساسیت به سرما و گرما دندان‌های همان طرف همراه است، کدام می‌باشد؟

- الف) Cluster Headache
- ب) Temporal Arteritis
- ج) Migraine
- د) Neurovascular Orofacial Pain

Burket's Oral Medicine 2015

۳۸ - داروی انتخابی در پیشگیری از سردردهای خوشه‌ای کدام است؟

- الف) گاباپنتین
- ب) تاپیرامات
- ج) لاموتریژین
- د) لیتیوم

Burket's Oral Medicine 2015

۳۹ - همه سردردها به تجویز ایندومتاسین پاسخ می‌دهند، به جز:

- الف) Chronic Paroxysmal
- ب) Exertional
- ج) Ice Pick
- د) Migraine

Burket's Oral Medicine 2015

۴۰ - تجویز کدام دسته دارویی، جهت پیشگیری از سردرد یکطرفه، همراه با تهوع و استفراغ، حداقل یکبار در هفته مناسب می‌باشد؟

الف) β -Adrenergic Blockers

ب) Stimulation of 5-HT

ج) Ergotamine Derivatives

د) Dopamine Antagonists

Burket's Oral Medicine 2015

۴۱ - دختر ۱۲ ساله با تورم بدون درد ناحیه قدام ماگزیلا از ۶ ماه قبل، مراجعه نموده است. در معاینه اکسپنشن ناحیه مذکور با مخاط طبیعی روی آن مشخص می‌گردد. نمای رادیوگرافی ضایعه کاملاً لوسنت با حدود مشخص و کورتیکه مرتبط با تاج دندان نهفته | ۳ که ریشه را هم در بر گرفته، می‌باشد. بهترین تشخیص کدام است؟

الف) Dentigerous Cyst

ب) Calcifying Odontogenic Cyst

ج) Adenomatoid Odontogenic Tumour

د) Odontogenic Keratocyst

Burket's Oral Medicine 2015

Oral Radiology, Principles interpretation 2019

۴۲ - بیمار ۱۵ ساله با تورم همراه با درد، پاراستزی و لقی دندان‌ها در فک پایین مراجعه کرده است. سابقه تب همراه با لکوسیتوز و افزایش ESR وجود دارد. بهترین تشخیص کدام است؟

الف) یوینگ سارکوما

ب) هیستوسیتوزیس

ج) استئوسارکوما

د) کندروسارکوما

Oral Radiology, Principles interpretation 2019

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۴۳ - بیمار مشکوک به استئوژنیک سارکوما، در ناحیه تنه ماندیبل دچار تورم لته و لقی دندان می‌باشد. در نمای رادیوگرافی، ضایعه رادیولوسنت با مارجین Ill-defined و تخریب کورتکس دیده می‌شود. کدام گزینه برای افتراق از دسموپلاستیک فایبروما کمک کننده است؟

الف) ابتلا تنه ماندیبل

ب) لقی دندان

ج) رادیولوسنسی نا واضح

د) تخریب کورتکس

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۴۴ - همه ضایعات می‌توانند ریم لوسنت داشته باشند به جز:

الف) Odontoma

ب) Osteoblastoma

ج) Ossifying Fibroma

د) Fibrous Dysplasia

Oral Radiology, Principles interpretation 2019

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۴۵ - در صورت وجود سپتاهای نازک، نمای رادیوگرافیک ادنتوژنیک فیبرومای مرکزی مشابه کدام مورد می‌شود؟

- الف) ژانت سل گرانولوما
- ب) آملوبلاستوما
- ج) ادنتوژنیک میگزوما
- د) آملوبلاستیک فیبروآدنتوما

Oral Radiology, Principles interpretation 2019

۴۶ - نمای کدام ضایعه استخوانی در سینوس‌های پاراناژال مشابه سینوزیت می‌باشد؟

- الف) Familial Gigantiform Cementoma
- ب) Juvenile Ossifying Fibroma
- ج) Chondromyxoid Fibroma
- د) Aggressive Osteoblastoma

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۴۷ - نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی در همه موارد نرمال است به جز:

- الف) استئولیزماسیو
- ب) چروبیسم
- ج) بیماری پاژت
- د) فیبرودیسپلازی مونواستاتیک

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۴۸ - تمام موارد در عود مجدد آملوبلاستوما مؤثر است به جز:

- الف) مولتی لاکولار بودن تومور
- ب) عدم برداشت کامل ضایعه
- ج) مسن بودن بیمار
- د) پرفوراسیون کورتکس استخوان

Oral Radiology, Principles interpretation 2019

۴۹ - کودکان مبتلا به کدام بیماری دچار برجستگی پیشانی و هیپرتلوریسم می‌باشند؟

- الف) کلئیدوکرانیال دیسپلازی
- ب) استئوپتروزیس
- ج) دیسپلازی فیبروز پلی استاتیک
- د) استئوژنزیس ایمپرکتا

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۰ - محتمل‌ترین تشخیص ضایعه پدانکوله با لبه‌های دندانه‌دار (Serrated) در کام سخت بیماری با پروتز کامل کدام است؟

- الف) Giant Cell Epulis
- ب) Giant Cell Fibroma
- ج) Fibroepithelial Polyp
- د) Ossifying Epulis

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۱ - کدام ضایعه از نظر بالینی، با پاپیلوما اشتباه می‌شود؟

الف) Fibrous Histiocytoma

ب) Solitary Fibrous Tumor

ج) Giant Cell Fibroma

د) Myofibromatosis

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۲ - زبان شایع‌ترین محل بروز تمامی تومورهای بافت نرم دهان است به جز:

الف) Osseous choriostoma

ب) Metastatic

ج) Schwannoma

د) Granular cell

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۳ - کدامیک به واسطه‌ی بروز پاپول‌های متعدد غیر پاپیلوماتوز در مخاط دهان مشخص می‌شود؟

الف) Heck's Disease

ب) Oral Florid Papillomatosis

ج) Verruca Vulgaris

د) Ichthyosis Hystrix

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۴ - محتمل‌ترین تشخیص برای توده ندولر با قوام سفت و رشد آهسته در زبان دختر ۸ ساله که در نمای آسیب‌شناسی سلول‌های کم دوکی شکل در استرومای میگزوئید گزارش شده، کدام است؟

الف) Neurofibroma

ب) Neurilemoma

ج) Traumatic Neuroma

د) Fibrolipoma

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۵ - بیماری با ضایعات پاپولو ندولر نرم در زبان، مخاط باکال و کام مراجعه کرده است. وی لاغر اندام با صورتی باریک و لب‌های برجسته است. بروز کدامیک با پیش آگهی ضعیف‌تری همراه است؟

الف) فئوکروموسایتومای آدرنال

ب) کارسینوم مدولای تیروئید

ج) گانگلیونورومای گوارشی

د) کارسینوم مجاری سینه

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۶ - در بیماران دچار سندرم داون، احتمال بروز کدام اختلال دندانی وجود دارد؟

الف) دنتین دیسپلازی

ب) هیپرسمنتوز

ج) تارودونتیس

د) دنتینوژنریس ایمپرکتا

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۷ - در بیماران مبتلا به الیگودونشیا، تاریخچه ابتلای خانوادگی کدام کانسر، باید بررسی شود؟

- الف) مری
- ب) دهان
- ج) کولو رکتال
- د) نازوفارنکس

Oral and Maxillofacial pathology 2016

۵۸ - بر مبنای پروتکل انجمن قلب آمریکا برای بیمار دارای پیس میکروقلبی، پروفیلاکسی آنتی بیوتیک برای کدام مورد لازم است؟

- الف) درناژ آبسه دندانی
- ب) جرم گیری و کورتاژ
- ج) معالجه ریشه دندان
- د) کشیدن تک دندان

Burket's Oral Medicine 2015

۵۹ - تمام علل سبب افزایش مرگ و میر در بیماران با فشار خون 130/85 mmHg می‌شود به جز:

- الف) Promotion of Atherosclerosis
- ب) Thrombogenesis
- ج) Left Ventricular Hypertrophy
- د) Transient Ischemic Attack

Burket's Oral Medicine 2015

۶۰ - آنژیوادم لب یا زبان عارضه جانبی مصرف کدام دارو می‌باشد؟

- الف) Furosemide
- ب) Chlorthiazide
- ج) Captopril
- د) Spironolactone

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۱ - حین کار دندانپزشکی، بروز تمام موارد در بیمار مبتلا به آریتمی که پروپرانولول مصرف می‌کند محتمل است به جز:

- الف) Hypotension
- ب) Bradycardia
- ج) Vomiting
- د) Fatigue

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۲ - وجود کسیفیکاسیون ناحیه C3 در نمای پانورامیک، نشان‌دهنده آترواسکلروز کدام شریان است؟

- الف) آئورت
- ب) آلوئولر اینفریور
- ج) ریوی
- د) کاروتید

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۳ - بیمار مبتلا به سل تحت درمان درازمدت با داروهای ایزونیازید و ریفامپین بوده است. قبل از درمان‌های جراحی، بررسی کدام المان خونی ضروری است؟

- الف) نوتروفیل
- ب) پلاکت
- ج) لنفوسیت
- د) اریتروسیت

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۴ - پسری ۵ ساله با سابقه حملات آسمی متوسط تحت درمان با تتوفیلین و اسپری سالمتروپول، جهت پالپوتومی دندان ارجاع شده است. کدام اقدام برای بیمار بی خطر است؟

- الف) بیهوشی عمومی برای اقدامات سرپایی
- ب) تجویز ایبوپروفن برای کنترل درد
- ج) تزریق بی حسی موضعی فاقد اپی نفرین
- د) تجویز آزیترومایسین برای کنترل عفونت

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۵ - کودک ۴ ساله دچار عفونت‌های مکرر ریوی، نارسایی رشد، Clubbing انگشتان دست و کراکل‌های ریوی می‌باشد. بهترین روش تشخیص بیماری زمینه‌ای کدام است؟

- الف) تست اسپرومتری
- ب) اندازه‌گیری میزان بزاق
- ج) اندازه‌گیری غلظت کلر در عرق
- د) برونکوسکوپی

Burket's Oral Medicine 2015

۶۶ - شایع‌ترین تظاهرات دهانی عفونت‌های ویروسی مجاری تنفسی فوقانی، مربوط به کدام ناحیه است؟

- الف) کام نرم
- ب) لوزه کامی
- ج) دورسال زبان
- د) لوزه زبانی

Burket's Oral Medicine 2015

۶۷ - شاخص RERA (Respiratory Effort Related Arousal) برای تشخیص کدامیک از اختلالات خواب کاربرد دارد؟

- الف) سندرم مقاومت مجرای تنفسی فوقانی
- ب) آپنه انسدادی خفیف
- ج) آپنه انسدادی شدید
- د) آپنه مرکزی خواب

Dental Management in the Medically compromised Patient

۶۸ - بیمار مبتلا به انسداد شدید مجاری صفراوی، جهت جراحی دندان عقل مراجعه کرده است. انجام تمام اقدامات صحیح است به جز:

- الف) تجویز ویتامین k
- ب) پرهیز از بیهوشی عمومی
- ج) مشاوره پزشکی
- د) پروفیلاکسی آنتی بیوتیک

Burket's Oral Medicine 2015

۶۹ - در مبتلایان به عفونت ویروس هپاتیت B، افزایش کدام المان خون نشانه تکثیر بالای ویروس است؟

الف) HBS-Ag

ب) Anti-HBs

ج) HBe-Ag

د) HBC-Ab

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۰ - برای دندانپزشکانی که واکسیناسیون هپاتیت را انجام داده‌اند مراقبت از ورود تصادفی سوزن به دست، برای کدام نوع هپاتیت اهمیت بیشتری دارد؟

الف) A

ب) B

ج) C

د) D

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۱ - امکان بروز همه موارد در بیمار مبتلا به کولیت سودوممبران و تحت درمان با مترونیدازول وجود دارد، به جز:

الف) تهوع

ب) احساس طعم فلزی

ج) کاندیدیازیس

د) زخم دهانی

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۲ - برای درمان عفونت دندانی بیمار مبتلا به اولسرپیتیک تحت درمان با آنتی اسید، تجویز کدام آنتی بیوتیک به ملاحظه کمتری نیاز دارد؟

الف) اریترومايسين

ب) پنی سیلین V

ج) تتراسیکلین

د) پنی سیلین G

Burket's Oral Medicine 2015

۷۳ - بیماری با سابقه نارسایی کلیوی از ۳ سالگی مراجعه نموده است. علائم استئودیستروفي کلیوی در فکین مشاهده نمی‌شود. احتمال بروز کدامیک کمتر است؟

الف) تأخیر در رویش دندانها

ب) باریک شدن پالپ دندانها

ج) لقی منتشر دندانها

د) هیپوپلازی مینا

Burket's Oral Medicine 2015

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۴ - در همه موارد جهت انجام جراحی وسیع پریدونتال برای بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی بعد از انجام مشاوره، ممکن است نیاز به شرایط بیمارستانی باشد، به جز:

الف) نارسایی کلیوی در زمینه بیماری لوپوس

ب) ابتلا به دیابت کنترل نشده

ج) مرحله انتهایی بیماری (Stage 4)

د) تحت دیالیز صفاقي

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۵ - افزایش کدام مورد با میزان بیشتر مرگ و میر در بیماران تحت همودیالیز همراه است؟

الف) BUN

ب) PTH

ج) Ca

د) ESR

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۶ - کدام ضایعه در سیفیلیس، بعنوان ریسک فاکتور بروز SCC دهانی مطرح می‌باشد؟

الف) Syphilic Glossitis

ب) Oral Gumma

ج) Chancre

د) Lues Maligna

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۷ - قبل از انجام پرتونگاری با ماده حاجب حاوی ید، توصیه به قطع موقت کدام داروی کنترل‌کننده دیابت ملیتوس می‌شود؟

الف) گلی بوراید

ب) کلرپروپامید

ج) متفورمین

د) ریپاگلی نید

Burket's Oral Medicine 2015

۷۸ - در میان علائم و نشانه‌های شوک هیپوگلیسمیک، کدام مورد دیرتر بروز می‌کند؟

الف) هیپوتانسیون

ب) تاکی کاردی

ج) رنگ پریدگی

د) پارستزی

Dental Management in the Medically compromised Patient

۷۹ - ارزیابی کدام یک در خانم مبتلا به سندرم شوگرن توصیه می‌شود؟

الف) TSH

ب) FBS

ج) ACTH

د) FSH

Burket's Oral Medicine 2015

۸۰ - در بیماری که در نتیجه وارد کردن ضربه آهسته به عصب فاسیال دچار انقباض عضلات صورت می‌شود، تمام موارد صحیح است به جز:

الف) کاهش PTH

ب) افزایش فسفات

ج) کاهش کلسیم

د) افزایش ALP

Burket's Oral Medicine 2015

۸۱ - کدام مورد در پیشگیری از خطر وقوع طوفان آدرنال در فرد مستعد، تحت بیهوشی عمومی، اهمیت بیشتری دارد؟

- الف) فرایند لوله‌گذاری
- ب) مدت‌زمان عمل جراحی
- ج) ترومای ناشی از جراحی
- د) فرایند به هوش آمدن

Dental Management in the Medically compromised Patient

۸۲ - کدام سیستم جنین در ماه سوم بارداری نسبت به اثر تراژونیک اشعه یونیزان حساس‌تر است؟

- الف) اعصاب مرکزی
- ب) لوله گوارش
- ج) پوست و دندانها
- د) مغز استخوان

Dental Management in the Medically compromised Patient

۸۳ - خانم مبتلا به آرتریت روماتوئید که یک سال پیش پروتز مفصل زانو گذاشته است، جهت کشیدن دندان نهفته نیاز به پروفیلاکسی آنتی بیوتیک دارد. وی قادر به خوردن آنتی بیوتیک نمی باشد. کدام دارو جهت تزریق عضلانی توصیه می‌شود؟

- الف) سفرا دین
- ب) وانکومايسين
- ج) سفازولین
- د) اریترومايسين

Dental Management in the Medically compromised Patient

۸۴ - در بیمار مبتلا به لوپوس سیستمیک که تحت همودیالیز می‌باشد، کدام مورد در درمان دندانپزشکی به ندرت روی می‌دهد؟

- الف) کاهش کلیرنس کلیوی
- ب) تشنج
- ج) خونریزی مخاطی
- د) عفونت

Burket's Oral Medicine 2015

۸۵ - ابتلا به سندرم CREST با مثبت شدن کدام یافته آزمایشگاهی مطابقت دارد؟

- الف) Anti-Centromere A.
- ب) Anti-CCP
- ج) AntiTopo
- د) Anti RNA Polimerase

Burket's Oral Medicine 2015

۸۶ - ایجاد کهیر بر اثر سرما جزء کدام دسته از واکنش‌های ازدیاد حساسیت است؟

- الف) کمپلکس ایمنی
- ب) سیتوتوکسیک
- ج) آنافیلاکسی
- د) تاخیری

Burket's Oral Medicine 2015

۸۷ - دندانپزشکی بعد از تزریق بی‌حسی موضعی برای فرد HIV+ بدون علامت، دچار Needlestick شده است. اولین اقدام کدام است؟

- الف) تست ELISA بلافاصله و ۳ تا ۶ ماه بعد
- ب) پروفیلاکسی دو دارویی پس از اکسپوز
- ج) تست PCR برای بررسی توده ویروسی
- د) بررسی میزان Load ویروسی

Dental Management in the Medically compromised Patient

۸۸ - تمام موارد بعنوان عارضه دهانی ناشی از مصرف داروهای ایمنوساپرسیو گزارش شده است به جز:

- الف) ژنژیویت دسکوماتیو
- ب) زخم شبه آفت
- ج) پیوژنیک گرانولوما
- د) هرپس عودکننده

Dental Management in the Medically compromised Patient

۸۹ - کدام تست جهت شناسایی آنمی ناشی از کمبود G6PD استفاده می‌شود؟

- الف) Intrinsic Factor Ab
- ب) Erythropoietin Level
- ج) Indirect Bilirubin
- د) Fluorescent Spot

Burket's Oral Medicine 2015

Dental Management in the Medically compromised Patient

۹۰ - در بیمار مبتلا به آنمی داسی شکل کاربرد کدام یک بصورت روتین بلامانع می‌باشد؟

- الف) میدازولام
- ب) بی‌حسی موضعی با اپی نفرین
- ج) سالیسیلات با دوز بالا
- د) فنوباریتال

Dental Management in the Medically compromised Patient

۹۱ - بیمار ۵۴ ساله مبتلا به دیابت با سابقه عفونت درمان نشده دستگاه ادراری، دچار خونریزی ناگهانی از بینی همراه با استفراغ خونی شده و در پوست ناحیه تنه و اندام‌ها، پورپورا و اکیموز ایجاد شده است. در بررسی آزمایشگاهی افزایش **aPTT, PT, TT** و کاهش پلاکت مشاهده شده است. تجویز تمام موارد برای درمان خونریزی مجاز می‌باشد به جز:

- الف) Fresh Frozen Plasma
- ب) Tranxamic Acid
- ج) Cryoprecipitate
- د) Platelet Infusion

Dental Management in the Medically compromised Patient

۹۲ - بیمار مبتلا به اختلال خونریزی دهنده، بعد از ۵ روز دچار خونریزی از محل کشیدن دندان عقل شده است، تجویز کدام مورد تا توقف خونریزی ارجح می‌باشد؟

- الف) ε-Aminocaproic Acid
- ب) DDAVP
- ج) FFP
- د) Cryoprecipitate

Burket's Oral Medicine 2015

۹۳ - بیماری با آزمایشات ذیل مراجعه کرده است. در تاریخچه پزشکی وی سابقه کاهش وزن و شکستگی‌های متعدد وجود دارد.

Creatinine: 5mg/dl

Ca: 12g/dl

Hb: 10g/dl

RBC: $2 \times 10^6/\text{mm}^3$

در نمونه بیوپسی انفیلتراسیون پلاسماسل‌ها دیده می‌شود. وجود کدام نما در رادیوگرافی محتمل‌تر است؟

الف) Hair-on-End

ب) Step Ladder

ج) Cotton Wool

د) Punched-Out

Burket's Oral Medicine 2015

۹۴ - بیمار ۱۲ ساله با زخم‌های راجعه دهانی و خونریزی از لثه مراجعه نموده است. در معاینه زخم‌های آفتی شکل کوچک و التهاب ژنرالیزه لثه مشاهده می‌شود. اولین اقدام کدام است؟

الف) ارزیابی دوره ای CBC

ب) بیوپسی از ضایعات زخمی

ج) مشاوره با پرودونتیست

د) درمان علامتی و فالوآپ

Burket's Oral Medicine 2015

۹۵ - علت افزایش پوسیدگی ریشه در افراد سالمند همه موارد است به جز:

الف) اختلال حرکتی

ب) تحلیل لثه

ج) خشکی دهان

د) سوء تغذیه

Burket's Oral Medicine 2015

۹۶ - علامت Lhermitte مربوط به کدام دسته از علائم مالتیپل اسکلروزیس است؟

الف) تغییرات بینایی

ب) ضعف عضلانی

ج) تغییرات حسی

د) اختلال مثانه

Burket's Oral Medicine 2015

۹۷ - انجام کدام مطالعه به منظور دریافت مجوز ساخت دارو از شرکت‌ها صورت می‌گیرد؟

الف) Cohort

ب) Case Control

ج) Pivotal

د) Cross Sectional

Burket's Oral Medicine 2015

۹۸ - کدام ناهنجاری کروموزومی در اثر تغییر تعداد کروموزوم‌ها ایجاد می‌شود؟

- الف) سندرم ترنر
- ب) دیسپلازی اکتودرمال
- ج) نوروفیبروماتوز
- د) آملوژنزیس ایمپرفکتا

Burket's Oral Medicine 2015

۹۹ - بهترین تشخیص برای کیست‌های متعدد، کوچک و ترانسلوسنت بر روی کرسٹ آلئولار ریج نوزاد چهار ماهه کدام است ؟

- الف) Epstein Pearls
- ب) Bohn Noduls
- ج) Dental Lamina
- د) Congenital Epulis

Burket's Oral Medicine 2015

۱۰۰ - در کلیشه‌های پانورامیک، تمام موارد قابل بررسی است به جز:

- الف) قطر اتاقک پالپ
- ب) بال کوچک اسفنوئید
- ج) سائز فولیکول دندان
- د) ضخامت لامینا دورا

Burket's Oral Medicine 2015

بسمه تعالی

دأوطلب محترم:

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخص به دبیرخانه ارسال گردند تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. لازم به ذکر است که تنها منابع اعلام شده آزمون می‌تواند به عنوان منبع طرح اعتراض مورد استفاده قرار گیرد. فرصت انعکاس اعتراضات از ساعت ۱۲ الی ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و تنها از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir خواهد بود. اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ذیل و به صورت غیراینترنتی و یا بعد از زمان تعیین شده به دبیرخانه ارسال شود یا فرم‌هایی که بیش از یک سوال در آن‌ها درج شده باشد مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

	نام درس:		شماره سوال:	
نام منبع	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد اعتراض:

- ☐ با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.
- ☐ بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- ☐ جواب صحیح ندارد یا متن سوال صحیح نیست.
- ☐ کلید اعلام شده، اشتباه است.

توضیحات

کلید اولیه - آزمون دانشنامه تخصصی - بهمن ماه ۱۴۰۰

رشته: بیماری‌های دهان، فک و دندان

توجه! اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سؤالات باید با مداد مشکی نرم و پرنرگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح  غلط   

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی ننویسید.

۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲	☐	☐	☐	☐	☐
۳	☐	☐	☐	☐	☐
۴	☐	☐	☐	☐	☐
۵	☐	☐	☐	☐	☐
۶	☐	☐	☐	☐	☐
۷	☐	☐	☐	☐	☐
۸	☐	☐	☐	☐	☐
۹	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰	☐	☐	☐	☐	☐
۵۱	☐	☐	☐	☐	☐
۵۲	☐	☐	☐	☐	☐
۵۳	☐	☐	☐	☐	☐
۵۴	☐	☐	☐	☐	☐
۵۵	☐	☐	☐	☐	☐
۵۶	☐	☐	☐	☐	☐
۵۷	☐	☐	☐	☐	☐
۵۸	☐	☐	☐	☐	☐
۵۹	☐	☐	☐	☐	☐
۶۰	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۱	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۲	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۳	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۴	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۵	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۶	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۷	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۸	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰۹	☐	☐	☐	☐	☐
۱۱۰	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۱	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۲	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۳	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۴	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۵	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۶	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۷	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۸	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵۹	☐	☐	☐	☐	☐
۱۶۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰۹	☐	☐	☐	☐	☐
۲۱۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵۹	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۶۹	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۷۹	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۸۹	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۰	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۱	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۲	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۳	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۴	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۵	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۶	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۷	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۸	☐	☐	☐	☐	☐
۲۹۹	☐	☐	☐	☐	☐
۳۰۰	☐	☐	☐	☐	☐