

۱- کدام گزینه ویژگی مشترک همه انواع عوامل دفاعی را بیان می کند که در پاسخ به بروز نوعی آسیب بافتی و ورود باکتری بیماری زا، از مویرگ های خونی خارج می شوند؟

- (۱) هر یک از آن ها همواره بین خون و مایع بین یاخته ای در حال گردش می باشند.
- (۲) در زمان عبور از دیواره مویرگ، شکل هسته خود را موقتاً تغییر می دهند.
- (۳) به منظور ایجاد نوعی فرورفتگی یا برآمدگی در غشای خود، نیازمند صرف انرژی هستند.
- (۴) به دنبال عملکرد در مایع بین یاخته ای، امکان تغییر در، بخشی از ساختار آن ها وجود دارد.

۲- طبق اطلاعات کتب درسی، یاخته هایی در بدن یک انسان سالم یافت می شوند که می توانند بدون نیاز به حضور پیک یا ماده (های) شیمیایی، پتانسیل غشای خود را تغییر دهند، چند مورد مشخصه مشترک همه این یاخته ها محسوب می شود؟

- (الف) فقط در پاسخ به حضور نوعی محرک، پیام عصبی تولید می کنند.
 - (ب) می توانند با انتقال پیام به یاخته های مجاور خود، آن ها را مهار کنند.
 - (ج) پردازش نهایی پیام آن ها در بخشی از وسیع ترین قسمت مغز رخ می دهد.
 - (د) با آزاد کردن پیک های شیمیایی در فضای بین یاخته ای، فعالیت یاخته مجاور خود را تغییر می دهند.
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) صفر

۳- کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول مویرگ هایی در بدن یک انسان سالم که محتویات آن ها در نهایت بدون ورود به بزرگ سیاهرگ زیرین به قلب برگردانده می شود،»

- (۱) فقط بعضی از - به واسطه ساختاری چین خورده در دیواره ماهیچه ای شان، جریان مواد درون خود را تنظیم می کنند
- (۲) فقط بعضی از - یاخته هایی را از خود عبور می دهند که از طریق زائده های غشادار خود به پادگن متصل می شوند
- (۳) همه - در سطحی بالاتر از پرده جداکننده قفسه سینه از حفره شکمی قرار دارند
- (۴) همه - محتویات درونی خود را به صورت یک طرفه جابه جا می کنند

۴- مطابق با مطالب کتاب درسی، گروهی از جانوران دفع مواد زائد نیتروژن دار یا مواد معدنی دفعی موجود در محیط داخلی بدن خود به خارج از بدن را، به کمک نوعی عضو گوارشی انجام می دهند، کدام گزینه، فقط در ارتباط با بعضی از این جانوران صادق است؟

- (۱) ماده ای را از روده خود خارج می کنند که با رسوب در برخی مفاصل انسان، موجب نشت خوناب در آن ها می شود.
- (۲) بخشی از مواد وارد شده به سامانه دفعی آن ها، توسط یاخته های پوششی بدن بازجذب می شوند.
- (۳) به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند.
- (۴) بیش از دو نوع ساختار مشخص، در تنظیم هم ایستایی یون (ها) در مایعات بدن نقش دارند.

۵- کدام گزینه درباره هر نوع پیک شیمیایی دوربرد فاقد ید صحیح است که بر تنظیم بیان ژن در گویچه های سفید با هسته گرد یا بیضی شکل در یک انسان سالم و بالغ مؤثر هستند؟

- (۱) پس از ورود عامل بیگانه به بدن، فرایند تولید آن در سیتوپلاسم برخی یاخته ها آغاز می شود.
- (۲) فعالیت گروهی از ساختارهای بدون غشا در سیتوپلاسم این یاخته ها را تغییر می دهد.
- (۳) توسط غدد درون ریز متعلق به دستگاه لنفوی بدن تولید و ترشح می شود.
- (۴) تحت تأثیر هورمون (های) مترشحه از غده ای در ناحیه مغز قرار دارد.

۶- با توجه به مویرگ‌های خونی مستقر در اندام‌های مختلف مطرح‌شده در کتاب درسی، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«به طور معمول انتهایی مویرگ (های) خونی موجود در»

(۱) در هر دو - بخش قیفی شکل گردیزه، جریان رو به خارج مواد از مویرگ مشاهده می‌شود

(۲) در هر دو - مرکز پرزهای روده باریک، اختلاف فشار اسمزی با فشار تراوشی بیشتر از سایر بخش‌های مویرگ است

(۳) فقط در یکی از دو - اطراف حبابک‌ها، سرخرگ با خون تیره وجود دارد

(۴) فقط در یکی از دو - اطراف بخش لوله‌ای گردیزه، کرین دی‌اکسید به خون وارد می‌شود

۷- از سرخرگ خروجی از بطن چپ در سطح بالایی نوعی دریچه دارای سه قطعه، ابتدا دو انشعاب کوچک‌تر جدا می‌شود، با در نظر گرفتن این مورد، چند مورد مشخصه انشعابی از آن را بیان می‌کند که در صورت رسوب کلسترول در آن، تعداد بیشتری از باخته‌های ماهیچه‌ای قلب می‌میرند؟

• نقش بیشتری در تأمین مواد مغذی تارهای سازنده گره سینوسی دهلیزی دارد.

• فقط در تغذیه یاخته‌های دیواره حفرات یک سمت قلب نقش دارد.

• نسبت به انشعاب دیگر این سرخرگ، زودتر منشعب می‌شود.

• بخشی از دیواره جلویی نوک قلب را خون‌رسانی می‌کند.

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

۸- چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌نماید؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی زیست‌شناسی ۲، هر نوع ترکیب اسیدی که در مقابله با گروهی از عوامل بیماری‌زا در بدن نقش مؤثری ایفا می‌کند، به طور حتم»

(الف) توسط یاخته‌هایی متصل به شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ترشح می‌شود

(ب) پس از خروج از یاخته سازنده خود، به بخشی خارج از محیط داخلی بدن وارد می‌شود

(ج) مستقیماً با اثر بر عامل بیماری‌زا، بخش‌هایی از آن را تجزیه می‌کند

(د) ترشح آن، تحت کنترل نورون‌های دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد

(۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

۹- در زمان آسیب دیدگی شدید دیواره رگ‌های خونی به منظور جلوگیری از خون‌ریزی، فرایندهایی (هایی) به راه می‌افتد. کدام گزینه در خصوص این واکنش‌ها صحیح است؟

(۱) در پی تغییر شکل سه‌بعدی برخی از اجزای متنوع‌ترین گروه مولکول‌های زیستی، درپوش پلاکتی در محل خونریزی ایجاد می‌گردد.

(۲) حضور انواعی از ترکیبات آلی و معدنی به منظور ادغام غشای ریزکیسه‌های حاوی فیبرین با غشای یاخته ضروری است.

(۳) نوعی کاتالیزور زیستی پس از تغییراتی در برهم‌کنش‌های آبگریز نوعی بسیار زیستی در خوناب ایجاد می‌گردد.

(۴) همه آنزیم‌های دخیل در فرایند، توسط هر ساختار متصل به شبکه آندوپلاسمی زیر سنتز می‌شوند.

۱۰- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«تنگ‌شدن سرخرگ باعث افزایش شبکه مویرگی مرتبط با نفرون‌های کلیه می‌شود.»

(الف) وایران برخلاف تنگ‌شدن سرخرگ آوران - حجم خون فقط در یک

(ب) آوران همانند گشادشدن سرخرگ وایران - جریان رو به خارج در اولین

(ج) وایران همانند تنگ‌شدن سرخرگ آوران - میزان بازجذب مواد در دومین

(د) آوران برخلاف گشادشدن سرخرگ وایران - جریان رو به داخل در هر دو

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱- در پی رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل نوعی واکنش دفاعی در بدن به راه می افتد. کدام عبارت، در ارتباط با این فرایند صحیح است؟

- (۱) فقط گروهی از بیگانه خوارهای خون، پیکهای شیمیایی تولید می کنند که گویچه های سفید را به سمت موضع آسیب فراخوانی می کنند.
- (۲) پروتئین های مکمل به دنبال خروج از خون به غشای عامل بیگانه متصل شده و بیگانه خواری درشت خوارها را افزایش می دهند.
- (۳) هیستامین مترشحه از بیگانه خوارها باعث گشاد شدن رگ های خونی شده و هیچگاه به جریان خون وارد نمی شود.
- (۴) امکان بروز علائمی مانند افزایش حجم مایع احاطه شده توسط کپسول مفصلی و تحریک گیرنده درد وجود دارد.

۱۲- اندام هایی در انسان وجود دارند که در پی اثرپذیری از نوعی هورمون مترشحه از اندام های لوبیایی شکل، به تولید مقادیر زیادی از نوعی یاخته زنده فاقد هسته از بافت پیوندی می پردازند، چند مورد فقط در خصوص گروهی از این اندام ها درست است؟

- (الف) توانایی تولید فراوان ترین ترکیب آلی موجود در ادرار را دارند.
- (ب) دو نوع خون حاوی مقادیر متفاوتی از گازهای تنفسی، به آن (ها) وارد می شود.
- (ج) پس از تجزیه یاخته های خونی پیر و فرسوده، آهن درون آن ها را آزاد می کنند.
- (د) درون آن ها، هر لنفوسیت مؤثر در دفاع اختصاصی، واجد گیرنده های آنتی ژنی در سطح خود است.
- (۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

۱۳- در پی تجزیه شدن ترکیب کربن دار حاصل از فعالیت نوعی پروتئین آنزیمی درون گویچه قرمز، دو نوع یون معدنی تولید می شود. چند مورد فقط در ارتباط با یکی از این یون ها صحیح است؟

- (الف) در پی افزایش فعالیت یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، بازجذب آن توسط یاخته های ریزپرزار می تواند افزایش یابد.
- (ب) تحریک گیرنده های حساس به میزان آن در خون، در تنظیم فشار سرخرگی در حد طبیعی نقش مؤثری دارد.
- (ج) به دنبال گشاد شدن سرخرگ های کوچک، همواره مقدار آن در خواب افزایش پیدا می کند.
- (د) بدون توجه به اندازه و نوع بار آن، طی تراوش، وارد حجیم ترین بخش نفرون می شود.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۴- کدام گزینه در خصوص اجزای دستگاه لنفی یک انسان سالم و بالغ نادرست است؟

- (۱) لنف طحال پس از عبور از تعدادی گره لنفی، در مجاور پانکراس به قطورترین مجرای لنفی می ریزد.
- (۲) مجرای لنفی چپ با عبور از جلوی سیاهرگ زیرترقوه ای همان سمت، محتویات خود را به درون آن تخلیه می کند.
- (۳) نوعی مجرای لنفی که در طول آن، چندین گره لنفی قابل مشاهده است، به سیاهرگ زیرترقوه ای قطورتر تخلیه می شود.
- (۴) لنف خروجی از بالاترین و پایین ترین اندام لنفی هنگام ورود به قلب، به طور حتم به بالاترین بخش دهلیز راست وارد می شود.

۱۵- به دنبال مصرف نوعی ترکیب شیمیایی، ایجاد پیام الکتریکی در یاخته های سازنده گره دهلیزی – بطنی به شدت مهار می شود، کدام مورد نمی تواند از عواقب مصرف این ترکیب شیمیایی در یک انسان بالغ محسوب شود؟

- (۱) اختلال در باز و بسته شدن دریچه لانه کبوتری در بزرگترین سیاهرگ ناحیه گردن
- (۲) توقف فرایندهای تولید و مصرف انرژی در یاخته های ماهیچه ای قلبی
- (۳) افزایش تحریک گیرنده های فاقد پوشش پیوندی در برخی بافت ها
- (۴) افزایش فشار درون سیاهرگ (های) متصل به حفره (های) بالای قلب

۱۶- کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«طبق اطلاعات کتاب درسی، هر ساختاری که به بخشی غیر از جایگاه‌های اتصال به پادگن از پروتئین پادتن متصل شده و توانایی تولید و مصرف انرژی زیستی را»

- (۱) دارد، پیک شیمیایی مؤثر در فراخوانی گویچه‌های سفید به محل ملتهب را تولید می‌کند.
- (۲) دارد، به کمک کیسه‌هایی پر از آنزیم می‌تواند ساختارهای یاخته‌ای و غیریاخته‌ای را تجزیه نماید.
- (۳) ندارد، پیش از فعال کردن ساختاری مشابه خود، به طور حتم ابتدا از عامل فعال‌کننده خود جدا می‌گردد.
- (۴) ندارد، با ایجاد منفذی در غشای یاخته سرطانی، زمینه ورود نوعی آنزیم به سیتوپلاسم آن‌ها را فراهم می‌نماید.

۱۷- کدام مورد به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی زیست شناسی دهم، ساختارهای لوله‌ای شکلی وجود دارند که در فرآیند دفع برخی مواد در جانداران فاقد اسکلت استخوانی نقش ایفا می‌کنند؛ از جمله ویژگی‌های مشترک همه این ساختارها در این مورد است که»

- (۱) دیواره آن‌ها، یاخته‌هایی با ظاهری استوانه‌ای شکل دارد
 - (۲) این لوله‌ها، حداقل از طریق یک انتهای خود، با محیط اطراف جانور ارتباط دارند
 - (۳) یاخته‌های زنده دیواره آن‌ها، می‌توانند در تماس با آب و یون‌ها قرار گیرند
 - (۴) مواد دفعی آن‌ها، به طور مستقیم به بخشی از لوله گوارش جاندار وارد می‌شود
- ۱۸- با توجه به مطالب کتاب درسی در مورد دستگاه گردش خون در یک فرد سالم، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول سیاهرگ‌ها، جریان خون»

- (الف) در همه – تحت تأثیر باقی‌مانده فشار سرخرگی قرار می‌گیرد
- (ب) فقط در بعضی از – به سمت قلب، می‌تواند به صورت ناپیوسته برقرار شود
- (ج) در همه – نسبت به سرخرگ‌های هم‌ارز، با مقاومت کم‌تری روبه‌رو می‌شود
- (د) فقط در بعضی از – با افزایش فشار مکشی درون قفسه سینه، افزایش می‌یابد

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«به طور معمول، فقط بعضی از یاخته‌های ماهیچه قلبی که»

- (۱) توانایی انقباض خودبه‌خودی دارند، در دیواره پشته‌ای دهلیز راست قرار دارند
- (۲) تک‌هسته‌ای هستند، به رشته‌های کلاژن بافت پیوندی متراکم متصل هستند
- (۳) از طریق صفحات درهم رفته با یاخته هم‌نوع خود ارتباط دارند، استراحت پیوسته دارند
- (۴) در دیواره بین حفرات بزرگ‌تر قلب قرار دارند، می‌توانند به طور مستقیم از نوعی گره قلبی، پیام دریافت کنند


۲۰- کدام گزینه مشخصه دستگاه گردش مواد در هر جانوری را بیان می‌کند که خون موجود در قلب آن، تنها به کمک یک رگ خونی خارج شده و می‌تواند مستقیماً به طرف اندام تنفسی آن‌ها هدایت گردد؟

- (۱) دریچه‌های موجود در حد فاصل بین دهلیزها و بطن قلب، جریان خون را یک‌طرفه می‌کنند.
- (۲) در دوران نوزادی، واجد سرخرگ‌هایی با کیفیت خون متفاوت درون هر یک از کمان‌های آبششی خود هستند.
- (۳) یاخته‌های ماهیچه‌ای دیواره قلب آن‌ها، مستقیماً به کمک انشعابات نوعی رگ خونی خارج‌شده از اندام تنفسی اکسیژن‌رسانی می‌گردند.
- (۴) درونی‌ترین دیواره قلب آن‌ها فقط با خونی تماس مستقیم دارد که هموگلوبین گویچه‌های قرمز آن اکثراً به CO_2 متصل هستند.

۲۱- مطابق با مطالب کتاب درسی، ویژگی مشترک همه جانوران مهره‌داری که در تمام طول حیات خود تنها از یک نوع ساختار تنفسی ویژه استفاده می‌کنند و خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب آن‌ها عبور می‌کند، کدام است؟

- (۱) بخش‌های واجد شبکه مویرگی در آبشش‌ها، علاوه بر اتصال به یکدیگر، دارای جهت جریان خون دوطرفه می‌باشند.
- (۲) در دستگاه عصبی مرکزی آن‌ها، بصل‌النخاع از یک طرف با نخاع و از طرف دیگر با نیمکره‌های مخ مجاورت دارد.
- (۳) عصب موجود در زیر کانال خط جانبی، ضخامت بیشتری در بخش‌های جلویی خود نسبت به سایر بخش‌ها دارد.
- (۴) بافت ماهیچه‌ای مخطط همانند بافت ماهیچه‌ای صاف این جانوران، دارای تکیه‌گاه استخوانی می‌باشد.

۲۲- با توجه به شکل زیر، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ «به طور معمول، در فاصله بین پایان ثبت موج تا شروع ثبت موج در نوار قلب یک انسان سالم،»



- (۱) R - P - بخش «۱» برخلاف بخش «۴»، باعث ورود خون از طریق حفره بالایی قلب به حفره پایینی آن می‌شود
- (۲) T - S - بخش «۴» همانند بخش «۲»، به دلیل افزایش فشار خون درون حفرات پایینی قلب، بسته هستند
- (۳) Q - P - قطعات بخش «۲» برخلاف بخش «۳»، در پایین‌ترین محل ممکن خود قرار گرفته است
- (۴) P - T - بخش «۱» همانند بخش «۳»، اجازه جریان یافتن خون به سمت بالا را می‌دهد

۲۳- گروهی از گویچه‌های سفید خون، دارای هسته‌ای هستند که قطعات سازنده آن‌ها در بخش‌هایی به یکدیگر متصل شده‌اند. با در نظر گرفتن این مورد، کدام گزینه درست است؟

- (۱) همه آن‌ها با تولید آنزیم‌های پروتئینی ترش‌خی در تجزیه اجزایی از پیکر عوامل بیماری‌زا مؤثر هستند.
- (۲) همه آن‌ها می‌توانند با صرف انرژی، در بخش اصلی تشکیل‌دهنده غشای یاخته‌ای خود تغییرات ایجاد کنند.
- (۳) فقط بعضی از آن‌ها به واسطه گیرنده آنتی‌ژنی، به آنتی‌ژن‌(های) سطح غشای عوامل بیماری‌زا متصل می‌گردند.
- (۴) فقط بعضی از آن‌ها در پی تغییر محل قرارگیری ساختارهای نوکلئوزومی خود، یاخته‌هایی مشابه خود را در خون ایجاد می‌کنند.

۲۴- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در یکی از مراحل چرخه ضربان قلب انسان،؛ در مرحله‌ای که بلافاصله از این مرحله قرار دارد،»

- (۱) دریچه‌های دهلیزی بطنی بسته می‌شوند - قبل - موج الکتریکی توسط سه رشته از جنس بافت هادی باعث تحریک گره دوم شده است
- (۲) تارهای ماهیچه دهلیزی کوتاه می‌شوند - بعد - به دنبال افزایش فشار خون، ابتدا دریچه‌های سینی باز و سپس سایر دریچه‌ها بسته می‌شوند
- (۳) همه ماهیچه قلب در حال استراحت است - قبل - انتشار موج الکتریکی به تارهای ماهیچه‌ای دیواره خارجی بطن‌ها رخ داده است
- (۴) حجم خون درون حفرات پایینی قلب کاهش می‌یابد - بعد - فشار خون در سرخرگ‌های متصل به قلب به تدریج کاهش می‌یابد

۲۵- مطابق با مطلب کتاب درسی، در مرحله‌ای از فرایند تشکیل ادرار مواد می‌توانند در جهت مخالف بازجذب جابه‌جا شوند، چند مورد فقط در خصوص یکی از این فرایندها به درستی بیان شده است؟

- (الف) در حضور یاخته‌هایی از گردیزه (نفرون) انجام می‌شود که در غشای خود دارای چین خوردگی هستند.
- (ب) به نیروی حاصل از اختلاف قطر دو سرخرگ ورودی و خروجی اطراف کلافک وابسته می‌باشد.
- (ج) توسط یاخته‌هایی در بخش‌های غیر پیچ‌خورده گردیزه (نفرون) انجام می‌شود.
- (د) مواد از فضای بین زوائد پاماند یاخته‌های خاصی عبور می‌کند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱

کدام گزینه ویژگی مشترک همه انواع عوامل دفاعی را بیان می‌کند که در پاسخ به بروز نوعی آسیب بافتی و ورود باکتری بیماری‌زا، از مویرگ‌های خونی خارج می‌شوند؟



پروتئین‌های دفاعی + یاخته‌های ایمنی
مثل نوتروفیل‌ها + پیک‌های شیمیایی

- (۱) هر یک از آن‌ها همواره بین خون و مایع بین یاخته‌ای در حال گردش می‌باشند.
- (۲) در زمان عبور از دیواره مویرگ، شکل هسته خود را موقتاً تغییر می‌دهند.
- (۳) به منظور ایجاد نوعی فرورفتگی یا برآمدگی در غشای خود، نیازمند صرف انرژی هستند.
- (۴) به دنبال عملکرد در مایع بین یاخته‌ای، امکان تغییر در، بخشی از ساختار آن‌ها وجود دارد.

پاسخ: گزینه ۴

خودت حل کنی بهتره آسیب بافتی حاصل از عامل خارجی و ورود میکروب‌ها به بدن، باعث پاسخ التهابی می‌شود؛ در پاسخ التهابی، ماستوسیت‌های آسیب‌دیده هیستامین رها می‌شود. هیستامین رگ‌های خونی را گشاد و نفوذپذیری آن‌ها را زیاد می‌کند. به دنبال این اتفاق، دیپادز گویچه‌های سفید و نشت پلاسما از مویرگ‌های خونی زیادتر می‌شود؛ بنابراین نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها از خون خارج می‌شوند. هم‌چنین پروتئین‌های مکمل بیشتری از دیواره مویرگ خونی عبور کرده و به مایع بین یاخته‌ای وارد می‌شوند. پس در پاسخ التهابی، گروهی از یاخته‌های ایمنی، پروتئین‌های ایمنی و برخی پیک‌های شیمیایی (مثل پیک ترشحی دیواره مویرگ‌ها) می‌توانند از خون خارج و به مایع میان بافتی وارد شوند.

درس نامه ●● آن چه در التهاب رخ می‌دهد:





پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی پیک‌های شیمیایی با اتصال به گیرنده خود، پیامی را منتقل می‌کنند پس امکان دارد در نتیجه این اتصال تغییراتی در ساختار آن‌ها رخ دهد، از طرفی گویچه‌های سفید پس از دیپدز یا خودشان یا یاخته حاصل از تمایز آن‌ها (مثل ماکروفاژها) به مبارزه با عوامل بیگانه می‌پردازند پس ساختار آن‌ها کمی تغییر می‌کند مثلاً هنگام بلعیدن عوامل بیگانه (طبق شکل‌های کتاب درسی در فصل ۵ زیست‌شناسی ۲). در مورد پروتئین‌های مکمل هم باید گفت این‌ها غیرفعال هستند و در برخورد با میکروب‌ها، فعال می‌شوند. فعال شدن آن‌ها با تغییر ساختار بخشی از آن‌ها، همراه است. بنابراین می‌توان گفت همه انواع این عوامل، می‌توانند کمی تغییر کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ پروتئین‌های ایمنی و یاخته‌های ایمنی می‌توانند بین خون و مایع بین یاخته‌ای جابه‌جا شوند، اما نه همواره مثلاً مونوسیت‌ها پس از خروج از خون به ماکروفاژ تبدیل می‌شود و دیگر نمی‌تواند به خون برگردد.

نکته در خصوص پروتئین‌های مکمل نکات زیر را بدانید:

- ۱** تولید آن‌ها وابسته به آلوده شدن بدن به عوامل بیماری‌زا نیست!
- ۲** در صورت ورود میکروب‌های غشادار به بدن، فعال می‌شوند (نه هر نوع میکروبی!). واکنش فعال شدن آن‌ها، به این صورت است که وقتی یکی از پروتئین‌ها فعال شود، دیگری را فعال می‌کند و به همین صورت پیش می‌رود.
- ۳** پروتئین مکمل می‌تواند در اثر برخورد با پادتن یا پروتئین مکمل فعال شده دیگری! نیز فعال شود.
- ۴** با آگروسیتوز از یاخته سازنده خود خارج می‌شود. ساخته شدن آن‌ها توسط یاخته‌های اختصاصی دستگاه ایمنی صورت نمی‌گیرد!

۲ گویچه‌های سفید در زمان دیپدز، می‌توانند شکل هسته خود را تغییر دهند، همه گویچه‌های سفید توانایی عبور از دیواره مویرگ (دیپدز) را دارند؛ اما توجه داشته باشید پروتئین مکمل ساختار یاخته‌ای و هسته ندارد و در نتیجه توانایی دیپدز و تغییر شکل هسته خود را ندارد!

نکته درشت‌خوارها و یاخته‌های دارینه‌ای، حاصل تغییر و تمایز مونوسیت‌ها در خارج از خون هستند؛ پس، در سایر بافت‌های زنده به جز خون قابل مشاهده هستند و توانایی دیپدز (خروج از مویرگ‌های خونی) را ندارند!

نکته در کتاب درسی در تعریف فرایند دیپدز می‌خوانیم که «فرایند عبور گویچه‌های سفید را از دیواره مویرگ‌ها، تراگذاری (دیپدز) می‌نامند.» اما در خط قبلی گفته است که گویچه‌های سفید از خون خارج می‌شوند! پس عزیزان دقت کنید که واژه «عبور» صرفن به معنی خارج شدن از مویرگ نیست! اما حواستون باشه دیپدز به معنای خروج از خون است و ورود به خون دیپدز محسوب نمی‌شود! به هر حال گفتیم *حواستون باشه که مثل دست و پا پلغتی توی دهن کوسه نیفتی!*

۳ آندوسیتوز و آگروسیتوز با ایجاد فرورفتگی و برآمدگی در غشای بعضی یاخته‌های زنده همراه است؛ این فرایندها نیاز به انرژی زیستی (ATP) دارد. اما دقت کنید پروتئین مکمل ساختار یاخته‌ای و غشا ندارد و در نتیجه خودش توانایی آندوسیتوز و آگروسیتوز هم ندارد! ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها، طی بیگانه‌خواری می‌توانند ذرات بیگانه را بلعند!

تست و پاسخ ۲

طبق اطلاعات کتب درسی، یاخته‌هایی در بدن یک انسان سالم یافت می‌شوند که می‌توانند بدون نیاز به حضور پیک یا ماده(های) شیمیایی، پتانسیل غشای خود را تغییر دهند، چند مورد مشخصه مشترک همه این یاخته‌ها محسوب می‌شود؟

گیرنده‌های (نورون‌های) حسی +
یاخته‌های شبکه‌های قلب

- الف فقط در پاسخ به حضور نوعی محرک، پیام عصبی تولید می‌کنند.
- ب می‌توانند با انتقال پیام به یاخته‌های مجاور خود، آن‌ها را مهار کنند.
- ج پردازش نهایی پیام آن‌ها در بخشی از وسیع‌ترین قسمت مغز رخ می‌دهد.
- د با آزاد کردن پیک‌های شیمیایی در فضای بین یاخته‌ای، فعالیت یاخته مجاور خود را تغییر می‌دهند.

۴) صفر

۳) سه

۲) دو

۱) یک

پاسخ: گزینه ۴



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی هیچ یک از موارد ویژگی مشترک این یاخته‌ها را بیان نمی‌کند.

خودت حل کنی بهتره همه گیرنده‌های حواس ویژه و پیکری بدون نیاز به ناقلین عصبی و به وسیله محرک حسی مربوط به خود (مثل نور، صدا و ...) تحریک می‌شوند که در نتیجه این تحریک پتانسیل غشای آن‌ها تغییر می‌کند؛ هم‌چنین یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی در شبکه هادی قلب نیز می‌توانند بدون نیاز به حضور ناقلین عصبی و در پی تحریک گره سینوسی - دهلیزی و دریافت پیام الکتریکی ناشی از این تحریک، تحریک شوند.

بررسی همه موارد:

الف) گیرنده حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت می‌کند و اثر محرک در آن به پیام عصبی تبدیل می‌شود؛ اما توجه داشته باشید که گیرنده‌ها برخلاف یاخته ماهیچه قلبی، در پاسخ به حضور نوعی محرک پیام عصبی تولید می‌کنند و این مورد درباره یاخته‌های ماهیچه قلبی صادق نیست. یاخته‌های گره اول در شبکه هادی قلب، به صورت خودبه‌خودی تحریک می‌شوند! تحریک یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی با تغییر پتانسیل دوسوی غشا همراه است اما این تغییر پتانسیل، پیام عصبی محسوب نمی‌شود.

ب) گیرنده‌های حسی باعث مهار یاخته دیگری نمی‌شوند. چراکه این‌ها، تحریک شده‌اند و می‌خواهند پیام ناشی از این تحریک را به دستگاه عصبی برسانند پس یاخته بعد از خود را تحریک می‌کنند! هم‌چنین ماهیچه‌های قلبی هم بعد از تحریک شدن، یاخته بعدی خود را، تحریک می‌کنند.

نکته یکی از ویژگی‌های یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی، ارتباط آن‌ها از طریق صفحات بینابینی و درهم‌رفته است. ارتباط یاخته‌ای در این صفحات به گونه‌ای است که باعث می‌شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته‌های ماهیچه قلبی منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک توده یاخته‌ای واحد عمل کند!

ج) وسیع‌ترین قسمت سازنده مغز، مخ است و محل پردازش نهایی پیام‌های ارسالی از گیرنده‌ها نیز، قشر مخ است؛ اما توجه داشته باشید فعالیت ماهیچه قلب به صورت غیرارادی است و ارتباطی به قشر مخ و پردازش اطلاعات در آن ندارند.

نکته دستگاه عصبی و درون‌ریز در فعالیت یاخته‌های قلبی نقش دارد؛ مثلاً افزایش تعداد ضربان قلب یا کاهش آن، اما در تحریک اولیه آن نقشی ندارد!

د) گیرنده‌های حسی از طریق فضای سیناپسی با یاخته‌های مجاور خود ارتباط برقرار می‌کنند اما؛ ماهیچه قلبی برخلاف گیرنده‌ها، نیازی به فضای سیناپسی ندارد و پیام تحریک یا استراحت از طریق صفحات بینابینی درهم‌رفته به سرعت در بین یاخته‌ها منتقل می‌شود. هم‌چنین ماهیچه‌های قلبی با ترشح پیک شیمیایی با هم در ارتباط نیستند بلکه پیامی که بین آن‌ها رد و بدل می‌شود، ماهیت الکتریکی دارد و سبب انقباض یا استراحت ماهیچه‌های قلبی می‌شود.

تست و پاسخ ۳

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول مویرگ‌هایی در بدن یک انسان سالم که محتویات آن‌ها در نهایت بدون ورود به بزرگ‌سیاهرگ زیرین به قلب برگردانده می‌شود،»

- (۱) فقط بعضی از - به واسطه ساختاری چین‌خورده در دیواره ماهیچه‌ای‌شان، جریان مواد درون خود را تنظیم می‌کنند
- (۲) فقط بعضی از - یاخته‌هایی را از خود عبور می‌دهند که از طریق زائده‌های غشادار خود به پادگن متصل می‌شوند
- (۳) همه - در سطحی بالاتر از پرده جداکننده قفسه سینه از حفره شکمی قرار دارند
- (۴) همه - محتویات درونی خود را به صورت یک‌طرفه جابه‌جا می‌کنند

پاسخ: گزینه ۴



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

خودت حل کنی بهتره مویرگ‌های خونی مربوط به اندام‌هایی که خون درون خود را به بزرگ‌سیاهرگ زیرین می‌ریزند (مانند اندام‌های بالاتر از قلب) و مویرگ‌های مربوط به تغذیه ماهیچه قلب و منشعب‌شده از سرخرگ‌های کرونری که محتویات آن‌ها، در نهایت به سیاهرگ کرونری می‌ریزد و هم چنین مویرگ‌های لنفی که به مجراهای لنفی و در نهایت به بزرگ سیاهرگ زیرین تخلیه می‌شوند؛ مد نظر سؤال هستند. لنف بعد از عبور از مویرگ‌ها و رگ‌های لنفی از طریق دو رگ بزرگ لنفی به نام مجرای لنفی چپ و راست به سیاهرگ‌های زیرترقوه‌ای چپ و راست می‌ریزد و محتویات این رگ‌ها نهایتاً از طریق بزرگ‌سیاهرگ زیرین به دهلیز راست وارد می‌شود.

پاسخ تشریحی جریان خون به صورت یک‌طرفه درون رگ‌های خونی جریان دارد یعنی از قلب به سرخرگ‌ها، مویرگ‌ها و در ادامه به سیاهرگ‌ها و در نهایت هم وارد قلب می‌شود. جریان لنف هم به همین صورت است یعنی لنفی که مثلاً از طحال خارج شد، از رگ لنفی مربوط به خروج آن، به سمت عقب برنمی‌گردد!

نکته برخی ویژگی‌های شبکه‌های مویرگی خونی در بدن: الف) همه آن‌ها بین دو رگ بزرگ‌تر از خود قرار دارند، اما این رگ‌ها لزوماً یکی سرخرگ و دیگری سیاهرگ نیست، بلکه هر دو می‌توانند سرخرگ باشند (آوران - کلافاک - وبران) و یا هر دو می‌توانند سیاهرگ باشند (سیاهرگ باب - شبکه مویرگی کبد - سیاهرگ فوق کبدی) ب) لزوماً در همه آن‌ها خون تیره و روشن جریان ندارد، بلکه ممکن است فقط خون تیره و یا فقط خون روشن داشته باشند. ج) در دیواره خود فقط یاخته‌های سنگفرشی به همراه غشای پایه دارند (فاقد لایه ماهیچه‌ای و پیوندی)؛ در برخی جاها (مثل حبابک) غشای پایه آن‌ها یاخته‌های مجاورشان مشترک است. د) یاخته‌های پوششی دیواره آن‌ها ممکن است به شکل‌های متفاوتی آرایش یافته باشند که سبب تشکیل مویرگ‌های مختلف مثل منفذدار، پیوسته و یا ناپیوسته می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) مویرگ‌ها فقط یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند. این ساختار با وظیفه آن‌ها که تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی است، هماهنگی دارد. در دیواره مویرگ‌ها لایه ماهیچه‌ای وجود ندارد و هیچ‌گاه ساختار ماهیچه‌ای ندارند؛ در ابتدای بعضی از آن‌ها حلقه‌ای ماهیچه‌ای هست که میزان جریان خون در آن‌ها را تنظیم می‌کند و به آن بنداره مویرگی می‌گویند. این بنداره جزء ساختار لایه‌های تشکیل‌دهنده دیواره مویرگ نیست!

۲) یاخته‌های ایمنی می‌توانند به پادگن متصل شوند. در خون یاخته‌های دفاع اختصاصی مثل لنفوسیت‌های B و T و خاطره به پادگن متصل می‌شوند؛ هم‌چنین نوتروفیل‌ها توانایی بلعیدن ذرات بیگانه را دارند؛ مونوسیت‌ها هم می‌توانند پادگن‌ها را از روی ویژگی‌های عمومی‌شان تشخیص دهند. مونوسیت‌ها، زوائد غشایی دارند. در لنف هم یاخته‌هایی مثل ماکروفاژها یا یاخته‌های دارینه‌ای وجود دارند که توان شناسایی ویژگی‌های عمومی پادگن‌ها را دارند.

۳) پرده جداکننده قفسه سینه از حفره شکمی، دیافراگم است؛ توجه داشته باشید مویرگ‌های لنفی در سراسر بدن توزیع شده‌اند!

اگر گفتی ...

هر رگی در بدن یک انسان سالم و بالغ که

- ۱) جهت جریان مواد درون آن به صورت یک طرفه است: رگ‌های خونی و لنفی
- ۲) ترکیبی حاوی پروتئین را در بخش‌های مختلف بدن جابه‌جا می‌کند: رگ‌های خونی و لنفی
- ۳) می‌تواند در بخشی از ساختار خود دارای دریچه باشد: برخی سرخرگ‌ها (آئورت و سرخرگ ششی)، سیاهرگ‌ها (دریچه‌های لانه‌کبوتری) و رگ‌های لنفی
- ۴) محتویات خود را در نهایت از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین به قلب تخلیه می‌کند: مویرگ‌های لنفی و مویرگ‌های خونی بالاتر از قلب
- ۵) ترکیبات خود را بدون عبور از بزرگ‌سیاهرگ‌های متصل به قلب، به درون دهلیز راست هدایت می‌کند: مویرگ‌ها و سیاهرگ‌های کرونری
- ۶) دیواره آن فقط از یک لایه بافت پوششی سنگفرشی ساده تشکیل شده است: همه مویرگ‌های بدن
- ۷) میان دو رگ خونی از یک نوع قرار گرفته است: ۱) مویرگ‌های کلافاک ۲) شبکه مویرگی حاصل از سیاهرگ باب کبدی
- ۸) از نظر دسته‌بندی به سه دسته پیوسته، منفذدار و ناپیوسته تقسیم می‌شود: مویرگ‌های خونی



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

مقایسه انواع مویرگ‌های خونی در بدن:

مویرگ‌های ناپيوسته	مویرگ‌های منفذدار	مویرگ‌های پیوسته	
خیر	خیر	خیر	بافت ماهیچه‌ای و پیوندی دارد؟
سنگفرشی تک‌لایه	سنگفرشی تک‌لایه	سنگفرشی تک‌لایه	نوع بافت پوششی آن
بله	بله	بله	غشای پایه دارد؟
—	—	+	یاخته‌های پوششی آن ارتباط تنگانی دارند؟
—	—	+	در دستگاه عصبی یافت می‌شود؟
+	+	+	ورود و خروج مواد را تنظیم می‌کند؟
—	+	—	در یاخته‌های پوششی آن، منفذ یافت می‌شود؟
—	+	—	غشای پایه در آن‌ها ضخیم‌تر است؟
—	+	—	درون کلیه‌ها یافت می‌شود؟
+	—	—	دارای حفره در دیواره خود است؟
+	—	—	در جگر (کبد) یافت می‌شود؟
+	—	—	دارای غشای پایه ناقص است؟

تست و پاسخ ۴

مطابق با مطالب کتاب درسی، گروهی از جانوران دفع مواد زائد نیتروژن‌دار یا مواد معدنی دفعی موجود در محیط داخلی بدن خود به خارج از

بدن را، به کمک نوعی عضو گوارشی انجام می‌دهند، کدام گزینه، فقط در ارتباط با بعضی از این جانوران صادق است؟

(۱) ماده‌ای را از روده خود خارج می‌کنند که با رسوب در برخی مفاصل انسان، موجب نشت خونا در آن‌ها می‌شود.

(۲) بخشی از مواد وارد شده به سامانه دفعی آن‌ها، توسط یاخته‌های پوششی بدن بازجذب می‌شوند.

(۳) به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می‌کند.

(۴) بیش از دو نوع ساختار مشخص، در تنظیم هم‌ایستایی یون (ها) در مایعات بدن نقش دارند.

حشرات + ماهیان غضروفی
ساکن آب شور

پاسخ: گزینه ۱

خودت حل کنی بهتره لوله‌های مالپیگی (سامانه دفعی) حشرات از طریق لوله گوارش و غدد راست‌روده‌ای ماهیان غضروفی ساکن آب شور از طریق روده، به ترتیب در دفع اوریک اسید و محلول غلیظ سدیم کلرید از بدن نقش دارند.

پاسخ تشریحی ماده دفعی نیتروژن‌دار در حشرات اوریک اسید است که از طریق لوله‌های مالپیگی وارد بخشی از لوله گوارش جانور می‌شود و در نهایت از طریق راست روده آن‌ها به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش از بدن دفع می‌شود. اوریک اسید انحلال‌پذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن برای رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است. رسوب بلورهای اوریک اسید در برخی مفاصل باعث بیماری نقرس می‌شود. نقرس موجب التهاب مفاصل می‌شود. التهاب با نشت مواد به خارج از خون و ایجاد تورم همراه است.

نکته در نقرس بلورهای اوریک اسید در مجاورت نوعی بافت پیوندی در مفصل‌های متحرک رسوب می‌کنند. التهاب مفاصل با درد همراه است، پس می‌توان گفت اوریک اسید از جمله مواد شیمیایی است (همانند لاکتیک اسید) که به علت ایجاد آسیب بافتی، می‌تواند بر تحریک گیرنده‌های درد مؤثر باشد.


۱- همه مویرگ‌ها با داشتن غشای پایه در تنظیم ورود و خروج مواد نقش دارند. اما خب برخی‌ها بیشتر و برخی هم کم‌تر!



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

بررسی سایر گزینه‌ها:



۲ حشرات، سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله‌های مالپیگی دارند. اوریک اسید، آب و نمک به لوله‌های مالپیگی جانور وارد می‌شوند. محتوای لوله‌های مالپیگی به روده تخلیه و با عبور مایعات در روده، آب و یون‌ها بازجذب می‌شوند (در راست‌روده). یاخته‌های بازجذب‌کننده آب و یون‌ها پوششی هستند. ماهیان غضروفی هم نوعی جانور مهره‌دار هستند؛ همه مهره‌داران کلیه دارند. در کلیه‌ها علاوه بر دفع مواد اضافی، بازجذب مواد مفید هم صورت می‌گیرد. پس این مورد درباره هر دو جانور درست است.

۳ عبارت مطرح شده، درباره دوزیستان صحیح است، نه حشرات و ماهیان غضروفی! مثانه دوزیستان محل ذخیره آب و یون‌ها است. به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگ‌تر می‌شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می‌کند.

۴ در ماهی‌های غضروفی ساکن آب شور، غدد راست‌روده‌ای با دفع محلول نمک غلیظ به روده، کلیه‌ها با دفع ادرار و آبشش‌ها با دفع برخی یون‌ها می‌توانند در تنظیم اسمزی و تعادل غلظت یون‌ها در مایعات بدن نقش داشته باشند. دقت کنید دستگاه گوارش هم در این هم‌ایستایی نقش دارد. در حشرات هم، لوله‌های مالپیگی، دستگاه گوارش و همچنین دستگاه تنفسی در هم‌ایستایی یون‌ها نقش دارد. دستگاه تنفس با جذب و دفع CO_2 در تنظیم میزان بی‌کربنات می‌تواند نقش داشته باشد. پس این مورد هم، درباره هر دو جانور صحیح است.

تست و پاسخ ۵

کدام گزینه درباره هر نوع پیک شیمیایی دوربرد فاقد ید صحیح است که بر تنظیم بیان ژن در گویچه‌های سفید با هسته گرد یا بیضی شکل در یک انسان سالم و بالغ مؤثر هستند؟

تیموسین + انسولین + برخی پیک‌های دیگر

- ۱) پس از ورود عامل بیگانه به بدن، فرایند تولید آن در سیتوپلاسم برخی یاخته‌ها آغاز می‌شود.
- ۲) فعالیت گروهی از ساختارهای بدون غشا در سیتوپلاسم این یاخته‌ها را تغییر می‌دهد.
- ۳) توسط غدد درون‌ریز متعلق به دستگاه لنفاوی بدن تولید و ترشح می‌شود.
- ۴) تحت تأثیر هورمون‌(های) مترشح از غده‌ای در ناحیه مغز قرار دارد.

پاسخ: گزینه ۲

خود حل کنی بهتره هورمون‌ها، نوعی پیک شیمیایی دوربرد هستند، هورمون‌هایی مثل تیموسین (که باعث تمایز لنفوسیت‌ها می‌شود) و یا انسولین که در تنظیم قند در دسترس یاخته‌ها (جذب قند توسط یاخته) نقش دارند؛ می‌توانند بر تنظیم بیان ژن در این یاخته‌ها مؤثر باشد. البته هورمون‌های دیگری مانند پرولاکتین و یا حتی کورتیزول نیز بر عملکرد دستگاه ایمنی مؤثر هستند، پس می‌توانند بر این یاخته‌ها نیز اثر داشته باشند.

پاسخ تشریحی همه پیک‌های شیمیایی پس از تأثیر بر یاخته هدف خود، فعالیت آن یاخته را تغییر می‌دهند، پروتئین‌ها بخش وسیعی از کارهای یاخته را انجام می‌دهند پس این پیک‌ها می‌توانند فعالیت پروتئین‌ها را در آن‌ها تغییر دهند؛ مثلاً در زمان تمایز لنفوسیت‌ها می‌تواند بر میزان تولید گیرنده‌های آنتی‌ژنی و قرارگیری آن‌ها در سطح یاخته مؤثر باشد. برای تغییر فعالیت یاخته‌ها، لازم است پروتئین‌هایی ساخته شوند و یا حتی جلوی ساخت آن‌ها گرفته شود. تولید پروتئین‌ها در یاخته به دنبال فعالیت ریبوزوم‌ها (ساختارهای بدون غشا) رخ می‌دهد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته رناتن‌ها و سانتیریول‌ها اندامک‌هایی در یاخته‌های جانوری هستند که فاقد غشا می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) دقت داشته باشید تولید و ترشح هورمون‌ها، ارتباطی به ورود عوامل بیگانه به بدن ندارد؛ بلکه این هورمون‌ها مثل تیموسین در حالت عادی نیز در بدن تولید می‌شوند و بر تمایز لنفوسیت‌ها مؤثر هستند.


نکته پروتئین‌هایی مثل پادتن، اینترفرون نوع ۱ و ... از جمله پروتئین‌هایی هستند که به دنبال ورود عوامل بیگانه تولید و ترشح می‌شوند، اما پروتئین‌هایی مثل گیرنده‌های آنتی‌ژنی و پروتئین‌های مکمل، از قبل هم ترشح می‌شوند و در زمان ورود عامل بیگانه به فعالیت می‌پردازند.

۳) در دستگاه لنفی تیموس می‌تواند هورمون تیموسین تولید کند؛ پس لفظ غدد نادرست است.

۴) دقت کنید هورمون تیموسین تحت کنترل هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده

هیپوتالاموسی قرار ندارند. انسولین نیز همین‌طور! اما پرولاکتین تحت اثر هورمون‌های

هیپوتالاموس قرار دارد.



لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی:

لنفوسیت T	لنفوسیت B	
مغز قرمز استخوان ^۱	محل تولیدشدن	
تیموس	محل بالغ شدن	
دارد	توانایی تقسیم‌شدن	
اینترفرون نوع ۱ و ۲ + گیرنده آنتی‌ژنی + برفورین و آنزیم القاکننده مرگ یاخته‌ای (توسط Tهای کشته)	ترشح کدام پروتئین دفاعی	
ندارد! (با یاخته آلوده به ویروس یا سرطانی مبارزه می‌کند نه با خودعامل بیماری‌زا)	توان مبارزه مستقیم با عامل بیماری‌زا ...	

تست و پاسخ ۶

با توجه به مویرگ‌های خونی مستقر در اندام‌های مختلف مطرح‌شده در کتاب درسی، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«به طور معمول انتهای مویرگ(های) خونی موجود در»

۱) در هر دو - بخش قیفی‌شکل گردیزه، جریان رو به خارج مواد از مویرگ مشاهده می‌شود

۲) در هر دو - مرکز پرزهای روده باریک، اختلاف فشار اسمزی با فشار تراوشی بیشتر از سایر بخش‌های مویرگ است

۳) فقط در یکی از دو - اطراف حبابک‌ها، سرخرگ با خون تیره وجود دارد

۴) فقط در یکی از دو - اطراف بخش لوله‌ای گردیزه، کربن دی‌اکسید به خون وارد می‌شود

پاسخ: گزینه ۴

۱- این یاخته‌ها می‌توانند در بخش‌های دیگری از بدن مثل غدد لنفاوی نیز تولید شوند کی؟ وقتی که با آنتی‌ژن مناسب خود برخورد کنند تکثیر می‌شوند و یاخته‌های دیگری را پدید می‌آورند (عمل‌کننده و خاطره) اما منشأ اولیه همه آنها، یاخته‌های بنیادی مغز استخوان است.
۲- پادتن‌ها از یاخته‌های پادتن‌ساز حاصل از تقسیم و تمایز لنفوسیت‌های B حاصل می‌شوند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی در اطراف بخش‌های لوله‌ای شکل گردیزه، شبکه مویرگی دورلوله‌ای قرار دارد. در این شبکه فرایندهای بازجذب و ترشح از مراحل تشکیل ادرار انجام می‌شود. در تمام بخش‌های شبکه دورلوله‌ای، تبادل گازهای تنفسی (رسیدن اکسیژن به یاخته‌ها و دریافت دی‌اکسید کربن از یاخته‌ها) مشاهده می‌شود. توجه کنید که در بخش انتهایی این شبکه مویرگی، فقط مقدار کربن دی‌اکسید بیشتر از ابتدای این شبکه است؛ به همین علت خون تیره مشاهده می‌شود. وگرنه در تمام بخش‌های آن، CO_2 به درون مویرگ وارد می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱ در بخش قیفی شکل گردیزه (کپسول بومن)، گلومرول قرار دارد. در این مویرگ مرحله تراوش از مراحل تشکیل ادرار انجام می‌شود. در نتیجه در این مویرگ، فشار تراوشی بیشتر از فشار اسمزی است و جریان رو به خارج مواد مشاهده می‌شود.
- ۲ به طور طبیعی در دو انتهای مویرگ‌های خونی، اختلاف فشار تراوشی و اسمزی بیشتر از سایر نقاط مویرگ است.
- ۳ در اطراف حبابک‌ها، شبکه مویرگی وجود دارد که در تبادل گازهای تنفسی بین خون و هوا نقش دارد. این شبکه از سرخرگی منشأ می‌گیرد که خون تیره را به آن وارد می‌کند و به سیاهرگی ختم می‌شود که خون روشن را از آن خارج می‌کند.

تست و پاسخ ۷

- از سرخرگ خروجی از بطن چپ در سطح بالایی نوعی دریچه دارای سه قطعه، ابتدا دو انشعاب کوچک‌تر جدا می‌شود، با در نظر گرفتن این مورد، چند مورد مشخصه انشعابی از آن را بیان می‌کند که در صورت رسوب کلسترول در آن، تعداد بیشتری از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب می‌میرند؟
- نقش بیشتری در تأمین مواد مغذی تارهای سازنده گره سینوسی دهلیزی دارد.
 - فقط در تغذیه یاخته‌های دیواره حفرات یک سمت قلب نقش دارد.
 - نسبت به انشعاب دیگر این سرخرگ، زودتر منشعب می‌شود.
 - بخشی از دیواره جلویی نوک قلب را خون‌رسانی می‌کند.

(۴) چهار


(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی موارد سوم و چهارم درست هستند.



سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی

خود حل کنی بهتره سرخرگ خروجی از بطن چپ، سرخرگ آئورت است که در بالای دریچه سینی ابتدای آن، دو انشعاب کوچک‌تر از آن جدا می‌شود (سرخرگ‌های کرونری) که این انشعاب‌ها، به دو شاخه راست و چپ تقسیم می‌شوند. با توجه به شکل‌های کتاب درسی، سرخرگ کرونری چپ انشعابات بیشتری دارد و در نتیجه به یاخته‌های بیشتری از قلب خون‌رسانی می‌کند؛ پس می‌توان گفت در صورت رسوب مولکول‌های کلسترول در دیواره این رگ‌ها و انسداد آن‌ها، تعداد بیشتری از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب ممکن است بمیرند.

نکته سرخرگ‌های کرونری اولین انشعابات سرخرگ آئورت هستند.


بررسی همه موارد:

- مورد اول: گره سینوسی دهلیزی در دیواره دهلیز راست قرار دارد؛ دقت کنید تغذیه سمت راست قلب بیشتر با سرخرگ کرونری راست صورت می‌گیرد!
- مورد دوم: اگرچه این سرخرگ کرونری به سمت چپ بدن جابه‌جا می‌شود، اما فقط به تغذیه سمت چپ قلب نمی‌پردازد؛ با توجه به شکل، می‌توان گفت انشعابات این رگ، به تغذیه بخش‌هایی از سمت راست قلب (مثلاً در بخش‌های جلویی قلب) هم می‌پردازد.
- مورد سوم: با توجه به شکل، سرخرگ کرونری چپ نسبت به سرخرگ کرونری راست زودتر منشعب می‌شود.
- مورد چهارم: با توجه به شکل، سرخرگ کرونری چپ به بخشی از دیواره نوک قلب، خون‌رسانی می‌کند. یعنی انشعابات آن به بخش‌های پایینی قلب می‌روند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس



شکل نامه: سرخرگ های کرونری:

- (۱) دو عدد سرخرگ کرونری به عنوان انشعابات اولیه آئورت از آن جدا شده و خون رسانی به ماهیچه قلب را برعهده دارند.
- (۲) انشعاب اولیه سرخرگ کرونری راست نسبت به سرخرگ کرونری چپ طول بیشتری دارد؛ به عبارتی این سرخرگ دیرتر منشعب می شود.
- (۳) قطر سرخرگ کرونری چپ نسبت به راست اندکی بیشتر بوده و این بدان معناست که می تواند حجم بیشتری از خون را جابه جا کند.
- (۴) انشعابی از سرخرگ کرونری چپ در دیواره جلویی بین دو بطن ها به سمت پایین (نوک قلب) نزول می کند. این انشعابات بر روی بستی از بافت چربی قرار دارند.
- (۵) همان طور که در شکل کتاب درسی نیز مشاهده می کنید، سرخرگ کرونری سمت چپ علاوه بر سمت چپ قلب، مسئولیت خون رسانی به ماهیچه نوک قلب، دیواره بین دو بطن و حتی بخش هایی از سمت راست قلب را نیز، برعهده دارد.
- (۶) سرخرگ کرونری سمت راست، به طور معمول سمت راست قلب را تغذیه می کند. به عبارتی مسئولیت تغذیه گره های قلبی شبکه هادی قلب با سرخرگ کرونری سمت راست بوده و لذا انسداد این رگ ها می تواند در تولید و یا نظم تکان های قلبی اختلال ایجاد کند.
- (۷) سرخرگ های کرونری، توانایی تشکیل انشعابات باریک تر و در نهایت تشکیل شبکه مویرگی را دارند. بعد از شبکه های مویرگی، سیاهرگ های کرونری ایجاد می شوند که در نهایت همگی با هم ادغام شده و محتویات همه آن ها از طریق یک سیاهرگ کرونری به دهلیز راست می ریزد.

تست و پاسخ ۸

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می نماید؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی زیست شناسی ۲، هر نوع ترکیب اسیدی که در مقابله با گروهی از عوامل بیماری زا در بدن نقش مؤثری ایفا می کند، به طور حتم»

HCL + اسید چرب + مواد اسیدی
موجود در دستگاه تناسلی زنان

(الف) توسط یاخته هایی متصل به شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ترشح می شود

(ب) پس از خروج از یاخته سازنده خود، به بخشی خارج از محیط داخلی بدن وارد می شود

(ج) مستقیماً با اثر بر عامل بیماری زا، بخش هایی از آن را تجزیه می کند

(د) ترشح آن، تحت کنترل نورون های دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد

(۴) یک

(۳) دو

(۲) سه

(۱) چهار

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی فقط مورد «ج» عبارت را به نادرستی تکمیل می کند.

خودت حل کنی بهتره پوست ترشحات مختلفی دارد. سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد و محیط اسیدی هم برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست. هم چنین اسید معده هم نوعی ترکیب اسیدی است که میکروب های وارد شده به معده را نابود می کند. در فصل ۷ هم می خوانید، مسیر عبور زامه به سمت گامت ماده اسیدی است که این بخش هم در مبارزه با عوامل بیماری زا نقش دارد. بنابراین ماده چرب سطح پوست و اسید معده و اسید دستگاه تناسلی زنان (حداقل طبق کتاب) مد نظر سؤال هستند.

بررسی همه موارد:

(الف) منظور از یاخته های متصل به شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، یاخته های بافت پوششی هستند؛ اسید معده توسط یاخته های کناری در غدد معده تولید می شود که نوعی یاخته پوششی هستند. اسیدهای چرب نیز توسط یاخته های غدد چربی تولید و ترشح می شوند دقت کنید این غدد نیز همانند سایر غدد برون ریز یاخته هایی از جنس بافت پوششی دارند که این اسیدهای چرب را می سازد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

دقت کنید که یاخته‌های چربی در ترشح اسیدهای چرب به سطح پوست نقش ندارند و این غدد از جنس بافت چربی نیستند. بخش داخلی دستگاه تناسلی زنان از جنس لایه مخاطی است. مخاط بافت پوششی دارد، پس این یاخته‌ها، این ماده اسیدی را می‌سازند.

ب) یاخته‌های کناری معده ترشحات خود را به مجرای غدد معده وارد می‌کنند و سپس این ترشحات از این مجاری به حفرات معده وارد می‌شوند. (یعنی در جایی خارج از محیط داخلی بدن) ترشحات غدد چربی پوست نیز به درون مجاری ویژه‌ای وارد شده و سپس به سطح پوست تخلیه می‌شوند. در دستگاه تناسلی زنان هم این ماده اسیدی در مجاری آن قرار دارد. خون، لنف و مایع میان‌بافتی جزء محیط داخلی بدن هستند.

ج) این مورد درباره اسید معده برخلاف اسیدهای چرب سطح پوست صدق می‌کند؛ طبق کتاب، ماده چرب سطح پوست به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد و این محیط اسیدی هم برای زندگی میکروب‌های بیماری‌زا مناسب نیست؛ نه اینکه مستقیم عامل بیماری‌زا را تجزیه کند! لیزوزیم موجود در عرق در سطح پوست، باکتری‌ها را تجزیه می‌کند.

نکته هر باکتری در سطح پوست تحت تأثیر ترشحات این بخش قرار نمی‌گیرد چراکه در سطح پوست، باکتری‌های مفیدی وجود دارند

که با انسان رابطه همزیستی داشته، پس می‌توانند با این شرایط سازگار باشند.

از جمله این باکتری‌ها، باکتری‌های موجود در سطح پوست هستند که در رقابت برای کسب غذا بر باکتری‌های بیماری‌زا پیروز می‌شوند. دقت کنید باکتری‌های همزیست ساکن در لوله گوارش انسان نیز می‌توانند در بدن زنده بمانند این باکتری‌ها در یک فرد سالم، باعث آسیب به بدن انسان نمی‌شوند.

د) فعالیت یاخته‌های برون‌ریز تحت کنترل اعصاب خودمختار تنظیم می‌شود، چراکه ترشح این مواد به صورت غیرارادی است. پس رشته‌های عصبی خودمختار در تنظیم تولید و ترشح این مواد اسیدی مؤثر هستند.

خط اول دفاعی و مکانیسم‌های آن:

پوست	لایه درونی	در این لایه، بافت پیوندی رشته‌ای وجود دارد که رشته‌های سازنده آن، به طرز محکمی به هم تابیده‌اند. محکم و بادوام است. پس این لایه عمل سد محکم و غیرقابل نفوذ است (به دلیل آرایش خاص رشته‌های سازنده آن!) و مانع نفوذ میکروب‌ها به بخش‌های بعدی می‌شود. چرم که از پوست جانوران درست می‌شود مربوط به همین لایه است.
	لایه بیرونی	شامل چندین لایه یاخته پوششی است که خارجی‌ترین یاخته‌های آن مرده‌اند. این سد نیز مانع نفوذ میکروب‌ها به درون بدن می‌شود؛ چه جوری؟ یاخته‌های مرده در خارجی‌ترین بخش آن، به تدریج می‌ریزند و به این ترتیب، میکروب‌هایی را که به آن چسبیده‌اند، از بدن دور می‌کنند. بین یاخته‌های پوششی، فضای بین‌یاخته‌ای اندکی وجود دارد (به هم چسبیده‌اند) و همین مسئله هم در جلوگیری از نفوذ میکروب‌ها به بخش‌های بعدی نقش دارد.
	ترشحات آن	چربی سطح پوست چربی سطح پوست حواست باشد! این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد و محیط اسیدی برای زندگی میکروب‌های بیماری‌زا مناسب نیست. (لزومن سبب مرگ نمی‌شود). عرق نمک دارد که نمک برای زندگی باکتری‌های غیر همزیست (بیماری‌زا) مناسب نیست. (از بین رفتن هومئوستازی در آن‌ها) آنزیم لیزوزیم (مؤثر در کشتن باکتری‌ها) هم دارد.
		در سطح پوست ما میکروب‌هایی زندگی می‌کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدی بودن، سازش یافته‌اند. این میکروب‌ها از تکثیر میکروب‌های بیماری‌زا جلوگیری می‌کنند، چون در رقابت برای کسب غذا بر آن‌ها پیروز می‌شوند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

آزمون دوم آنلاین

مخاط	سطح مجاری دستگاه‌های تنفس، گوارش و ادراری - تناسلی را مخاط پوشانده است از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی سست تشکیل شده است و ماده چسبناکی را به نام ماده مخاطی ترشح می‌کند. همه این بخش‌ها در جلوگیری از ورود عوامل آسیب‌رسان به درون بدن، نقش دارند. یاخته‌های پوششی مخاط به هم چسبیده‌اند و سدّی را ایجاد می‌کنند. هم‌چنین ماده مخاطی، که چسبناک است، میکروب‌ها را به دام می‌اندازد و از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند. ترشحات مخاط، با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری‌ها نیز می‌شود. در برخی جاها مثل دستگاه تناسلی زنان، در این بخش ترکیبات اسیدی هم دیده می‌شود!
دستگاه تنفس	مکانیسم‌های دفاعی متعددی دارد: عطسه (خروج هوا از راه دهان و بینی) سرفه (خروج هوا از راه دهان / مؤثرتر برای سیگاری‌ها) حواست باشد! مرکز عطسه و سرفه، بصل‌النخاعه مخاط مژکدار هم دارد که در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب‌ها به بخش‌های عمیق‌تر می‌شود. (با به دام افتادن ذرات در ترشحات مخاطی و رانده شدن این ترشحات توسط مژک‌ها به سوی حلق!)
دستگاه گوارش	مکانیسم‌های دفاعی متعددی دارد: دارای بزاق که لیزوزیم دارد. به وسیله اسید معده، میکروب‌های موجود در غذا و آن‌هایی که از حلق آمده‌اند را نابود می‌سازد. استفراغ که محتویات بخشی از لوله گوارش را از بدن خارج می‌کند؛ اگر میکروبی وجود داشته باشد طی این فرایند می‌تواند از بدن خارج شود. مدفوع که شامل مواد جذب‌نشده + گوارش نیافته + یاخته‌های مرده + باقی مانده شیرۀ گوارشی و میکروب‌هایی است که ممکن است به دستگاه گوارش وارد شده باشند.
چشم	اشک (حواست باشد! مرکز تنظیم ترشح آن پل مغزیه) با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می‌کند.
دستگاه ادراری - تناسلی	ادرار باعث بیرون‌راندن میکروب‌های مجاری می‌شود. (حواست باشد! باعث کشتن نمی‌شه)

و به جمع‌بندی ببینیم از انواع ترشحات دفاعی در پوست و خط اول دفاعی بدن!

هر ماده مؤثر در خط اول دفاعی که	عرق	اشک	ماده چرب	اسید معده	ترشحات مخاطی	بزاق
دارای نمک است.	*	*				
دارای لیزوزیم است.	*	*			*	*
دارای خاصیت اسیدی است.			*	*		
چسبناک است.					*	
با سطح پوست در ارتباط است	*	*	*			
با سطح قرینه در ارتباط است.	*	*				
در بینی مشاهده می‌شود.	* (در پوست ابتدای بینی)		* (ابتدای بینی)		* (بعد از پایان یافتن پوست ابتدای بینی و در مخاط مژکدار)	
از پوست ترشح می‌شود.	*		*			



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۹

در زمان آسیب دیدگی شدید دیواره رگ های خونی به منظور جلوگیری از خون ریزی، فرایند(هایی) به راه می افتد. کدام گزینه در خصوص این واکنش ها صحیح است؟


تشکیل لخته

- (۱) در پی تغییر شکل سبه بعدی برخی از اجزای متنوع ترین گروه مولکول های زیستی، درپوش پلاکتی در محل خونریزی ایجاد می گردد.
- (۲) حضور انواعی از ترکیبات آلی و معدنی به منظور ادغام غشای ریزکیسه های حاوی فیبرین با غشای یاخته ضروری است.
- (۳) نوعی کاتالیزور زیستی پس از تغییراتی در برهم کنش های آبگریز نوعی بسیار زیستی در خوناب ایجاد می گردد.
- (۴) همه آنزیم های دخیل در فرایند، توسط هر ساختار متصل به شبکه آندوپلاسمی زبر سنتز می شوند.

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی منظور از عبارت صورت سؤال، فرایند تشکیل لخته است. در این

فرایند آنزیم های مختلفی شرکت می کنند مثل پروترومبیناز و ترومبین، پروتئین ترومبین هم خاصیت آنزیمی دارد، چراکه می تواند فیبرینوژن را تغییر دهد. این پروتئین می تواند در پی تغییر نوعی پروتئین دیگر (پروترومبین) ایجاد گردد. تغییر پروترومبین با تغییر در پیوندهای آن از جمله برهم کنش های آبگریز آن رخ می دهد.



بررسی سایر گزینه ها:

۱ در فرایند تشکیل لخته، درپوش پلاکتی ایجاد نمی شود. بلکه در زمان آسیب دیدگی های جزئی دیواره مویرگ ها پلاکت ها درپوش تشکیل می دهند. این دو فرایند از هم متفاوت هستند.

۲ ترکیبات مورد نیاز برای انجام فرایند تشکیل لخته یون کلسیم (معدنی) و ویتامین K (آلی) است. هم چنین برای ترشح ریزکیسه ها به خارج از یاخته، ATP مصرف می شود که طی هیدرولیز آن، H_2O هم مصرف می شود، اما توجه داشته باشید در زمان تشکیل لخته، پروتئین های فیبرین درون خوناب از تغییر شکل فیبرینوژن ایجاد می شوند نه اینکه اگزوسیتوز شوند.

۴ ترومبین و آنزیم پروترومبیناز، آنزیم هایی هستند که در فرایند تشکیل لخته مؤثرند. دقت داشته باشید پروتئین های ترشحی از طریق رناتن های متصل به شبکه آندوپلاسمی زبر تولید می شوند؛ اما توجه کنید غیر از رناتن، شبکه آندوپلاسمی صاف و حتی بخشی از پوشش هسته نیز به شبکه آندوپلاسمی زبر متصل هستند.

تست و پاسخ ۱۰

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«تنگ شدن سرخرگ باعث افزایش شبکه مویرگی مرتبط با نفرون های کلیه می شود.»

(الف) وایران برخلاف تنگ شدن سرخرگ آوران – حجم خون فقط در یک

(ب) آوران همانند گشاد شدن سرخرگ وایران – جریان رو به خارج در اولین

(ج) وایران همانند تنگ شدن سرخرگ آوران – میزان بازجذب مواد در دومین

(د) آوران برخلاف گشاد شدن سرخرگ وایران – جریان رو به داخل در هر دو

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی فقط مورد «الف» جمله را به درستی کامل می کند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس


بررسی همه موارد:

(الف) با تنگ شدن سرخرگ و ابران خون به راحتی از گلومرول به سرخرگ و ابران وارد نمی شود، در نتیجه حجم خون در گلومرول زیاد (سرعت خروج خون از آن ها کاهش می یابد) و در شبکه مویرگی دورلوله ای کم می شود. در صورتی که آوران تنگ شود، خون کمتری به گلومرول و در نتیجه دورلوله ای وارد می شود؛ در نتیجه حجم خون در هر دو شبکه مویرگی کم می شود.

(ب) جریان رو به خارج در مویرگ، تابع میزان حجم و فشار خون در مویرگ است. هر چه قدر مقدار حجم خون بیشتر باشد، جریان رو به خارج هم بیشتر است و برعکس! در صورت تنگ شدن سرخرگ آوران و یا گشاد شدن سرخرگ و ابران، حجم خون (جریان خون) در گلومرول کم می شود؛ در نتیجه جریان رو به خارج (تراوش) کاهش می یابد.

(ج) تنگ شدن و ابران باعث می شود که خون در گلومرول تجمع کند و خون کمتری به شبکه مویرگی دورلوله ای وارد شود. در این وضعیت تراوش مواد بیشتر از حالت طبیعی خواهد بود؛ در نتیجه می توانیم بگوییم که باید باز جذب مواد هم بیشتر شود. اما تنگ شدن آوران باعث کاهش تراوش و به دنبال آن کاهش باز جذب می شود.

(د) در شبکه مویرگی اول کلیه، جریان رو به داخل مشاهده نمی شود؛ به عبارتی در این مویرگ صرفن جریان رو به خارج مواد انجام می شود و مواد طی تراوش به کپسول بومن وارد می شوند.



آزمون دوم آنلاین

رشته تجربی

تست و پاسخ ۱۱

التهاب

در پی رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل نوعی واکنش دفاعی در بدن به راه می افتد. کدام عبارت، در ارتباط با این فرایند صحیح است؟

- (۱) فقط گروهی از بیگانه خوارهای خون، پیک های شیمیایی تولید می کنند که گوچه های سفید را به سمت موضع آسیب فراخوانی می کنند.
- (۲) پروتئین های مکمل به دنبال خروج از خون به غشای عامل بیگانه متصل شده و بیگانه خواری درشت خوارها را افزایش می دهند.
- (۳) هیستامین مترشح از بیگانه خوارها باعث گشاد شدن رگ های خونی شده و هیچگاه به جریان خون وارد نمی شود.
- (۴) امکان بروز علائمی مانند افزایش حجم مایع احاطه شده توسط کپسول مفصلی و تحریک گیرنده درد وجود دارد.

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی

رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل متحرک باعث بیماری نقرس می شود. نقرس یکی از بیماری های مفصلی است که با التهاب آن ها همراه است. التهاب، نوعی واکنش دفاعی است. تورم در محل آسیب دیدگی از علائم التهاب است که این تورم ناشی از افزایش حجم مایع احاطه شده توسط کپسول مفصلی است. همچنین پاسخ التهابی می تواند در پاسخ به آسیب بافتی نیز رخ دهد و می دانیم که گیرنده های درد در زمان آسیب بافتی تحریک می شوند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ طبق متن کتاب، یاخته‌های دیواره مویرگ خونی و درشت‌خوارهای بافتی توانایی تولید پیک شیمیایی مؤثر در فراخوانی گویچه‌های سفید به سمت موضع آسیب را دارا هستند. درشت‌خوارها در خون دیده نمی‌شوند! نوتروفیل‌ها از جمله بیگانه‌خوارهای خونی هستند که طبق کتاب، طی پاسخ التهابی، پیک شیمیایی ترشح نمی‌کنند.

بر اساس منابع علمی به طور کلی ما دو گروه ماکروفاژ در محل التهاب داریم! دسته‌ای از این درشت‌خوارها با تمایز یافتن از مونوسیت‌های دیپدز یافته، ایجاد شده و به بیگانه‌خواری می‌پردازند. (یعنی از قبل نبودن و پس از شروع پاسخ التهابی در محل ایجاد می‌شوند)، اما گروهی دیگر از قبل در این محل وجود دارند و با ترشح پیک شیمیایی به فراخوانی گویچه‌های سفید به محل آسیب‌دیده کمک می‌کنند. این درشت‌خوارهای مستقر در بافت نسبت به سایر ماکروفاژها زودتر وارد عمل شده و بیگانه‌خواری می‌کنند.

نکته مونوسیت‌ها اگرچه جزء گویچه‌های سفید خونی بدون دانه محسوب می‌شوند، اما طبق شکل کتاب در درشت‌خوارها دانه‌هایی دیده می‌شود که این‌ها در واقع ریزکیسه‌های حاوی مواد دفاعی هستند.

۲ این پاسخ التهابی در پی رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل ایجاد می‌شود به عبارتی، این نوع التهاب به دلیل ورود میکروب یا باکتری به بدن رخ نمی‌دهد، در نتیجه در این زمان، اتصال پروتئین‌های مکمل به غشای عامل بیگانه مشاهده نمی‌شود. چراکه عامل بیگانه‌ای نداریم!

نکته همه پاسخ‌های التهابی منشأ خارجی ندارند. التهاب می‌تواند در پاسخ به ورود عامل خارجی مانند ورود باکتری یا ویروس و ... به بدن باشد یا در اثر وقایع و آسیب‌های بافتی درونی در بدن بروز یابد مانند التهاب ناشی از رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل متحرک در بیماری نقرس.

۳ در التهاب از ماستوسیت‌های آسیب‌دیده هیستامین رها (نه ترشح!!) می‌شود و رگ‌ها را گشاد می‌کند. به این ترتیب به دلیل افزایش جریان خون ناشی از گشاد شدن رگ‌ها، گویچه‌های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می‌شوند و خونا ب بیشتری هم به بیرون نشت می‌کند. هم‌چنین دقت کنید که این هیستامین مطابق شکل کتاب می‌تواند به جریان خون نیز وارد شود.

نکته هیستامین نوعی پیک شیمیایی کوتاه‌برد است که در جریان التهاب وارد مایع بین یاخته‌ای و در ادامه مویرگ‌های خونی می‌شود. این پیک با اثر بر دیواره مویرگ‌های خونی، فاصله میان یاخته‌های پوششی جدار آن را از یکدیگر افزایش می‌دهد. که نتیجه‌اش می‌شود گشاد شدن رگ‌ها و افزایش نفوذپذیری آن‌ها؛ بنابراین امکان دارد در بدن انسان نوعی پیک شیمیایی کوتاه‌برد نیز، بتواند وارد خون شود!

تست و پاسخ ۱۲

اندام‌هایی در انسان وجود دارند که در پی اثرپذیری از نوعی هورمون مترشح از اندام‌های لوبیایی‌شکل، به تولید مقادیر زیادی از نوعی یاخته زنده فاقد هسته از بافت پیوندی می‌پردازند، چند مورد فقط در خصوص گروهی از این اندام‌ها درست است؟

کبد + طحال + مغز استخوان

الف) توانایی تولید فراوان‌ترین ترکیب آلی موجود در ادرار را دارند.

ب) دو نوع خون حاوی مقادیر متفاوتی از گازهای تنفسی، به آن (ها) وارد می‌شود.

ج) پس از تجزیه یاخته‌های خونی پیر و فرسوده، آهن درون آن‌ها را آزاد می‌کنند.

د) درون آن‌ها، هر لنفوسیت مؤثر در دفاع اختصاصی، واجد گیرنده‌های آنتی‌ژنی در سطح خود است.

(۴) یک

(۳) دو

(۲) سه

(۱) چهار

پاسخ: گزینه ۲



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

خودت حل کنی بهتره اندام‌های لوبیایی شکل، کلیه‌ها هستند که با تولید هورمون اریتروپویتین در تولید گویچه‌های قرمز (یاخته‌های زنده فاقد هسته) نقش دارند؛ در یک فرد بالغ، تولید یاخته‌های خونی و گرده‌ها در مغز قرمز استخوان انجام می‌شود؛ البته در دوران جنینی، یاخته‌های خونی و گرده‌ها در اندام‌های دیگری مثل کبد و طحال نیز ساخته می‌شود؛ پس می‌توان گفت در صورت سؤال، مغز قرمز استخوان و کبد و طحال مد نظر طراح هستند. چراکه به بالغ بودن فرد اشاره‌ای نشده است پس هم فرد بالغ و هم نابالغ در نظر گرفته می‌شود.

نکته در سراسر حیات یک انسان، مغز قرمز استخوان و کبد و طحال به نوعی در تولید گویچه‌های قرمز نقش دارند؛ کبد و طحال که همراه با مغز استخوان در دوران جنینی به تولید گویچه‌های خونی می‌پردازند. مغز استخوان در بلوغ هم به تولید این یاخته‌ها می‌پردازد. کبد با تولید اریتروپویتین و ذخیره آهن و طحال همانند کبد با تجزیه گویچه‌های قرمز فرسوده و آزادسازی آهن آن‌ها، در ادامه زندگی یک فرد در ساخت گویچه‌های قرمز نقش دارند.


پاسخ تشریحی موارد «الف»، «ب» و «ج» صحیح هستند.

بررسی همه موارد:

الف) فراوان‌ترین ماده دفعی آلی در ادرار، اوره است. در نتیجه تجزیه موادی مانند آمینواسیدها، آمونیاک تولید می‌شود که بسیار سمی است. کبد، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن‌دی‌اکسید به اوره تبدیل می‌کند؛ این مورد فقط درباره کبد صادق است.

نکته اوره نوعی ترکیب شیمیایی نیتروژن دار بوده و در اثر فرایند تراوش از کلافک وارد فضای نفرون می‌شود. هم‌چنین دقت داشته باشید این ترکیب شیمیایی فراوان‌ترین ماده آلی سازنده ادرار را تشکیل می‌دهد؛ نه فراوان‌ترین ماده دفعی آن را! آب، فراوان‌ترین ماده دفعی ادرار است.

ب) سیاهرگ باب کبدی (دارای خون تیره) و سرخرگ کبدی (منشعب‌شده از آئورت و دارای خون روشن) پس از ورود به کبد، شبکه مویرگی تشکیل می‌دهند؛ پس این مورد درباره کبد صادق است. میزان گازهای تنفسی در سیاهرگ باب کبدی و سرخرگ کبدی (خون تیره و روشن) متفاوت است. در خون روشن نسبت به خون تیره، O_2 بیشتر و CO_2 کمتر وجود دارد.



نکته شبکه مویرگی حاصل از سرخرگ ورودی به کبد، در نهایت به سیاهرگ منتهی می‌شود، شبکه مویرگی حاصل از سیاهرگ باب کبدی هم در نهایت به سیاهرگ ختم می‌شود که این سیاهرگ‌ها در نهایت خون خروجی خود را، وارد سیاهرگ فوق کبدی کرده تا به سمت بزرگ سیاهرگ زیرین هدایت شود. به عبارتی همه خون تیره کبد در نهایت وارد سیاهرگ فوق کبدی می‌شود.

ج) تخریب یاخته‌های خونی قرمز آسیب‌دیده و مرده در طحال و کبد انجام می‌شود. آهن آزادشده در این فرایند یا در کبد ذخیره می‌شود و یا همراه خون به مغز قرمز استخوان می‌رود و در ساخت دوباره گویچه‌های قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پس این مورد درباره کبد و طحال صادق است.

د) هر لنفوسیت مؤثر در دفاع اختصاصی، لزومن گیرنده آنتی‌ژنی ندارد؛ مثلاً یاخته‌های پادتن ساز یا همان پلاسموسیت‌ها، گیرنده آنتی‌ژنی ندارند! این یاخته‌ها، در دستگاه لنفی می‌توانند دیده شوند. لنفوسیت‌های نابالغ هم، گیرنده آنتی‌ژنی ندارند که در مغز استخوان، می‌توانند دیده شوند.

نکته در سطح غشای لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی انواعی از گیرنده‌ها قابل مشاهده هستند. دقت داشته باشید اگرچه این یاخته‌ها حداکثر می‌توانند یک نوع گیرنده آنتی‌ژنی داشته باشند، اما از آن‌جا که برای هورمون‌هایی نظیر هورمون‌های تیروئیدی و انسولین هم واجد گیرنده هستند، بنابراین به طور حتم بیش از یک نوع گیرنده در سطح غشای خود دارند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۳

در پی تجزیه شدن ترکیب کربن دار حاصل از فعالیت نوعی پروتئین آنزیمی درون گویچه قرمز، دو نوع یون معدنی تولید می شود. چند مورد فقط در ارتباط با یکی از این یون ها صحیح است؟

بی کربنات و یون هیدروژن

(الف) در پی افزایش فعالیت یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، باز جذب آن توسط یاخته های ریز پر زدار می تواند افزایش یابد.

(ب) تحریک گیرنده های حساس به میزان آن در خون، در تنظیم فشار سرخرگی در حد طبیعی نقش مؤثری دارد.

(ج) به دنبال گشاد شدن سرخرگ های کوچک، همواره مقدار آن در خنوب افزایش پیدا می کند.

(د) بدون توجه به اندازه و نوع بار آن، طی تراوش، وارد حجیم ترین بخش نفرون می شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)


پاسخ: گزینه ۲

موارد «الف» و «ب» به درستی بیان شده اند.

خود حل کنی بهتره

در گویچه های قرمز، آنزیمی به نام کربنیک انیدراز وجود دارد که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید تولید می کند. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود بنابراین منظور سؤال دو یون بی کربنات و هیدروژن است.

بررسی همه موارد:



(الف) در پی فعالیت شدید یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، به دلیل کمبود O_2 در دسترس این یاخته، امکان دارد تولید لاکتیک اسید افزایش یابد؛ هم چنین ممکن است جریبه ها برای تأمین انرژی مصرف شوند، نتیجه این وقایع، کاهش pH خون است؛ در این شرایط، به منظور حفظ هومئوستازی خون لازم است تا دفع یون H^+ (ترشح آن) افزایش یابد و باز جذب یون بی کربنات توسط یاخته های ریز پر زدار لوله پیچ خورده نزدیک افزایش پیدا کند.

(ب) گیرنده های حساس به فشار خون، گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید و یون هیدروژن پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ، و نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود. دقت کنید بی کربنات گیرنده ندارد، بلکه خود CO_2 گیرنده دارد.

(ج) در بافت ها افزایش کربن دی اکسید، با گشاد کردن سرخرگ های کوچک میزان جریان خون را در آن ها افزایش می دهد. به دنبال افزایش کربن دی اکسید و گشاد شدن سرخرگ ها میزان تبادل گازهای تنفسی یاخته های بدن با خون افزایش می یابد، در نتیجه CO_2 حاصل از فعالیت یاخته ها توسط آنزیم کربنیک انیدراز با آب مخلوط شده و در نهایت میزان دو یون بی کربنات و هیدروژن افزایش می یابد نتیجه نهایی این فرایند هم افزایش دفع CO_2 از بدن است. به عبارتی به دنبال این فرایند میزان این یون ها در نهایت کاهش می یابد.

(د) در مرحله تراوش، یون ها، مواد مفیدی مثل گلوکز و مواد دفعی بر اساس اندازه خود وارد کپسول بومن می شوند. این عبارت در ارتباط با هر دو یون بی کربنات و هیدروژن صحیح است. مثلاً اگر این یون ها به قدری بزرگ بودند که از منافذ دیواره مویرگ ها عبور نمی کردند تراوش هم نمی شدند، اما چون کوچک هستند می توانند تراوش شوند.

تست و پاسخ ۱۴

کدام گزینه در خصوص اجزای دستگاه لنفی یک انسان سالم و بالغ نادرست است؟

(۱) لنف طحال پس از عبور از تعدادی گره لنفی، در مجاور پانکراس به قطورترین مجرای لنفی می ریزد.

(۲) مجرای لنفی چپ با عبور از جلوی سیاهرگ زیر ترقوه ای همان سمت، محتویات خود را به درون آن تخلیه می کند.

(۳) نوعی مجرای لنفی که در طول آن، چندین گره لنفی قابل مشاهده است، به سیاهرگ زیر ترقوه ای قطورتر تخلیه می شود.

(۴) لنف خروجی از بالاترین و پایین ترین اندام لنفی هنگام ورود به قلب، به طور حتم به بالاترین بخش دهلیز راست وارد می شود.


پاسخ: گزینه ۲



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

درس نامه... جمع بندی دستگاه لنفی



۱) دستگاه لنفی از رگ های لنفی، مجاری لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی تشکیل شده است.

۲) بالاترین و پایین ترین اندام لنفی در بدن انسان، مغز قرمز استخوان است که در بافت استخوانی اسفنجی دیده می شود.

۳) دستگاه لنفی وظایف گوناگونی برعهده داشته و از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) اندام های این دستگاه توانایی تولید گویچه های سفید خونی مانند لنفوسیت های دفاع اختصاصی را داشته و بنابراین در فعالیت های ایمنی بدن انسان مؤثر هستند. مغز استخوان توانایی تولید گویچه های قرمز و گرده ها را هم دارد، اما گویچه های سفید مثل لنفوسیت های دفاع اختصاصی در سایر بخش های این دستگاه هم، می توانند تولید شوند.

ب) دستگاه لنفی در انتقال چربی های جذب شده از پرزهای دیواره روده باریک نقش دارد که این مواد در نهایت به خون وارد می شوند.

ج) این دستگاه می تواند در پخش یاخته های سرطانی به بخش های مختلف بدن نقش داشته باشد.

۴) در این دستگاه، دو مجرای لنفی بزرگ وجود دارد. مجرای لنفی راست و چپ، دقت کنید مجرای لنفی راست از مجرای لنفی چپ نازک تر بوده، پس نقش کمتری در بازگرداندن لنف به جریان خون دارد. مجرای لنفی راست برخلاف چپ در طول خود دارای گره های متعددی است اما مجرای لنفی چپ فاقد گره است.

۵) مجرای لنفی راست به سیاهرگ زیر ترقوه ای راست و مجرای لنفی چپ به سیاهرگ زیر ترقوه ای چپ می ریزد. همان طور که در شکل می بینید هر دو مجرای لنفی برای ملحق شدن به سیاهرگ زیر ترقوه ای سمت خود، از پشت آن (زیر آن) عبور می کنند.

۶) سیاهرگ زیر ترقوه ای راست نسبت به سیاهرگ زیر ترقوه ای چپ قطر بیشتری دارد.

۷) بزرگ ترین مجرای لنفی، مجرای لنفی چپ است. این مجرا از سطح پشتی قلب عبور می کند. گروهی از گره های لنفی که لنف خود را به این مجرا تخلیه می کنند، در سطح زیر دیافراگم (در حفره شکمی) و گروهی بالای دیافراگم (درون بخشی از قفسه سینه، سر و گردن) قرار دارند.

۸) لنف هر دو پا به مجرای لنفی چپ وارد می شود. اما در ارتباط با لنف خروجی از دست ها دقت داشته باشید، لنف دست راست به مجرای لنفی راست و لنف دست چپ به مجرای لنفی چپ می ریزد.

۹) تراکم گره های لنفی در بخش های گوناگون دستگاه با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال در کشاله ران، زانو و زیر بغل تراکم زیادی از گره های لنفی یافت می شود اما در بخش هایی مانند ساعد دست ها و کف دست تراکم آن ها به شدت کاهش پیدا می کند. (دیده نمی شود)

۱۰) به گره های لنفی تعدادی رگ وارد و تعدادی هم، خارج می شود. در محل اتصال رگ های لنفی به گره های لنفی، دریچه هایی مشاهده می شود که جریان لنف را یک طرفه می کند.

۱۱) همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، دریچه های موجود در رگ های لنفی از دو قطعه تشکیل شده اند. اما دو اندام لنفی مهم ...

تیموس:

۱۲) در سطح جلوتر از قلب و پشت استخوان جناغ واقع شده است.

۱۳) از دو نیمه تشکیل شده است که یکی بزرگ تر از دیگری است یعنی دو نیمه غیر هم اندازه با هم.

۱۴) هورمون مترشحه از آن تیموسین نام دارد. این هورمون در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد.

طحال:

۱۵) یکی از مراکز تولید گویچه های خونی و گرده ها در زمان جنینی بوده اما پس از تولد به عنوان مرکز تخریب گویچه های قرمز پیر و آسیب دیده محسوب می شود.

۱۶) سرخرگ ورودی به آن نسبت به سیاهرگ خروجی از آن در سطح بالاتری واقع شده است.

۱۷) لنف خود را به مجرای لنفی چپ تخلیه می کند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی طبق شکل کتاب درسی، مجرای لنفی چپ با عبور از پشت (نه جلوی!) سیاهرگ زیرترقوه‌ای همان سمت، محتویات خود را به درون آن تخلیه می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) قطورترین مجرای لنفی، مجرای لنفی چپ است؛ با توجه به شکل کتاب درسی، لنف طحال پس از عبور از تعدادی گره لنفی، در مجاور پانکراس (لوزالمعده) به مجرای لنفی چپ می‌ریزد.

۳) در طول مجرای لنفی راست، چند گره لنفی قابل مشاهده است؛ مجرای لنفی راست به سیاهرگ زیرترقوه‌ای راست که قطورتر از سمت چپی است، تخلیه می‌شود.

۴) بالاترین و پایین‌ترین اندام لنفی، مغز قرمز استخوان است؛ این مغز در بافت استخوانی اسفنجی وجود دارد و از آن جایی که در همه استخوان‌های بدن هم بافت استخوانی اسفنجی داریم و هم متراکم، می‌توان گفت این اندام لنفی هم در بخش‌های بالایی بدن و هم پایینی آن وجود دارد؛ لنف، در هر صورت به بزرگ سیاهرگ زبرین وارد می‌شود که این سیاهرگ هم، محتویات خود را به بخش بالایی دهلیز راست تخلیه می‌کند.

تست و پاسخ ۱۵

به دنبال مصرف نوعی ترکیب شیمیایی، ایجاد پیام الکتریکی در یاخته‌های سازنده گره دهلیزی - بطنی به شدت مهار می‌شود، کدام مورد نمی‌تواند از عواقب مصرف این ترکیب شیمیایی در یک انسان بالغ محسوب شود؟

۱) اختلال در باز و بسته شدن دریچه لانه‌کبوتری در بزرگ‌ترین سیاهرگ ناحیه گردن

۲) توقف فرایندهای تولید و مصرف انرژی در یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی

۳) افزایش تحریک گیرنده‌های فاقد پوشش پیوندی در برخی بافت‌ها

۴) افزایش فشار درون سیاهرگ (های) متصل به حفره (های) بالایی قلب

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی با مهار ایجاد پیام الکتریکی در یاخته‌های سازنده گره دهلیزی - بطنی، در انتشار پیام الکتریکی به بطن‌ها اختلال ایجاد می‌شود؛ در نتیجه در نهایت انقباض ماهیچه قلب نیز مختل می‌شود. دقت کنید دریچه‌های لانه‌کبوتری در سیاهرگ‌های دست و پا وجود دارند نه سیاهرگ‌های ناحیه گردن! هم‌چنین این موضوع ارتباط مستقیمی با قدرت انقباضی قلب ندارد. بلکه انقباض ماهیچه‌های اسکلتی (در نواحی پایین‌تر از قلب) مجاور سیاهرگ‌ها در باز شدن و یا بسته شدن این دریچه‌ها، نقش دارد.

نکته در خصوص دریچه‌های لانه‌کبوتری باید بدانید که:

۱) در بسیاری از سیاهرگ‌ها وجود دارند. مانند سیاهرگ‌های دست و پا.

۲) در طول سیاهرگ وجود دارند نه در ابتدا و یا انتهای آن‌ها!

۳) باز و بسته شدن آن‌ها در نتیجه انقباض و استراحت ماهیچه‌های اسکلتی اطراف سیاهرگ است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در این زمان به دلیل نرسیدن پیام تحریک به ماهیچه‌های بطن‌ها به تدریج خروج خون (حجم ضربه‌ای به مقدار کافی) با اختلال مواجه شده و سرخرگ‌های کرونری با کمبود خون ورودی به آن‌ها، مواجه می‌شوند. در این زمان به تدریج با نرسیدن اکسیژن کافی به این یاخته‌ها، فعالیت‌های مربوط به تولید و مصرف انرژی در این یاخته‌ها متوقف می‌گردد.

۳) گیرنده‌های درد گیرنده‌های فاقد پوشش هستند که به صورت انتهای دندریت آزاد می‌باشند؛ به دنبال عدم ایجاد حجم ضربه‌ای کافی یا عدم پمپاژ خون به درون گردش عمومی، ممکن است خون‌رسانی به اندام‌ها مختل شده و در نتیجه آسیب بافتی ایجاد شود. این آسیب بافتی می‌تواند سبب تحریک گیرنده‌های درد شود.

۴) در صورت عدم انقباض کافی ماهیچه قلبی، خون در قلب تجمع می‌یابد و از آن خارج نمی‌شود؛ به دنبال این اتفاق، خون به بخش‌های قلبی یعنی سیاهرگ‌ها پس زده می‌شود (در واقع خون سیاهرگی به طور کامل به قلب وارد نمی‌شود) و فشار درون سیاهرگ‌ها افزایش پیدا می‌کند!



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۶

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟


«طبق اطلاعات کتاب درسی، هر ساختاری که به بخشی غیر از جایگاه‌های اتصال به پادتن از پروتئین پادتن متصل شده و توانایی تولید و

مصرف انرژی زیستی را»

پروتئین‌های مکمل + بیگانه‌خوارها

- (۱) دارد، پیک شیمیایی مؤثر در فراخوانی گویچه‌های سفید به محل ملتهب را تولید می‌کند.
- (۲) دارد، به کمک کیسه‌هایی پر از آنزیم می‌تواند ساختارهای یاخته‌ای و غیریاخته‌ای را تجزیه نماید.
- (۳) ندارد، پیش از فعال کردن ساختاری مشابه خود، به طور حتم ابتدا از عامل فعال‌کننده خود جدا می‌گردد.
- (۴) ندارد، با ایجاد منفذی در غشای یاخته سرطانی، زمینه ورود نوعی آنزیم به سیتوپلاسم آن‌ها را فراهم می‌نماید.

پاسخ: گزینه ۲




پاسخ تشریحی: پادتن‌ها مولکول‌هایی Y شکل و از جنس پروتئین هستند. هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به آنتی‌ژن دارد و بخش دیگر آن هم می‌تواند به پروتئین مکمل و هم به بیگانه‌خوارها متصل شود؛ بنابراین پروتئین مکمل و بیگانه‌خوارها مد نظر سؤال هستند که بیگانه‌خوارها (مثل ماکروفاژها) برخلاف پروتئین مکمل توانایی تولید و مصرف انرژی زیستی را دارند.

همه بیگانه‌خوارها به دنبال فرایند بیگانه‌خواری باید با استفاده از آنزیم‌های تجزیه‌کننده خود، ساختارهای بلعیده‌شده که می‌توانند یاخته‌ای (مثلن باکتری‌ها) و غیریاخته‌ای (مثلن ویروس‌ها) باشند را تجزیه کنند؛ این آنزیم‌ها درون ریزکیسه‌ها ذخیره شده‌اند.

نکته: علاوه بر گیرنده‌های آنتی‌ژنی در غشای لنفوسیت‌های B و پادتن‌ها، کربوهیدرات‌هایی که در سطح خارجی غشای یاخته‌ها نیز قرار می‌گیرند، می‌توانند ظاهری Y شکل داشته باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در التهاب یاخته‌های دیواره مویرگ‌ها و درشت‌خوارها با تولید پیک‌های شیمیایی، گویچه‌های سفید خون را به محل آسیب فرا می‌خوانند؛ توجه داشته باشید که درشت‌خوارهای حاضر در محل التهاب با تولید پیک شیمیایی باعث فراخوانی گویچه‌های سفید به محل التهاب می‌شوند اما بیگانه‌خوارهایی مثل نوتروفیل‌ها هم می‌توانند به بخش دم! پادتن متصل شوند. نوتروفیل‌ها، این پیک‌های شیمیایی را تولید و ترشح نمی‌کنند.



(۳) با توجه به شکل مقابل، پروتئین مکمل فعال‌شده، برای فعال کردن پروتئین مکمل دیگر، در حالی که هم‌چنان به پادتن متصل است، آن را فعال می‌کند؛ یعنی از پادتن که عامل فعال‌کننده آن بوده است، جدا نشده است!

(۴) پروتئین‌های مکمل فعال‌شده، به کمک یکدیگر، با ایجاد ساختارهای حلقه‌مانند در غشای میکروب‌ها (نه غشای یاخته سرطانی!)، منافذی را به وجود می‌آورند.

نکته: پروتئین‌های مکمل در غشای میکروب‌ها و پرفورین‌ها در غشای یاخته آلوده به ویروس، یاخته بافت پیوندشده یا یاخته سرطانی منفذ ایجاد می‌کنند. به هم خوردن تعادل ورود و خروج مواد به دنبال اثر پروتئین مکمل، عامل مرگ باکتری بیگانه است. اما در حالت پرفورین، آنزیم لاکاننده‌ای که از طریق آن، وارد یاخته می‌شود با راه‌اندازی مرگ برنامه‌ریزی‌شده، سبب مرگ آن می‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

بررسی انواعی از پروتئین‌های ایمنی:

پروتئین‌ها	کدام خط دفاعی؟	وظیفه	یاخته ترشح کننده	یاخته هدف	توضیحات لازم
مکمل	دوم	۱) فعال شده‌ها با ایجاد ساختارهای حلقه‌مانند در غشای میکروب‌ها، منافذی به وجود می‌آورند (چندتایی نه انفرادی). این منافذ عملکرد غشای یاخته‌ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می‌برند و سرانجام یاخته بیگانه می‌میرد. ۲) قرار گرفتن پروتئین‌های مکمل در غشای میکروب، باعث می‌شود که بیگانه‌خواری آن‌ها آسان‌تر انجام شود.	😊	غشا میکروب	- پروتئین محلول در خوناب است که همواره تولید می‌شود - این پروتئین‌ها در فرد غیر آلوده به صورت غیرفعال‌اند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال می‌شوند. واکنش فعال‌شدن، به این صورت است که وقتی یکی از این پروتئین‌ها فعال می‌شود، دیگری را فعال می‌کند و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. - در اثر پادتن‌ها هم می‌توانند فعال شوند.
اینترفرون نوع ۱	دوم	افزایش مقاومت یاخته آلوده به ویروس و یاخته سالم مجاور آن نسبت به ویروس!	یاخته آلوده به ویروس	یاخته آلوده به ویروس و سالم مجاور آن	-
اینترفرون نوع ۲	دوم	درشت‌خوارها را فعال می‌کند. (در پاسخ به یاخته‌های سرطانی)	یاخته‌های کشته شده طبیعی و لنفوسیت T	درشت‌خوارها	نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته‌های سرطانی دارد.
پرفورین و آنزیم الفاکندنده مرگ برنامه‌ریزی شده	دوم + سوم (بسته به نوع یاخته ترشح کننده آن‌ها)	پرفورین‌ها منفذی در غشای یاخته خودی تغییر یافته (سرطانی یا آلوده به ویروس) یا یاخته بافت پیوند زده شده ایجاد می‌کنند. سپس با وارد شدن آنزیمی به درون یاخته از طریق این منافذ، باعث آغاز مرگ برنامه‌ریزی شده می‌شوند و در نهایت هم مرگ یاخته هدف	لنفوسیت T کشته شده و لنفوسیت طبیعی	یاخته آلوده به ویروس و سرطانی + یاخته‌های بافت پیوند زده شده	هم در دفاع اختصاصی و هم در دفاع غیراختصاصی نقش دارد. از طریق برون‌رانی و با مصرف انرژی، همراه با یکدیگر (از یک ریزکیسه مشترک) ترشح می‌شوند. پرفورین منفذ می‌سازد تا آنزیم وارد شود. خود آنزیم سبب مرگ نمی‌شود (مستقیم) بلکه فرایندهایی را به راه می‌اندازد که این فرایندها، سبب مرگ می‌شوند.
پادتن	سوم	خنثی سازی آنتی‌ژن‌ها، به هم چسباندن میکروب‌ها، رسوب دادن آنتی‌ژن‌های محلول، فعال کردن پروتئین‌های مکمل جلوگیری از عملکرد آنتی‌ژن‌ها	یاخته پادتن ساز	میکروب + آنتی‌ژن‌های محلول	پادتن‌ها مولکول‌هایی Y شکل و از جنس پروتئین‌اند. هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به پادگن دارد. از پادتن‌ها می‌توان به عنوان دارو نیز استفاده کرد. (پادتن آماده یا سرم) پادتن همراه مایعات بین یاخته‌ای، خون و لنف در گردش در می‌آید و با آنتی‌ژن‌ها، مبارزه می‌کند.

آزمون دوم آنلاین

رشته تجربی



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۷

کدام مورد به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی زیست شناسی دهم، ساختارهای لوله‌ای شکلی وجود دارند که در فرآیند دفع برخی مواد در جانداران فاقد

اسکلت استخوانی نقش ایفا می‌کنند؛ از جمله ویژگی‌های مشترک همه این ساختارها در این مورد است که»

لوله‌گوارش (مثلن در حشرات) +
نایدیس‌ها + لوله‌های مالپیگی + نفریدی

(۱) دیواره آن‌ها، یاخته‌هایی با ظاهری استوانه‌ای شکل دارد


(۲) این لوله‌ها، حداقل از طریق یک انتهای خود، با محیط اطراف جانور ارتباط دارند

(۳) یاخته‌های زنده دیواره آن‌ها، می‌توانند در تماس با آب و یون‌ها قرار گیرند

(۴) مواد دفعی آن‌ها، به طور مستقیم به بخشی از لوله‌گوارش جاندار وارد می‌شود

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی



لوله‌گوارش در جانورانی مثل حشرات، نفریدی و لوله‌های مالپیگی و نایدیس‌ها، از جمله ساختارهای لوله‌ای مؤثر در دفع مواد زائد در جانداران مختلف می‌باشند. نفریدی در گروهی از بی‌مهرگان و لوله‌های مالپیگی در حشرات در دفع و تنظیم اسمزی نقش دارند. یاخته‌های سازنده این لوله‌ها به نوعی در تماس با آب و یون‌ها قرار می‌گیرند. (این جانوران همگی پریاکته‌ای هستند و محیط داخلی دارند که در آن حتمن آب و یون‌ها وجود دارند). نفریدی به علت نقش داشتن

در تنظیم اسمزی می‌تواند در تماس با آب و یون‌ها باشد و لوله‌های مالپیگی و لوله‌گوارش در حشرات نیز مطابق شکل، می‌توانند در تماس با این مواد قرار گیرند. لوله‌های سازنده نایدیس‌ها نیز از سطح خارج خود در تماس با مایع همولنف هستند. این مایع کار خون، لنف و آب میان بافتی را در حشرات برعهده داشته پس حتمن دارای آب و یون‌ها است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) به عنوان مثال در دیواره لوله‌های مالپیگی، یاخته‌های مکعبی شکل دیده می‌شوند نه یاخته‌هایی با ظاهر استوانه‌ای!

(۲) نفریدی‌ها و برخی نایدیس‌ها (انشعابات اولیه آن‌ها) به واسطه یک انتهای خود با محیط اطراف جانور ارتباط دارند ولی لوله‌های مالپیگی، در تماس با محیط بیرون قرار نگرفته‌اند. (به لوله‌گوارش راه دارند).

(۴) مواد دفعی موجود در لوله‌های مالپیگی به لوله‌گوارش حشرات (روده آن‌ها) تخلیه می‌شوند ولی نفریدی یا نایدیس‌ها ارتباطی با لوله‌گوارش جاندار ندارند.

جمع‌بندی سامانه‌های دفعی در جانوران

بی‌مهره‌ها		فاقد ساختاری مشخص برای دفع	بعضی از بی‌مهره‌ها
	نفریدی	دارای ساختار مشخصی برای دفع	لوله‌ای است که با منفذی به بیرون باز می‌شود. می‌تواند در دفع، تنظیم اسمزی و یا هر دو نقش داشته باشد.
	آبشش		در سخت‌پوستان، مواد دفعی نیترژن دار با انتشار ساده از آبشش دفع می‌شوند. آبشش در این جانور به یک ناحیه خاص محدود می‌شود.
	لوله‌های مالپیگی		سامانه متصل به روده در حشرات است. در این سامانه، لوله‌هایی از یک انتها بسته و از انتهای دیگر به بخش ابتدایی روده باز می‌شوند. این لوله‌ها، آب، نمک و اوریک اسید را از همولنف دریافت و به روده منتقل می‌کنند. آب و یون‌ها در روده بازجذب و اوریک اسید به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

مهره داران	ماهی‌های آب شور	غضروفی‌های آب شور، علاوه بر کلیه از غدد راست‌روده‌ای برای تنظیم اسمزی بدن استفاده می‌کنند. در این ماهی‌ها، محلول نمک غلیظ از غدد راست‌روده‌ای به روده ترشح می‌شود. اما همه آن‌ها کلیه دارند.
	ماهی‌های آب شیرین	فشار اسمزی بدن آن‌ها از فشار اسمزی محیط کم‌تر است؛ در نتیجه آب تمایل به خروج از بدن دارد. آب زیادی می‌نوشند، ولی ادرار غلیظ تولید می‌کنند! برخی یون‌ها را از طریق ادرار از کلیه و برخی دیگر را به وسیله آبشش دفع می‌کنند.
	دوزیستان	فشار اسمزی بدن آن‌ها از فشار اسمزی محیط بیشتر است؛ در نتیجه آب تمایل به وارد شدن به بدن دارد. آب زیادی نمی‌نوشند ولی ادرار رقیق تولید می‌کنند.
	خزندگان و پرندگان	این جانوران می‌توانند از مثانه خود بازجذب آب داشته باشند. کلیه آن‌ها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد. برخی خزندگان و پرندگان دریایی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان خود، نمک اضافه را به صورت قطره‌های غلیظ دفع می‌کنند.

تست و پاسخ ۱۸

با توجه به مطالب کتاب درسی در مورد دستگاه گردش خون در یک فرد سالم، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول سیاهرگ‌ها، جریان خون»

(الف) در همه - تحت تأثیر باقی‌مانده فشار سرخرگی قرار می‌گیرد

(ب) فقط در بعضی از - به سمت قلب، می‌تواند به صورت ناپیوسته برقرار شود

(ج) در همه - نسبت به سرخرگ‌های هم‌ارز، با مقاومت کم‌تری روبه‌رو می‌شود

(د) فقط در بعضی از - با افزایش فشار مکشی درون قفسه سینه، افزایش می‌یابد

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲

مشاوره خودتان را در تله قیدهای مطرح شده در کتاب درسی نیندازید! در سؤالاتی با قالب بالا، منظور از قید بعضی لزومن تعداد کمی

نیست؛ به عبارتی «بعضی» یعنی همه نه!

پاسخ تشریحی

همه موارد به درستی بیان شده اند.

بررسی همه موارد:

(الف) باقی‌مانده فشار سرخرگی باعث ادامه جریان خون در سیاهرگ‌ها می‌شود، اما به علت کاهش شدید فشار خون و جهت حرکت خون در سیاهرگ‌ها که در بیشتر آن‌ها به سمت بالا است، لازم است عواملی به جریان خون در سیاهرگ‌ها کمک کنند.

(ب) وجود دریچه‌های لانه کبوتری در بعضی از سیاهرگ‌ها باعث می‌شود که جریان خون در این رگ‌ها برخلاف سرخرگ‌ها به صورت پیوسته برقرار نباشد! چراکه با بسته شدن این دریچه‌های جریان خون برای لحظه‌ای کوتاه، متوقف می‌شود.

(ج) جریان خون در هر سیاهرگ در مقایسه با سرخرگ هم‌ارز (هم اندازه) خود، با مقاومت کم‌تری روبه‌رو می‌شود؛ چون سیاهرگ‌ها فضای داخلی وسیع تر و دیواره نازک‌تری دارند.

(د) در زمان دم هنگامی که قفسه سینه باز می‌شود (افزایش حجم آن)، فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب (نه همه سیاهرگ‌های بدن) برداشته می‌شود و درون آن‌ها فشار مکشی ایجاد می‌شود که خون را به سمت بالا می‌کشد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

مقایسه انواع رگ های خونی:

سرخرگ	سیاهرگ	مویرگ
دیواره همه آن ها از ۳ لایه ساخته شده است (از بیرون به درون: پیوندی ← ماهیچه ای ← پوششی)		
دیواره آن ها از یک لایه بافت پوششی سنگفرشی (یک لایه پوششی + غشای پایه آن) ساخته شده است.		
ساختار هر کدام از رگ های خونی متناسب با کاری است که انجام می دهد.		
بیشتر در نواحی عمقی بدن مشاهده می شود.	بیشتر در نواحی سطحی بدن مشاهده می شود و بیشترین حجم خون را دارند.	-
در دیواره خود دارای یاخته های بافت ماهیچه ای صاف و بافت پیوندی هستند.		
فاقد یاخته ماهیچه ای و پیوندی در ساختار دیواره خود هستند.		
در ساختار همه رگ های خونی بافت پوششی سنگفرشی تک لایه و غشای پایه مشاهده می شود.		
دارای فشار خون حداقل و حداکثر هستند.	فاقد فشار خون حداقل و حداکثر هستند؛ در نتیجه تغییرات فشار خون در آن ها کم تر است.	
ساختار پایه ای آن ها به یکدیگر شباهت دارد.		
از بیش یک بافت اصلی تشکیل شده اند.		
فقط از یک بافت اصلی تشکیل شده اند.		
در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شوند.	در برش عرضی، شکل گرد ندارند.	-
نسبت به سیاهرگ ها، ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی بیشتری دارد؛ در نتیجه دیواره آن قطور تر است.	نسبت به سرخرگ ها، ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی کم تری دارد؛ در نتیجه دیواره آن نازک تر است.	به دلیل عدم وجود لایه ماهیچه ای و پیوندی در ساختار دیواره، این رگ ها دارای نازک ترین دیواره بین انواع رگ های خونی هستند.
در برابر فشار وارد شده از قلب، مقاومت بیشتری دارند.	در برابر فشار وارد شده از قلب، مقاومت کم تری دارند.	-
در ابتدای بعضی از آن ها (سرخرگ ششی و آئورت) دریچه های سینی دیده می شود.	می توانند در طول خود دارای دریچه باشند. (دریچه های لانه کبوتری)	بعضی از مویرگ های خونی در ابتدای خود بنداره دارند که از جنس ماهیچه صاف است.
عمدتن وارد کننده خون به مویرگ ها هستند.	عمدتن دریافت کننده خون از مویرگ ها هستند.	عمدتن در امتداد سرخرگ های کوچک قرار دارند.
امکان رسوب کلسترول در دیواره آن ها وجود دارد.	برخی از سیاهرگ ها دریافت کننده لنف جمع آوری شده بدن هستند.	-
اکثراً دارای نبض هستند.		
فاقد نبض هستند!		
می توانند گیرنده های درد، حساس به فشار خون و حساس به کاهش O_2 ، افزایش کربن دی اکسید و هیدروژن را داشته باشند.	می توانند گیرنده های دمایی داشته باشند. (حساس به دمای درون بدن)	-



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۹

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«به طور معمول، فقط بعضی از یاخته‌های ماهیچه قلبی که»

- (۱) توانایی انقباض خودبه‌خودی دارند، در دیواره پستی دهلیز راست قرار دارند
- (۲) تک‌هسته‌ای هستند، به رشته‌های کلاژن بافت پیوندی متراکم متصل هستند
- (۳) از طریق صفحات درهم رفته با یاخته هم‌نوع خود ارتباط دارند، استراحت پیوسته دارند
- (۴) در دیواره بین حفرات بزرگ تر قلب قرار دارند، می‌توانند به طور مستقیم از نوعی گره قلبی، پیام دریافت کنند

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی: یکی از ویژگی‌های یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب (همه آن‌ها) ارتباط آن‌ها از طریق صفحات بینابینی (درهم رفته) است. هیچ یک از یاخته‌های ماهیچه قلبی استراحتی پیوسته ندارند؛ زیرا می‌دانیم که طی یک چرخه قلبی، مدت‌زمانی در حال انقباض و مدت‌زمانی در حال استراحت هستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای تحریک خودبه‌خودی اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاخته‌ها به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یاخته‌هاست که به مجموعه آن‌ها شبکه هادی قلب می‌گویند. از این بین گره‌های اول و دوم و مسیرهای بین گرهی در دیواره پستی دهلیز راست قرار دارند.
- (۲) در لایه میانی قلب علاوه بر بافت ماهیچه‌ای قلبی، بافت پیوندی متراکم نیز وجود دارد. بسیاری از یاخته‌های ماهیچه قلبی به رشته‌های کلاژن این بافت اتصال دارند. از طرفی بیشتر یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی تک‌هسته‌ای و بعضی دو هسته‌ای هستند؛ در نتیجه می‌توان گفت که بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای تک‌هسته‌ای و بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای دو هسته‌ای به رشته‌های کلاژن اتصال دارند.
- (۴) در دیواره بین بطن‌ها، هم یاخته‌هایی از شبکه هادی قلب و هم یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی عادی حضور دارند. یاخته‌های شبکه هادی قلب می‌توانند از گره دوم، به طور مستقیم، پیام تحریکی را دریافت کنند.

تست و پاسخ ۲۰

کدام گزینه مشخصه دستگاه گردش مواد در هر جانوری را بیان می‌کند که خون موجود در قلب آن، تنها به کمک یک رگ خونی خارج شده و می‌تواند مستقیماً به طرف اندام تنفسی آن‌ها هدایت گردد؟

ماهی و نوزاد دوزیستان + دوزیست بالغ

- (۱) دریچه‌های موجود در حد فاصل بین دهلیزها و بطن قلب، جریان خون را یک‌طرفه می‌کنند.
- (۲) در دوران نوزادی، واجد سرخرگ‌هایی با کیفیت خون متفاوت درون هر یک از کمان‌های آبششی خود هستند.
- (۳) یاخته‌های ماهیچه‌ای دیواره قلب آن‌ها، مستقیماً به کمک انشعابات نوعی رگ خونی خارج‌شده از اندام تنفسی اکسیژن‌رسانی می‌گردند.
- (۴) درونی‌ترین دیواره قلب آن‌ها فقط با خونی تماس مستقیم دارد که هموگلوبین گویچه‌های قرمز آن اکثراً به CO_2 متصل هستند.

پاسخ: گزینه ۲


پاسخ تشریحی: طبق شکل کتاب درسی، منظور از عبارت صورت سؤال، ماهی‌ها، نوزاد دوزیستان و نیز دوزیستان بالغ است. همه این جانوران در دوران نوزادی از تنفس آبششی استفاده می‌کنند. در این زمان درون هر یک از کمان‌های آبششی آن‌ها دو سرخرگ با کیفیت خون متفاوت (تیره و روشن) یافت می‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

بررسی سایر گزینه‌ها:



ماهی
قلب دوحفره‌ای،
گردش خون ساده

دوزیست
قلب سه‌حفره‌ای،
گردش خون مضاعف

پستاندار
قلب چهارحفره‌ای،
گردش خون مضاعف

۱) ماهی‌ها و نوزاد دوزیستان فقط یک دهلیز دارند و استفاده از واژه «دهلیزها» سبب نادرستی این گزینه می‌شود.

۳) این مورد در خصوص نوزاد دوزیستان و ماهی‌ها درست است. در این جانوران انشعابی از سرخرگ پشتی که از آبشش‌ها خارج می‌شود، به سمت قلب رفته و ماهیچه‌های دیواره آن را تغذیه می‌کند، اما در دوزیست بالغ همان خونی که به درون بطن سرازیر می‌شود در تغذیه ماهیچه قلب نقش دارد. (انشعابات رگی که از قلب خارج می‌شود در تغذیه ماهیچه قلب هم نقش دارد).

۴) در پستانداران گویچه‌های قرمز اکثر اندامک‌های خود را از دست داده و سیتوپلاسم آن‌ها با پروتئین‌های هموگلوبین پر شده است. به عبارتی در ماهی‌ها و دوزیستان اصلاً هموگلوبین یافت نمی‌شود. از طرفی در دهلیز چپ دوزیست بالغ خون روشن داریم که غنی از O_2 است.

تست و پاسخ ۲۱

مطابق با مطالب کتاب درسی، ویژگی مشترک همه جانوران مهره‌داری که در تمام طول حیات خود تنها از یک نوع ساختار تنفسی ویژه استفاده می‌کنند و خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب آن‌ها عبور می‌کند، کدام است؟

ماهی‌های دارای سامانه گردش ساده

- ۱) بخش‌های واجد شبکه مویرگی در آبشش‌ها، علاوه بر اتصال به یکدیگر، دارای جهت جریان خون دوطرفه می‌باشند.
- ۲) در دستگاه عصبی مرکزی آن‌ها، بصل النخاع از یک طرف با نخاع و از طرف دیگر با نیمکره‌های مخ مجاورت دارد.
- ۳) عصب موجود در زیر کانال خط جانبی، ضخامت بیشتری در بخش‌های جلویی خود نسبت به سایر بخش‌ها دارد.
- ۴) بافت ماهیچه‌ای مخطط همانند بافت ماهیچه‌ای صاف این جانوران، دارای تکیه‌گاه استخوانی می‌باشد.

پاسخ: گزینه ۳

خودت حل کنی بهتره ماهی‌ها گروهی از جانوران مهره‌دار هستند که در تمام طول حیات خود از تنفس آبششی استفاده می‌کنند. در گردش ساده ماهی، خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دوحفره‌ای آن عبور می‌کند.

نکته دوزیستان در طول حیات خود از سه ساختار ویژه برای تنفس استفاده می‌کنند. در نوزادی از آبشش و بعد از آن از پوست و شش!

پاسخ تشریحی در زیر کانال خط جانبی، یک عصب وجود دارد. هرچه عصب به سر جانور نزدیک تر شود، ضخامت آن افزایش پیدا می‌کند. چراکه رشته‌های عصبی بیشتری به آن ملحق می‌شوند!

درس نامه خط جانبی در ماهی‌ها

- ۱) خط جانبی در ماهی‌ها از مجاورت آبشش‌ها تا بخش ابتدایی باله دمی و نزدیک به سطح پشتی بدن قرار دارد.
- ۲) گیرنده‌های تماسی یا مکانیکی (جزء حواس پیکری) در خط جانبی ماهی وجود دارند که به ارتعاش حساس‌اند.
- ۳) کانالی که در زیر پوست ماهی وجود دارد، در سراسر طول خود، تقریباً قطر ثابتی دارد.
- ۴) در کانال خط جانبی، فرورفتگی‌هایی وجود دارد که در آن‌ها یاخته‌های گیرنده قرار دارند.
- ۵) عصبی که در زیر کانال خط جانبی قرار دارد، هر چه قدر به سر نزدیک‌تر می‌شود، قطورتر می‌شود؛ چون به طور مداوم رشته‌های عصبی از کانال خط جانبی به آن اضافه می‌شوند.
- ۶) آب واردشده به کانال خط جانبی، با مژک‌های یاخته‌های گیرنده تماس مستقیم ندارد؛ چون مژک‌ها درون ماده ژلاتینی قرار دارند و این ماده ژلاتینی است که در اثر تماس با آب تغییر وضعیت می‌دهد و سبب تحریک مژک‌های گیرنده‌ها می‌شود.
- ۷) هر یاخته گیرنده در کانال خط جانبی، چندین مژک دارد که یکی از آن‌ها از سایرین طول بیشتری دارد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز


زیست پلاس

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ تیغه‌های آبششی ماهی‌ها حاوی شبکه‌های مویرگی فراوان به منظور تبادلات گازی بین آب و خون هستند. تیغه‌های مجاور هم، اتصال مستقیم به هم ندارند بلکه فضایی بین آن‌ها وجود دارد که آب از بین آن‌ها عبور می‌کند. هم‌چنین جهت جریان خون در این تیغه‌ها به صورت یک‌طرفه است. از بخش دارای خون تیره به بخش دارای خون روشن!

۲ در مغز ماهی‌ها بصل‌النخاع در حد فاصل نخاع و مخچه قرار دارد و از هر طرف خود با یکی از این ساختارها مجاورت دارد.

شکل نامه مغز ماهی



• لوب‌های بویایی در جلویی‌ترین بخش مغز ماهی قرار دارند که عصب بویایی به آن‌ها متصل است.

• لوب بینایی، بزرگ‌ترین بخش مغز ماهی است و عصب بینایی از پایین به آن وارد می‌شود.

• لوب بینایی و مخ هر دو از دو نیمکره تشکیل شده‌اند.

• مخچه بالاترین بخش مغز ماهی است.

• بصل‌النخاع، عقبی‌ترین بخش مغز ماهی است که نسبت به مخچه و لوب‌های بینایی در سطح پایین‌تری قرار دارد.


• ضخامت نخاع و عصب بویایی از ضخامت بصل‌النخاع کم‌تر است.

• لوب‌های (پیاژه‌ای) بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب‌های بویایی انسان بزرگ‌تر است.

۴ در ماهیان غضروفی بافت استخوانی وجود ندارد؛ بنابراین ماهیچه مخطط همانند ماهیچه صاف آن‌ها، بدون کمک تکیه‌گاه استخوانی و با کمک تکیه‌گاه غضروفی، فعالیت خود را انجام می‌دهد.

تست و پاسخ ۲۲

با توجه به شکل زیر، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ «به طور معمول، در فاصله بین پایان ثبت موج تا شروع ثبت موج در نوار قلب یک انسان سالم،»



۱) R - P - بخش «۱» برخلاف بخش «۴»، باعث ورود خون از طریق حفره بالایی قلب به حفره پایینی آن می‌شود

۲) T - S - بخش «۴» همانند بخش «۲»، به دلیل افزایش فشار خون درون حفرات پایینی قلب، بسته هستند

۳) Q - P - قطعات بخش «۲» برخلاف بخش «۳»، در پایین‌ترین محل ممکن خود قرار گرفته است

۴) P - T - بخش «۱» همانند بخش «۳»، اجازه جریان یافتن خون به سمت بالا را می‌دهد

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی شکل نشان‌دهنده «دریچه‌های قلب» است و بخش‌های مشخص شده در شکل، به ترتیب عبارت‌اند از: ۱) دریچه سینی سرخرگ ششی، ۲) دریچه دولختی، ۳) دریچه سینی آئورتی و ۴) دریچه سه‌لختی.

فاصله بین پایان موج S تا شروع ثبت موج T، مربوط به مرحله انقباض بطن‌ها است. به هنگام شروع انقباض بطن‌ها به دلیل افزایش فشار خون درون بطن‌ها دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بسته می‌شوند و تا پایان این مرحله بسته خواهند بود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ فاصله بین پایان موج P تا شروع ثبت موج R، مربوط به مرحله انقباض دهلیزها است. در مرحله استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون از دهلیز وارد بطن می‌شود. در این زمان‌ها دریچه‌های سینی بسته‌اند و دریچه‌های دهلیزی بطنی باز هستند.

۳ فاصله بین پایان موج P تا شروع ثبت موج Q، مربوط به مرحله انقباض دهلیزها است. در این مرحله، قطعات سازنده همه دریچه‌های قلب در پایین‌ترین محل خود هستند. چراکه دریچه‌های دهلیزی بطنی باز و دریچه‌های سینی بسته هستند. دریچه‌های سینی به سمت درون سرخرگ‌ها باز می‌شوند؛ پس وقتی بسته هستند در پایین‌ترین وضعیت خود هستند و وقتی باز می‌شوند در بالاترین وضعیت قرار می‌گیرند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

آزمون دوم آنلاین

۴) فاصله بین پایان ثبت موج T تا شروع موج P، مربوط به مرحله استراحت عمومی است. در مرحله استراحت عمومی هیچ یک از دریچه‌ها اجازه عبور خون به سمت بالا را نمی‌دهند. خون از دریچه‌های باز دهلیزی بطنی به سمت پایین (از دهلیز به بطن) جابه‌جا می‌شود. به یاد داشته باشید، دریچه‌های سینی که اجازه عبور خون به بالا را می‌دهند (به درون سرخرگ‌های ششی و آئورت)، در مرحله استراحت عمومی بسته‌اند.

مدت زمان وقوع آن	انقباض دهلیزها	انقباض بطن‌ها	استراحت عمومی
۰/۱ ثانیه	۰/۳ ثانیه	۰/۴ ثانیه	
موج مربوط به آن در نوار قلب	P	QRS	T
در طی وقوع آن، دهلیزها منقبض می‌شوند؟	بله	خیر	خیر
در طی وقوع آن، دهلیزها در حال استراحت هستند؟	خیر	بله	بله
در طی وقوع آن، بطن‌ها منقبض می‌شوند؟	خیر	بله	خیر
در طی وقوع آن، بطن‌ها استراحت می‌کنند؟	بله	خیر	بله
در ابتدای وقوع آن صدای طبیعی از قلب شنیده می‌شود؟	خیر	بله (صدای اول قلب)	بله (صدای دوم قلب)
در ابتدای وقوع آن، دریچه‌های قلبی دچار تغییر وضعیت می‌شوند؟	خیر	بله (دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بسته شده و دریچه‌های سینی باز می‌شوند.)	بله (دریچه‌های سینی بسته شده و دولختی و سه‌لختی باز می‌شوند.)
در طی وقوع آن، دهلیزها از بالا به پایین منقبض می‌شوند؟	بله	خیر	خیر
در طی وقوع آن، بطن‌ها از پایین به سمت بالا منقبض می‌شوند؟	خیر	بله	خیر
در طی وقوع آن، خون به دهلیزها وارد می‌شود؟	بله	بله	بله
در طی وقوع آن، خون از دهلیزها خارج می‌شود؟	بله	خیر	بله
در طی وقوع آن، خون به بطن‌ها وارد می‌شود؟	بله	خیر	بله
در طی وقوع آن، خون از بطن‌ها خارج می‌شود؟	خیر	بله	خیر

رشته تجربی

تست و پاسخ ۲۳

گروهی از گویچه‌های سفید خون، دارای هسته‌ای هستند که قطعات سازنده آن‌ها در بخش‌هایی به یکدیگر متصل شده‌اند. با در نظر گرفتن این مورد، کدام گزینه درست است؟

انوزینوفیل + نوتروفیل + بازوفیل

- ۱) همه آن‌ها با تولید آنزیم‌های پروتئینی ترش‌چی در تجزیه اجزایی از پیکر عوامل بیماری‌زا مؤثر هستند.
- ۲) همه آن‌ها می‌توانند با صرف انرژی، در بخش اصلی تشکیل‌دهنده غشای یاخته‌ای خود تغییرات ایجاد کنند.
- ۳) فقط بعضی از آن‌ها به واسطه گیرنده آنتی‌ژنی، به آنتی‌ژن(های) سطح غشای عوامل بیماری‌زا متصل می‌گردند.
- ۴) فقط بعضی از آن‌ها در پی تغییر محل قرارگیری ساختارهای نوکلئوزومی خود، یاخته‌هایی مشابه خود را در خون ایجاد می‌کنند.

پاسخ: گزینه ۲



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

خود حل کنی بهتره منظور از عبارت صورت سؤال گویچه‌های سفید با هسته دو قسمتی و چند قسمتی است. بنابراین باید نوتروفیل‌ها، بازوفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها را در نظر بگیریم.

پاسخ تشریحی نوتروفیل‌ها توانایی بیگانه خواری دارند پس طی آن، بخشی از غشای خود را که حاوی فسفولیپیدها است (بخش اصلی غشا)، به دور عامل بیگانه، احاطه می‌کنند؛ به عبارتی ریزکیسه‌های حاوی عوامل بیگانه را تشکیل می‌دهند، هم‌چنین ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها نیز در طی برون‌رانی چنین قابلیت‌هایی دارند. یاخته‌های زنده یوکاریوتی توانایی درون‌بری و برون‌رانی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) به عنوان مثال بازوفیل‌ها فاقد توانایی تولید و ترشح آنزیم‌های پروتئینی تجزیه‌کننده پیکر عوامل بیماری‌زا هستند. ائوزینوفیل‌ها این قابلیت را دارند. دقت کنید آنزیم‌های تجزیه‌کننده نوتروفیل‌ها ترشح نمی‌شوند بلکه به ریزکیسه‌های حاوی عوامل بیگانه وارد می‌شوند و تجزیه در داخل خود یاخته رخ می‌دهد.

۳) هیچ یک از این یاخته‌ها گیرنده آنتی‌ژنی ندارند و در نتیجه به واسطه آن نمی‌توانند به آنتی‌ژن‌های بیگانه متصل شوند. البته دقت کنید همه این یاخته‌ها، توانایی شناسایی ویژگی‌های عمومی عوامل بیگانه را دارند، اما گیرنده‌های آنتی‌ژنی، اختصاصی عمل می‌کنند.

۴) منظور از این گزینه فرایند تقسیم هسته (جداسدن هیستون‌ها جهت انجام همانندسازی) است. از میان گویچه‌های سفید فقط برخی لنفوسیت‌ها توانایی انجام تقسیم را دارند. هیچ یک از گویچه‌های سفید دانه‌دار نمی‌توانند تقسیم شوند.

ویژگی و توضیح	نوتروفیل	بازوفیل	ائوزینوفیل	مونوسیت	ماکروفاژ	یاخته دندریتی	یاخته کشته طبیعی	لنفوسیت B	لنفوسیت T	ماستوسیت
توانایی فاگوسیتوز دارند.	*			*	*	*				*
دارای نقش در دفاع غیراختصاصی هستند	*	*	*	*	*	*	*			*
جزء خط دوم دفاعی هستند.	*	*	*	*	*	*	*			*
توانایی دیapedز دارند.	*	*	*	*			*	*	*	
توانایی ترشح هیستامین دارند.		*								*
قابل مشاهده در خون	*	*	*	*			*	*	*	
نوعی یاخته بیگانه‌خوار محسوب می‌شوند.	*			*	*	*				*
در بخش‌هایی از بدن که با بیرون در ارتباطند، فراوان‌ترند.						*				*

رشته تجربی

آزمون دوم آنلاین



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

ویژگی و توضیح	نوتروفیل	بازوفیل	ائوزینوفیل	مونوسیت	ماکروفاژ	یاخته دندریتی	یاخته کشنده طبیعی	لنفوسیت B	لنفوسیت T	ماستوسیت
نیروی واکنش سریع و چابک	*									
گوچه سفید با توانایی بیگانه خواری و هسته چندقسمتی	*									
گوچه سفیدی که ماده دفاعی زیادی حمل نمی کند.	*									
هر یاخته ترشح کننده هپارین	*									
هر یاخته حاصل از تمایز مونوسیت					*	*				
هر یاخته مؤثر در خط سوم ایمنی								*	*	

رشته تجربی

آزمون دوم آنلاین

تست و پاسخ ۲۴

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در یکی از مراحل چرخه ضربان قلب انسان،؛ در مرحله ای که بلافاصله از این مرحله قرار دارد،».

- دریچه های دهلیزی بطنی بسته می شوند - قبل - موج الکتریکی توسط سه رشته از جنس بافت هادی باعث تحریک گره دوم شده است
- تارهای ماهیچه دهلیزی کوتاه می شوند - بعد - به دنبال افزایش فشار خون، ابتدا دریچه های سینی باز و سپس سایر دریچه ها بسته می شوند
- همه ماهیچه قلب در حال استراحت است - قبل - انتشار موج الکتریکی به تارهای ماهیچه ای دیواره خارجی بطن ها رخ داده است
- حجم خون درون حفرات پایینی قلب کاهش می یابد - بعد - فشار خون در سرخرگ های متصل به قلب به تدریج کاهش می یابد

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی: در مرحله انقباض دهلیزها (مرحله ۱ / ۰ ثانیه ای)، تارهای ماهیچه دهلیزی کوتاه می شوند. در مرحله بعد از این مرحله یعنی مرحله انقباض بطن ها، در ابتدا فشار خون بطنی کمی بیشتر شده و ابتدا دریچه های دهلیزی بطنی بسته شده و سپس دریچه های سینی باز می شوند و خون بطن ها وارد سرخرگ های ششی و آئورت می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در ابتدای انقباض بطن ها (ابتدای مرحله ۳ / ۰ ثانیه ای)، دریچه های دهلیزی بطنی بسته می شوند. در مرحله قبل از آن یعنی انقباض دهلیزها، موج الکتریکی توسط سه رشته از جنس بافت هادی از گره اول به گره دوم منتقل شده است و باعث تحریک گره دوم می شود. دقت کنید تحریک گره دوم برای انقباض بطن ها ضروری است، پس لازم است قبل از انقباض بطن ها یعنی در مرحله انقباض دهلیزی، این اتفاق رخ دهد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

توجه داشته باشید اگرچه شکل مربوط به انتشار تکانه قلبی در طول چرخه ضربان قلب از کتاب درسی حذف گردیده است، اما این به این منظور نیست که طراح توجیهی برای ترکیب کردن میحث شبکه هادی با چرخه ضربان قلب نداشته باشد! در کنکور سراسری تیر ۱۴۰۲ نیز شاهد ترکیب شدن این دو میحث با یکدیگر بودیم اما چرا؟ از کجای کتاب درسی طراح این اجازه را پیدا کرده است؟ در کتاب درسی مطرح شده است، رسیدن پیام تحریک به ماهیچه‌های قلب اندکی پیش از انقباض آن‌هاست. به عبارتی از این جمله می‌توان برداشت کرد، فعالیت گره سینوسی دهلیزی در مرحله استراحت عمومی آغاز می‌شود.

نکته در طول موج P پیام در مسیرهای بین گرهی جابه‌جا شده و به گره دهلیزی بطنی می‌رسد. در فاصله P تا Q پیام در گره دهلیزی بطنی معطل شده و سپس در فاصله Q تا R (بخش بالاروی موج QRS) پیام از دسته‌تار موجود در دیواره بین دو بطن عبور می‌کند.

۳ در مرحله استراحت عمومی همه ماهیچه‌های قلبی (دهلیزی و بطنی) در حال استراحت هستند. در مرحله قبل از آن یعنی انقباض بطن‌ها، در حد فاصل موج R تا S، پیام الکتریکی در حال انتشار در دیواره بطن‌ها از جمله بخش‌های خارجی آن است.

۴ در طی مرحله انقباض بطن‌ها (مرحله ۳/۰ ثانیه‌ای)، حجم خون درون حفرات پایینی (بطن‌های) قلب کاهش می‌یابد. در مرحله بعد از آن یعنی مرحله استراحت عمومی و در حین انقباض دهلیزها فشار خون سرخرگی در حال کاهش بوده و در حین انقباض بطن‌ها در حال افزایش است.

تست و پاسخ ۲۵

مطابق با مطلب کتاب درسی، در مراحل از فرایند تشکیل ادرار مواد می‌توانند در جهت مخالف بازجذب شوند، چند مورد فقط در خصوص یکی از این فرایندها به درستی بیان شده است؟

الف) در حضور یاخته‌هایی از گردیزه (نفرون) انجام می‌شود که در غشای خود دارای چین خوردگی هستند.

ب) به نیروی حاصل از اختلاف قطر دو سرخرگ ورودی و خروجی اطراف کلافک وابسته می‌باشد.

ج) توسط یاخته‌هایی در بخش‌های غیرپیچ خورده گردیزه (نفرون) انجام می‌شود.

د) مواد از فضای بین زوائد پامانند یاخته‌های خاصی عبور می‌کند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

تراوش + ترشح

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی در مراحل تراوش و ترشح، مواد می‌توانند در جهت مخالف بازجذب جابه‌جا شوند. در بازجذب مواد از نفرون به خون جابه‌جا می‌شوند و در ترشح و تراوش برعکس است.

موارد «الف» و «ج» نادرست بیان شده‌اند.

بررسی همه موارد:

الف) تراوش در حضور یاخته‌های پودوسیت انجام می‌شود که دارای زوائد پامانند هستند؛ درواقع این زوائد پامانند به دنبال چین‌خوردگی غشای این یاخته‌ها، ایجاد شده‌اند. همچنین، ترشح توسط یاخته‌های پوششی لوله پیچ‌خورده نزدیک نیز رخ می‌دهد که دارای چین‌خوردگی‌های ریز غشایی هستند.

ب) اختلاف قطر سرخرگ‌های آوران و وایران (کلافک در بین این دو سرخرگ قرار دارد)، باعث افزایش فشار خون در شبکه مویرگی کلافک می‌شود که در تأمین نیروی لازم برای تراوش نقش دارد. این عامل در ترشح نقش ندارد.

ج) هر دوی این مراحل تشکیل ادرار می‌توانند توسط یاخته‌هایی در بخش‌های غیرپیچ‌خورده نفرون انجام شوند. تراوش، درون کپسول بومن و ترشح، در لوله هنله.

د) در تراوش، مواد از شکاف‌های تراوشی (حد فاصل بین رشته‌های پامانند پودوسیت‌ها) عبور می‌کنند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

مراحل تشکیل ادرار:

تراوش	ترشح	بازجذب
فقط درون کپسول بومن انجام می شود.	در بخش های لوله ای نفرون (پیچ خورده نزدیک و دور و لوله هنله) و مجرای جمع کننده انجام می شود.	
فقط در بخش قشری کلیه صورت می گیرد.	در بخش های قشری و مرکزی کلیه صورت می گیرند.	
در جهت خروج مواد از خون عمل می کنند.	در جهت ورود مواد به خون عمل می کنند.	
به صورت غیرفعال انجام می شود.	در بیشتر موارد به صورت فعال انجام می شوند.	
هیچ یک از این مراحل در داخلی ترین بخش کلیه، یعنی لگنچه انجام نمی شود.		
در صورت مهار آنزیم های تولیدکننده ATP در یاخته های کپسول بومن، میزان تراوش ممکن است تغییر نکند!	در صورت مهار آنزیم های ایجادکننده ATP در یاخته های بخش های لوله ای نفرون و مجرای جمع کننده، میزان این دو فرایند کاهش می یابد ولی متوقف نمی شود. (چون در بعضی موارد هم بدون مصرف انرژی و به صورت غیرفعال انجام می شوند.)	
باعث وارد شدن بخشی از خونابه به درون کپسول بومن می شود.	باعث: (۱) دفع بعضی از سموم و داروها (۲) تنظیم pH خون (ترشح یون هیدروژن)	مؤثر در: (۱) جلوگیری از دفع مواد مفید از طریق ادرار (۲) تنظیم pH خون (بازجذب بیکربنات)
مواد براساس اندازه وارد گردیزه می شوند.	مواد به صورت انتخابی به درون نفرون وارد و یا از آن خارج می شوند.	

آزمون دوم آنلاین