


- ۱- چند مورد در خصوص جهش های کوچک، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟ «هر جهشی که»
- (الف) در ژن مربوط به ساخت نوعی آنزیم رخ می دهد، فعالیت آنزیم مورد نظر را تا حدودی دستخوش تغییر می کند
- (ب) بر طول رشته پلی پپتیدی حاصل از ژن اثر دارد، در پی جانشینی یک نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگر حاصل شده است
- (ج) در فعالیت پروتئین حاصل از نوعی ژن فاقد اثر است، به دنبال تبدیل رمزهای مختلف یک آمینواسید به یکدیگر ایجاد می شود
- (د) سبب جداسازی زود هنگام رناتن از رنای پیک (نسبت به حالت طبیعی) می شود، در نزدیکی یا بر روی رمز مربوط به پایان ترجمه در مولکول دنا (DNA) رخ داده است

(۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

- ۲- طبق مطلب کتاب درسی، در جمعیت انسان ها، «دو» نوع گروه خونی مطرح می شود. در خصوص نوعی گروه خونی که نسبت به دیگری، ژن (های) خود را بر روی فام تن (کروموزوم) های هسته ای کوچک تری قرار داده است، چند مورد زیر صحیح است؟
- (الف) توالی ژن هایش به میزان بیشتری توسط فراوان ترین یاخته های خونی مورد رونویسی قرار می گیرد.
- (ب) همواره سبب قرارگیری مولکولی با مونومرهای متنوع بر سطح یاخته های بدن می شود.
- (ج) نسبت به گروه خونی دیگر، اختلاف بیشتری میان تعداد فنوتیپ و ژنوتیپ های خود در جمعیت دارد.
- (د) انواعی از ژنوتیپ های ناخالص را، در افراد جمعیت پدید می آورد.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱



- ۳- با توجه به نوعی از گیاه ذرت که صفت مربوط به تعیین رنگ آن در کتاب درسی مطرح گردیده است، از خودلقاحی گروهی از ذرت ها، زاده هایی حاصل می شوند که برخی از آن ها رنگی تیره تر و برخی رنگی روشن تر از رنگ ذرت های حاصل از لقاح دو والد با ژن نمود (ژنوتیپ) های $AABbCc$ و $AabbCc$ خواهند داشت. با در نظر گرفتن تمامی حالات، کدام گزینه درست است؟
- (۱) یاخته های بخش «۱» این دانه ممکن نیست ژن نمودی مشابه با درون دانه (آندوسپرم) دانه ذرتی با ژن نمود $AABbCc$ داشته باشند.
- (۲) یاخته ایجادکننده بخش «۲» این دانه ممکن است از لقاح دو یاخته جنسی با ژن نمود (ژنوتیپ) یکسان ایجاد شده باشد.
- (۳) یاخته ایجادکننده بخش «۳» این دانه به طور حتم دارای حداقل دو دگره نهفته در ترکیب ژن نمود (ژنوتیپ) خود می باشد.
- (۴) یاخته های بخش «۱» این گیاه به طور حتم رخ نمود (فنوتیپ)ی قرمزتر از ذرتی با درون دانه (آندوسپرم) $AAaBBbCCc$ دارند.
- ۴- در جمعیتی از طاووس های دولد (دیپلوئید) آسیای جنوب شرقی، از آمیزش طاووس های ماده با منقار بلند و دمی با خال های سفید با طاووس های نر منقار کوتاه و دمی فقط واجد خال های سیاه، همه زاده هایی که منقاری با طول متوسط دارند، با یکدیگر هم جنس بوده و همه زاده ها دمی با خال های سیاه دارند. با در نظر گرفتن این مورد، از آمیزش هر ماده ای که منقار کوتاه داشته و واجد خال های سفید بر روی دم خود است، با هر طاووسی واجد منقار بلند و خال های سیاه بر روی دم خود، تولد کدام مورد زیر محتمل است؟ (کروموزوم های تعیین کننده جنسیت طاووس ها همانند کروموزوم های جنسی انسان با X و Y نشان داده می شود).

(۱) طاووس ماده با خال های سیاه و منقار کوتاه (۲) طاووس نر با منقار متوسط و خال های سفید

(۳) طاووس نر با خال های غیرهم رنگ و منقار بلند (۴) طاووس ماده با خال های هم رنگ و منقار متوسط

- ۵- کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (توارث بیماری های بیان شده، تماماً مشابه رایج ترین شکل بیماری هموفیلی است.)
- «بیماری پیلیتئوس مرتسباخر (PM)، نوعی بیماری عصبی است که در طی آن، همانند MS، میلین اطراف گروهی از رشته های عصبی از بین می رود و با نشانه های مشکلات حرکتی و تکلم بروز پیدا می کند. در صورت ازدواج مردی که مبتلا به هر دو بیماری PM و کوررنگی است با زنی که مشکلی در خصوص دو بیماری مطرح شده ندارد، اگر با قاطعیت می توان بیان داشت که»
- (۱) پسرانی متولد شوند که در حرکات دست و پاهای خود مشکل دارند - همه افراد کوررنگ و دارای اختلال در حرکت دست و پا از یک جنس هستند
- (۲) مادر از نظر بیماری PM ناخالص باشد - همه فرزندان پسر در فعالیت گیرنده های مخروطی خود اختلال دارند
- (۳) همه دختران خانواده، فاقد نشانه هایی از این بیماری ها باشند - برخی پسران در فعالیت های حرکتی یا بینایی مشکل دارند
- (۴) همه دختران بیمار، در بیان کلمات مشکل داشته باشند - تولد پسرانی با عدم داشتن گام های استوار محتمل است

۶- چند مورد را نمی‌توان در خصوص فردی که دارای گروه خونی O^+ است با قاطعیت بیان کرد؟

- (الف) در صورت دریافت خون از فردی با گروه خونی غیرمشابه، فعالیت یاخته‌هایی از خط سوم دفاعی فرد تحریک می‌گردد.
 (ب) ممکن است دگره‌های گروه خونی Rh در غشای گویچه‌های قرمز آن، توانایی متفاوتی در تولید پروتئین داشته باشند.
 (ج) پروتئین‌های مؤثر در تنظیم بیان ژن، فاقد توانایی اتصال به راه‌انداز ژن گروه خونی واقع بر روی کروموزوم کوچک‌تر هستند.
 (د) حداقل برای یکی از انواع گروه خونی، ژن نمود خالص داشته و فاقد زنجیره‌های منشعب پلی‌ساکارییدی در سطح گویچه‌های قرمز خود است.
- (۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

۷- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی، برای یک بیماری ممکن است»

- (الف) وابسته به جنس نهفته – مردی با داشتن الل بیماری، صاحب دختری سالم شود
 (ب) مستقل از جنس نهفته – زنی با داشتن دو الل بیماری، اثرات بیماری را نشان ندهد
 (ج) مستقل از جنس نهفته – مردی با داشتن یک الل بیماری، اثرات بیماری را نشان دهد
 (د) وابسته به جنس نهفته – زنی سالم، دختری سالم و با ژن نمود متفاوت از خود داشته باشد
- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۸- در خصوص ذرت معرفی‌شده در فصل ۳ کتاب دوازدهم، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در صورتی که از آمیزش دو ذرت با یکدیگر دانه‌ای تولید شود که در ژن نمود آندوسپرم آن، فقط سه دگره نهفته وجود داشته باشد، ممکن نیست ژن نمود»

- (۱) پوسته دانه سه جایگاه خالص بارز داشته باشد (۲) یاخته ترشح‌کننده جیبرلین، ۴ دگره بارز داشته باشد
 (۳) یاخته مولد اسپرم، دو دگره نهفته داشته باشد (۴) بزرگ‌ترین بخش رویان، ۳ دگره نهفته داشته باشد

۹- در صورتی که ظاهر شدن دندان‌های آسیاب، مربوط به نوعی صفت مستقل از جنس بارز باشد، اگر زن و مردی که از نظر گروه خونی ABO، ژن نمودی ناخالص و متفاوت دارند بتوانند صاحب فرزندی شوند که بعضی از آن‌ها در ارتباط با صفت ظاهر شدن دندان‌های آسیاب، ژن نمودی متفاوت با والدین داشته باشند، در این صورت تولد چند مورد از فرزندان زیر ممکن است؟

(الف) دختری فاقد دندان‌های آسیاب با گروه خونی O

(ب) پسری با دندان‌های آسیاب و دارای ژن نمود AA برای گروه خونی

(ج) دختری که از نظر هر دو صفت، ژن نمودی یکسان با مادرش دارد

(د) پسری فاقد دندان‌های آسیاب و دارای هر دو کربوهیدرات گروه خونی در غشای گویچه قرمز

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۰- در جمعیتی از زنبورهای عسل، اگر کوتاهی بال نسبت به بلندی آن، نهفته باشد، در این جمعیت، از آمیزش نرهای قطعاً همه زاده‌های بالی با طول خواهند داشت.

- (۱) بال کوتاه با ملکه بال بلند – ماده – بلند (۲) بال بلند با ملکه بال کوتاه – نر – کوتاه
 (۳) بال کوتاه با ملکه بال بلند – نر – کوتاه (۴) بال بلند با ملکه بال کوتاه – ماده – بلند

۱۱- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟


«از خودلقاحی نوعی گیاه دولاد با ژن نمود AaBb که در آن دگره(الل)های A و B بر روی یک فام‌تن (کروموزوم) قرار دارند، زاده‌ای با ژن نمود در شرایط ایجاد می‌شود.»

- (۱) فقط AaBb – رخ دادن کراسینگ‌اور (۲) aaBB – رخ دادن کراسینگ‌اور، نیز
 (۳) Aabb فقط – رخ دادن کراسینگ‌اور (۴) AABb – رخ دادن کراسینگ‌اور، نیز

۱۲- از ازدواج دو فرد با فنوتیپ سالم، سه فرزند متولد شده‌اند. فرزند اول، پسری مبتلا به DM (دیستروفی عضلانی دوشن) و فاقد فاکتور انعقادی شماره ۸ و مبتلا به بیماری فنیل کتونوری است. فرزند دوم، دختری سالم از نظر DM و دارای فاکتور انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم‌های A و B و واجد پروتئین D مربوط به گروه‌های خونی است. فرزند سوم، پسری سالم و دارای گروه خونی O و فاقد پروتئین D است. تولد کدام فرزند، در این خانواده غیرممکن است؟ (توارث بیماری دیستروفی عضلانی دوشن مشابه رایج‌ترین نوع هموفیلی است.)

- (۱) پسری مبتلا به فنیل کتونوری و سالم از نظر دو بیماری دیگر و دارای گروه خونی B و واجد پروتئین D
 - (۲) دختری سالم و دارای دگره(الل)های خالص برای فاکتور انعقادی شماره ۸ با گروه خونی AB و فاقد پروتئین D
 - (۳) پسری سالم از نظر فنیل کتونوری و دارای اختلالات حرکتی و فاقد فاکتور انعقادی شماره ۸ و فاقد آنزیم‌های A و B گروه خونی
 - (۴) دختری مبتلا به شایع‌ترین نوع هموفیلی و فنیل کتونوری و دارای دگره(الل)های ناخالص برای بیماری تحلیل عضلانی دوشن و واجد آنزیم‌های A و B
- ۱۳- کدام گزینه در خصوص نوعی جاندار پریاخته‌ای، به نحو متفاوتی از سایر گزینه‌ها بیان شده است؟

- (۱) فقط بعضی از جهش‌هایی که طول فام‌تن‌ها را دستخوش تغییر می‌کنند، در اغلب موارد به مرگ می‌انجامند.
 - (۲) فقط بعضی از جهش‌هایی که می‌توانند به نسل بعد منتقل شوند، بر روی یاخته‌های مسیر گامت‌زایی رخ می‌دهند.
 - (۳) همه جهش‌های ساختاری فام‌تن که در تصویر کاریوتیپ تشخیص داده نمی‌شوند، تعداد ژن‌های سازنده فام‌تن‌ها را تغییر می‌دهند.
 - (۴) همه جهش‌هایی که می‌توانند فاصله سانترومر از دو انتهای فام‌تن را تغییر دهند، همراه با شکستن نوعی پیوند اشتراکی رخ می‌دهند.
- ۱۴- در یک خانواده پدر و مادری سالم که به ترتیب گروه خونی A و B دارند و هر دو دارای پروتئین D در غشای گویچه‌های قرمز خود هستند، پسر اول این خانواده دارای علائم مغزی ناشی از تجمع فنیل آلانین بوده و نمی‌تواند پروتئین D و عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد. در حاملگی بعدی، در صورتی که در بر خلاف بخش دیگر، گویچه قرمزی یافت شود که یاخته بنیادی سازنده آن، ژن نمود BO را داشته باشد، تولد گروه خونی غیرممکن است.



- (۱) بخش (۲) - پسری سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری همراه با اختلال در فرایند لخته‌شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات
 - (۲) بخش (۱) - پسری سالم از نظر فنیل کتونوری و با اختلال در فرایند لخته‌شدن خون و ژنوتیپ متفاوت با هر دو والد از لحاظ کربوهیدرات‌های
 - (۳) بخش (۲) - دختری مبتلا به فنیل کتونوری و دارای عامل انعقادی شماره ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات
 - (۴) بخش (۲) - دختری سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای تنها یک نوع کربوهیدرات
- ۱۵- اگر در اثر خودلقاحی نوعی گل میمونی، گل‌هایی تولید شده باشند که رنگ حلقه دوم گروهی از آن‌ها مشابه گل‌های گیاه شبدر باشد، چند مورد از ژن‌نمودهای زیر به ترتیب برای یاخته‌های ریشه روبانی و درون دانه گل‌های میمونی حاصل از این خود لقاحی امکان‌پذیر می‌باشد؟

الف) RRW - RW	ب) RWW - RW
ج) WWW - WW	د) RRR - RR
۱ (۱)	۲ (۲)
۳ (۳)	۴ (۴)

۱۶- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«وجه اشتراک همه سازوکارهایی که موجب افزایش تفاوت‌های میان دو جمعیت در گونه‌زایی دگرمیهنی می‌شوند در این است که ..»

- الف) پس از نوعی خطا در فرایند میوز باعث پدید آمدن گامت‌هایی با عدد فام‌تنی غیرطبیعی می‌گردند
- ب) پس از متوقف‌شدن نوعی سازوکار مؤثر در تغییر فراوانی نسبی دگره(الل)ها بین این دو جمعیت عمل می‌نمایند
- ج) همواره به دنبال اثرگذاری عاملی نقش ایفا می‌کنند که می‌تواند موجب کاهش توان بقای جمعیت شود
- د) می‌توانند با تغییر میزان فراوانی دگره(الل)ها موجب افزایش توانایی بقای جمعیت در محیط جدید شوند

۱ (۱)	۲ (۲)	۳ (۳)	۴ (۴)
-------	-------	-------	-------

۱۷- فرض می‌کنیم در انسان، داشتن انگشت اشاره بلندتر از انگشت وسط را نوعی ژن مستقل از جنس کنترل می‌کند که این صفت در مردان، **Aa** و در زنان، **AA** ظاهر می‌شود. اگر مردی با انگشت اشاره کوتاه‌تر با زنی با انگشت وسط بلندتر ازدواج کند و صاحب پسری با انگشت وسط کوتاه‌تر شود، کدام گزینه در خصوص این خانواده درست است؟

- (۱) تولد دختر و پسر با ژن نمود (ژنوتیپ) مشابه و رخ نمودی (فنوتیپ) متفاوت دور از انتظار است.
- (۲) همه فرزندان ناخالص این خانواده، رخ نمودی (فنوتیپ) مشابه والد هم‌جنس خود دارند.
- (۳) احتمال تولد فرزند دختری با انگشت اشاره بلندتر در این خانواده وجود دارد.
- (۴) ژن نمود (ژنوتیپ) پدر و مادر این خانواده با یکدیگر تفاوت دارد.

۱۸- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ارتباط با اگر ژنوتیپ باشد، قطعاً» (بدون در نظر گرفتن جهش)

- (۱) بکرزایی زنبور عسل - زنبور ماده **AABBcc** - ژنوتیپ تخم تشکیل شده **ABC** است.
- (۲) بکرزایی مار - مار ماده **AaBbCc** - ژنوتیپ مار حاصل از بکرزایی **AABBCC** یا **aabbcc** است.
- (۳) تولیدمثل کرم کبد - کرم کبد **AABbCC** - می‌تواند زاده‌ای با ژنوتیپ مشابه خود، تولید کند.
- (۴) زنبور عسل - زنبور ماده و نر به ترتیب **AABBCC** و **aabbcc** - زنبور ماده حاصل **AaBbCc** است.

۱۹- در مسیر اسپرم‌زایی در یک مرد سالم، عواملی وجود دارند که بدون ایجاد تغییر در تعداد فام‌تن‌های یاخته‌ها، باعث می‌شوند که هر دو نوع ژن مربوط به ساخت کربوهیدرات‌های گروه خونی فرد در یاخته اسپرماتوسیت ثانویه دیده شوند. کدام ویژگی، فقط در مورد یکی از این عوامل، درست است؟

- (۱) ممکن است با تغییر میزان پروتئین‌های فشرده‌کننده دنا در بخش‌هایی از فام‌تن همراه باشد.
- (۲) نسبت بازهای تک‌حلقه‌ای به دو حلقه‌ای را در ساختار کروماتیدها دستخوش تغییر می‌کند.
- (۳) می‌تواند سبب تشکیل کروموزوم حاوی دگره‌های هر دو گروه خونی **ABO** و **Rh** شود.
- (۴) در طی بروز آن طول دو کروموزوم (کروماتید) می‌تواند به طور هم‌زمان تغییر کند.

۲۰- مطابق با مطلب کتاب درسی، همه عوامل بر هم زننده تعادل یک جمعیت که منجر به افزایش تنوع دگره(الل)های خزانه ژنی جمعیت می‌شوند، چه مشخصه مشترکی دارند؟

- (۱) همواره منجر به پیدایش حداقل یک دگره جدید در جمعیت می‌شوند.
- (۲) می‌توانند سبب حذف نوعی دگره از خزانه ژنی یک جمعیت شوند.
- (۳) با تغییر یک یا چند نوکلئوتید در ماده وراثتی همراه هستند.
- (۴) میزان وقوع آن‌ها در خزانه ژن جمعیت، وابسته به اندازه آن جمعیت می‌باشد.

۲۱- با توجه به مطالب کتاب درسی، در یک خانواده، پدری سالم از نظر تمامی بیماری‌های ژنتیکی مطرح‌شده در کتاب درسی می‌باشد. چنانچه مادر خانواده باردار باشد و ژنوتیپ یاخته‌های ساختار ممانعت‌کننده از مخلوط‌شدن خون مادر و جنین در جفت، از نظر تمامی این بیماری‌ها، به صورت ناخالص باشد و فرزند قبلی این خانواده، پسری دارای مشکلاتی در زمینه فعالیت‌های مغزی و انعقاد خون بوده باشد که در سنین کودکی، به علت عوارض ناشی از کمبود اکسیژن بافتی، فوت کرده است، کدام مورد در ارتباط با مادر این خانواده صادق است؟

- (۱) پدر این فرد، ممکن است اختلالاتی در تشکیل ساختارهای ممانعت‌کننده از خونریزی‌های شدید، داشته باشد.
- (۲) ممکن نیست در دوران کودکی خود، محدودیت‌هایی در مصرف شیر مادر تجربه کرده باشد.
- (۳) برای زندگی در مناطق مرتفع، از نظر کمبود اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها فاقد مشکل است.
- (۴) ممکن است فاقد هرگونه دگره بیماری‌زا بر روی فام‌تن‌های جنسی خود باشد.

۲۲- به طور کلی سازوکارهایی را که باعث ایجاد گونه‌ای جدید می‌شوند، به دو گروه تقسیم می‌کنند و این دو سازوکار، در شکل زیر نشان داده شده‌اند. در خصوص این سازوکارها، کدام مورد نادرست است؟



(۱) در سازوکار (۲) برخلاف سازوکار (۱)، وقوع کراسینگ‌اور با تشکیل آلل‌های جدید، تفاوت بین جمعیت‌ها را افزایش می‌دهد.
(۲) در سازوکار (۱) همانند سازوکار (۲)، انتخاب طبیعی، فراوانی دگرها در خزانه ژنی دو جمعیت را دستخوش تغییر می‌کند.

(۳) در سازوکار (۲)، در جاندارانی که تعریف ارنست مایر برای آن‌ها کاربرد دارد، نوترکیبی می‌تواند باعث ایجاد تفاوت بین افراد شود.
(۴) تغییرات ماندگار در نوکلئوتیدهای مادهٔ وراثتی، در متمایز کردن افراد از هم در سازوکار (۲) همانند سازوکار (۱) نقش دارد.

۲۳- با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره‌های بارز، رنگ قرمز و دگره‌های نهفته، رنگ سفید را به وجود می‌آورند و رخ نمود (فنوتیپ)‌های دو آستانهٔ طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ)‌های $AABBCC$ و $aabbcc$ را دارند، بنابراین فراوانی همهٔ ذرت‌های حاصل از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)‌های و $aaBBCC$ در نمودار توزیع فراوانی رخ نمودها، به طور حتم بیشتر از فراوانی ذرت‌های حاصل از آمیزش دو ذرت با ژن نمود $aabbcc$ و $AABBcc$ خواهد بود.

(۱) $AABbcc$ (۲) $AaBbCc$ (۳) $AaBbcc$ (۴) $aaBbcc$

۲۴- صفت طاسی صفتی مستقل از جنس است که در مردان به شکل بارز و در زنان به صورت نهفته بروز می‌کند. در یک خانوادهٔ چهارنفری، فرزند دختری وجود دارد که از نظر ژنتیکی مستعد از دست دادن مو می‌باشد ولی از نظر فاکتورهای انعقادی مشکلی ندارد. این دختر هم‌چنین به دلیل نوعی بیماری ارثی، از رژیم غذایی فاقد آمینواسید فنیل آلانین استفاده می‌کند. به دنبال ازدواج این دختر با مردی واجد نوعی بیماری وابسته به جنس مربوط به کمبود ارثی فاکتور انعقادی شمارهٔ هشت در پلاسمای خود و دارای مشکلات مربوط به ریزش مو، هم‌چنین فاقد هرگونه محدودیت در مصرف آمینواسیدهای مختلف، پسری با اختلال مشابه مادر خود از نظر مصرف آمینواسیدهای مختلف و بدون مشکل از نظر سلامت مو و هم‌چنین دارای مشکل در انعقاد خون، متولد شده است. کدام گزینه، در ارتباط با این خانواده به درستی بیان شده است؟

(۱) این خانواده ممکن است صاحب دختری فاقد دگرهٔ بیماری‌زا بر روی فام‌تن‌های جنسی خود شود.
(۲) مادر بزرگ مادری این پسر، ممکن نیست مشکلی از نظر کمبود فاکتور انعقادی شمارهٔ هشت داشته باشد.
(۳) پدر بزرگ مادری این پسر، ممکن نیست دارای هر دو دگرهٔ غالب صفت طاسی در یاخته‌های خود باشد.
(۴) دایی این پسر نمی‌تواند در آینده صاحب فرزندی واجد محدودیت در مصرف آمینواسید فنیل آلانین شود.

۲۵- اگر صفت وجود لکه‌های تیره و روشن بر روی بدن جاندارانی نرماده که از مویرگ‌های زیر پوستی جهت تبادل گازهای تنفسی استفاده می‌کنند، نوعی صفت مستقل از جنس باشد که توسط دو دگرهٔ B و W کنترل می‌شود، به نحوی که دگرهٔ B رنگ تیره و دگرهٔ W رنگ روشن را تعیین کند و بین آن‌ها، رابطهٔ بارزیت ناقص برقرار باشد. هم‌چنین اگر وجود زوائد دایره‌ای بر روی پوست آن‌ها نیز، به صورت نهفته و تحت کنترل دو دگرهٔ R و r باشد، تولد کدام مورد، محتمل است؟

(۱) زاده‌ای با لکه‌های تیره و بدون زائده از خودلقاحی والدی واجد رخ نمودی مشابه با زاده
(۲) زاده‌ای واجد زوائد و لکه‌های خاکستری از والدینی با لکه‌های تیره و بدون زوائد
(۳) هر زاده واجد لکه‌های خاکستری و بدون زائده از والدی با لکه‌های روشن و دارای زوائد
(۴) زاده‌ای با لکه‌های روشن و واجد زوائد دایره‌ای از والدینی دارای لکه‌های خاکستری و بدون زوائد

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیالی سبز



تست و پاسخ ۱

جانشینی + حذف و اضافه
+ تشکیل دوپار تیمین

چند مورد در خصوص جهش‌های کوچک، عبارت را به نادرستی کامل می‌کند؟ «هر جهشی که»

- (الف) در ژن مربوط به ساخت نوعی آنزیم رخ می‌دهد، فعالیت آنزیم مورد نظر را تا حدودی دستخوش تغییر می‌کند
(ب) بر طول رشته پلی‌پپتیدی حاصل از ژن اثر دارد، در پی جانشینی یک نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگر حاصل شده است
(ج) در فعالیت پروتئین حاصل از نوعی ژن فاقد اثر است، به دنبال تبدیل رمزهای مختلف یک آمینواسید به یکدیگر ایجاد می‌شود
(د) سبب جداسازی زودهنگام رناتن از رنای پیک (نسبت به حالت طبیعی) می‌شود، در نزدیکی یا بر روی رمز مربوط به پایان ترجمه در مولکول دنا (DNA) رخ داده است

(۲) سه

(۱) چهار

(۴) یک

(۳) دو

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی همه موارد نادرست هستند.

بررسی همه موارد:

(الف) هر جهشی لزومن فعالیت محصول ژن را تغییر نمی‌دهد، مثلن ممکن است جهش به گونه‌ای رخ داده باشد که بر روی جایگاه فعال آنزیم فاقد اثر باشد. در این حالت نمی‌توان گفت فعالیت آنزیم مورد نظر دستخوش تغییر می‌شود. مثل جهش خاموش یا حتی دوپار تیمین که در رشته رمزگذار ژن رخ داده است.

نکته هر جهشی که در یک ژن رخ می‌دهد لزومن در رنای حاصل از رونویسی آن اثر نمی‌گذارد، مثلن طی تشکیل دوپار تیمین چون توالی دنا تغییری نمی‌کند، پس رنای حاصل از رونویسی نیز می‌تواند بدون تغییر باشد (مثلن اگر جهش دوپار تیمین در رشته رمزگذار رخ داده باشد، تأثیری در توالی رشته الگو ندارد)؛ این جهش، همانندسازی را با اختلال مواجه می‌کند. از طرفی یک جهش ممکن است در توالی رنای پیک اثر بگذارد، اما لزومن در فعالیت یاخته اختلال ایجاد نمی‌کند؛ مثلن ممکن است در اینترون رخ داده باشد یا حتی یک جهش خاموش باشد.

(ب) جهش‌هایی که سبب ایجاد کدون پایان زودهنگام یا کدون آغاز دیرهنگام در رنای پیک حاصل از ژن می‌شوند، می‌توانند بر طول رشته پلی‌پپتیدی مورد نظر اثر داشته باشند. جهش‌های جانشینی، حذف و اضافه می‌توانند سبب این تغییر شوند. از طرفی جهش‌های حذف و اضافه با تغییر در تعداد نوکلئوتیدهای ژن، حتی بدون تغییر در کدون آغاز یا پایان، هم‌چنان می‌توانند طول رشته پلی‌پپتیدی حاصل از ژن را تغییر دهند، چراکه در این جهش‌ها چندین نوکلئوتید ممکن است به ژن اضافه و یا از آن حذف شده باشند.

نکته کاهش طول زنجیره پپتیدی در اثر بروز جهش‌های کوچک می‌تواند:

- ۱ همراه با کاهش طول دنا و به دنبال جهش حذف باشد؛ مثلن حذف رمز چند یا یک کدون از دنا.
- ۲ بدون کاهش طول دنا و به دنبال تغییر رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه باشد.
- ۳ به دنبال اضافه شدن توالی باشد که رمز پایان ترجمه زودتر از موعد ایجاد می‌کند، مثلن توالی ACAACT به توالی ابتدایی یک ژن اضافه شود و چون ACT به UGA رونویسی می‌شود و UGA هم رمز پایان ترجمه است، ترجمه خیلی زود متوقف می‌شود.

نکته افزایش طول رشته پلی‌پپتیدی در اثر بروز جهش‌های کوچک می‌تواند:

- ۱ به دنبال اثر جهش اضافه یا حذف باشد (مثلن حذف رمز پایان ترجمه) که در این صورت امکان تغییر چارچوب خواندن رمزها نیز وجود دارد.
- ۲ به دنبال تبدیل رمز پایان ترجمه به رمز آمینواسید انجام بگیرد.

(ج) لزومن این گونه نیست. به عنوان مثال جهش ممکن است در توالی بین ژنی رخ دهد. در این حالت، جهش سبب تبدیل رمزهای مختلف یک آمینواسید به یکدیگر نشده است. جهش دوپار تیمین هم، لزومن سبب تغییر محصول نمی‌شود.



د) جهشی که سبب ایجاد کدون آغاز دیرهنگام یا کدون پایان زودهنگام در رنای پیک رونویسی شده از مولکول دنا گردد، می تواند سبب جداسازی زودهنگام رناتن از رنای پیک نسبت به حالت طبیعی شود. حتی جهش حذف هم می تواند سبب این موضوع شود. دقت کنید بخش دوم این گزینه فقط در خصوص جهش هایی درست است که بر روی رمز پایان یا نزدیکی آن رخ می دهد، اما ممکن است جهش بر روی رمز آغاز باشد که آن را به رمز دیگری تبدیل کرده است یا حتی حذف در نواحی ابتدایی ژن!

انواع جهش های کوچک	تعریف	ویژگی	انواع آن
جانشینی	یک یا چند نوکلئوتید، جانشین یک یا چند نوکلئوتید دیگر می شود.	عدم تغییر در تعداد نوکلئوتیدهای دنا و در نتیجه رنای حاصل از آن تغییر در توالی رنای حاصل از رونویسی از روی ژن	خاموش ← تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان آمینواسید (عدم تغییر در توالی پروتئین) دگر معنا ← تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگر (تغییر توالی پروتئین) بی معنا ← تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه (تغییر در توالی پروتئین)
حذف و اضافه	حذف و یا اضافه شدن یک یا چند نوکلئوتید	با تغییر تعداد نوکلئوتیدها در دنا همراه است. می تواند تعداد نوکلئوتیدهای رنای پیک را کاهش یا افزایش دهد.	با تغییر چارچوب خواندن همراه است ← حذف و اضافه با ضرب غیر از سه نوکلئوتید رخ داده است و طول پروتئین تغییر می کند. با تغییر چارچوب خواندن همراه نیست ← حذف و اضافه با ضرب سه نوکلئوتید که می تواند منجر به تغییر پروتئین ساخته شده شود.
تشکیل دوپاریمین	تشکیل پیوند بین دو باز T مجاور هم در یک رشته دنا، در اثر پرتو فرابنفش	منجر به اختلال در ساختار دنا می شود ← اختلال در یک رشته دنا که سبب اختلال در همانندسازی می شود.	—

تست و پاسخ ۲

گروه های خونی ABO + Rh

طبق مطلب کتاب درسی، در جمعیت انسان ها، «دو» نوع گروه خونی مطرح می شود. در خصوص نوعی گروه خونی که نسبت به دیگری، ژن (های) خود را بر روی فام تن (کروموزوم) های هسته ای کوچک تری قرار داده است، چند مورد زیر صحیح است؟
الف) توالی ژن هایش به میزان بیشتری توسط فراوان ترین یاخته های خونی مورد رونویسی قرار می گیرد.
ب) همواره سبب قرارگیری مولکولی با مونومرهای متنوع بر سطح یاخته های بدن می شود.
ج) نسبت به گروه خونی دیگر، اختلاف بیشتری میان تعداد فنوتیپ و ژنوتیپ های خود در جمعیت دارد.
د) انواعی از ژنوتیپ های ناخالص را، در افراد جمعیت پدید می آورد.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

پاسخ: گزینه ۳

خود حل کنی بهتره ژن (های) مربوط به گروه خونی Rh بر روی فام تن شماره ۱ و ژن (های) مربوط به گروه خونی ABO بر روی فام تن شماره ۹ قرار گرفته است. براساس تصاویر تهیه شده از کاریوتیپ فام تن های هسته ای، می دانیم که بزرگ ترین فام تن هسته ای انسان، همان فام تن شماره ۱ است؛ بنابراین منظور صورت سؤال، گروه خونی ABO می باشد.

پاسخ تشریحی موارد «ج» و «د» درست بیان شده است.

بررسی همه موارد:

الف) ژن های مربوط به گروه های خونی، توسط یاخته های هسته دار رونویسی می شوند، اما گویچه های قرمز بالغ، یاخته های خونی هستند که از بقیه یاخته های خونی فراوان تر هستند. گویچه های قرمز بالغ فاقد هسته و دنا هستند، در نتیجه از روی ژن های مربوط به گروه خونی ABO در آن ها، رونویسی رخ نمی دهد.



ب) گروه خونی Rh مربوط به قرارگیری (ژن‌نمودهای DD یا Dd) یا عدم قرارگیری (ژن‌نمود dd) نوعی مولکول پروتئینی و گروه خونی ABO، مربوط به قرارگیری و حضور مولکول (های) کربوهیدراتی بر سطح گویچه‌های قرمز است. اگر فرد ژن‌نمود ii داشته باشد، گروه خونی O دارد. در این فرد، کربوهیدراتی از گروه‌های خونی در سطح گویچه‌های قرمز مشاهده نمی‌شود.

نکته بیان ژن‌های مربوط به هر دو نوع گروه خونی، سبب ساخته شدن پروتئین می‌شود. تفاوت در این است که در گروه خونی Rh، خود پروتئین حاصل از بیان، در غشای یاخته قرار می‌گیرد اما در گروه خونی ABO، پروتئین حاصل از بیان، کربوهیدرات (هایی) را به سطح غشای یاخته اضافه می‌کند (خود پروتئین در غشا قرار نمی‌گیرد).


ج) گروه خونی ABO دارای شش نوع ژنوتیپ و چهار نوع فنوتیپ در افراد جمعیت می‌باشد (دو عدد اختلاف میان ژنوتیپ و فنوتیپ)، در حالی که در گروه خونی Rh، سه نوع ژنوتیپ و دو نوع فنوتیپ در افراد جمعیت قابل انتظار می‌باشد (یک عدد اختلاف میان ژنوتیپ و فنوتیپ).
د) در این نوع گروه خونی، انواعی از ژنوتیپ‌های ناخالص (AB، AO و BO) در افراد جمعیت قابل انتظار است ولی در گروه خونی Rh، تنها یک نوع ژنوتیپ ناخالص (Dd) دیده می‌شود، بنابراین گروه خونی ABO، دارای ژنوتیپ ناخالص بیشتری نسبت به دیگری است.

مقایسه گروه خونی ABO و Rh									
گروه خونی ABO			گروه خونی Rh		نوع گروه خونی				
بودن یا نبودن کربوهیدرات‌های A و B در غشای گویچه‌های قرمز			بودن یا نبودن پروتئین D در غشای گویچه‌های قرمز		اساس تقسیم‌بندی				
فام‌تن شماره ۹			فام‌تن شماره ۱		ژن مربوط به آن در کدام فام‌تن است؟				
(i)O	(I ^A)A	(I ^B)B	D	d	انواع ال‌های مرتبط با آن				
هم‌توانی (بین ال‌های A و B) + بارز و نهفتگی (بین ال‌های A یا B و O)			بارز و نهفتگی		نوع رابطه بین ال‌ها				
آنزیم اضافه‌کننده کربوهیدرات B به غشای برخی یاخته‌ها، حاصل از بیان شدن ال B آنزیم اضافه‌کننده کربوهیدرات A به غشای برخی یاخته‌ها، حاصل از بیان شدن ال A			پروتئین D از بیان شدن ال D		پروتئین ایجاد شده از بیان شدن ال				
OO	AA	AO	BB	BO	AB	DD	Dd	dd	انواع ژنوتیپ‌ها
خالص	خالص	ناخالص	خالص	ناخالص	ناخالص	خالص بارز	ناخالص	خالص نهفته	نوع ژنوتیپ‌ها
O	A	B	AB	مثبت		منفی			
								شکل گویچه قرمز مربوط به فنوتیپ	

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیل سبز



تست و پاسخ ۳



با توجه به نوعی از گیاه ذرت که صفت مربوط به تعیین رنگ آن در کتاب درسی مطرح گردیده است، از خودلقاحی گروهی از ذرت‌ها، زاده‌هایی حاصل می‌شوند که برخی از آن‌ها رنگی تیره‌تر و برخی رنگی روشن‌تر از رنگ ذرت‌های حاصل از لقاح دو والد با ژن‌نمود (ژنوتیپ) های $AABbCc$ و $AABBcc$ خواهند داشت. با در نظر گرفتن تمامی حالات، کدام گزینه درست است؟

(۱) یاخته‌های بخش «۱» این دانه ممکن نیست ژن‌نمودی مشابه با درون‌دانه (آندوسپرم) دانهٔ ذرتی با ژن‌نمود $AABBcc$ داشته باشند.

(۲) یاختهٔ ایجادکنندهٔ بخش «۲» این دانه ممکن است از لقاح دو یاختهٔ جنسی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) یکسان ایجاد شده باشد.

(۳) یاختهٔ ایجادکنندهٔ بخش «۳» این دانه به طور حتم دارای حداقل دو دگرهٔ نهفته در ترکیب ژن‌نمود (ژنوتیپ) خود می‌باشد.

(۴) یاخته‌های بخش «۱» این گیاه به طور حتم رخ‌نمود (فنوتیپ) قرمزتر از ذرتی با درون‌دانه (آندوسپرم) $AAaBBBCCc$ دارند.

پاسخ: گزینه ۲

خود حل کنی بهتره از لقاح دو ذرت با ژن‌نمودهای $AABbCc$ و $AABbCc$ ، فقط ذرت‌هایی با ژن‌نمود $AABbCc$ ایجاد می‌شوند که در ژن‌نمود خود سه دگرهٔ بارز و سه دگرهٔ نهفته دارند. ذرت‌هایی که می‌توانند پس از خودلقاحی، هم ذرت‌های تیره‌تر و هم روشن‌تر از ذرتی با سه دگرهٔ بارز و نهفته ایجاد کنند به سه دستهٔ زیر تقسیم می‌شوند.

- (۱) ذرت‌هایی که بیشترین تعداد رخ‌نمود را دارند (ذرت‌هایی با سه دگرهٔ بارز و سه دگرهٔ نهفته)
- (۲) گروهی از ذرت‌هایی که ۴ دگرهٔ بارز و ۲ دگرهٔ نهفته دارند (به شرطی که در تمام جایگاه‌ها خالص نباشند).
- (۳) گروهی از ذرت‌هایی که ۲ دگرهٔ بارز و ۴ دگرهٔ نهفته دارند (به شرطی که در تمام جایگاه‌ها خالص نباشند).

پاسخ تشریحی

بخش «۲» مربوط به لبه است که از تقسیمات متوالی یاختهٔ تخم اصلی ایجاد می‌شود. تخم اصلی از لقاح اسپرم و تخم‌زا تشکیل می‌شود. ذرت $AaBbCc$ را در نظر بگیرید که می‌خواهد خودلقاحی انجام دهد؛ والد ماده همانند والد نر می‌تواند گامت‌های AbC , ABc , ABC ، abc , aBc , aBC , Abc و ABC تولید کند. از لقاح دو گامت ABc (اسپرم و تخم‌زا، ژن‌نمود یکسان دارند) ذرتی با ژن‌نمود $AABBcc$ ایجاد می‌شود که تیره‌تر از ذرت مورد سؤال است؛ پس این گزینه امکان دارد!

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) اگر ژن‌نمود گیاه به صورت $AABBcc$ باشد، دانهٔ ایجادکنندهٔ این گیاه می‌تواند حاصل از لقاح گامت‌های ABC و Abc باشد. اگر ABC مربوط به والد ماده باشد، آندوسپرم ژن‌نمود $AAaBBBCCc$ خواهد داشت و اگر گامت Abc مربوط به والد ماده باشد، آندوسپرم ژن‌نمود $AAaBBBCCc$ خواهد داشت. خودلقاحی ذرتی با ژن‌نمود $AABbCc$ را در نظر بگیرید. اگر گامت ماده ABC و گامت نر Abc باشد، آندوسپرم ژن‌نمودی مشابه با گیاه مطرح‌شده در گزینه خواهد داشت، پس ممکن است.

۳) بخش «۳» ساقهٔ رویانی را نشان می‌دهد. گفتیم ذرتی با ژن‌نمود $AaBbCc$ هم می‌تواند در صورت خودلقاحی، ذرت‌هایی تیره‌تر و یا روشن‌تر از خود تولید کند. اگر گامت‌های ABC با هم لقاح کنند ذرتی ایجاد می‌شود که ۶ الل بارز دارد (الل نهفته‌ای ندارد).

۴) آندوسپرمی که به صورت $AAaBBBCCc$ است، رویانی به صورت $AaBBcc$ دارد. در حالی که ما می‌توانیم رویانی داشته باشیم که در هر جایگاه خالص و بارز است و یا خالص و نهفته است (حاصل از خودلقاحی ذرت $AaBbCc$). یعنی می‌توانیم ذرت‌هایی سفیدتر از ذرتی با ۴ دگرهٔ بارز هم داشته باشیم.

تست و پاسخ ۴

در جمعیتی از طاووس‌های دولا (دیپلوئید) آسیای جنوب شرقی، از آمیزش طاووس‌های ماده با منقار بلند و دمی با خال‌های سفید با طاووس‌های نر منقار کوتاه و دمی فقط واجد خال‌های سیاه، همهٔ زاده‌هایی که منقاری با طول متوسط دارند، با یکدیگر هم‌جنس بوده و همهٔ زاده‌ها دمی با خال‌های سیاه دارند. با در نظر گرفتن این مورد، از آمیزش هر ماده‌ای که منقار کوتاه داشته و واجد خال‌های سفید بر روی دم خود است، با هر طاووسی واجد منقار بلند و خال‌های سیاه بر روی دم خود، تولد کدام مورد زیر محتمل است؟ (کروموزوم‌های تعیین‌کنندهٔ جنسیت طاووس‌ها همانند کروموزوم‌های جنسی انسان با X و Y نشان داده می‌شود).

- (۱) طاووس ماده با خال‌های سیاه و منقار کوتاه
- (۲) طاووس نر با منقار متوسط و خال‌های سفید
- (۳) طاووس نر با خال‌های غیرهم‌رنگ و منقار بلند
- (۴) طاووس ماده با خال‌های هم‌رنگ و منقار متوسط

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیال سبز



خود حل کنی بهتره در ابتدا باید نوع رابطه میان دگره‌های مربوط به صفت طول منقار و نوع خال‌های موجود در دم را تعیین کنیم. صفت طول منقار به صورت بارزیت ناقص بوده (کوتاه، بلند و متوسط) و با توجه به این که همه زاده‌هایی که منقاری با طول متوسط دارند، هم‌جنس هستند، نتیجه می‌گیریم دگره‌های مربوط به تعیین طول منقار (K و B) بر روی کروموزوم X قرار گرفته‌اند. در این صورت فقط زاده‌های دختر می‌توانند منقاری با طول متوسط (حد واسط) داشته باشند. در مقابل، رابطه میان خال‌های سیاه و سفید به صورت بارز و نهفتگی با بارزیت خال سیاه است، چراکه از آمیزش خال‌های سفید با خال‌های سیاه، فقط با خال‌های سیاه متولد شده‌اند. بنابراین ژن نمود طاووس‌های والدی که آمیزش می‌کنند به صورت زیر است:

طاووس ماده منقار کوتاه و واجد خال‌های سفید: $X^K X^K WW$

طاووس نر منقار بلند و واجد خال‌های سیاه: $X^B YBB$ یا $X^B YBW$

پاسخ تشریحی با در نظر گرفتن هر دو حالت ممکن برای والد نر، از آمیزش طاووس‌های مورد نظر، زاده ماده‌ای ایجاد می‌شود که خال‌های سیاه (با ژن نمود BW) یا سفید (WW) داشته (هم‌رنگ) و منقار آن طولی متوسط دارد. ($X^B X^K$) بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱ با توجه به این که منقار والد نر بلند است، منقار زاده ماده حاصل نمی‌تواند به صورت کوتاه باشد! به عبارتی دیگر منقار آن با گرفتن یک دگره K و یک دگره B، به صورت متوسط خواهد بود.
- ۲ طاووس نر نمی‌تواند هر دو دگره B و K مربوط به طول منقار را بر روی یک کروموزوم X خود داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند منقاری با طول متوسط داشته باشد.
- ۳ دقت کنید که دگره سیاه‌بودن خال بر سفیدبودن بارز است. در این حالت امکان ندارد خال‌های طاووس‌ها غیرهم‌رنگ باشد! به عبارتی یا همه سیاه بوده یا همه سفید هستند.

تست و پاسخ ۵

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (توارث بیماری‌های بیان‌شده، تماماً مشابه رایج‌ترین شکل بیماری هموفیلی است.) «بیماری پیلیتئوس مرتسباخر (PM)، نوعی بیماری عصبی است که در طی آن، همانند MS، میلین اطراف گروهی از رشته‌های عصبی از بین می‌رود و با نشانه‌های مشکلات حرکتی و تکلم بروز پیدا می‌کند. در صورت ازدواج مردی که مبتلا به هر دو بیماری PM و کوررنگی است با زنی که مشکلی در خصوص دو بیماری مطرح شده ندارد، اگر با قاطعیت می‌توان بیان داشت که

- ۱) پسرانی متولد شوند که در حرکات دست و پاهای خود مشکل دارند - همه افراد کوررنگ و دارای اختلال در حرکت دست و پا از یک جنس هستند
- ۲) مادر از نظر بیماری PM ناخالص باشد - همه فرزندان پسر در فعالیت گیرنده‌های مخروطی خود اختلال دارند
- ۳) همه دختران خانواده، فاقد نشانه‌هایی از این بیماری‌ها باشند - برخی پسران در فعالیت‌های حرکتی یا بینایی مشکل دارند
- ۴) همه دختران بیمار، در بیان کلمات مشکل داشته باشند - تولد پسرانی با عدم داشتن گام‌های استوار محتمل است

پاسخ: گزینه ۴

خود حل کنی بهتره با توجه به این که بیماری‌های مورد نظر وابسته به X نهفته هستند، می‌توانیم ژن‌نمودهای پدر و مادر را به دست بیاوریم. (الل‌های q و Q برای بیماری PM و الل‌های r و R برای بیماری کوررنگی در نظر گرفته شده‌اند.)

ژن‌نمود پدر مبتلا به هر دو بیماری: $X_r^q Y$

ژن‌نمود مادر فاقد مشکل در خصوص هر دو بیماری:

الف) برای هر دو بیماری ناقل باشد. $X_R^Q X_r^q$ یا $X_R^Q X_R^q$

ب) برای یکی از بیماری‌ها ناقل و برای دیگری کاملاً سالم باشد. $X_R^Q X_R^Q$ یا $X_R^Q X_r^q$

ج) برای هر دو بیماری کاملاً سالم باشد. $X_R^Q X_R^Q$

پاسخ تشریحی در صورتی که همه دختران بیمار، در بیان کلمات مشکل داشته باشند، یعنی به طور حتم دچار بیماری PM هستند. از آن جا که پدر حتم q دارد، مادر هم باید q داشته باشد، یعنی ژن‌نمودهای $X_R^Q X_r^q$ یا $X_r^q X_R^Q$ ؛ پس می‌توان انتظار داشت پسرانی دارای الل q متولد شوند که دچار مشکل حرکتی هستند.



درس نامه •• حل سؤالات مربوط به ژنتیک انسانی

این نوع سؤالات، شایع ترین تیپ سؤالات کنکور هستند. برای حل این سؤالات باید نکات زیر رو بلد باشی:

- (۱) اگر زنان ناقل، دو صفت وابسته به X نهفته داشته باشند، ۲ حالت داریم:
الف) هر دو ژن بیماری را بر روی یک کروموزوم X قرار داشته باشند (X^a_b) ← بدون کراسینگ اور نیمه از فرزندان پسر سالم و نیمه دیگر هر دو بیماری را دارند.
- ب) هر یک از ژن های بیماری را بر روی یک کروموزوم X باشد ($X^a X^b$) ← بدون کراسینگ اور همه پسران بیمار خواهند بود به طوری که نیمه از پسران مبتلا به یک نوع بیماری و نیمه دیگر مبتلا به نوع دیگر.
- (۲) اگر زنی سالم در مورد بیماری وابسته به X ، در بین فرزندان پسر بیمار داشته باشد، ژن نمود زن، ناخالص خواهد بود.
- (۳) در بیماری های وابسته به X مرد ناقل وجود ندارد.
- (۴) در بیماری های بارز، فرد ناقل وجود ندارد و افرادی که ژن نمود ناخالص دارند، بیمار هستند.
- (۵) دختران برای مبتلا شدن به یک بیماری وابسته به X :
الف) اگر بیماری نهفته باشد ← باید دو کروموزوم X حامل الل بیماری را داشته باشد. از این دو کروموزوم، یکی را از پدر می گیرد و دیگری را از مادر.
- ب) اگر بیماری بارز باشد ← وجود یک کروموزوم X حامل الل بیماری کافی است. این کروموزوم را می تواند از مادر یا پدر دریافت کرده باشد.
- (۶) پسران برای مبتلا شدن به بیماری وابسته به X ، یک کروموزوم X حاوی الل بیماری را از مادر خود دریافت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

- (۱) اگر پسران متولد شده دچار اختلال حرکتی باشند، یعنی مادر الل q را دارد و حداقل از نظر این بیماری ناقل است. در این شرایط همه فرزندان مبتلا به هر دو بیماری نمی توانند از یک جنس باشند، چرا که هم دختران و هم پسران می توانند این ویژگی را داشته باشند؛ مثلاً به دنبال آمیزش زیر:

$$X^q_R Y \times X^Q_R X^q_r \rightarrow X^q_r X^Q_R + X^q_r X^q_r + X^Q_R Y + X^q_r Y$$
- (۲) اگر مادر از نظر PM ناخالص باشد می تواند یکی از ژنوتیپ های مطرح شده در الف و ب را داشته باشد، یعنی می تواند فقط برای یکی از آن ها ناقل و یا برای هر دو ناقل باشد. اگر مادر $X^Q_R X^q_r$ باشد، فقط الل R را به پسران خود می دهد و آن ها حتمن سالم خواهند بود.
- (۳) دختران فاقد علائم بیماری می تواند کاملن سالم و یا ناخالص باشند. از آن جایی که پدر بیمار است و هر دو الل بیماری را به دختران می دهد، مادر باید کاملن سالم باشد تا همه دختران بتوانند ناخالص (با فنوتیپ سالم) باشند. در چنین شرایطی، پسر بیمار متولد نمی شود.

تست و پاسخ ۶

- چند مورد را نمی توان در خصوص فردی که دارای گروه خونی O^+ است با قاطعیت بیان کرد؟
- الف) در صورت دریافت خون از فردی با گروه خونی غیرمشابه، فعالیت یاخته هایی از خط سوم دفاعی فرد تحریک می گردد.
- ب) ممکن است دگره های گروه خونی Rh در غشای گویچه های قرمز آن، توانایی متفاوتی در تولید پروتئین داشته باشند.
- ج) پروتئین های مؤثر در تنظیم بیان ژن، فاقد توانایی اتصال به راه انداز ژن گروه خونی واقع بر روی کروموزوم کوچک تر هستند.
- د) حداقل برای یکی از انواع گروه خونی، ژن نمود خالص داشته و فاقد زنجیره های منشعب پلی ساکارییدی در سطح گویچه های قرمز خود است.
- (۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی فردی که دارای گروه خونی O^+ است، ژن نمودی به صورت OODD یا OODd خواهد داشت. با در نظر گرفتن این موضوع، هیچ یک از موارد قطعی نیستند.

بررسی همه موارد:

- الف) این فرد ممکن است از فردی با گروه خونی O^- خون بگیرد، در این حالت نه کربوهیدرات و نه پروتئینی متعلق به گروه های خونی به بدن فرد وارد نخواهد شد. به عبارتی مولکولی وجود ندارد که به عنوان آنتی ژن بیگانه توسط یاخته های دستگاه ایمنی شناسایی گردد. در این حالت فعالیت یاخته های دستگاه ایمنی در خط سوم دفاعی تحریک نمی گردد.



نکته سیستم ایمنی به آن چه که بیگانه تلقی کند حمله می کند. در فردی که گروه خونی O دارد، کربوهیدرات های A و B گروه خونی در غشای گویچه های قرمز وجود ندارد؛ بنابراین سیستم ایمنی این فرد، یاخته هایی که چنین کربوهیدراتی را دارند به عنوان بیگانه شناسایی می کند و به آن ها حمله می کند.

ب) ممکن است فرد برای گروه خونی Rh $\bar{r}$ نمودی به صورت Dd داشته باشد. در این حالت بیان الل D منجر به تولید پروتئین می شود، دقت کنید از روی الل d پروتئینی ساخته نمی شود. نکته مهم این جاست که دگرها هیچ وقت در سطح غشای گویچه قرمز قرار ندارند. دگرها در دنا هستند و دنا هم در هسته و یا میتوکندری های یاخته های جانوری وجود دارد.

نکته گویچه های قرمز در خون فاقد هسته هستند؛ بنابراین فام تن ندارند. بیان $\bar{r}$ ها و قرارگیری پروتئین ها و کربوهیدرات ها در غشای این یاخته ها، قبل از بالغ شدن آن ها رخ می دهد، یعنی زمانی که هنوز DNA و ... دارند.

ج) الل های گروه خونی Rh بر روی فام تن ۱ و الل های گروه خونی ABO بر روی فام تن ۹ قرار دارند. از روی $\bar{r}$ های مربوط به گروه خونی ABO، در این فرد در نهایت پروتئینی ساخته نمی شود. پروتئین های مختلفی در تنظیم بیان $\bar{r}$ ها نقش دارند مثل عوامل رونویسی. دقت کنید یکی از راه های تنظیم بیان $\bar{r}$ در یوکاریوت ها، در سطح فام تنی است که میزان فشردگی فام تن ها در این تنظیم نقش دارد. هیستون ها که در فشردگی فام تن ها نقش دارند می توانند به راه انداز هم متصل شوند.

د) این فرد حداقل برای گروه خونی ABO $\bar{r}$ نمود خالص (ii) داشته اما ممکن است برای گروه خونی Rh به صورت خالص (DD) یا ناخالص (Dd) باشد. این فرد فاقد کربوهیدرات مربوط به گروه خونی ABO است اما ممکن است کربوهیدرات های دیگری در سطح غشای گویچه های قرمز آن دیده شود! در غشای یاخته های یوکاریوتی کربوهیدرات دیده می شود.

تست و پاسخ ۷

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با مطالب کتاب درسی، برای یک بیماری ممکن است»

الف) وابسته به جنس نهفته – مردی با داشتن الل بیماری، صاحب دختری سالم شود

ب) مستقل از جنس نهفته – زنی با داشتن دو الل بیماری، اثرات بیماری را نشان ندهد

ج) مستقل از جنس نهفته – مردی با داشتن یک الل بیماری، اثرات بیماری را نشان دهد

د) وابسته به جنس نهفته – زنی سالم، دختری سالم و با $\bar{r}$ نمود متفاوت از خود داشته باشد

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی هر چهار مورد صحیح می باشد.

بررسی همه موارد:

الف) در بیماری وابسته به جنس (X) نهفته، دختر بیمار باید دو الل بیماری داشته باشد که یکی را از پدر و دیگری را از مادر می گیرد؛ پس مردی که الل بیماری را دارد، می تواند دختر سالم داشته باشد، اگر دختر، الل سالم! را از مادر دریافت کرده باشد.

نکته در بیماری های وابسته به X نهفته، اگر دختر بیمار باشد، پدرش حتمن بیمار است اما مادرش می تواند سالم (خالص یا ناخالص) و یا بیمار باشد.

ب) در بیماری های مستقل از جنس نهفته، برای بروز علائم بیماری، وجود هر دو الل بیماری در فرد مورد نیاز است پس زنی با داشتن هر دو الل بیماری، قطعن بیمار خواهد بود ولی لزومن علائم بیماری را بروز نمی دهد. مثلن دقت کنید در بیماری فنیل کتونوری که نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است، علائم بیماری زمانی بروز می یابد که در رژیم غذایی فرد فنیل آلانین وجود داشته باشد! پس در صورت عدم مصرف این آمینواسید، فرد علائم را بروز نمی دهد (اثر محیط بر بروز صفات).

نکته صرف وجود الل های بیماری زاء، علائم در فرد ظاهر نمی شود و با حتی اگر فرد ناخالص الل سالم را هم داشته باشد، به این معنا نیست که علائم بیماری را بروز نمی دهد. مثلن در فنیل کتونوزی فرد ff رژیم فاقد فنیل آلانین داشته باشد، علائم بیماری را بروز نمی دهد و یا در کم خونی داسی شکل، فرد ناخالص $Hb^A Hb^S$ در محیط کم اکسیژن، علائم بیماری را بروز می دهد علی رغم این که پروتئین سالم را می سازد.

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیل سبز



ج) بیماری مستقل از جنس نهفته مثل کم خونی داسی شکل؛ در این بیماری در فرد ناخالص علی رغم وجود یک الل بیماری، علائم بیماری در شرایط کمبود O_2 محیط بروز می یابد.

د) در بیماری وابسته به جنس نهفته مثل هموفیلی، برای بروز علائم آن در دختران، باید هر دو الل بیماری در فرد، وجود داشته باشد. زن سالم ممکن است ژنوتیپ کاملن سالم $(X^H X^H)$ یا ناقل $(X^H X^h)$ داشته باشد. در این شرایط بسته به ژن نمود پدر و حتی مادر، دختر می تواند سالم و یا حتی بیمار باشد. اگر مادر $X^H X^H$ و پدر $X^h Y$ باشد، دختر می تواند $X^H X^h$ باشد، یعنی سالم و ناخالص (ژن نمود متفاوت از مادر).

بیماری با الگوی مستقل از جنس نهفته	بیماری با الگوی وابسته به X نهفته
الل نهفته سبب بروز بیماری می شود.	
به طور معمول! برای بروز بیماری در فرد، وجود دو الل نهفته لازم است.	برای بروز بیماری در مردان (فرد XY) وجود تنها یک الل نهفته کافی است و در زنان حضور دو الل نهفته سبب بیماری می شود.
هم آقایان و هم خانم ها می توانند الل بیماری را داشته باشند، اما فنوتیپ سالم داشته باشند.	فقط فرد XX می تواند ناقل بیماری باشد؛ یعنی علی رغم داشتن الل بیماری، فنوتیپ سالم را نشان دهد.
احتمال ابتلا به این بیماری ها در فرزندان به یک اندازه است و جنسیت در میزان شانس مبتلا شدن تأثیری ندارد!	احتمال بروز این بیماری ها در یکی از دو جنس (پسران) بیشتر از دیگری است.
دو فرد سالم می توانند فرزندی بیمار داشته باشند.	
از ازدواج دو فرد سالم هم می تواند پسر بیمار و هم دختر بیمار متولد شود.	از ازدواج دو فرد با فنوتیپ سالم، اگر فرزند بیمار متولد شود، جنسیت آن پسر است که الل بیماری را از مادر ناقل گرفته است.
در صورت سالم بودن پدر، دختران می توانند سالم و یا بیمار باشند، بسته به خالص یا ناخالص بودن والدین!	اگر پدر سالم باشد، قطعاً دختران خانواده سالم خواهند بود، حتی اگر مادر بیمار باشد.

تست و پاسخ

در خصوص ذرت معرفی شده در فصل ۳ کتاب دوازدهم، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در صورتی که از آمیزش دو ذرت با یکدیگر دانه ای تولید شود که در ژن نمود آندوسپرم آن، فقط سه دگره نهفته وجود داشته باشد، ممکن نیست ژن نمود»

- (۲) یاخته ترشح کننده جیبرلین، ۴ دگره بارز داشته باشد
(۴) بزرگ ترین بخش رویان، ۳ دگره نهفته داشته باشد

- (۱) پوسته دانه سه جایگاه خالص بارز داشته باشد
(۳) یاخته مولد اسپرم، دو دگره نهفته داشته باشد

پاسخ: گزینه ۳

خود حل کنی بهتره در صورتی که در ژن نمود آندوسپرم سه دگره نهفته وجود داشته باشد، دو نتیجه گیری می توان انجام داد:

- (۱) هر سه دگره نهفته مربوط به اسپرم است و تمامی دگره های یاخته دوهسته ای بارز هستند. در این صورت می توان گفت ذرت نر حداقل سه دگره نهفته در ژن نمود خود و ذرت ماده نیز، حداقل سه دگره بارز در ژن نمود خود دارد.
(۲) یکی از دگره های نهفته مربوط به اسپرم است و دو دگره نهفته دیگر در ژن نمود یاخته دوهسته ای وجود دارد. در این صورت می توان گفت ذرت نر حداقل یک دگره نهفته و ذرت ماده نیز حداقل یک دگره نهفته در ژن نمود خود دارند.

نکته در ژن نمود یاخته دوهسته ای، تعداد الل های بارز یا نهفته به صورت زوج است! یعنی در هر جایگاه ژنی، خالص است.

پاسخ تشریحی با توجه به نکاتی که گفتیم، یاخته مولد اسپرم که همان یاخته زایشی است، یا یک دگره نهفته دارد و یا هر سه دگره آن نهفته است! یاخته زایشی، هاپلوئید است و با میتوز خود، اسپرم ها را تولید می کند؛ پس ژنوتیپ یاخته زایشی با اسپرم یکسان است. بررسی سایر گزینه ها:

۱) پوسته دانه از تغییر پوسته تخمک به وجود می آید پس ژنوتیپ آن، همان ژنوتیپ گیاه مادر است. گفتیم که ذرت ماده می تواند سه دگره بارز در ژن نمود خود داشته باشد.



۲) هورمون جیبرلین از یاخته‌های رویان ترشح می‌شود. اگر اسپرم دو دگره بارز (مثلن AbC) و یاخته تخم‌زا هم دو دگره بارز (مثلن aBC) داشته باشند، یاخته تخم اصلی (که مولد رویان است) می‌تواند ۴ دگره بارز داشته باشد ($AaBbCC$).

۴) بزرگ‌ترین بخش رویان، لپه است. اگر اسپرم abc و تخم‌زا ABC باشند، رویان و در نتیجه لپه، ژن‌نمود $AaBbCc$ خواهد داشت که دارای سه دگره نهفته است.

درس‌نامه •• برای حل سؤالات مربوط به ژنتیک گیاهی، ابتدا باید به چند مورد مهم توجه کنید:

- ۱) ژن‌نمود پوسته تخمک و همه یاخته‌های $2n$ بافت خورش موجود در تخمک یکسان است.
- ۲) کیسه‌های گرده در بساک قرار دارند و در یک گیاه $2n$ ، یاخته‌های دیپلوئید دارند. از تقسیم میوز این یاخته‌ها، چهار یاخته هاپلوئید ایجاد می‌شود که در واقع گرده‌های نارس‌اند. هر یک از این یاخته‌ها با انجام‌دادن تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می‌شود. دانه گرده رسیده یک دیواره خارجی، یک دیواره داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاخته زایشی دارد. از تقسیم میتوز یاخته زایشی درون لوله گرده (این لوله حاصل رشد یاخته رویشی است) دو گامت نر ایجاد می‌شود که ژن‌نمودی مثل هم دارند.
- ۳) در مادگی یک گل، تخمدان که به صورت بخشی متورم در گل دیده می‌شود، محل تشکیل تخمک‌هاست. در یک گیاه $2n$ تخمک جوان پوششی دولایه‌ای دارد که یاخته‌های دیپلوئیدی را در بر می‌گیرد. مجموع این یاخته‌ها، بافتی به نام بافت خورش را می‌سازند. یکی از یاخته‌های بافت خورش بزرگ می‌شود و با تقسیم میوز چهار یاخته هاپلوئیدی ایجاد می‌کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می‌ماند که با تقسیم میتوز، ساختاری به نام کیسه رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می‌کند. تخم‌زا و یاخته دوهسته‌ای از یاخته‌های کیسه رویانی هستند که در لقاح با گامت‌های نر شرکت می‌کنند.

۴) لقاح گامت نر و تخم‌زا سبب ایجاد یاخته تخم اصلی می‌شود که به رویان نمو می‌یابد. لقاح گامت نر و یاخته دوهسته‌ای منجر به ایجاد تخم ضمیمه می‌شود که با تقسیمات متوالی، بافتی به نام آندوسپرم را ایجاد می‌کند.

۵) وضعیت تعداد مجموعه کروموزومی یاخته‌های مختلف:

بخش (یاخته‌های گیاهی)	وضعیت کروموزومی در گیاه $2n$	وضعیت کروموزومی در گیاه $4n$
بخش‌های رویشی گیاه (ریشه، ساقه و برگ)	$2n$	$4n$
بخش‌های تولیدمثلی گیاه (بخش‌های پرچم و مادگی)	$2n$	$4n$
دانه گرده نارس، دانه گرده رسیده، یاخته‌های رویشی، زایشی و اسپرم	n	$2n$
تخم‌زا	n	$2n$
یاخته دوهسته‌ای	$n + n$	$2n + 2n$
تخم ضمیمه (آندوسپرم)	$3n$	$6n$
تخم اصلی (رویان)	$2n$	$4n$
پوسته دانه، پوسته تخمک، لپه، ساقه رویانی و ریشه رویانی	$2n$	$4n$



۶) برای پی بردن ژن نمود رویان از روی ژن نمود آندوسپرم، کافی است که الل های تکراری را در ژن نمود آندوسپرم یکی بگیریم؛ یعنی فقط یکی از آن ها را حساب کنیم که با باقی مانده الل ها ژن نمود رویان مشخص می شود. به عبارتی الل تکراری مربوط به تخمزا و الل دیگر مربوط به گامت نر است؛ مثلاً در آندوسپرمی با ژن نمود AAB، گامت نر، ژن نمود B و گامت ماده، ژن نمود A دارد.

تست و پاسخ ۹

در صورتی که ظاهر شدن دندان های آسیاب، مربوط به نوعی صفت مستقل از جنس بارز باشد، اگر زن و مردی که از نظر گروه خونی ABO، ژن نمودی ناخالص و متفاوت دارند بتوانند صاحب فرزندی شوند که بعضی از آن ها در ارتباط با صفت ظاهر شدن دندان های آسیاب، ژن نمودی متفاوت با والدین داشته باشند، در این صورت تولد چند مورد از فرزندان زیر ممکن است؟

الف) دختری فاقد دندان های آسیاب با گروه خونی O

ب) پسری با دندان های آسیاب و دارای ژن نمود AA برای گروه خونی

ج) دختری که از نظر هر دو صفت، ژن نمودی یکسان با مادرش دارد

د) پسری فاقد دندان های آسیاب و دارای هر دو کربوهیدرات گروه خونی در غشای گویچه قرمز

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی: هر چهار مورد ممکن است رخ دهد.

خودت حل کنی بهتره ژنوتیپ والدین در مورد گروه های خونی می تواند AO یا BO یا AB باشد و از آن جا که ژن نمود والدین از هم متفاوت است، آمیزش ها می تواند به صورت $AO \times BO$ - $AO \times AB$ - $BO \times AB$ باشد. همچنین والدین در مورد دندان های آسیاب باید ژنوتیپ Gg داشته باشند تا فرزندان ژنوتیپ متفاوت با آن ها را داشته باشد.

بررسی همه موارد:

الف) اگر ژنوتیپ پدر و مادر AO و BO باشد، امکان تولد دختری با گروه خونی O وجود دارد. در مورد دندان های آسیاب نیز با توجه به داشتن ژنوتیپ ناخالص برای هر دو والد، تولد دختر gg که فاقد دندان های آسیاب هست، امکان پذیر است.

ب) اگر ژنوتیپ پدر و مادر AO و AB باشد، تولد فرزند AA ممکن است. پسری که الل G را دارد (ژن نمود GG یا Gg) حتمن دندان آسیاب دارد که این هم امکان پذیر است.

ج) با توجه به ژنوتیپ های والدین، این ژنوتیپ نیز شدنی است. در مورد دندان های آسیاب نیز با توجه به داشتن ژنوتیپ ناخالص برای هر دو والد این مورد امکان پذیر است.

د) اگر ژنوتیپ پدر و مادر AO و BO باشد، این ژنوتیپ نیز شدنی است.

تست و پاسخ ۱۰

در جمعیتی از زنبور های عسل، اگر کوتاهی بال نسبت به بلندی آن، نهفته باشد، در این جمعیت، از آمیزش نرهای قطعاً همه زاده های بالی با طول خواهند داشت.

۲) بال بلند با ملکه بال کوتاه - نر - کوتاه

۱) بال کوتاه با ملکه بال بلند - ماده - بلند

۴) بال بلند با ملکه بال کوتاه - ماده - بلند

۳) بال کوتاه با ملکه بال بلند - نر - کوتاه

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی: در جمعیت زنبور های عسل، ملکه و زنبور های نر توانایی تولید مثل دارند. ملکه دیپلوئید است پس دو الل دارد ولی زنبور نر، هاپلوئید است و برای صفت های تک اللی و تک جایگاهی فقط یک الل دارد. زنبور های نر، از بکرزایی و زنبور های ماده از آمیزش ملکه و زنبور نر، به وجود می آیند. نر بال بلند، ژن نمود B و ملکه بال کوتاه، ژن نمود KK دارد. حاصل این آمیزش می شود ماده های BK که همگی بال بلند دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) این آمیزش به این صورت است $BK \leftarrow K \times BB$ (ماده های بال بلند) یا $BK \leftarrow K \times BK$ (بال بلند) + KK (بال کوتاه) که خب می بینید، ماده ای با بال کوتاه هم داریم.

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیال سبز



۲ و ۳ دقت کنید زنبورهای نر، حاصل بکرزایی ملکه هستند نه آمیزش بین زنبورهای نر و ماده. از آمیزش زنبورهای نر با ماده، فقط زنبور ماده حاصل می شود.

درس نامه •• ویژگی های افراد مختلف جمعیت زنبورهای عسل

ملکه	کارگر	نر
دیپلوئید و حاصل لقاح اسپرم و تخمک هستند.	هاپلوئید و حاصل بکرزایی ملکه است.	
توانایی تولیدمثل و انجام میوز را دارد.	نازا است.	توانایی تولیدمثل را دارد، ولی میوز انجام نمی دهد و با میتوز گامت تولید می کند.
ژن هایش را به صورت مستقیم به نسل بعد منتقل می کند.	ژن هایش را به صورت غیرمستقیم به نسل بعد منتقل می کند. ^۱	ژن هایش را به صورت مستقیم به نسل بعد منتقل می کند.
دارای فام تن همتا هستند.	فاقد فام تن همتا هستند.	
می توانند رخ نمودهای حد واسط و هم توان را هم بروز دهند.	نمی تواند رخ نمود حد واسط و هم توان را بروز دهد.	
با والد ماده خود از نظر تعداد فام تن یکسان و از نظر ژن نمود می توانند یکسان و یا متفاوت باشند.	از نظر تعداد فام تن و ژن نمود با والد خود قطعی متفاوت است.	
نیمی از اطلاعات وراثتی هسته والد ماده و تمام اطلاعات هسته ای والد نر را به ارث می برد.	تمام اطلاعات ژنی خود را از والد ماده دارد.	

فرض کنید که ژنوتیپ زنبور عسل ملکه، $AaBb$ باشد. ملکه با تقسیم میوز می تواند چهار نوع گامت ab ، AB ، Ab و aB را تولید کند. هر یک از این گامت ها می توانند با تقسیم میتوز، رشد کنند و زنبور عسل نر ایجاد کنند.

تست و پاسخ ۱۱

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«از خودلقاحی نوعی گیاه دوداد با ژن نمود $AaBb$ که در آن دگره (الل) های A و B بر روی یک فام تن (کروموزوم) قرار دارند، زاده ای با ژن نمود

..... در شرایط ایجاد می شود.»

(۱) فقط - رخ دادن کراسینگ اور

(۲) $aaBB$ - رخ دادن کراسینگ اور، نیز

(۳) $Aabb$ فقط - رخ دادن کراسینگ اور

(۴) $AABb$ - رخ دادن کراسینگ اور، نیز

پاسخ: گزینه ۳

مشاوره برای حل چنین سوالاتی ابتدا انواع گامت هایی که در حالت عادی و بدون کراسینگ اور تولید می شوند را بنویسید و به این نکته دقت کنید که هر گامتی که در شرایط بدون کراسینگ اور تولید می شود، در زمان رخ دادن کراسینگ اور هم می تواند تولید شود.

پاسخ تشریحی

با توجه به قرارگیری الل های A و B در یک کروموزوم، در صورت عدم وقوع کراسینگ اور، این دو الل با هم منتقل می شوند. نحوه قرارگیری این الل ها به این صورت است $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$ ، اگر کراسینگ اور رخ ندهد، گامت های AB و ab تولید می شود. در صورت وقوع کراسینگ اور، علاوه بر این گامت ها، گامت های aB و Ab هم تولید خواهد شد. زاده $Aabb$ می تواند حاصل لقاح دو گامت Ab (حاصل نوترکیبی) و ab (گامت والدی) باشد؛ پس حتمن لازم است کراسینگ اور رخ دهد. بررسی سایر گزینه ها:

۱ زاده $AaBb$ می تواند حاصل آمیزش دو گامت والدی AB و ab باشد، یعنی بدون وقوع نوترکیبی.

۲ زاده $aaBB$ ، فقط در صورت نوترکیبی زاده می شود و در صورت عدم وقوع نوترکیبی ایجاد نمی شود، چراکه گامت aB فقط در این شرایط تولید می شود.

۱- به دلیل نگهداری از زاده های ملکه و چون با ملکه ژن های مشترک دارد، پس در صورت افزایش شانس بقای بچه ها، ژن های او نیز به صورت غیرمستقیم به نسل بعد منتقل شده اند.



۴) زاده AABb می تواند حاصل از لقاح دو گامت AB و Ab باشد. گامت Ab فقط در صورت وقوع نوترکیبی ایجاد می شود.

نکته در فرایند کراسینگ اور:

- ۱) قطع صورت می گیرد ← شکسته شدن و تشکیل پیوند فسفودی استر + ثابت ماندن طول فام تن های همتا
- ۲) ممکن است صورت بگیرد ← تشکیل گامت نوترکیب
- ۳) هیچ گاه صورت نمی گیرد ← جابه جایی قطعات بین کروماتیدهای خواهری + جابه جایی قطعات بین تترادها (در واقع جابه جایی درون یک تتراد و بین کروماتیدهای غیرخواهری دو کروموزوم همتا رخ می دهد).

تست و پاسخ ۱۲

از ازدواج دو فرد با فنوتیپ سالم، سه فرزند متولد شده اند. فرزند اول، پسری مبتلا به DM (دیستروپی عضلانی دوشن) و فاقد فاکتور انعقادی شماره ۸ و مبتلا به بیماری فنیل کتونوری است. فرزند دوم، دختری سالم از نظر DM و دارای فاکتور انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم های A و B و واجد پروتئین D مربوط به گروه های خونی است. فرزند سوم، پسری سالم و دارای گروه خونی O و فاقد پروتئین D است. تولد کدام فرزند، در این خانواده غیرممکن است؟ (توارث بیماری دیستروپی عضلانی دوشن مشابه رایج ترین نوع هموفیلی است).

- ۱) پسری مبتلا به فنیل کتونوری و سالم از نظر دو بیماری دیگر و دارای گروه خونی B و واجد پروتئین D
- ۲) دختری سالم و دارای دگره (الل) های خالص برای فاکتور انعقادی شماره ۸ با گروه خونی AB و فاقد پروتئین D
- ۳) پسری سالم از نظر فنیل کتونوری و دارای اختلالات حرکتی و فاقد فاکتور انعقادی شماره ۸ و فاقد آنزیم های A و B گروه خونی
- ۴) دختری مبتلا به شایع ترین نوع هموفیلی و فنیل کتونوری و دارای دگره (الل) های ناخالص برای بیماری تحلیل عضلانی دوشن و واجد آنزیم های A و B

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی ژن نمود فرزندان به این صورت است:

فرزند اول ← $X_H^d Y ff$ - فرزند دوم ← $X_H^D X ABD$ - فرزند سوم ← $X_H^D Y O odd$
 با توجه به ژن نمود فرزندان و سالم بودن هر دو والد، ژن نمود والدین به صورت روبه رو است: مادر $X_H^D X_H^d D d A O ff$ و پدر $X_H^D Y D d B O ff$ می باشد.

از آن جا که پدر این خانواده از نظر هموفیلی سالم است، امکان تولد دختری مبتلا به هموفیلی وجود ندارد.


نکته در بیماری های وابسته به X نهفته به چند نکته توجه کنید: ۱) اگر پدر سالم باشد، همه دخترها، حتمن سالم خواهند بود، چرا که الل سالم پدر را دریافت می کنند. ۲) اگر مادر بیمار باشد، همه پسرها بیمار می شوند. ۳) اگر مادر سالم باشد، پسرها می توانند سالم باشند (اگر الل سالم مادر را دریافت کنند) و یا می توانند بیمار باشند (اگر مادر ناخالص باشد و الل نهفته مادر به پسرها منتقل شود).

بررسی سایر گزینه ها:

- ۱) با توجه به وجود الل سالم در مادر، پسر از نظر بیماری های وابسته جنس می تواند سالم باشد و از نظر بیماری فنیل کتونوری، چون هر دو والد ناخالص هستند، می تواند بیمار باشد. همچنین چون گروه خونی پدر و مادر A و B می باشد و ناخالص هستند ($AO \times BO$)، همه گروه های خونی در بین فرزندان، دیده می شود. در مورد گروه خونی Rh نیز چون هر دو والد ناخالص هستند، همه حالات مثبت و منفی ممکن است.
- ۲) با توجه به سالم بودن پدر و ناقل بودن مادر این نوع! دختر امکان تولد دارد. همچنین چون ژن نمود پدر و مادر AO و BO می باشد، فرزند دارای ژن نمود AB می تواند متولد شود. در مورد گروه خونی Rh هم، امکان تولد فرزند dd وجود دارد.



۳ از نظر بیماری فنیل کتونوری چون هر دو والد ناخالص هستند، فرزند FF و Ff می تواند متولد شود. از نظر بیماری های وابسته به جنس، چون مادر ناقل است ممکن است بیماری را به فرزندان پسر خود منتقل کند.



تست و پاسخ ۱۳

کدام گزینه در خصوص نوعی جاندار پریاخته ای، به نحو متفاوتی از سایر گزینه ها بیان شده است؟

- ۱) فقط بعضی از جهش هایی که طول فام تن ها را دستخوش تغییر می کنند، در اغلب موارد به مرگ می انجامند.
- ۲) فقط بعضی از جهش هایی که می توانند به نسل بعد منتقل شوند، بر روی یاخته های مسیر گامت زایی رخ می دهند.
- ۳) همه جهش های ساختاری فام تن که در تصویر کاریوتیپ تشخیص داده نمی شوند، تعداد ژن های سازنده فام تن ها را تغییر می دهند.
- ۴) همه جهش هایی که می توانند فاصله سانترومر از دو انتهای فام تن را تغییر دهند، همراه با شکستن نوعی پیوند اشتراکی رخ می دهند.

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی ۳ نادرست و بقیه گزینه ها، درست هستند.

جهش های بزرگ (ساختاری) فام تنی که بدون تغییر در طول فام تن (ها) رخ می دهند مانند جهش واژگونی و جابه جایی (بر روی همان کروموزوم یا کروماتید) در کاریوتیپ تشخیص داده نمی شوند. اولن که جهش واژگونی بر روی یک فام تن رخ می دهد نه فام تن ها! همچنین در این حالت لزومن تعداد ژن های کروموزوم تغییر نمی کند، چراکه یک ژن (به عنوان مثال) می تواند در جهت معکوس خود جابه جا شود. بررسی سایر گزینه ها:

۱ جهش هایی مثل جابه جایی (بین دو فام تن غیر همتا)، حذف و مضاعف شدگی از جمله جهش هایی هستند که می توانند طول کروموزوم (ها) را تغییر دهند. جهش حذف بزرگ در اغلب موارد به مرگ می انجامد.

۲ ممکن است جهشی که به نسل بعد منتقل می شود بر روی یاخته های مسیر گامت زایی نباشد! به عنوان مثال گیاهان (به عنوان جاندار پریاخته ای) ممکن است تولیدمثل غیرجنسی انجام دهند. در این حالت ممکن است جهش را به نسل بعد منتقل کنند که به دلیل جهش در یاخته جنسی نیست.

۴ جهش هایی مثل مضاعف شدگی، جابه جایی، واژگونی و حذف می توانند محل قرارگیری سانترومر از دو انتهای کروموزوم را تغییر دهند. دقت کنید همه جهش های بزرگ ساختاری فام تن ها با شکستن پیوند فسفودی استر (نوعی پیوند اشتراکی) همراه هستند.

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیل سبز



شکل	نکات دیگر!	تأثیرات	تعریف	نوع جهش	
—	زمانی که فام‌تن‌های شماره ۲۱ هنگام تشکیل گامت (ها) در انسان از هم جدا نشوند، گامتی ایجاد می‌شود که از فام‌تن ۲۱، دوتا دارد. به دنبال لقاح این گامت با گامت طبیعی و رشد تخم حاصل، فرد مبتلا به نشانگان داون متولد می‌شود.	- کاهش یا افزایش یک یا چند فام‌تن - عدم تغییر طول فام‌تن‌ها	یک یا چند فام‌تن در مرحله آنافاز (میتوز و میوز) از هم جدا نمی‌شوند	با هم ماندن فام‌تن‌ها	عددی
—	ایجاد این وضعیت در آزمایشگاه با تخریب رشته‌های دوک انجام می‌شود. در شرایط طبیعی، رخ دادن این نوع جهش می‌تواند منجر به پیدایش گیاهان پلی‌پلوئید مثل گل مغربی $4n$ و گندم $6n$ شود.	- ایجاد یاخته‌هایی با تعداد مجموعه فام‌تنی غیرطبیعی! - عدم تغییر طول فام‌تن‌ها	با هم ماندن همه فام‌تن‌های یاخته با یکدیگر هنگام تقسیم	پلی‌پلوئیدی شدن	
	- یاخته می‌تواند بعضی از ژن‌ها را از دست بدهد! - غالبن باعث مرگ یاخته می‌شود.	- کاهش طول فام‌تن و کاهش مقدار ماده ژنتیکی - یک یاخته	حذف بخشی از فام‌تن	حذف	
	در صورتی که قطعه جدا شده به همان فام‌تن متصل شود، یا به همان کروماتیدی که از آن جدا شده است متصل شده و یا به کروماتید خواهری خود (اگر فام‌تن‌ها مضاعف شده باشد)!	- می‌تواند همراه با عدم تغییر طول فام‌تن باشد. (جابه‌جایی در یک کروماتید) - می‌تواند منجر به تغییر طول دو فام‌تن غیرهمتا شود.	قسمتی از یک فام‌تن به فام‌تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فام‌تن منتقل می‌شود.	جابه‌جایی	ساختمانی
	- در یاخته و یا جاندار هاپلوئید (مثل زنبور عسل نر) رخ نمی‌دهد. - در مردان نمی‌تواند بین فام‌تن‌های جنسی رخ بدهد.	- تغییر طول دو فام‌تن همتا (یکی افزایش و دیگری کاهش) - در فام‌تن گیرنده از بعضی از ژن‌ها دو نسخه دیده می‌شود.	قسمتی از یک فام‌تن به فام‌تن همتا جابه‌جا شود.	مضاعف‌شدگی	


پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیل سبز



نوع جهش	تعریف	تأثیرات	نکات دیگر!	شکل
ساختمانی	واژگونی	عدم تغییر طول فام تن	- اگر منجر به تغییر مکان سانترومر نشود، توسط کاریوتیپ تشخیص داده نمی‌شود و اگر محل سانترومر تغییر کند، می‌تواند تشخیص داده شود. - معکوس شدن قسمتی از فام تن می‌تواند منجر به تغییر شکل آن و یا از بین رفتن بعضی از ژن‌ها شود (اگر شکستگی در بخشی از ژن رخ دهد).	

تست و پاسخ ۱۴

در یک خانواده پدر و مادری سالم که به ترتیب گروه خونی A و B دارند و هر دو دارای پروتئین D در غشای گویچه‌های قرمز خود هستند، پسر اول این خانواده دارای علائم مغزی ناشی از تجمع فنیل آلانین بوده و نمی‌تواند پروتئین D و عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد. در حاملگی بعدی، در صورتی که در برخلاف بخش دیگر، گویچه قرمزی یافت شود که یاخته بنیادی سازنده آن، ژن نمود BO را داشته باشد، تولد گروه خونی غیرممکن است.



۱) بخش (۲) - پسری سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری همراه با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات

۲) بخش (۱) - پسری سالم از نظر فنیل کتونوری و با اختلال در فرایند لخته شدن خون و ژنوتیپ متفاوت با هر دو والد از لحاظ کربوهیدرات‌های

۳) بخش (۲) - دختری مبتلا به فنیل کتونوری و دارای عامل انعقادی شماره ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات

۴) بخش (۲) - دختری سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای تنها یک نوع کربوهیدرات

پاسخ: گزینه ۴

خودت حل کنی بهتره بخش‌های (۱) و (۲) به ترتیب نشان‌دهنده خون جنین و خون مادر است. اول بریم سراغ ژن نمود پدر و مادر: پدر دارای یک ال A و یک ال D مربوط به گروه‌های خونی است و مادر هم یک ال B و یک ال D دارد. از آنجایی که فرزند مبتلا به فنیل کتونوری دارند و خودشان سالم هستند، هر دو ناخالص (Ff) هستند و چون فرزند آن‌ها فاقد پروتئین D هم هست از این نظر هم، ناخالص هستند. پس پدر ژن نمود $A - DdFfX^H Y$ و مادر ژن نمود $B - DdFfX^H X^h$ دارند.

پاسخ تشریحی طبق فرض سؤال، پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی است، در نتیجه همه دختران از نظر بیماری هموفیلی سالم بوده (حتی اگر ال X^h مادر را دریافت کنند) اما پسران می‌توانند بیمار یا سالم باشند؛ در نتیجه ۲ غیرممکن است. بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) چون مادر ناقل هموفیلی می‌باشد، پس پسر می‌تواند ال X^h مادر را دریافت کند و بیمار باشد. هم‌چنین چون از نظر فنیل کتونوری، هر دو ناقل هستند، فرزندان می‌توانند سالم یا بیمار باشند. بخش ۲، خون مادری است، پس طبق فرض سؤال مادر ژن نمود BO دارد اما فرزند این ژن نمود را نخواهد داشت. اگر پدر هم AO باشد، فرزند می‌تواند AO باشد و فقط یک کربوهیدرات گروه خونی را داشته باشد.

۲) دقت کنید طبق فرض سؤال، ژن نمود مادر با فرزند از نظر گروه خونی ABO متفاوت است؛ پس اگر فرزند BO باشد مادر حتمن BB است؛ چراکه گروه خونی B دارد، پس از نظر این صفت، ژن نمود متفاوت با هر دو والد دارد. این فرزند می‌تواند مبتلا به فنیل کتونوری و هموفیلی باشد.

۳) در این‌جا مادر گروه خونی B با ژن نمود BO دارد. پدر هم می‌تواند AO باشد، پس تولد فرزندی با ژن نمود OO محتمل است. با توجه به ناقل بودن مادر و سالم بودن پدر، دختر دارای عامل انعقادی شماره ۸ خواهد بود و از نظر فنیل کتونوری نیز با توجه به ناخالص بودن هر دو والد، ممکن است مبتلا به این بیماری باشد.



تست و پاسخ ۱۵

اگر در اثر خودلقاحی نوعی گل میمونی، گل‌هایی تولید شده باشند که رنگ حلقه دوم گروهی از آن‌ها مشابه گل‌های گیاه شبدرد باشد، چند مورد از ژن‌نمودهای زیر به ترتیب برای یاخته‌های ریشه رویانی و درون‌دانه گل‌های میمونی حاصل از این خود لقاحی امکان‌پذیر می‌باشد؟

RRR – RR (د)

WWW – WW (ج)

RWW – RW (ب)

RRW – RW (الف)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی همه موارد ممکن است.

خود حل کنی بهتره گل‌های گیاه شبدرد، رنگی سفید دارند. ژنوتیپ گل‌های میمونی‌ای که حلقه دوم آن‌ها (گلبرگ‌ها) سفید است، به صورت WW می‌باشد. از آنجایی که به دنبال خودلقاحی این گیاه، گروهی از گل‌ها، سفیدرنگ شده‌اند، پس می‌توان نتیجه گرفت گل‌هایی دیگر با رنگ‌های متفاوت (صورتی یا قرمز) نیز تشکیل شده است. با توجه به این توضیحات، ژن‌نمود WW برای گل والد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در این صورت، ژن‌نمود تمام گل‌های حاصل از خودلقاحی این گل، به رنگ سفید دیده خواهند شد، پس ژنوتیپ این گل به صورت RW است، چراکه در این حالت می‌توان ژن‌نمودهای دیگری را هم در گل‌های حاصل از خودلقاحی، انتظار داشت.

بررسی همه موارد:

(الف) اگر ژنوتیپ یاخته تخم‌زا و دوهسته‌ای حاصل از این گل را به ترتیب R و RR در نظر بگیریم و ژن‌نمود زامه‌ها نیز به صورت W باشد، ژن‌نمودهای یاخته‌های ریشه رویانی و درون‌دانه به ترتیب به صورت RW و RRW می‌باشد.

(ب) اگر ژنوتیپ یاخته تخم‌زا و دوهسته‌ای حاصل از این گل را به ترتیب W و WW در نظر بگیریم و ژن‌نمود زامه‌ها نیز به صورت R باشد، ژن‌نمودهای یاخته‌های ریشه رویانی و درون‌دانه به ترتیب به صورت RW و RWW می‌باشد.

(ج) اگر ژنوتیپ یاخته تخم‌زا و دوهسته‌ای حاصل از این گل را به ترتیب W و WW در نظر بگیریم و ژن‌نمود زامه‌ها نیز به صورت W باشد، ژن‌نمودهای یاخته‌های ریشه رویانی و درون‌دانه به ترتیب به صورت WW و WWW می‌باشد.

(د) اگر ژنوتیپ یاخته تخم‌زا و دوهسته‌ای حاصل از این گل را به ترتیب R و RR در نظر بگیریم و ژن‌نمود زامه‌ها نیز به صورت R باشد، ژن‌نمودهای یاخته‌های ریشه رویانی و درون‌دانه به ترتیب به صورت RR و RRR می‌باشد.

اگر در گل میمونی آندوسپرم به صورت باشد؛ آن‌گاه				
RWW	RRW	WWW	RRR	
R	W	W	R	دانه گرده
W	R	W	R	تخم‌زا
WW	RR	WW	RR	یاخته دوهسته‌ای
RW	RW	WW	RR	رویانی
W	R	W	R	یاخته ایجادکننده کیسه رویانی
RW یا WW	RW یا RR	RW یا WW	RW یا RR	یاخته خورش
R	W	W	R	یاخته رویشی و زایشی
RW یا WW	RW یا RR	RW یا WW	RW یا RR	ژنوتیپ محل تولید گامت‌های نر و ماده
RW یا WW	RW یا RR	RW یا WW	RW یا RR	پوسته دانه
RW یا WW	RW یا RR	RW یا WW	RW یا RR	کلاله
RW یا RR	RW یا WW	RW یا WW	RW یا RR	پرچم



تست و پاسخ ۱۶

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- «وجه اشتراک همه سازوکارهایی که موجب افزایش تفاوت‌های میان دو جمعیت در گونه‌زایی دگرمیهنی می‌شوند در این است که»
- (الف) پس از نوعی خطا در فرایند میوز باعث پدید آمدن گامت‌هایی با عدد فام‌تنی غیرطبیعی می‌گردند
- (ب) پس از متوقف‌شدن نوعی سازوکار مؤثر در تغییر فراوانی نسبی دگره (الل)‌ها بین این دو جمعیت عمل می‌نمایند
- (ج) همواره به دنبال اثرگذاری عاملی نقش ایفا می‌کنند که می‌تواند موجب کاهش توان بقای جمعیت شود
- (د) می‌توانند با تغییر میزان فراوانی دگره (الل)‌ها موجب افزایش توانایی بقای جمعیت در محیط جدید شوند
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی: تنها مورد «ب» به درستی بیان شده است.

خودت حل کنی بهتره عوامل بر هم زننده تعادل مثل جهش و رانش دگره‌ای و ... عوامل مؤثر در تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها مثل نوترکیبی می‌توانند در گونه‌زایی دگرمیهنی نقش داشته باشند.

بررسی همه موارد:

- (الف) مثلن رانش دگره‌ای و حتی نوترکیبی این گونه نیستند. دقت کنید تشکیل گامت با عدد فام‌تنی غیرطبیعی نوعی جهش است که در گونه‌زایی دگرمیهنی نیز می‌تواند رخ دهد.
- (ب) برای گونه‌زایی دگرمیهنی، لازم است شارش ژن بین دو گروه جداسده از هم، متوقف شود. پس از متوقف‌شدن شارش ژنی، عواملی مانند جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی موجب افزایش تفاوت‌های دو جمعیت در گونه‌زایی دگرمیهنی می‌شوند. شارش ژنی، می‌تواند موجب تغییر فراوانی نسبی دگره‌ها شود.
- (ج) عواملی که سبب کاهش تفاوت‌های فردی یا تنوع در جمعیت‌ها می‌شوند، می‌توانند سبب کاهش توان بقای جمعیت‌ها شوند، مثل رانش دگره‌ای یا انتخاب طبیعی، اما مثلن جهش فرایندی تصادفی است و وقوع یا عدم وقوع آن به فرایندهای دیگر وابسته نیست!
- (د) نوترکیبی نمی‌تواند موجب تغییر فراوانی دگره‌ها شود. این فرایند سبب می‌شود همان دگره‌های موجود، با آرایشی متفاوت در کنار هم قرار بگیرند و الل جدیدی به وجود نمی‌آورد، به همین دلیل چون نه اللی حذف می‌شود و نه اضافه، فراوانی دگره‌ها را تغییر نمی‌دهد. نوترکیبی سبب افزایش تنوع در جمعیت می‌شود و به همین دلیل، توان بقای جمعیت را افزایش می‌دهد.

تست و پاسخ ۱۷

فرض می‌کنیم در انسان، داشتن انگشت اشاره بلندتر از انگشت وسط را نوعی ژن مستقل از جنس کنترل می‌کند که این صفت در مردان، Aa و AA و در زنان، AA ظاهر می‌شود. اگر مردی با انگشت اشاره کوتاه‌تر با زنی با انگشت وسط بلندتر ازدواج کند و صاحب پسری با انگشت وسط کوتاه‌تر شود، کدام گزینه در خصوص این خانواده درست است؟

- (۱) تولد دختر و پسر با ژن نمود (ژنوتیپ) مشابه و رخ نمودی (فنوتیپ) متفاوت دور از انتظار است.
- (۲) همه فرزندان ناخالص این خانواده، رخ نمودی (فنوتیپ) مشابه والد هم‌جنس خود دارند.
- (۳) احتمال تولد فرزند دختری با انگشت اشاره بلندتر در این خانواده وجود دارد.
- (۴) ژن نمود (ژنوتیپ) پدر و مادر این خانواده با یکدیگر تفاوت دارد.

پاسخ: گزینه ۴

خودت حل کنی بهتره با توجه به فرض سؤال، نحوه توارث این صفت در مردان و زنان متفاوت از یکدیگر است. بر همین اساس ژنوتیپ افراد به شکل زیر است:

- مردان با انگشت اشاره بلندتر (انگشت وسط کوتاه‌تر): AA و Aa
- زنان با انگشت اشاره بلندتر (انگشت وسط کوتاه‌تر): AA
- مردان با انگشت اشاره کوتاه‌تر (انگشت وسط بلندتر): aa
- زنان با انگشت اشاره کوتاه‌تر (انگشت وسط بلندتر): Aa و aa

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیل سبز



پاسخ تشریحی در صورت سؤال فرض شده است که مرد aa با زن Aa یا aa ازدواج می‌کند، از آنجایی که این دو صاحب پسری با انگشت وسط کوتاه‌تر (aa یا Aa) شده‌اند، با توجه به ژن نمود پدر می‌توان گفت a از پدر به فرزند رسیده است پس فرزند حتمی aa دارد که در این شرایط مادر نمی‌تواند aa باشد و حتمی Aa است؛ بنابراین ژنوتیپ پدر aa و ژنوتیپ مادر Aa است که از هم متفاوت هستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

- ❶ دختران و پسران ناخالص در این خانواده، ژن نمود مشابه دارند، ولی رخ نمودهای آن‌ها متفاوت است.
- ❷ پسر Aa که فرزند ناخالص این خانواده است، انگشت اشاره بلندتری دارد، یعنی فنوتیپ متفاوتی نسبت به پدر خود دارد.
- ❸ دختری که انگشت اشاره بلندتر داشته باشد، ژنوتیپ AA دارد. امکان تولد این فرزند از پدری که ژنوتیپ aa دارد، دور از انتظار خواهد بود.

تست و پاسخ ۱۸

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ارتباط با اگر ژنوتیپ باشد، قطعاً» (بدون در نظر گرفتن جهش)

- ۱) بکرزایی زنبور عسل - زنبور ماده $AABBcc$ - ژنوتیپ تخم تشکیل شده ABc است.
- ۲) بکرزایی مار - مار ماده $AaBbCc$ - ژنوتیپ مار حاصل از بکرزایی $AABBCC$ یا $aabbcc$ است.
- ۳) تولیدمثل کرم کبد - کرم کبد $AABbCC$ - می‌تواند زاده‌ای با ژنوتیپ مشابه خود، تولید کند.
- ۴) زنبور عسل - زنبور ماده و نر به ترتیب $AABBCC$ و $aabbcc$ - زنبور ماده حاصل $AaBbCc$ است.

پاسخ: گزینه ۳


پاسخ تشریحی کرم کبد هرمافرودیتی است که لقاح داخلی دارد و خودش هم گامت نر و هم گامت ماده می‌سازد، گامت‌های حاصل از ژن نمود $AABbCC$ می‌توانند دو نوع باشند: AbC و ABC که می‌توانند با هم لقاح کنند؛ پس انواع ژنوتیپ‌های حاصل از این تولیدمثل شامل این‌ها می‌شود: $AABbCC$ ، $AABbCC$ و $AABBCC$ ، پس می‌تواند زاده‌ای با ژنوتیپ مشابه با خودش نیز داشته باشد.

نکته در کرم کبد هر دو نوع دستگاه تولیدمثل وجود دارد و جانوری نرماده است. این کرم جزء کرم‌های پهن بوده که در آن هر فرد تخمک‌های خود را بارور می‌کند. (زیست یازدهم - فصل ۷)

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ❶ دقت کنید که در بکرزایی زنبور ملکه، تخم تشکیل نمی‌شود زیرا لقاحی صورت نگرفته است! ملکه می‌تواند تخمک با ژنوتیپ ABC بسازد که این تخمک تقسیم می‌شود و زنبور نر هاپلوئیدی ایجاد می‌شود.
- ❷ این مار ماده می‌تواند ۸ نوع گامت مختلف تولید کند که همه آن‌ها می‌توانند منشأ زاده نسل بعد حاصل از بکرزایی باشند، مثلاً ممکن است گامت تشکیل شده، ژن نمود aBc داشته باشد که در این شرایط، ژنوتیپ جانور حاصل به صورت $aaBBcc$ است.

درس نامه •• بکرزایی در مار



- ۱) مار ماده با میوز، تخمک هاپلوئید ایجاد می‌کند. این تخمک‌ها ابتدا با انجام همانندسازی، تعداد فام‌تن‌های خود را دوبرابر می‌کنند و سپس تخمک که دیگر دیپلوئید است، با انجام تقسیمات میتوزی، یک مار دیپلوئید را ایجاد می‌کند.
- ۲) مار حاصل از بکرزایی توانایی انجام میوز دارد ولی به دلیل این‌که ژنوتیپ آن خالص است، همواره یک نوع گامت تولید می‌کند.
- ۳) در مار حاصل از بکرزایی انجام فرایند کراسینگ‌اور منجر به ایجاد فامینک‌های نو ترکیب نمی‌شود.
- ۴) فرض کنید ماری داریم با ژنوتیپ $AaBB$ ؛ این مار با انجام میوز می‌تواند گامت‌های AB و aB را ایجاد کند. هر یک از این گامت‌ها می‌تواند ابتدا فام‌تن‌هایش را دو برابر کند؛ یعنی به صورت $AABB$ و یا $aaBB$ دربی‌آورد و سپس با تقسیم میتوز، یک مار دولا را ایجاد کند. از بکرزایی یک مار با ژنوتیپ $AaBB$ ، زاده حاصل یا به صورت $AABB$ است و یا $aaBB$.

- ❷ در جمعیت زنبورهای عسل، زنبور ماده دیپلوئید است اما زنبور نر، هاپلوئید است و نمی‌تواند به تعداد زنبور ماده الل داشته باشد.



تست و پاسخ ۱۹

در مسیر اسپرم‌زایی در یک مرد سالم، عواملی وجود دارند که بدون ایجاد تغییر در تعداد فام‌تن‌های یاخته‌ها، باعث می‌شوند که هر دو نوع ژن مربوط به ساخت کربوهیدرات‌های گروه خونی فرد در یاخته اسپرماتوسیت ثانویه دیده شوند. کدام ویژگی، فقط در مورد یکی از این عوامل، درست است؟

جابه‌جایی + مضاعف‌شدگی
+ کراسینگ‌اور

- ۱) ممکن است با تغییر میزان پروتئین‌های فشرده‌کننده دنا در بخش‌هایی از فام‌تن همراه باشد.
- ۲) نسبت بازهای تک‌حلقه‌ای به دو حلقه‌ای را در ساختار کروماتیدها دستخوش تغییر می‌کند.
- ۳) می‌تواند سبب تشکیل کروموزوم حاوی دگره‌های هر دو گروه خونی ABO و Rh شود.
- ۴) در طی بروز آن طول دو کروموزوم (کروماتید) می‌تواند به طور هم‌زمان تغییر کند.

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی: جهش جابه‌جایی، مضاعف‌شدگی و کراسینگ‌اور، عواملی هستند که بدون تغییر تعداد کروموزوم‌ها، می‌توانند باعث شوند که هر دو نوع ژن (الل) مربوط به گروه خونی ABO، در یک اسپرماتوسیت ثانویه فرد دیده شوند. دگره‌های مربوط به گروه خونی Rh بر روی کروموزوم شماره ۱ و دگره‌های مربوط به گروه خونی ABO بر روی کروموزوم شماره ۹ قرار دارند. کراسینگ‌اور بین کروماتیدهای غیرخواهری فام‌تن‌های هم‌تا رخ می‌دهد در حالی که فام‌تن‌های ۱ و ۹، غیرهم‌تا هستند. در صورت انجام جهش جابه‌جایی (دگره‌های مربوط به گروه خونی ABO و یا Rh جابه‌جا شوند) بین کروموزوم‌های ۱ و ۹، امکان این که یکی از کروموزوم‌های ۱ یا ۹ حاوی دگره‌های مربوط به هر دو گروه خونی ABO و Rh شوند، وجود دارد. جهش مضاعف‌شدگی نیز، بین دو کروموزوم ۱ یا بین دو کروموزوم ۹ صورت می‌گیرد.

نکته: کراسینگ‌اور بین کروماتیدهای غیرخواهری فام‌تن‌های هم‌تا رخ می‌دهد؛ پس شرط انجام آن، این است که فام‌تن‌ها، مضاعف‌شده باشند و تتراد تشکیل داده باشند تا هم کروماتیدهای خواهری داشته باشند و هم غیرخواهری‌ها در کنار هم باشند؛ اما جهش مضاعف‌شدن بین فام‌تن‌های هم‌تا رخ می‌دهد؛ از یک فام‌تن می‌رود به فام‌تن هم‌تایش پس وجود فام‌تن هم‌تا ضروری است، اما به هر حال هر دو فرایند بین فام‌تن‌های هم‌تا رخ می‌دهد.

نکته: جابه‌جایی، نوعی ناهنجاری فام‌تنی از نوع ساختاری است که در آن قسمتی از یک فام‌تن به فام‌تن غیرهم‌تا یا حتی بخش دیگری از همان فام‌تن منتقل می‌شود.

جهش جابه‌جایی، می‌تواند به چند شکل انجام شود؛ قطعه‌ای از دنا:

- ۱) از یک کروماتید فام‌تن مضاعف جدا و به بخش دیگری از همان کروماتید متصل شود.
- ۲) از یک کروماتید فام‌تن مضاعف جدا و به کروماتید خواهری متصل شود.
- ۳) از یک فام‌تن جدا و به فام‌تن غیرهم‌تا متصل شود.
- ۴) از بخشی از یک فام‌تن تک‌کروماتیدی جدا و به بخش دیگری از همان فام‌تن متصل شود.

دقت کنید که اگر جهش جابه‌جایی درون یک فام‌تن مضاعف رخ بدهد، کروماتیدهای خواهری با یکدیگر متفاوت می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) همه این عوامل با جابه‌جایی قطعه یا قطعاتی از دنا همراه هستند که شکسته‌شدن این قطعات نیازمند امکان دسترسی آنزیم (ها) به دنا است، به همین دلیل ممکن است با تغییر میزان پروتئین‌های فشرده‌کننده دنا در بخش‌هایی از فام‌تن همراه باشد. از طرفی طی جابه‌جایی و مضاعف‌شدگی، قطعه‌ای از یک فام‌تن می‌رود به جای دیگر که در این شرایط، علاوه بر دنا، پروتئین‌ها هم جابه‌جا می‌شوند و مقدار آن‌ها در فام‌تن، می‌تواند تغییر کند.
- ۲) وقوع جهش‌ها و کراسینگ‌اور چون هر دو رشته دنا سازنده کروموزوم‌ها را درگیر می‌کند، بنابراین نمی‌تواند با تغییر در نسبت بازهای آلی پورینی به پیریمیدینی در دنا همراه باشد و این نسبت با وقوع این عوامل هم‌چنان ثابت خواهد ماند.
- ۴) در جهش مضاعف‌شدگی طول یکی از کروموزوم‌های هم‌تا کاهش و طول کروموزوم هم‌تای دیگر افزایش می‌یابد. در جهش‌های جابه‌جایی که قطعه‌ای از دنا بین دو فام‌تن غیرهم‌تا جابه‌جا می‌شود، طول یکی از کروموزوم‌ها کاهش و طول کروموزوم غیرهم‌تا افزایش می‌یابد.



جهد جابه جایی	جهد مضاعف شدگی	کراسینگ اور
می تواند بین دو فام تن غیر همتا صورت بگیرد.	فقط بین دو فام تن همتا صورت می گیرد.	فقط بین دو فام تن همتا صورت می گیرد.
قطعه جداشده از یک فام تن می تواند (۱) به همان فام تن متصل شود (به همان کروماتید یا به کروماتید خواهری در فام تن مضاعف) (۲) به فام تن غیر همتا متصل شود.	قطعه جداشده از یک فام تن قطعاً به یک فام تن دیگر متصل می شود.	قطعاتی از فام تن بین دو کروماتید غیر خواهری یک فام تن همتا مبادله می شود.
به دنبال آن طول فام تنی که قطعه از آن جدا می شود، می تواند ثابت باشد و یا کاهش یابد.	به دنبال آن طول فام تنی که قطعه از آن جدا می شود قطعاً کاهش می یابد.	طول فام تن ها، ثابت است.
در بدن یک مرد می تواند بین دو فام تن جنسی رخ دهد.	در زنان می تواند بین دو فام تن جنسی و فام تن های غیر جنسی می تواند رخ دهد. در مردان هم، فقط بین فام تن های همتا رخ می دهد.	در زنان بین دو فام تن جنسی و فام تن های غیر جنسی می تواند رخ دهد. در مردان هم، فقط بین فام تن های همتا رخ می دهد.
در انواع جانداران و یاخته ها می تواند انجام شود.	در یاخته یا جانداران هاپلوئید نمی تواند انجام شود.	در یاخته یا جانداران هاپلوئید نمی تواند انجام شود. (طی میوز رخ می دهد، پس فقط در جاندارانی با توانایی میوز رخ می دهد).

تست و پاسخ ۲۰

مطابق با مطلب کتاب درسی، همه عوامل بر هم زنده تعادل یک جمعیت که منجر به افزایش تنوع دگره (الل) های خزانه ژنی جمعیت می شوند، چه مشخصه مشترکی دارند؟

جهد + شارش ژنی

- همواره منجر به پیدایش حداقل یک دگره جدید در جمعیت می شوند.
- می توانند سبب حذف نوعی دگره از خزانه ژنی یک جمعیت شوند.
- با تغییر یک یا چند نوکلئوتید در ماده وراثتی همراه هستند.
- میزان وقوع آن ها در خزانه ژن جمعیت، وابسته به اندازه آن جمعیت می باشد.

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی: علاوه بر جهد، شارش ژن به درون جمعیت نیز ممکن است موجب حضور الل جدید در خزانه ژنی جمعیت شود و از این طریق تنوع در جمعیت افزایش می یابد. این عوامل بر هم زنده تعادل، می توانند سبب حذف نوعی دگره از جمعیت شوند. مثلن جهد حذفی (ساختاری) می تواند سبب حذف دگره (ها) از جمعیت شود؛ هم چنین شارش ژن یک طرفه می تواند سبب حذف دگره (هایی) در جمعیت مبدأ شود (اگر همه دگره های موجود که از یک نوع هستند، به جمعیت مقصد وارد شوند).

نکته: در یک جمعیت، جهد با تغییر ماده وراثتی می تواند باعث پیدایش الل جدید در جمعیت شود. هم چنین شارش ژنی هم با آوردن افراد جدید به جمعیت در افزایش تنوع اللی در جمعیت می تواند نقش داشته باشد. اما فرایندهایی مثل نوترکیبی و گوناگونی دگره ای در گامت ها، الل جدیدی ایجاد نمی کنند، بلکه طی آن ها، الل های موجود به شکل های متفاوتی به نسل بعد منتقل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

- جهد می تواند سبب پیدایش دگره های جدید شود. از طرفی شارش ژن، ممکن است به گونه ای رخ دهد که دگره جدیدی به جمعیت مقصد وارد نشود بلکه همان دگره های خود جمعیت مقصد به آن وارد شوند و فقط تعداد آن ها تغییر کند.
- در جهد برخلاف شارش ژنی، یک یا چند نوکلئوتید در ماده وراثتی دچار تغییر می شوند. جهد، ماده وراثتی افراد را تغییر می دهد اما شارش ژن، ماده وراثتی افراد را تغییر نمی دهد.
- حداقل می توان گفت، وقوع یا عدم وقوع جهد به اندازه جمعیت بستگی ندارد. جهد به صورت تصادفی می تواند رخ دهد.



عوامل مؤثر در از بین بردن تعادل در جمعیت	مکانیسم	تأثیر بر گوناگونی دگرهای
جهش	افزودن دگرهای جدید به خزانه ژنی جمعیت (ایجاد دگرهای جدید) یا حذف برخی دگرهای موجود	افزایش / کاهش
رانس دگرهای	حذف تصادفی بخشی از دگرهای موجود در جمعیت	می تواند کاهش دهد. (اگر مثلن یک نوع دگر خاص به طور کامل حذف شود).
شارش ژن	انتقال تعدادی از دگرهای جمعیت مبدأ به جمعیت مقصد و در نتیجه تغییر فراوانی دگرهای در هر دو جمعیت	کاهش (در جمعیت مبدأ) و افزایش (در جمعیت مقصد) در صورت دوسویه نبودن، در صورت دوسویه بودن در هر دو جمعیت می تواند افزایش دهد.
آمیزش غیرتصادفی	شانس بالاتر بعضی صفات و ویژگی ها برای انتقال به نسل بعد	—
انتخاب طبیعی	انتخاب افراد سازگارتر با محیط و کاهش فراوانی دیگر افراد	کاهش

تست و پاسخ ۲۱

با توجه به مطالب کتاب درسی، در یک خانواده، پدری سالم از نظر تمامی بیماری های ژنتیکی مطرح شده در کتاب درسی می باشد. چنانچه مادر خانواده باردار باشد و ژنوتیپ یاخته های ساختار ممانعت کننده از مخلوط شدن خون مادر و جنین در جفت، از نظر تمامی این بیماری ها، به صورت ناخالص باشد و فرزند قبلی این خانواده، پسری دارای مشکلاتی در زمینه فعالیت های مغزی و انعقاد خون بوده باشد که در سنین کودکی، به علت عوارض ناشی از کمبود اکسیژن بافتی، فوت کرده است، کدام مورد در ارتباط با مادر این خانواده صادق است؟

(۱) پدر این فرد، ممکن است اختلالاتی در تشکیل ساختارهای ممانعت کننده از خونریزی های شدید، داشته باشد.

(۲) ممکن نیست در دوران کودکی خود، محدودیت هایی در مصرف شیر مادر تجربه کرده باشد.

(۳) برای زندگی در مناطق مرتفع، از نظر کمبود اکسیژن رسانی به بافت ها فاقد مشکل است.

(۴) ممکن است فاقد هرگونه دگر بیماری را بر روی فام تن های جنسی خود باشد.

پاسخ: گزینه ۱

خودت حل کنی بهتره بیماری های ژنتیکی مطرح شده در کتاب درسی، شامل: بیماری هموفیلی، فنیل کتونوری و کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل است. با توجه به اطلاعات ذکر شده در صورت سؤال، ژنوتیپ پدر خانواده به صورت $X^H Y P p H b^A H b^S$ و ژنوتیپ فرزند قبلی خانواده که در اثر بیماری فوت کرده است، به صورت $X^h Y p p H b^S H b^S$ می باشد. از آنجایی که کوریون در جفت، مانع از مخلوط شدن خون مادر و جنین با یکدیگر می شود و این ساختار از بخش های جنینی منشأ می گیرد، ژنوتیپ آن معادل ژنوتیپ فرزند موجود در رحم مادر می باشد و به صورت $X^H X^h P p H b^A H b^S$ می باشد (چون در صورت سؤال گفته شده است که فرزند فعلی از نظر تمامی بیماری ها ناخالص است، می توان نتیجه گرفت که جنسیت آن دختر است). با توجه به این توضیحات، مادر حتم یک ال X^h ، Hb^S و p را دارد و می توان گفت ژنوتیپ های ممکن برای مادر به صورت $X^h X^h$ یا $X^H X^h$ برای بیماری هموفیلی، Pp یا pp برای بیماری فنیل کتونوری و $Hb^A Hb^S$ برای بیماری کم خونی داسی شکل می باشد.

پاسخ تشریحی از آنجایی که مادر به طور حتم حداقل یک دگر X^h دارد، ممکن است این دگر را از پدر یا مادر خود به ارث برده باشد و اگر از پدر به ارث رسیده باشد، می توان به این نتیجه رسید که پدر این فرد مشکلاتی در زمینه تشکیل لخته دارد. بررسی سایر گزینه ها:

(۲) یکی از ژنوتیپ های ممکن برای این فرد در زمینه بیماری فنیل کتونوری به صورت pp می باشد که این موضوع باعث می شود که این فرد مبتلا به بیماری باشد و در نتیجه محدودیت هایی در مصرف شیر مادر که حاوی اسید آمینه فنیل آلانین می باشد را در دوران کودکی تجربه کرده است.



۳) از آن جایی که ژنوتیپ آن برای بیماری کم خونی داسی شکل به صورت $Hb^A Hb^S$ می باشد، به دنبال قرارگیری در مناطق مرتفع و کم اکسیژن، دچار اختلال در خون رسانی به بافت ها می شود.

۴) همان طور که ذکر شد، این فرد به طور حتم یک دگره بیماری هموفیلی را دارد و بنابراین ممکن نیست که فاقد هرگونه دگره بیماری را بر روی فام تن های جنسی خود باشد.

تست و پاسخ ۲۲

به طور کلی سازوکارهایی را که باعث ایجاد گونه های جدید می شوند، به دو گروه تقسیم می کنند و این دو سازوکار، در شکل زیر نشان داده شده اند. در خصوص این سازوکارها، کدام مورد نادرست است؟

۱) گونه زایی هم میهنی و ۲) گونه زایی دگر میهنی



۱) در سازوکار (۲) برخلاف سازوکار (۱)، وقوع کراسینگ اور با تشکیل الل های جدید، تفاوت بین جمعیت ها را افزایش می دهد.

۲) در سازوکار (۱) همانند سازوکار (۲)، انتخاب طبیعی، فراوانی دگره ها در خزانه ژنی دو جمعیت را دستخوش تغییر می کند.

۳) در سازوکار (۲)، در جاندارانی که تعریف ارنست مایر برای آن ها کاربرد دارد، نوترکیبی می تواند باعث ایجاد تفاوت بین افراد شود.

۴) تغییرات ماندگار در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی، در متمایز کردن افراد از هم در سازوکار (۲) همانند سازوکار (۱) نقش دارد.

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی: شکل نشان دهنده «انواع گونه زایی» است و بخش (۱)، مربوط به گونه زایی هم میهنی و بخش (۲)، گونه زایی دگر میهنی را نشان می دهد. کراسینگ اور هم در گونه زایی هم میهنی و هم دگر میهنی می تواند رخ دهد و سبب افزایش تفاوت های فردی شود، اما دقت کنید که وقوع کراسینگ اور باعث تشکیل الل های جدید در جمعیت نمی شود، بلکه همان الل های موجود را به شکل متفاوتی در کنار سایر الل ها قرار می دهد.

درس نامه

گونه زایی هم میهنی	گونه زایی دگر میهنی	
x	✓	توقف شارش ژنی بین دو گروه جدا شده از هم، در ابتدای آن ضروری است
✓	✓	با ایجاد جدایی تولیدمثلی همراه است
✓	x	جدایی تولیدمثلی و گونه زایی در یک نسل رخ می دهد
x	✓	بر اثر تغییرات تدریجی در نسل های متعدد، گونه جدید ایجاد می شود
x	✓	ابتدا ارتباط فیزیکی بین دو بخش از جمعیت قطع می شود (جدایی جغرافیایی)
✓	x	در جمعیت های ساکن یک زیستگاه صورت می گیرد
✓	x	هنگام پیدایش گیاهان چندلادی رخ می دهد
✓	✓	در آن افراد گونه جدید قادر به آمیزش موفقیت آمیز با گونه نیایی خود نیستند



بررسی سایر گزینه‌ها:

۲ عوامل تغییردهنده خزانه ژنی جمعیت (مانند انتخاب طبیعی، جهش و ...) در هر دو نوع گونه‌زایی مؤثرند و رخ می‌دهند. انتخاب طبیعی می‌تواند فراوانی دگرها را در خزانه ژنی جمعیت تغییر دهد، با حذف افراد ناسازگار از جمعیت و در نتیجه حذف الل‌های مربوط به آن‌ها.

۳ تعریفی که ارنست مایر برای گونه ارائه کرده است، برای جاندارانی کاربرد دارد که تولیدمثل جنسی دارند. طی تولیدمثل جنسی هم امکان وقوع میوز وجود دارد پس نوترکیبی نیز در جانداران دارای تولیدمثل جنسی (تشکیل گامت‌ها به واسطه تقسیم میوز) مشاهده می‌شود و در ایجاد تفاوت بین افراد، مؤثر است.

۴ تغییرات ماندگار در ماده وراثتی یعنی جهش. جهش در هر دو نوع گونه‌زایی می‌تواند رخ دهد و سبب تفاوت بین افراد شود. به عبارتی جهش، یکی از عواملی است که در تشکیل گونه جدید اثر مهمی دارد.

تست و پاسخ ۲۳

با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره‌های بارز، رنگ قرمز و دگره‌های نهفته، رنگ سفید را به وجود می‌آورند و رخ نمود (فنوتیپ)‌های دو آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ)‌های AABbCc و aabbcc را دارند، بنابراین فراوانی همه ذرت‌های حاصل از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)‌های و aaBBCC در نمودار توزیع فراوانی رخ نمودها، به طور حتم بیشتر از فراوانی ذرت‌های حاصل از آمیزش دو ذرت با ژن نمود aabbcc و AABbCc خواهد بود.

AaBbCc (۲)

Aabbcc (۱)

aaBbCc (۴)

AaBbCc (۳)

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی طبق گفته سؤال، اگر AABbCc و aabbcc با هم آمیزش یابند، همه زاده‌های حاصل AaBbCc می‌شوند که دارای ۲ دگره بارز هستند، پس ما باید دنبال آمیزشی باشیم که همه زاده‌های حاصل دارای ۳ دگره بارز باشند که فراوانی آن‌ها بیشتر باشد. از آمیزش aaBBCC و Aabbcc همه زاده‌ها دارای ژنوتیپ AaBbCc می‌شوند که دارای ۳ دگره بارز هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲ از آمیزش aaBBCC و AaBbCc زاده‌هایی با تعداد دگره‌های بارز متفاوت ایجاد می‌شوند، مثلاً ذرتی با ژنوتیپ aaBbCc ممکن است ایجاد شود که دارای دو دگره بارز است و فراوانی بیشتری ندارد.

۳ از آمیزش aaBBCC و AaBbCc زاده‌هایی با ژنوتیپ aaBbCc ممکن است ایجاد شود که دارای ۲ دگره بارز است و فراوانی بیشتری ندارد.

۴ از آمیزش aaBBCC و AaBbCc زاده‌هایی با ژنوتیپ aaBbCc ممکن است ایجاد شود که دارای دو دگره بارز است و فراوانی بیشتری ندارد.

تعداد دگره بارز در ژنوتیپ	۱	۲	۳	۴	۵	۶
ژنوتیپ‌ها	aabbcc Aabbcc aaBbCc aabbCc	Aabbcc aaBBcc aabbCC AaBbCc AabbCc aaBbCc	AABbCc AaBbCc aaBBcc aaBbCC AaBbCc AaBBcc AabbCC	AABbCc aaBBCC AaBbCC AaBbCc AaBbCC AaBbCC	AABbCc AaBBCC AABbCc	AABbCc
فراوانی	۱	۶	۷	۶	۳	۱
تعداد جایگاه در ژنوتیپ	۳	یک یا هر ۳ جایگاه	صفر، یک یا دو	یک یا هر ۳ جایگاه	۲	۳
ناخالص	صفر	۱	۱ یا ۲ و ۳	صفر یا ۲	۱	صفر



تست و پاسخ ۲۴

صفت طاسی صفتی مستقل از جنس است که در مردان به شکل بارز و در زنان به صورت نهفته بروز می‌کند. در یک خانواده چهارنفری، فرزند دختری وجود دارد که از نظر ژنتیکی مستعد از دست دادن مو می‌باشد ولی از نظر فاکتورهای انعقادی مشکلی ندارد. این دختر همچنین به دلیل نوعی بیماری ارثی، از رژیم غذایی فاقد آمینواسید فنیل آلانین استفاده می‌کند. به دنبال ازدواج این دختر با مردی واجد نوعی بیماری وابسته به جنس مربوط به کمبود ارثی فاکتور انعقادی شماره هشت در پلاسمای خود و دارای مشکلات مربوط به ریزش مو، همچنین فاقد هرگونه محدودیت در مصرف آمینواسیدهای مختلف، پسری با اختلال مشابه مادر خود از نظر مصرف آمینواسیدهای مختلف و بدون مشکل از نظر سلامت مو و همچنین دارای مشکل در انعقاد خون، متولد شده است. کدام گزینه، در ارتباط با این خانواده به درستی بیان شده است؟

- (۱) این خانواده ممکن است صاحب دختری فاقد دگرهٔ بیماری‌زا بر روی فام‌تن‌های جنسی خود شود.
- (۲) مادر بزرگ مادری این پسر، ممکن نیست مشکلی از نظر کمبود فاکتور انعقادی شماره هشت داشته باشد.
- (۳) پدر بزرگ مادری این پسر، ممکن نیست دارای هر دو دگرهٔ غالب صفت طاسی در یاخته‌های خود باشد.
- (۴) دایی این پسر نمی‌تواند در آینده صاحب فرزندی واجد محدودیت در مصرف آمینواسید فنیل آلانین شود.

پاسخ: گزینه ۳

پاسخ تشریحی: با توجه به اطلاعات ذکر شده در صورت سؤال، ژنوتیپ مادر به صورت bb (برای صفت طاسی)، $X^H X^h$ (برای بیماری هموفیلی) و PP (برای بیماری فنیل کتونوری) می‌باشد. ژنوتیپ مرد مطرح شده نیز به صورت Bb (برای صفت طاسی)، $X^h Y$ (برای بیماری هموفیلی) و Pp (برای بیماری فنیل کتونوری) می‌باشد و همچنین ژنوتیپ پسر حاصل از ازدواج این دو فرد نیز به صورت bb (برای صفت طاسی)، $X^h Y$ (برای بیماری هموفیلی) و pp (برای بیماری فنیل کتونوری) می‌باشد. از آنجایی که مادر، دارای ژنوتیپ bb برای صفت طاسی می‌باشد، به طور حتم یکی از این دگره‌های b را از پدر خود دریافت کرده است، به همین علت پدر بزرگ مادری این پسر (در واقع پدر دختر خانوادهٔ ۴ نفری)، نمی‌تواند فقط دارای دگره‌های غالب صفت طاسی باشد.

نکته: در بیماری طاسی مطرح شده در سؤال، حضور یک ال بارز برای این که مردی طاس شود کافی است، اما زنان برای آن که به این بیماری مبتلا شوند باید دو دگرهٔ نهفته داشته باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) از بین صفات مطرح شده در صورت سؤال، تنها بیماری هموفیلی، نوعی صفت وابسته به جنس می‌باشد و چون مرد مطرح شده در صورت سؤال مبتلا به بیماری هموفیلی می‌باشد و حاوی دگرهٔ بیماری‌زا بر روی فام‌تن جنسی خود می‌باشد، تمامی دخترهای حاصل از این ازدواج دگرهٔ بیماری‌زا را بر روی حداقل یکی از فام‌تن‌های جنسی خود دارند.
- (۲) در ژنوتیپ مادر، یک دگرهٔ بیماری‌زا برای بیماری هموفیلی وجود دارد، این دگره ممکن است از مادر و یا پدر فرد به ارث رسیده باشد، بنابراین ممکن است که مادر این دختر (در واقع مادر بزرگ مادری پسر مطرح شده در سؤال)، مبتلا به بیماری هموفیلی باشد.
- (۴) از آنجایی که دختر خانوادهٔ ۴ نفری، مبتلا به بیماری فنیل کتونوری می‌باشد، می‌توان گفت پدر و مادر این فرد، هر کدام حداقل یک دگرهٔ p را دارند که در این حالت ممکن است برادر این دختر نیز مبتلا به بیماری فنیل کتونوری باشد و اگر با زنی ناخالص از این نظر ازدواج کند، می‌تواند فرزندی مبتلا به فنیل کتونوری داشته باشند.

کره‌های خاکی

تست و پاسخ ۲۵

اگر صفت وجود لکه‌های تیره و روشن بر روی بدن جاندارانی نرماده که از مویرگ‌های زیر پوستی جهت تبادل گازهای تنفسی استفاده می‌کنند، نوعی صفت مستقل از جنس باشد که توسط دو دگرهٔ B و W کنترل می‌شود، به نحوی که دگرهٔ B رنگ تیره و دگرهٔ W رنگ روشن را تعیین کند و بین آن‌ها، رابطهٔ بارزیت ناقص برقرار باشد. همچنین اگر وجود زوائد دایره‌ای بر روی پوست آن‌ها نیز، به صورت نهفته و تحت کنترل دو دگرهٔ R و r باشد، تولد کدام مورد، محتمل است؟

- (۱) زاده‌ای با لکه‌های تیره و بدون زائده از خودلقاحی والدی واجد رخ‌نمودی مشابه با زاده
- (۲) زاده‌ای واجد زوائد و لکه‌های خاکستری از والدینی با لکه‌های تیره و بدون زوائد
- (۳) هر زاده واجد لکه‌های خاکستری و بدون زائده از والدی با لکه‌های روشن و دارای زوائد
- (۴) زاده‌ای با لکه‌های روشن و واجد زوائد دایره‌ای از والدینی دارای لکه‌های خاکستری و بدون زوائد

پاسخ: گزینه ۴



خودت حل کنی بهتره جاندار نرماده (هرمافرودیتی) که از مویرگ‌های زیرپوستی جهت تبادل گازهای تنفسی استفاده می‌کند، کرم خاکی می‌باشد. نحوه تولیدمثل در این جانداران به این صورت است که هر دو جاندار از طول در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اسپرم‌های هر کدام، تخمک‌های دیگری را بارور می‌سازد که به این فرایند لقاح دوطرفی گفته می‌شود.

ترکیب گروهی از جانداران هرمافرودیت هستند که این‌ها هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را درون خود دارند؛ هرمافرودیتی می‌تواند به دو صورت دیده شود:

- (۱) هر فرد خودش گامت‌های خودش را بارور می‌کند.
- (۲) هر فرد گامت‌های دیگری را بارور می‌کند، اما هر دو نوع گامت را می‌تواند بسازد مثل همان چیزی که در کرم خاکی رخ می‌دهد.

پاسخ تشریحی ژنوتیپ زاده‌ای با لکه‌های روشن و واجد زوائد به صورت $WWrr$ می‌باشد و والدینی با لکه‌های خاکستری و بدون زوائد نیز ژنوتیپ $BWRR$ و یا $BWrr$ دارند. چنانچه دو کرم با ژنوتیپ $BWrr$ با یکدیگر لقاح دوطرفی انجام دهند، می‌توانند زاده‌ای با ژنوتیپ مورد نظر تولید کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

① ژنوتیپ زاده‌ای با لکه‌های تیره و بدون زائده به صورت $BBRR$ و یا $BBrr$ می‌باشد. دقت کنید که در کرم‌های خاکی، یک والد نمی‌تواند به تنهایی و با بارورسازی تخمک‌های خود توسط اسپرم‌های خودی، زاده‌ای تولید کند (کرم خاکی خودلقاحی ندارد).

② ژنوتیپ زاده‌ای با لکه‌های خاکستری و واجد زوائد به صورت $BWrr$ می‌باشد. چنانچه والدین این زاده دارای ژن‌نمود $BBrr$ باشند، از آنجایی که هیچ‌کدام از والدین دارای دگره W نمی‌باشند، نمی‌توانند چنین زاده‌ای تولید کنند.

③ ژنوتیپ زاده‌ای با لکه‌های خاکستری و بدون زائده به صورت $BWRR$ و یا $BWrr$ می‌باشد، نمی‌توان از یک والد با ژنوتیپ $WWrr$ (دارای لکه‌های روشن زائده‌دار) انتظار تولد زاده‌ای با ژنوتیپ $BWRR$ را داشت، چراکه برای تولد این زاده، هر والد باید حداقل یک R داشته باشد.

درس‌نامه ..

① ژنتیک در کرم کبد $\leftarrow$ جانوری هرمافرودیت است که خودلقاحی دارد؛ یعنی اسپرم‌های خودش باعث بارورشدن تخمک‌های خودش می‌شود. دقت کنید که اگر یک کرم کبد در ژنوتیپ خود اللی را نداشته باشد، زاده‌های آن کرم نیز فاقد آن ال خواهند بود، مثلاً اگر ژنوتیپ کرم کبدی به صورت $AaBB$ باشد، هیچ‌یک از زاده‌هایش در ژنوتیپ خود، ال b را نخواهند داشت.

② ژنتیک در کرم خاکی $\leftarrow$ جانوری هرمافرودیت است و دگرلقاحی دارد؛ یعنی اگر کرم‌خاکی بخواهد بچه‌دار بشه باید یک کرم‌خاکی دیگه رو پیدا کنه که با هم لقاح بدن. در این حالت اسپرم‌های یکی، تخمک‌های اون یکی رو بارور می‌کنه و برعکس! یعنی هر دوتا کرم‌خاکی بچه‌دار می‌شن.

دقت کنید که در داستان کرم‌خاکی، ژنوتیپ دو والد می‌تواند یکسان و یا متفاوت باشد. حتی دقت کنید که از آمیزش دو کرم خاکی ممکن است زاده‌ای با ژنوتیپ متفاوت از والدین ایجاد شود. مثلاً دو کرم خاکی با ژنوتیپ‌های Aa و Aa می‌توانند زاده‌ای با ژنوتیپ aa یا AA داشته باشند.