

آزمون شماره ۱۴

جمعه ۱۰/۱۰/۱۴۰۲



آزمون‌های سراسری کاح

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

سوالات آزمون دفترچه شماره (۱)

پایه دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه	تعداد سوال: ۴۰

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره سوال		مدت پاسخگویی
			تا	از	
۱	زیست‌شناسی	۴۰	۱	۴۰	۴۰ دقیقه

زیست‌شناسی



- ۱- در یک یاخته غده تیروئید انسانی سالم، آمینواسیدها به کمک آنزیمی ویژه به نوعی نوکلئیک اسید تکرشته‌ای متصل می‌شوند. چند مورد در رابطه با این آنزیم به درستی بیان شده است؟
- (الف) همانند آنزیم‌های بازکننده پیچ و تاب دنا، نقش بسیار مهمی در فرایندهای یاخته‌ای دارد.
- (ب) برخلاف مهم ترین آنزیم مؤثر در همانندسازی، حداکثر دارای دو جایگاه فعال در ساختار خود می‌باشد.
- (ج) برخلاف پروتئین‌های به کار رفته در ساختار نوکلئوزوم، پس از تولید، درون ریزکیسه قرار می‌گیرد.
- (د) همانند سایر پروتئین‌های تولیدشده در یاخته، الگویی از جنس ماده و راثتی دارد.
- ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)
- ۲- چند مورد ویژگی مشترک جاندارانی است که می‌توان از آن‌ها، آنزیم‌های دلمه‌کننده کازئین (پروتئین شیر) را به دست آورد؟
- (الف) گروهی از رناتن‌ها می‌توانند پیش از بایان رونویسی، با اتصال به بخشی از رنای بیک، فرایند توجه را آغاز کنند.
- (ب) پروتئین‌هایی که در فضای بین غشای یاخته و هسته آن‌ها ساخته می‌شوند، به واسطه گروهی از توالی‌های آمینواسیدی خود، به سمت مقصد هدایت می‌شوند.
- (ج) متنوع ترین گروه مولکول‌های زیستی می‌توانند به صورت همزمان و پشت سر هم، توسط مجموعه‌ای از رناتن (ربیوزوم)‌ها، سنتز شوند.
- (د) برای تولید مستقیم گروهی از مولکول‌های مرتبط با ژن، فقط یک نوع آنزیم دارای فعالیت بسپارازی، دخالت می‌کند.
- ۱ (۱) صفر ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)
- ۳- با توجه به مطلب کتاب زیست‌شناسی (۳) و در خصوص یوکاریوت‌ها، کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) میزان به کارگیری نوکلئوتیدهای آزاد سه‌سفاتۀ ریبوزدار توسط رنابسپاراز، نوعی تنظیم بیان ژن حین رونویسی می‌باشد.
- (۲) تغییر فشردگی واحدهای کروی‌شکل و تکراری کروماتین، نوعی تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی می‌باشد.
- (۳) تجزیه شدن مولکول میانجی دنا و رناتن پس از مدتی، نوعی تنظیم بیان ژن پس از رونویسی می‌باشد.
- (۴) میزان تمایل پیوستن عوامل رونویسی به توالی ژنی، نوعی تنظیم بیان ژن حین رونویسی می‌باشد.
- با توجه به اطلاعات کتاب زیست‌شناسی (۳) و در خصوص مقایسه ژن‌های زنجیرۀ بتای هموگلوبین در افراد سالم و بیماران کم‌خونی داسی‌شکل، کدام مورد درست است؟
- (۱) در صورتی که رمزه ششمین آمینواسید در رنای بیک هموگلوبین، GUA باشد، آمینواسید Glu به زنجیره پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.
- (۲) در صورتی که پادرمزه ششمین آمینواسید در رنای ناقل هموگلوبین، CUL باشد، آمینواسید Val به زنجیره پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.
- (۳) در صورتی که رمز ششمین آمینواسید در رشتۀ الگوی دنای هموگلوبین، CAT باشد، آمینواسید Val به زنجیره پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.
- (۴) در صورتی که رمز ششمین آمینواسید در رشتۀ رمزگذار دنای هموگلوبین، GTA باشد، آمینواسید Glu به زنجیره پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.
- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
- «پس از آن که مالتوز به محیط کشته فاقد گلوكز اشرشیاکلای افزوده می‌شود، اتصال دی‌ساکارید به سبب می‌گردد.»
- (۱) پروتئین متصل شده به توالی‌ای که بلافاصله قبل از نوعی ژن قرار دارد - آغاز رونویسی از آن ژن
- (۲) سطحی از پروتئین فعلکننده که فاصله بیشتری تا راهانداز دارد - تولید یک mRNA و سه نوع رشتۀ پلی‌پپتیدی
- (۳) پروتئینی که ابعاد بزرگ‌تری نسبت به رنابسپاراز دارد - اتصال راهانداز به پلیمر پروتئینی و آغاز حرکت آن بر روی دنا
- (۴) توالی نوکلئوتیدی که ابعاد یکسانی با راهانداز دارد - تشکیل زنجیره‌ای کوتاه از ریبونوکلئوتیدها در مقابل یکی از رشتۀ‌های دنا
- در گیاه لوبيا، ژن نمود (ژنوتیپ) ساقۀ رویانی دانه، AB است. کدام مورد به ترتیب از راست به چپ، در ارتباط با ژن نمود آندوسپرم این دانه و یاخته سازنده گرده نارس و یاخته خورشی که در تشکیل این دانه شرکت داشته، غیرمحتمل است؟
- BB - AA - AAB (۴) AB - BB - AAB (۳) BB - AB - ABB (۲) AB - AB - ABB (۱)

-۷

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می‌کند؟

«به طور معمول در ارتباط با بیماری هموفیلی، در صورتی که در یک خانواده متشکل از مادر سالم، دختران ممکن، و امکان تولد پسر وجود نداشته باشد، به طور قطع پدر خانواده است.»

۱) نیمی از - فاقد ال سالم باشد - سالم - بیمار ۲) همه - بتوانند دخترانی بیمار داشته باشند - بیمار - سالم

۳) نیمی از - فاقد ال بیماری هموفیلی باشند - سالم - سالم ۴) همه - بتوانند پسرانی سالم یا بیمار داشته باشند - بیمار - بیمار

با توجه به اطلاعات کتاب زیست‌شناسی (۳)، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در افرادی از یک جمعیت انسانی طبیعی که در هیچ حالتی نمی‌توانند ناقل صفت هموفیلی باشند، در ارتباط با صفات تک‌جایگاهی، هر تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای ماده و راثتی که همواره»


۱) فقط در بعضی از کروموزوم‌های یاخته‌های اسپرماتوگونی قادر به رخ دادن است - در زبورهای عسل حاصل از لقاح می‌تواند سبب متفاوت شدن مقدار ماده و راثتی در گامت‌ها شود.

۲) در بین کروموزوم‌های با سانتوروم قرارگرفته در محلی یکسان رخ می‌دهد - سبب می‌شود تا در یکی از آن دو کروموزوم، از یک ژن، دو نسخه دیده شود.

۳) با شکسته شدن یک یا چند پیوند فسفو دی‌استر همراه است - در صورت مشاهده کروموزوم‌ها در مرحله متافاز میتوز قابل ردیابی است.

۴) می‌تواند سبب با هم به اثر رسیدن ال‌های صفت گروه خونی Rh شود - به وجود آنژم‌های با فعالیت نوکلئازی و پلیمرازی وابسته است.

در ارتباط با بخش‌های مشخص شده در شکل زیر که نوعی فرایند را در یاخته یوکاریوٹی به نمایش می‌گذارد، کدام گزینه با قاطعیت صحیح است؟



-۹

۱) بخش (۱) برخلاف بخش (۲)، میان واحدهای سازنده خود، رابطه مکملی برقرار می‌کند.

۲) بخش (۲) برخلاف بخش (۱)، از طریق منافذ هسته، به سیتوپلاسم یاخته وارد می‌شود.

۳) بخش (۲) همانند بخش (۱)، از مونومرهای واجد قند اکسیژن دار تشکیل شده است.

۴) بخش (۱) همانند بخش (۲)، دارای همه انواع بازهای آلی در ساختار خود می‌باشد.

-۱۰

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«به هنگام رونویسی از ژن زنجیره نخستین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، فقط در مرحله این فرایند رخ می‌دهد.»

الف) اتصال واحدهای سازنده رشتۀ رنا با پیوند فسفو دی‌استر به یکدیگر - دوم

ب) تشکیل مجدد پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا در محل راهانداز ژن - دوم

ج) جدا شدن زنجیره رنا در حال ساخت از دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای مکمل آن - سوم

د) اتصال تمامی ریبونوکلئوتیدهای رنا پیک در حال ساخت به نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی مولکول دنا - اول

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

-۱۱

مطابق با کتاب زیست‌شناسی (۳)، در بین عوامل تغییردهنده گونه نوعی نیرو به صورت غیرتصادفی می‌تواند منجر به افزایش فراوانی دگرۀ سازگارکننده در جمعیت شود. ویژگی مشترک این نیرو و نیرویی که به صورت تصادفی دگرۀ جدید ایجاد می‌کند، کدام گزینه زیر است؟

۱) فقط به دنبال خطای میوزی یا میتوزی به جدایی تولید می‌کنند.

۲) فقط تحت تأثیر محیط و شرایط آن باعث تغییرات فتوتیپی یا ژنتیکی می‌شوند.

۳) به دنبال ایجاد دگرۀ جدید، بر سازگاری جمعیت با محیط مورد نظر آن می‌افزایند.

۴) به دنبال تأثیر بر جمعیت یا فرد، باعث تغییر فراوانی نسبی دگرهای ژنتیکی در جمعیت می‌شوند.

در جمعیت موش صحرابی، صفت تک‌زنی مستقل از جنس رنگ بدن با سه ال کنترل می‌شود، با توجه به این‌که ال سیاهی رنگ بدن بر

اللهای خاکستری و سفیدی بارزیت داشته و در بی آمیزش موش با رنگ بدن خاکستری با موشی سفید، موشی با رنگ بدن متفاوت با هر دو ظاهر می‌شود، درباره این صفت کدام گزینه، عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«به طور معمول، از آمیزش موشی با رخ نمود، ممکن نیست»

۱) خاکستری با موشی با رخ نمود سفید - زادهای با ژن نمود خالص ظاهر شود.

۲) خاکستری با موشی با ژن نمود خالص - زادهای با رخ نمود سفید ظاهر شود.

۳) سفید با موشی با ژن نمود ناخالص - نیمی از زاده‌ها دارای رخ نمود سیاه باشند.

۴) سیاه با موشی با رخ نمود حد واسط - نیمی از زاده‌ها دارای رخ نمود سفید باشند.

- ۱۳- در صورت وقوع لقاح در کرم کبد واحد زن نمود $AaBbCc$ ، تولید کدام یاخته تنمها در صورت وقوع کراسینگ اور برای تولید هر دو نوع گامات شرکت‌کننده در لقاح ممکن است؟ (دگرهای C و B بر روی یک کروموزوم حضور دارند).

$$Aa \frac{Bc}{Bc} (4)$$

$$aa \frac{BC}{Bc} (3)$$

$$AA \frac{bc}{bc} (2)$$

$$Aa \frac{bc}{BC} (1)$$

- ۱۴- چند مورد در بی اتصال لاکتوز به پروتئین قرار گرفته بر روی اپراتور، می‌تواند رخ بدهد؟

(الف) تولید آنزیم‌هایی واحد جایگاه فعال برای اتصال قند لاکتور

(ب) اتصال آنزیم‌های رنابسپاراز متعدد به توالی نوکلئوتیدی ویژه قبل از اپراتور

(ج) کاهش مقدار نوکلئوتیدهای یوراسیل دار آزاد درون یاخته

(د) حرکت آنزیم رنابسپاراز از راه انداز به سمت اپراتور

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۱۵- با توجه به این‌که صفت رنگ در نوعی ذرت صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره (الل) دارد. برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک A، B و C استفاده می‌کنیم. نظر به این‌که صفات چند جایگاهی رخ‌نمود (فنتویپ‌های) پیوسته‌ای دارند و نمودار توزیع فراوانی این رخ‌نمود (فنتویپ)‌ها شبیه به زنگوله است، کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«هر ذرتی که در ژن نمود آن، است، به طور حتم توانایی ایجاد نوع گامت را دارد.»

(۱) تعداد جایگاه‌های ناخالص بیشتر از جایگاه‌های خالص - ۲

(۲) تنها دارای یک دگره ایجاد‌کننده رنگ قرمز - ۴

(۳) دارای سه جایگاه ژنی خالص - ۳

(۴) دو نوع دگره نهفته قابل مشاهده - ۲

- ۱۶- کدام مورد موقعیت صحیح پیوند ایجاد‌کننده جمهش دوپار تیمین بر اثر پرتوهای فرابنفس خورشید را نشان می‌دهد؟

(۱) دو رأس مقابل یکدیگر از حلقة شش‌ضلعی آلی موجود در ساختار پک نوکلئوتید تیمین دار با نوکلئوتید مجاور

(۲) بین حلقة‌های آلی دارای بیشترین تعداد ضلع در دو نوکلئوتید تیمین دار روبروی هم در دنا

(۳) بین دو رأس حلقة پنج‌ضلعی دارای بازهای آلی نیتروژن دار دو نوکلئوتید تیمین دار

(۴) بین رأس‌های مجاور یکدیگر از حلقة‌های آلی دارای چهار نوع عنصر در ساختار خود

چند مورد در ارتباط با عوامل جهش‌زا، صحیح می‌باشد؟

(الف) دوپار تیمین، موجب اختلال در عملکرد آنزیمی می‌شود که عملکردی اختصاصی داشته و تنها یک واکنش را سرعت می‌بخشد.

(ب) از عوامل جهش‌زا فیزیکی، می‌توان به نوعی پرتو اشاره نمود که توسط نوعی جانور با توانایی بکرایی، قابل تشخیص است.

(ج) ترکیباتی مانند سوسیس و کالباس، در صورت ورود به بدن، می‌توانند مستقیماً موجب سرطان‌زایی و اختلال در نقاط وارسی چرخه یاخته‌ای شوند.

(د) در نوعی دود که استعمال آن باعث افزایش جایه‌جایی زبان کوچک به سمت بالا می‌شود، نوعی ماده شیمیایی جهش‌زا یافت می‌گردد.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

- ۱۷- در خصوص مولکول‌های مرتبط با واحدهای سازماندهی اطلاعات در دنا، کدام مورد درست است؟

(۱) مولکولی که با مولکول رنای پیک رابطه مکملی برقرار می‌کند، به طور حتم حاوی نوکلئوتیدهای ریبوزدار است.

(۲) مولکولی که ساختار آن با کمک پرتو ایکس قابل شناسایی است، به طور حتم در ساختارهای کروی‌شکل و تکرارشونده کروماتین قرار دارد.

(۳) مولکولی که سرعت مناسب واکنش (ها) را فراهم می‌کند، به طور حتم از اتصال واحدهای تکرارشونده در یک زنجیره بدون شاخه تشکیل می‌شود.

(۴) مولکولی که در ساختار خود حاوی عنصر فسفر است، به طور حتم جزء متنوع ترین مولکول‌های زیستی از نظر ساختار و عملکرد محسوب می‌شود.

- ۱۹- فرض می‌کنیم در قطعه‌ای از مولکول‌های دنای (mRNA) یک یاخته جانوری فعال، دو ژن سازنده رنای پیک (mRNA)، با فاصله‌ای در پشت سر هم قرار دارند. در صورتی که رشتة رمزگذار این دو ژن متفاوت باشد، کدام مورد نادرست است؟

(۱) به طور حتم، راه‌انداز این دو ژن در نزدیکی هم می‌باشد.

(۲) ممکن است در بین این دو ژن، توالی راه‌انداز وجود نداشته باشد.

(۳) به طور حتم، جهت حرکت رنابسپارازهای این دو ژن در خلاف هم می‌باشد.

(۴) ممکن است برخی توالی‌های سه‌تایی این دو ژن، آمینواسیدی را رمز نکنند.

- ۲۰ در مطالعه دو بیماری هموفیلی و کم خونی داسی شکل، با فرض این‌که مادر خالص و فقط یکی از والدین بیمار باشد، در شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همهٔ حالات ممکن است؟
- (۱) دختر بیمار (۲) دختر سالم و ناخالص (۳) پسر بیمار (۴) پسر سالم و خالص
- ۲۱ طی آزمایشات گریفیت، در مرحله‌ای که به بدن موش‌ها تزریق شده بود،
- (۱) تنها باکتری‌های پوشینه‌دار کشته‌شده با گرمای نتایجی برخلاف انتظار وی به وقوع پیوست.
 - (۲) باکتری‌های پوشینه‌دار زنده - نتیجه گرفته شد پوشینه به تنها یکی عامل مرگ موش‌ها نیست.
 - (۳) تنها باکتری‌های فاقد پوشینه زنده - تغییراتی در شکل ظاهری گروهی از باکتری‌ها صورت گرفت.
 - (۴) دو نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا - مشخص شد مادهٔ وراشی می‌تواند بین یاخته‌ها منتقل شود.
- ۲۲ کدام گزینه، عبارت زیر را به صورت مناسب تکمیل می‌کند؟
- «در طرح همانندسازی که در دقیقه ۴۰ آزمایشات مزلسون و استلال رد شد، طرح همانندسازی نیمه حفاظتی،»
- (۱) همانند - میان دئوکسی ریبیونوکلئوتیدهای جدید و قدیمی، رابطهٔ مکملی برقرار می‌گردد.
 - (۲) برخلاف - فرایند ویرایش توسط دنابسپاراز در هر دو مولکول دنای حاصل قابل انجام است.
 - (۳) همانند - نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی با پیوند فسفو دی‌استری به یکدیگر متصل می‌شوند.
 - (۴) برخلاف - دو رشتهٔ دنای اولیه به صورت دست‌نخورده به یکی از یاخته‌های نسل بعد وارد می‌شوند.
- ۲۳ در ارتباط با فردی که درون هستهٔ لنفوسيت‌های T خود، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟
- (۱) عامل بیماری مalarیا، پس از ورود به فراوان ترین یاخته‌های خونی این فرد، کنترل فعالیت‌های حیاتی خود را از دست می‌دهد.
 - (۲) در صورت کاهش سطح اکسیژن محیط، مدت زمان مرحله G چرخهٔ یاخته‌ای در یاخته‌های بنیادی میلوبیتیدی مغز استخوان کاهش می‌یابد.
 - (۳) نیمی از زنجیره‌های پلی‌پتیدی هموگلوبین در ساختار اول خود، گلوتامیک اسیدهای بیشتری در مقایسه با فرد دارای ژنوتیپ Hb^AHb^S دارند.
 - (۴) در رنای پیک ساخته‌شده از روی رشتهٔ الگوی ژن برخی از زنجیره‌های هموگلوبین این فرد، تعداد بازهای تک‌حلقه‌ای نسبت به حالت طبیعی بیشتر است.
- ۲۴ چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟
- «در یک یاختهٔ پروکاریوتی، در محل یک دوراهی همانندسازی، قابل مشاهده است.»
- (الف) نوکلئوتید تک‌فسفاته آدنین دار برخلاف نوکلئوتید سه‌فسفاته یوراسیل دار
 - (ب) شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید آدنین دار و تیمین دار به کمک آنزیمه‌های هلیکاز
 - (ج) ارتباط یک حلقة آلی شش‌ضلعی با یک حلقة آلی شش‌ضلعی دیگر به کمک پیوند اشتراکی و غیراشتراکی
 - (د) تبدیل مولکول آدنوزین توی‌فسفات به نوکلئوتید تک‌فسفاته جی‌پت قرارگیری در رشته در حال ساخت
- | | | | |
|--------|------|------|------|
| ۱) صفر | ۲) ۱ | ۳) ۲ | ۴) ۳ |
|--------|------|------|------|
- ۲۵ کدام گزینه در ارتباط با همهٔ انواع آنزیمه‌هایی که پس از اتصال به مولکول دنای خطی، از نوکلئوتیدهای آدنین دار سه‌فسفاته به عنوان پیش‌ماده استفاده می‌کنند، درست است؟
- (۱) در یاخته‌های دارای دنای اصلی حلقوی نیز به مولکول دنا متصل می‌شوند.
 - (۲) در قرار دادن نوکلئوتیدهای سیتوزین دار فقط در برابر یک رشته از مولکول دنا نقش دارند.
 - (۳) پس از دربر گرفتن هر دو رشته مولکول دنا همواره موجب ساخت یک اسید نوکلئیک خطی می‌شوند.
 - (۴) قادر به برقراری پیوند فسفو دی‌استر بین مولکول قند و گروه فسفات درون یک نوکلئوتید هستند.
- ۲۶ در مردی سالم و بالغ، قطعه‌ای از کروموزوم ۲۱ در یاخته‌های لنفوسيت از آن جدا شده است. اتصال قطعهٔ جداشده به چند مورد از موارد زیر نوعی جهش جایه‌جایی محسوب می‌شود؟
- (الف) کروموزومی که دارای دگرگروه خونی ABO است.
 - (ب) کروموزومی که قطعه از آن جدا شده است.
 - (ج) کروموزوم ۲۱ دیگری که در یاخته موجود است.
- | | | | |
|--------|------|------|------|
| ۱) صفر | ۲) ۱ | ۳) ۲ | ۴) ۳ |
|--------|------|------|------|

- ۲۷- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نادرست است؟

«فرض کنید در یک گیاه گل مغربی چارlad، جدا نشدن فامتن‌ها فقط در یکی از تقسیمات میوز دوم اتفاق افتاده است. در صورت لقاح گامت‌های این گیاه با گامت‌های نوعی گل مغربی دولاد که هم در تقسیمات میوز اول و هم در تقسیمات میوز دوم خود، جدا نشدن کروموزوم داشته است، احتمال ایجاد تخم‌هایی که»

۱) بیش از چهار مجموعه فامتنی داشته باشند، کمتر از احتمال ایجاد تخم‌هایی فاقد مجموعه فامتنی است.

۲) بیش از تعداد ویژگی‌های اصلی حیات جانداران، مجموعه فامتنی داشته باشد، تنها نصف احتمال تشکیل تخم ۲۱۱ است.

۳) دولاد باشند، با احتمال ایجاد تخم‌هایی که دارای شش مجموعه فامتنی می‌باشند، برابری می‌کند.

۴) بالاترین تعداد مجموعه کروموزومی در بین حالات ممکن را دارند، کمتر از احتمال ایجاد تخم‌هایی با کمترین تعداد مجموعه فامتنی است.

- ۲۸- در شرایط طبیعی محیط و با توجه به دو صفت داسی شدن گلبول‌های قرمز و هموفیلی در انسان، کدام مورد برای همه حالات محتمل است؟

(الف) تولد پسری بیمار از مادری خالص و بیمار

ج) تولد پسری بیمار از مادری ناخالص

۱) «ج» و «د»

۳) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

- ۲۹- کدام عبارت در ارتباط با همه یاخته‌هایی صحیح است که در آن‌ها سازوکارهایی سبب توقف عمل ترجمه پیش از تجزیه رنای پیک می‌شوند؟

۱) نوعی اندازک آن‌ها که از کیسه‌های روی هم قرارگرفته تشکیل شده است، برخی پروتئین‌های تولیدشده را توسط بزرگ‌ترین کیسه خود دریافت می‌کند.

۲) بلافاصله پس از اتمام رونویسی mRNA از روی یک ژن گستته یا منقطع، رونوشت برخی از توالی‌های اگزون می‌توانند فاقد پیوند با رونوشت توالی‌های اینترن باشند.

۳) توالی‌ای که اتصال نوعی پروتئین به آن سبب خم شدن دنا می‌شود، حاوی پیوندهای فسفو دی‌استر کمتری نسبت به توالی راهانداز است.

۴) mRNA حاوی رونوشت ژن موجود در میتوکندری‌های خود را توسط رنابسپارازی کاملاً متفاوت با رنابسپاراز اشرشیاکلای تولید می‌کند.

- ۳۰- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در صورتی که در یک خانواده فرزندی متولد شود که فاقد باشد، نمی‌توان گفت مردی که می‌باشد با زنی بیمار و دارای گروه خونی Rh مثبت ازدواج کرده است.»

۱) مقاومت در برابر انگل تکیاخته‌ای عامل بیماری مالاریا - دارای گویجه‌های قرمز مقاوم نسبت به شرایط کم اکسیژن

۲) توانایی کنترل خونریزی‌های شدید - از نظر بیماری هموفیلی سالم بوده و دارای ویتامین و یون‌های لازم

۳) الال D بر روی بزرگ‌ترین جفت کروموزوم یاخته‌های پیکری هسته‌دار - فاقد ال D بر روی هر دو کروموزوم شماره ۱

۴) آسیب مغزی ناشی از تجمع فنیل آلانین در بدن - مبتلا به بیماری PKU

- ۳۱- خانواده‌ای متشکل از پدر و مادری سالم از نظر هموفیلی به همراه دو فرزند می‌باشد. در صورتی که اعضای این خانواده فاقد گروه خونی ABO مشابه با یکدیگر باشند، کدام مورد به طور حتم صحیح است؟

۱) دختر واجد گروه خونی O و فاقد فاکتور انعقادی A، دارای برادری سالم با گروه خونی AB است.

۲) در بین فرزندان، آنژیم مشابهی جهت افزودن کربوهیدرات‌گروه خونی ABO به غشای فراوان‌ترین یاخته‌های خونی وجود ندارد.

۳) پسر فاقد فقط کربوهیدرات در غشای گویچه‌های قرمز و دارای فاکتور انعقادی A، دارای خواهر سالم با گروه خونی AB است.

۴) در صورتی که پدر تنها کربوهیدرات B را در غشای گویچه‌های قرمز نداشته باشد، یکی از فرزندان، دارای هر دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی است.

- ۳۲- چند مورد در ارتباط با هر نوع نوکلئیک اسید خطی دارای پیوندهای کمانزی بین بازه‌های آلی مکمل و ساختار واجد پیچش در یک یوکاریوتوی درست است؟

(الف) آمینواسید(ها) توانایی اتصال به نوکلئوتید(ها)ی آن را دارند.

ب) توسط نوعی آنزیم دارای فعالیت بسپارازی و نوکلتازی تولید می‌شود.

ج) می‌تواند با رنای دارای رمزه‌های مربوط به پروتئین هیستون بیوند هیدروژنی برقرار کند.

د) تعداد پیوندهای فسفو دی‌استر آن یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدهای آن است.

۳۳- برای تکمیل عبارت زیر کدام موارد مناسب هستند؟ (در این سؤال کراسینگ اور تنها در یکی از والدین و دگرهای یکی از صفات آنها می‌تواند رخ دهد).

«در صورت آمیزش دو فردی با ژن نمودهای $\frac{ABC}{aBc}$ و $\frac{AbC}{abC}$ به دنیا آمدن فرزندی با ژن نمود در صورت کراسینگ اور ممکن است.»

الف) $\frac{Abc}{abC}$ - عدم وقوع

ج) کاملاً خالص - وقوع

۱) «الف» و «ب»

۲) «ب» و «ج»

۳) «الف» و «د»

۴) «الف»، «ج» و «د»

۳۴- با توجه به مطالب کتاب زیست‌شناسی (۳)، در رابطه با آن دسته از عواملی که در گونه‌زایی دگرمیهنی نقش دارند و می‌توانند جمعیت‌های کوچک را از تعادل خارج کنند، کدام موارد صحیح می‌باشد؟

(الف) همه آن‌ها با افزایش گوناگونی در جمعیت، شانس بقای جمعیت را افزایش می‌دهند.

(ب) همه آن‌ها در نهایت باعث افزایش فراوانی افرادی می‌شوند که ژنتیک خالص دارند.

(ج) فقط گروهی از آن‌ها می‌توانند با حذف بعضی دگرهای از خزانه ژنی جمعیت، منجر به سازش شوند.

(د) فقط گروهی از آن‌ها می‌توانند بدون تغییر در تعداد افراد جمعیت، بر تنوع دگرهای خزانه ژنی بیافزایند.

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۲) «ب»، «ج» و «د»

۳) «ج» و «د»

۳۵- با توجه به این‌که صفت رنگی در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دارای دو الی می‌باشد، برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه از حروف A، B، C و a، b، c استفاده می‌کنیم. با توجه به این‌که صفات چندجاگاهی، فنوتیپ‌های پیوسته‌ای دارند و نمودار توزیع فراوانی این رخ‌نمودها، شبیه به زنگوله است، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«همه ذرات‌هایی که فقط دارند، با فاصله یکسان از ذرات‌هایی قرار دارند که می‌باشد.»

۱) یک جایگاه ژنی خالص - در هر سه جایگاه ژنی خود دارای ژنتیک خالص نهفته

۲) یک جایگاه ژنی ناخالص - فقط در دو جایگاه ژنی خود دارای ژنتیک بارز و خالص

۳) دو جایگاه ژنی خالص - فقط در یک جایگاه ژنی خود دارای ژنتیک بارز و خالص

۴) دو جایگاه ژنی ناخالص - در هر سه جایگاه ژنی خود، دارای ژنتیک ناخالص

۳۶- چند مورد در ارتباط با گروه خونی با تنوع ژنتیکی بیشتر در جمعیت انسان‌ها درست نیست؟

(الف) در همه یاخته‌هایی که محصول ژن این صفت را در اختیار دارند، رونویسی از ژن آن ادامه می‌یابد.

(ب) در صورت وقوع فرایند چلیپایی شدن در همه یاخته‌هایی که این صفت را دارند، ممکن است ژن صفت خاموش شود.

(ج) فردی که هر کربوهیدرات غشایی گویچه‌های قرمز آن توسط آنزیم A به غشا اضافه می‌شود، می‌تواند ژنتیک خالص یا ناخالص داشته باشد.

(د) اگر فردی از لحاظ گروه خونی ژنتیک خالص داشته باشد، کربوهیدرات‌های غشایی گویچه‌های قرمز مرتبط با گروه خونی آن توسط یک نوع آنزیم به غشا اضافه می‌شود.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۳۷- با توجه به رخ‌نمودهای داده شده در هر عبارت زیر، در کدام گزینه تنوع گامتی فرد کمتر از سایرین است؟

۱) مردی که مبتلا به نوعی بیماری مستقل از جنس بارز و وابسته به جنس نهفته بوده و واجد کربوهیدرات A گروه خونی است.

۲) مردی که مبتلا به نوعی بیماری وابسته به جنس بارز و مستقل از جنس بارز بوده و فاقد هرگونه کربوهیدرات گروه خونی است.

۳) ژنی که مبتلا به هر دو نوع بیماری اشاره شده در فصل سوم کتاب زیست‌شناسی (۳) بوده و واجد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی است.

۴) ژنی که از نظر یکی از بیماری‌های اشاره شده در فصل سوم کتاب زیست‌شناسی (۳) بیمار و از نظر دیگری سالم بوده و واجد کربوهیدرات B گروه خونی است.

- کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در مرحله ترجمه یک mRNA مربوط به پروتئینی که به منظور تکثیر نوعی باکتری شدیداً مورد نیاز است، «

(۱) طویل شدن - قبل از جایه‌جایی ریبوزوم به اندازه سه نوکلئوتید، یک مولکول آب در جایگاه A ریبوزوم آزاد می‌گردد.

(۲) آغاز - پس از تشکیل آخرین پیوند هیدروژنی بین توالی UAC و AUG، ساختار ریبوزوم کامل شده و دو جایگاه آن خالی می‌ماند.

(۳) پایان - بالافصله قبل از ورود عوامل آزادکننده به ریبوزوم، آخرین رونوشت از آگزون ۳' مورد نظر، با نوعی توالی آنتی‌کدون، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد.

(۴) طویل شدن - پس از تشکیل پیوند پیپتیدی و جایه‌جایی ریبوزوم، چندین پیوند هیدروژنی بین ریبونوکلئوتیدها و دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل می‌شود.

- به طور معمول در یاخته‌های ماهیچه حرکت‌دهنده کره چشم، در پی افزوده شدن هر نوکلئوتید دارای قند به زنجیره پلی‌نوکلئوتیدی درون هسته، نوکلئیک اسیدی تولید می‌شود که

(۱) دئوکسی ریبوز - دارای پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دارای باز آلی آدنین و تیمین است.

(۲) دئوکسی ریبوز - در مجاورت آن زیرواحد بزرگ ریبوزوم به زیرواحد کوچک آن ملحق می‌شود.

(۳) ریبوز - همزمان با رونویسی و تولید، بین بازهای مکمل آن پیوندهای هیدروژنی برقرار نمی‌شود.

(۴) ریبوز - حذف رونوشت همه پخش‌های اینترونی آن، قسمتی از فرایند بلوغ آن است.

- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ساختار پروتئین‌ها، به طور قطع «

(۱) اول - آمینواسیدها می‌توانند در زاویه‌های مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند.

(۲) سوم - تاخورده‌گی صفحات و ماربیچ‌های تشکیل شده در ساختار دوم نسبت به قبل، افزایش می‌یابد.

(۳) چهارم - بیش از یک رشته دارای ساختار سوم وجود دارد که به یک ترکیب معدنی متصل است.

(۴) دوم - در صورت تشکیل ساختار صفحه‌ای، گروه R آمینواسیدها تقریباً در محل تاخورده‌گی‌های صفحات مجاور قرار دارد.

آزمون شماره ۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۲



آزمون‌های سراسری کاح

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

سوالات آزمون دفترچه شماره (۲)

پایه دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۵۵ دقیقه	تعداد سوال: ۵۰


عنوانین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره سوال		مدت پاسخگویی
			تا	از	
۱	فیزیک	۲۵	۶۱	۶۵	۳۰ دقیقه
۲	شیمی	۲۵	۶۶	۹۰	۲۵ دقیقه

فیزیک



۴۱- نمودار مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده یک سامانه جرم- فنر، مطابق شکل زیر است. اگر جرم جسم 500 g باشد، ثابت فنر چند واحد است؟ $(\pi^2 \approx 10)$ SI



$$\frac{2000}{9} \quad (1)$$

$$\frac{2000}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1000}{9} \quad (3)$$

$$\frac{1000}{3} \quad (4)$$

۴۲- معادله مکان-زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = A\cos(100\pi t)$ است. اگر تندی متوسط نوسانگر در بازه

زمانی 15 s برابر با $\frac{m}{s}$ باشد، بزرگی سرعت متوسط نوسانگر در این بازه زمانی چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟

$$20 \quad (4)$$

$$30 \quad (3)$$

$$0/3 \quad (2)$$

$$0/2 \quad (1)$$

۴۳- چه تعداد از عبارت‌های زیر، در مورد حرکت هماهنگ ساده صحیح است؟

(الف) مدت زمان هر نوسان کامل برابر یک دوره است.

(ب) در نیمی از زمان هر دوره تناوب، بردارهای مکان و شتاب، هم‌جهت هستند.

(ج) مسافت طی شده در هر دوره تناوب، برابر طول پاره خط نوسان است.

(د) هنگامی که اندازه تکانه نوسانگر، بیشینه است، نیروی وارد بر آن صفر است.

(ه) هنگامی که نوسانگر به صورت تنشیونده حرکت می‌کند، اندازه شتاب آن در حال کاهش است.

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۴۴- به فنری سبک، یک بار جسمی به جرم 1 kg و بار دیگر جسمی به جرم 4 kg می‌بندیم تا با دامنه یکسان، حرکت هماهنگ ساده انجام دهد. بیشینه تکانه جسم 1 کیلوگرمی ، چند برابر بیشینه تکانه جسم 4 کیلوگرمی است؟

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۴۵- در یک حرکت نوسانی هماهنگ ساده با دامنه A و دوره T . حداکثر مسافت طی شده توسط نوسانگر در مدت زمان $\frac{T}{3}$ چند برابر دامنه نوسان است؟

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$\sqrt{3} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۴۶- نوسانگری به جرم 50 g روی سطح افقی بدون اصطکاک، روی پاره خطی به طول 6 cm حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر بزرگی

شتاب نوسانگر در انتهای پاره خط نوسان $\frac{m}{s^2}$ باشد، حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر چند میکروژول است؟ $(\pi^2 \approx 10)$

$$1800 \quad (4)$$

$$180 \quad (3)$$

$$900 \quad (2)$$

$$90 \quad (1)$$

۴۷- روی سطح افقی، جسمی را به فنری سبک بسته‌ایم و فنر را کشیده و در لحظه $t=0$ رها می‌کنیم تا جسم از مکان $x=A$ ، حول مبدأ محور x شروع به حرکت هماهنگ ساده کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل کشسانی آن، 25 درصد کمتر از انرژی جنبشی آن است، تندی

носانگر $\pi\sqrt{5}\frac{m}{s}$ است. اگر بسامد نوسان این جسم $25/6$ هرتز باشد، معادله شتاب-زمان آن در کدام گزینه به درستی آمده است؟


$$a = -\frac{125}{4}\pi^2 \cos(\frac{25\pi}{2}t) \quad (2)$$

$$a = -125\pi^2 \cos(\frac{25\pi}{2}t) \quad (1)$$

$$a = \frac{125}{4}\pi^2 \cos(\frac{25\pi}{2}t) \quad (4)$$

$$a = 125\pi^2 \cos(\frac{25\pi}{2}t) \quad (3)$$

۴۸- نمودار تغییرات انرژی‌های جنبشی و پتانسیل یک نوسانگر ساده به جرم 100 g ، مطابق شکل زیر است. این نوسانگر در هر دقیقه چند نوسان کامل انجام می‌دهد؟ $(\pi^2 \approx 10)$




$$300 \quad (1)$$

$$400 \quad (2)$$


$$600 \quad (3)$$

$$150 \quad (4)$$




- ۴۹- مطابق شکل مقابل، گلوله آونگی در مدت زمان ۵۵٪ از نقطه A تا نقطه B جایه‌جا می‌شود و تندا متوسط آن در این حرکت برابر $\frac{m}{s} \cdot 24\pi / 3$ است. اگر همین آونگ را با دامنه کوچک به نوسان در بیاریم تا حرکت هماهنگ ساده انجام دهد، در هر ساعت در سطح زمین چند نوسان کامل انجام خواهد داد؟ ($g = \pi^2 \frac{N}{kg}$)

- (۱) ۱۰۰۰ (۲) ۲۰۰۰ (۳) ۴۰۰۰ (۴) ۳۰۰۰ - ۵۰- مطابق شکل زیر، پنج جسم توسط فنرهای قائم با جرم ناچیز از یک میله افقی آویزان هستند. بسته به این‌که کدام جسم را از وضع تعادل خارج کرده و رها بسازیم، به ترتیب از راست به چپ، حداقل چند جسم دیگر دچار تشدید می‌شوند؟



- (۱) ۱ - ۲ (۲) ۲ - ۳ (۳) ۲ - ۲ (۴) ۱ - ۱

- ۵۱- در شکل زیر، جسم به صورت تندشونده روی سطح شیب‌دار پایین می‌آید. اگر نیروی F حذف شود:




- (۱) جسم به صورت تندشونده پایین می‌رود.
(۲) جسم با سرعت ثابت پایین می‌رود.
(۳) جسم به صورت کندشونده پایین می‌رود.

(۴) بسته به اندازه نیروی \bar{F} ، هر سه گزینه می‌توانند صحیح باشند.

- ۵۲- می‌گویند در پرش آزاد یک چتر باز در هوا، چتر باز دو تندا حدى را تجربه می‌کند. در این صورت کدام گزینه صحیح است؟


- (۱) تندا حدى چتر باز، در حالتی که چتر، باز است، بیشتر از حالتی است که چتر، باز نیست.
(۲) تندا حدى چتر باز، در حالتی که چتر، باز است، کمتر از حالتی است که چتر، باز نیست.
(۳) در فاصله سقوط بین دو تندا حدى، حرکت چتر باز، تندشونده است.
(۴) در فاصله سقوط بین دو تندا حدى، اندازه نیروی مقاومت هوا کمتر از نیروی وزن جسم است.

- ۵۳- دو متوجه که جرم هر دو برابر $2/5 kg$ است، در مبدأ زمان از مبدأ محور می‌گذرند و نمودار تکانه - زمان آن‌ها مطابق شکل زیر است. در بازه زمانی که دو متوجه در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، فاصله بین آن‌ها چند متر و چگونه تغییر می‌کند؟



- (۱) ۴۸ - افزایش
(۲) ۴۸ - کاهش
(۳) ۶۴ - افزایش
(۴) ۶۴ - کاهش

- ۵۴- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $2kg$ را در مبدأ زمان، مماس بر سطح افقی دارای اصطکاک با تندا $\frac{m}{s} \cdot 40$ در جهت محور x پرتاب می‌کنیم. اگر از لحظه $t = 2s$ ، نیروی خارجی $(N) \bar{F} = -20\bar{t}$ نیز به جسم اثر کند، تندا متوسط جسم در ۸ ثانیه اول حرکت چند متر بر



$$\text{ثانیه می‌شود؟ } (\mu_k = 0.5, \mu_s = 0.8, g = 10 \frac{m}{s^2})$$

- (۱) ۱۴ (۲) ۱۵/۵ (۳) ۱۶ (۴) ۱۷/۵

سوال دوازدهم تجربی

- ۵۵- در سه آزمایش، سه نیروی افقی متفاوت بر جسمی به جرم 2kg که بر روی سطح افقی در حال سکون قرار گرفته است، وارد می‌شود. اگر بزرگی نیرویی که سطح افقی در این سه آزمایش بر جسم وارد می‌کند برابر $R_1 = 22\text{N}$, $R_2 = 15\sqrt{2}\text{N}$, $R_3 = 25\text{N}$ باشد و در هر سه آزمایش، جسم ساکن باقی بماند، ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$

$$\mu_s \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4) \quad \mu_s \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \quad \mu_s \geq \frac{3}{4} \quad (2) \quad \mu_s \leq \frac{3}{4} \quad (1)$$

- ۵۶- معادله مکان - زمان متحركی به جرم 200g که بر روی محور X حرکت می‌کند، در SI برابر $x = 2t^7 - 12t^5 - 12t^3$ است. در بازه زمانی که متحرك به صورت کندشونده از مبدأ محور X دور می‌شود، تغییرات تکانه آن چند واحد SI است؟

$$-12 \quad (4) \quad 12 \quad (3) \quad -2/4 \quad (2) \quad 2/4 \quad (1)$$

- ۵۷- نمودار تغییرات تکانه متحركی که بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند، برحسب زمان مطابق شکل زیر است. اندازه نیروی خالص متوسط وارد بر متحرك در کدام بازه زمانی بزرگ‌تر است؟



- (1) صفر تا t_1
- (2) t_1 تا t_2
- (3) t_2 تا t_3
- (4) صفر تا t_3

- ۵۸- شتاب گرانش در سطح زمین برابر $\frac{m}{s^2}$ و شاعع زمین برابر 6400km است. اگر وزن جسمی به جرم 81kg در ارتفاع h از سطح زمین برابر N باشد، h چند کیلومتر است؟

$$3200 \quad (4) \quad 1600 \quad (3) \quad 800 \quad (2) \quad 400 \quad (1)$$

- ۵۹- گلوله‌ای به جرم m را با تندی اولیه v_0 مماس بر سطح زمین و در جهت محور X روی سطح افقی پرتاب می‌کنیم. اگر همین آزمایش بر روی سطح سیاره‌ای انجام شود که شعاع و چگالی آن به ترتیب 2 و $\frac{1}{4}$ برابر شعاع و چگالی زمین باشد و حداکثر مسافت طی شده توسط گلوله تا هنگام توقف، در هر دو سیاره یکسان باشد، آن‌گاه ضریب اصطکاک جنبشی سطح در کره زمین چند برابر ضریب اصطکاک جنبشی سطح در سیاره موردنظر است؟

$$8 \quad (4) \quad 2 \quad (3) \quad \frac{1}{2} \quad (2) \quad \frac{1}{2} \quad (1)$$

- ۶۰- متحركی بر روی یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط و تندی متوسط این متحرك در بازه زمانی t_1 تا t_2 به ترتیب برابر \bar{v}_{av} و \bar{s}_{av} باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر الزاماً صحیح است؟

$$(1) \text{ اگر } \bar{v}_{av} = s_{av} \bar{t} \text{ باشد، جهت حرکت متحرك تغییر کرده است.}$$


$$(2) \text{ اگر } \bar{v}_{av} = -s_{av} \bar{t} \text{ باشد، جهابه‌جایی متحرك در جهت مثبت محور } X \text{ است.}$$

$$(3) \text{ اگر } |v_{av}| > s_{av} \text{ باشد، جهت حرکت متحرك تغییر کرده است.}$$

$$(4) \text{ اگر } v_{av} = -s_{av} \bar{t} \text{ باشد، جهت حرکت متحرك تغییر نکرده است.}$$

- ۶۱- نمودار مکان - زمان متحركی که روی محور X حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر اندازه سرعت متوسط متحرك در ۸ ثانیه اول حرکت برابر

$$\frac{m}{s} \quad (4/5) \text{ باشد، تندی متوسط در این بازه زمانی چند متر بر ثانیه است؟}$$



- (1) ۸/۵
- (2) ۹/۵
- (3) ۴/۵
- (4) ۹

- ۶۲- معادله سرعت برحسب مکان متحركی که با شتاب ثابت روی محور X حرکت می‌کند، در SI به صورت $v = 2\sqrt{x}$ است. اگر این متحرك در مبدأ زمان از مکان $x = 16\text{m}$ در جهت محور X بگذرد، در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه از مکان $x = 36\text{m}$ عبور می‌کند؟


$$10 \quad (4) \quad 5 \quad (3) \quad 2 \quad (2) \quad 1 \quad (1)$$

- ۶۳- شکل زیر، نمودار شتاب-زمان متحرکی را نشان می‌دهد که روی محور X در حرکت است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در مدتی که شتاب متحرک در جهت منفی محور X است، چند متر بر مربع ثانیه است؟




- (۱) صفر
(۲) ۶
(۳) ۸
(۴) ۹

- ۶۴- نمودار سرعت-زمان دو متحرک که بر روی محور X به طور هم‌زمان از مبدأ مکان شروع به حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. نمودار مکان-زمان این دو متحرک در کدام گزینه به درستی رسم شده است؟



- ۶۵- جسمی به جرم m مماس بر سطح افقی با تنیدی $\frac{m}{s}$ پرتاب می‌شود و نمودار مکان-زمان آن تا لحظه توقف، مطابق سه‌می شکل زیر است. ضریب اصطکاک بین جسم و سطح افقی چقدر است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$



- ۰/۱۵ (۱)
۰/۱۷۵ (۲)
۰/۲ (۳)
۰/۱۳۵ (۴)




- ۶۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر در ارتباط با اوره درست است؟
- شمار پیوندهای دوگانه در مولکول روغن زیتون، ۶ برابر شمار پیوندهای دوگانه در مولکول اوره است.
 - شمار اتم‌های کربن در فرمول تقریبی بنزین برابر با مجموع شمار اتم‌ها در مولکول اوره است.
 - شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در مولکول‌های اتیلن گلیکول و اوره با هم برابر است.
 - گشتاور دوقطبی مولکول اوره همانند مولکول‌های سازنده عسل، بزرگ‌تر از صفر است.

- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

سوال دوازدهم تجربی

- ۶۷ - چه تعداد از عبارت‌های زیر در ارتباط با شیر منیزی درست است؟
- یکی از رایج‌ترین داروهای ضداسیدی است که شامل منیزیم اکسید است.
 - این دارو به شکل سوسپانسیون مصرف می‌شود.
 - در معادله موازنۀ شده واکنش آن با اسید مده، مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها برابر با مجموع ضرایب فراورده‌ها است.
 - به عنوان یک داروی ضداسید اغلب به همراه آلومینیم هیدروکسید مصرف می‌شود.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۶۸ - اگر جرم کربن موجود در یک پاک‌کننده غیرصابونی سدیم (دارای گروه سولفونات)، ۵ برابر جرم اکسیژن موجود در آن باشد، مجموع شمار اتم‌ها در این پاک‌کننده کدام است؟ (در ساختار این پاک‌کننده، چهار پیوند دوگانه وجود دارد.) ($C=12$, $O=16$: $g.mol^{-1}$)
- ۵۴ (۴) ۶۰ (۳) ۵۸ (۲) ۵۶ (۱)
- ۶۹ - a گرم باریم اکسید و b گرم پتاسیم اکسید به طور جداگانه در دو لیتر آب حل شده‌اند. اگر غلظت یون هیدروکسید در محلول شامل باریم اکسید، سه برابر غلظت یون هیدروکسید در محلول دیگر باشد، نسبت $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (از تغییر حجم محلول چشم‌پوشی شود.) ($K=39$, $O=16$, $Ba=137:g.mol^{-1}$)
- ۴/۸۸ (۴) ۲/۴۴ (۳) ۲/۷۸ (۲) ۵/۵۶ (۱)
- ۷۰ - به ۸ لیتر آب خالص چند مول اسید ضعیف HA اضافه کنیم تا pH آن برابر با $\frac{3}{7}$ شود؟ ($K_a = 4 \times 10^{-4}$)
- ۰/۰۸ (۴) ۰/۰۰۸ (۳) ۰/۰۲۴ (۲) ۰/۰۰۲۴ (۱)
- ۷۱ - m گرم از یک اسید چرب با زنجیر هیدروکربنی سیرشده که شامل 33 اتم هیدروژن است با 4 دسی‌لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید $(C=12, H=1, O=16:g.mol^{-1})$
- ۱۶/۲ (۴) ۱/۶۲ (۳) ۳۷/۸ (۲) ۳/۷۸ (۱)
- ۷۲ - نوار منیزیم با کدام‌یک از محلول‌های زیر سریع تر واکنش می‌دهد؟ ($H=1, N=14, O=16, C=12:g.mol^{-1}$)
- ۱) محلول هیدرویدیک اسید با $pH = \frac{3}{2}$
۲) محلول 536 g/mol نیترو اسید با درجه یونش $0/025$
۳) محلول نیتریک اسید که در هر چهار لیتر آن، 189 میلیگرم اسید حل شده است.
۴) محلول 5 g/mL درصد جرمی سرکه با درجه یونش $0/0015$ و چگالی $1g.mL^{-1}$
- ۷۳ - ۳۲ میلی‌گرم دی‌نیتروژن پنتوکسید ناخالص در 6 لیتر آب حل شده و pH محلول ایجاد شده برابر $4/1$ می‌شود. اگر ناخالصی‌ها در آب حل نشده باشند، درصد خلوص اکسید حل شده کدام است؟ ($N=14, O=16:g.mol^{-1}$)
- ۴۰/۵ (۴) ۸۱ (۳) ۹۰ (۲) ۴۵ (۱)
- ۷۴ - نمونه‌ای از صابون پتاسیم به جرم 5 g با مقداری محلول کلسیم کلرید واکنش داده و $0/4\text{ mol}$ رسوب تولید می‌شود. اگر درصد خلوص صابون $2/67$ درصد و بازده واکنش 80% باشد، شمار اتم‌های کربن در فرمول شیمیایی صابون کدام است؟ (زنگیر هیدروکربنی در صابون، سیر شده است.) ($K=39, C=12, H=1, O=16:g.mol^{-1}$)
- ۲۱ (۴) ۲۰ (۳) ۱۹ (۲) ۱۸ (۱)
- ۷۵ - چه تعداد از نمودارهای زیر درست رسم شده‌اند؟
-
- The figure contains four separate graphs:
- Graph 1: A plot of $[H^+] \times [OH^-]$ versus volume (ml). The y-axis is labeled $[H^+] \times [OH^-]$ and the x-axis is labeled "حجم محلول". A horizontal line is drawn at a constant value, representing a constant product of ion concentrations.
 - Graph 2: A plot of $[H_3O^+]$ versus $[OH^-]$. The y-axis is labeled $[H_3O^+]$ and the x-axis is labeled $[OH^-]$. A curve starts at a high value on the y-axis and decreases as it moves to the right, approaching a horizontal asymptote.
 - Graph 3: A plot of K_a versus pH . The y-axis is labeled K_a and the x-axis is labeled "pH". A horizontal line is drawn at a constant value, representing a constant acid dissociation constant.
 - Graph 4: A plot of pH versus $[H^+] [\text{mol.L}^{-1}]$. The y-axis is labeled "pH" and the x-axis is labeled $[H^+] [\text{mol.L}^{-1}]$. A curve starts at a high pH value (around 14) for low concentration and decreases as concentration increases, asymptotically approaching a pH of 7.
- ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

- ۷۶ - چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- امروزه صابون‌ها را از بنزن و دیگر مواد اولیه صنایع پتروشیمی تولید می‌کنند.
 - نقطه ذوب $C_{17}H_{35}COONa$ بالاتر از $C_{17}H_{35}$ است.
 - کاغذ pH در خاکی که گل ادریسی در آن به رنگ سرخ شکوفا می‌شود، به رنگ آبی در می‌آید.
 - آرنیوس نخستین کسی بود که واکنش میان اسیدها و بازها را معرفی کرد.
- ۱) (۱) ۲) (۳) ۳) (۲) ۴) (۴)
- ۷۷ - اگر 400 میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید با $pH=1/7$ با 200 میلی‌لیتر محلول باریم هیدروکسید $8\% / ۰$ مولار مخلوط شود، pH محلول نهایی کدام است؟
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)
- ۷۸ - مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول $169\% / ۰$ مولار اسید HX چند مول بر لیتر است؟ ($K_a = 1/96 \times 10^{-9}$)
- ۱) $3/12 \times 10^{-5}$ ۲) $3/64 \times 10^{-5}$ ۳) $3/64 \times 10^{-4}$ ۴) $3/64 \times 10^{-4}$
- ۷۹ - با ایجاد خراش در سطح حلبی چه تعداد از مواد زیر رخ می‌دهد؟
- فلزهای آهن و قلع به ترتیب در نقش آند و کاتند ظاهر می‌شوند.
 - نیم‌واکنش کاتندی انجام شده متفاوت با نیم‌واکنش کاتندی سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن است.
 - بهارای تولید دو مول کاتیون در آند، یک مول گاز اکسیژن در کاتند مصرف می‌شود.
 - اگر به جای حلبی از آهن سفید استفاده کنیم، جای آند و کاتند عوض شده و به جای آهن، فلز روی خورده می‌شود.
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)
- ۸۰ - اگر مخلوطی از نمک‌های مذاب لیتیم فلورید و پتاسیم کلرید را برگرفت کنیم، فراورده‌های نهایی کدامند؟
- ۱) لیتیم و گاز فلور ۲) لیتیم و گاز کلر ۳) پتاسیم و گاز کلر ۴) پتاسیم و گاز کلر
- ۸۱ - چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- emf سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن بیشتر از سلول سوختی متان – اکسیژن است.
 - متان در مقایسه با هیدروژن، سوخت ارزان‌تری بوده و خطر کم‌تری دارد.
 - بهارای عبور جریان الکتریکی یکسان از دو سلول سوختی متان – اکسیژن و هیدروژن – اکسیژن، در سلول هیدروژن – اکسیژن، O_2 بیشتری تولید می‌شود.
 - نسبت مجموع ضرایب فراورده‌ها به مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها در واکنش کلی سلول سوختی متان – اکسیژن در مقایسه با سلول هیدروژن – اکسیژن، عدد بزرگ‌تری است.
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)
- ۸۲ - در سلول گالوانی «روی – مس» سلول گالوانی «منیزیم – آلومینیم» با گذشت زمان جرم مواد جامد موجود در سلول می‌یابد.
- $(Zn=65, Cu=64, Mg=24, Al=27: g/mol^{-1})$
- ۱) همانند – افزایش ۲) همانند – کاهش ۳) برخلاف – افزایش ۴) برخلاف – کاهش
- ۸۳ - اگر از دو الکترود آهنی در یک سلول الکتروولیتی برای برگرفت آب شهری استفاده شود، در کدام قطب گاز هیدروژن تولید می‌شود و آیا با عبور جریان برق، امکان تشکیل رسوب $Fe(OH)_2$ وجود دارد؟
- ۱) مثبت، بله ۲) مثبت، خیر ۳) منفی، بله ۴) منفی، خیر
- $Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Fe(s) \quad E^\circ = -0.44 V$
- $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq) \quad E^\circ = +1.23 V$
- $2H_2O(l) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq) \quad E^\circ = -0.83 V$
- ۸۴ - درباره فرایند زنگ زدن آهن، چند مورد از مواد زیر درست است؟
- تبدیل فلز آهن به زنگ آهن، از دو واکنش اکسایش آن تشکیل شده است.
 - فراورده‌های نیم‌واکنش‌های اکسایش و کاهش، هر دو محلول در آب‌اند.
 - مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در واکنش کلی، برابر 17 است.
 - وجود یون هیدرونیوم سبب افزایش سرعت انجام فرایند می‌شود.
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)



- ۸۵ - در ترکیبی با ساختار زیر چند نوع اتم کربن با عدد اکسایش مختلف وجود دارد؟


- ۳ (۱)
- ۴ (۲)
- ۵ (۳)
- ۶ (۴)

- ۸۶ - اگر با عبور II الکترون از سلول الکتروولیتی بر قکافت مینیزیم کلرید مذاب، یک کیلوگرم فراورده در کاتد به دست آید، با عبور همان II الکترون از سلول مارتین هال، چند کیلوگرم فراورده در آند به دست می آید؟

$$(Al = ۲۷, Mg = ۲۴, Cl = ۳۵/۵, C = ۱۲, O = ۱۶ : g/mol^{-1})$$

- ۱ / ۸۳۳ (۴)
- ۰ / ۹۱۶ (۳)
- ۱ / ۰۹ (۲)
- ۰ / ۶۶۶ (۱)

- ۸۷ - در نوعی از باتری خودرو نیم واکنش های انجام شده به صورت زیر هستند. چه تعداد از عبارت های پیشنهاد شده در ارتباط با آن درست هستند؟



• تفاوت x و y برابر با صفر است.

• نیروی الکترو موتوری این باتری برابر با 205 ولت است.

• در واکنش کلی باتری، مجموع ضرایب استوکیومتری اجزای واکنش برابر با 10 است.

• گونه های کاهنده و اکسنده به ترتیب فلز سرب و ترکیب سرب (II) اکسید هستند.

- ۴ (۴)
- ۳ (۳)
- ۲ (۲)
- ۱ (۱)

- ۸۸ - چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با سلول بر قکافت سدیم کلرید مذاب درست است؟

• نوعی سلول الکتروولیتی است که در آزمایشگاه برای تهیه فلز سدیم به کار می رود.

• نیم واکنش کاتدی آن به صورت $(I) \text{Na}^+(aq) + e^- \rightarrow \text{Na(l)}$ است.

• شمار مول های فراورده حاصل از قطب منفی سلول، دو برابر شمار مول های فراورده قطب دیگر است.

• افزودن مقداری کلسیم اکسید باعث می شود تا سدیم کلرید در دمای پایین تری ذوب شود.

- ۴ (۴)
- ۳ (۳)
- ۲ (۲)
- ۱ (۱)

- ۸۹ - اگر نیم واکنش کاتدی در یک سلول آبکاری به صورت $(s) M^{n+}(aq) + ne^- \rightarrow M(s)$ باشد، چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

• فلز M باید به قطب منفی باتری متصل شود.

• هر کدام از نمک های فلز M الکتروولیت مناسبی برای این سلول به شمار می آیند.

• پتانسیل کاهشی فلز M باید کوچک تر از پتانسیل کاهشی فلز دیگر موجود در سلول باشد.

• جهت حرکت الکترون در مدار خارجی از سمت فلز دیگر به سمت فلز M است.

- ۳ (۴)
- ۲ (۳)
- ۱ (۲)
- ۰ (۱)

- ۹۰ - چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با نوعی سلول نور الکتروشیمیایی که برای تهیه گاز هیدروژن از آب به کار می رود، درست است؟

• انجام واکنش اکسایش - کاهش در این سلول با تولید نور همراه است.

• نیم واکنش کاتدی آن مشابه نیم واکنش کاتدی سلول بر قکافت آب است.

• پتانسیل کاهشی نیم واکنشی که شامل H^+ است در مقایسه با نیم واکنش دیگر، منفی تر است.

• emf، بازده و سرعت انجام واکنش در این سلول پایین است.

• pH محلول اطراف آند کاهش می یابد.

- ۲ (۴)
- ۳ (۳)
- ۴ (۲)
- ۵ (۱)

آزمون شماره ۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۲



آزمون‌های سراسری کاج

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

سوالات آزمون دفترچه شماره (۳)

پایه دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه	تعداد سؤال: ۲۵

عنوانی مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت پاسخگویی
			تا	از	
۱	ریاضیات	۲۵	۹۱	۱۱۵	۴۰ دقیقه

ریاضیات



- ۹۱- تابع f اکیداً صعودی و دامنه آن مجموعه‌ای از مقادیر مثبت است. اگر $f(3x-1) > f(4-2x^2)$ باشد، x در کدام محدوده قرار می‌گیرد؟

$$(1, \sqrt{2}) \quad (4)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right) \quad (3)$$

$$(0, \sqrt{2}) \quad (2)$$

$$(1, +\infty) \quad (1)$$

- ۹۲- در صورتی که $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ax-1}{3ax-4}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax+b}{x-\sqrt[3]{x}}$ کدام است؟

$$\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$+\infty \quad (3)$$

$$-\infty \quad (2)$$

$$0 \quad (1)$$

- ۹۳- در صورتی که $f(4) = 4f'(4) = 2f''(4)$ باشد، حاصل عبارت $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h)-f(4)}{h}$ کدام است؟

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

$$\frac{5}{16} \quad (3)$$

$$\frac{3}{16} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8} \quad (1)$$


- ۹۴- در کدامیک از نقاط مشخص شده $xf(x)f'(x) < 0$ است؟

$$D \quad (1)$$

$$E \quad (2)$$

$$A \text{ و } E \quad (3)$$

$$A \text{ و } C \quad (4)$$



- ۹۵- اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4)-f(4+h)}{4h}$ باشد، مقدار $f'(4)$ چند برابر باشد، مقدار $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(4)}{2x-8}$ چند است؟

$$2 \quad (4)$$

$$-2 \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$-1 \quad (1)$$

- ۹۶- بهای چند مقدار صحیح x تابع $\{(-1, x^2 + 6x), (1, 3x + 10), (0, 7)\}$ اکیداً صعودی است؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

- ۹۷- اگر $g(x) = 2^{x-[x]}$ و $f(x) = [x] + [-x]$ نماد جزء صحیح است.

$$\{0\} \quad (4)$$

$$\{1\} \quad (3)$$

$$\{-1, 0\} \quad (2)$$

$$\{0, 1\} \quad (1)$$

- ۹۸- اگر f یک تابع متناوب و بهایزی هر x باشد، با شرط $f(123/25) = f(x)$ کدام است؟

نماد جزء صحیح است.

$$0/65 \quad (4)$$

$$0/9 \quad (3)$$

$$0/8 \quad (2)$$

$$0/6 \quad (1)$$

- ۹۹- تابع $|x-2|$ در یک بازه اکیداً نزولی است. ضابطه وارون آن در این بازه کدام است؟

$$f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{1-x} \quad x \leq 1 \quad (2)$$

$$f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{1-x} \quad -1 \leq x \leq 0 \quad (1)$$

$$f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{1-x} \quad x \leq 1 \quad (4)$$

$$f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{1+x} \quad -1 \leq x \leq 0 \quad (3)$$

- ۱۰۰- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \frac{[-x]\cos 2x}{\sqrt{1-\sin 2x}}$ کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3)$$

$$-\sqrt{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

۱۰۱ - در صورتی که $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| - [-x] - 2k-1}{2x - 2x^3 + x^5 + 1} = +\infty$ باشد، حدود k کدام است؟ () نماد جزء صحیح است.

$k > 2$ (۴)

$k < 2$ (۳)

$k > \frac{3}{2}$ (۲)

$k < \frac{3}{2}$ (۱)

۱۰۲ - در صورتی که $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ab(x+1)^4}{x\sqrt[4]{x^3+1}}$ کدام است؟ () باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax+b}{\sqrt[4]{x-1}}$ است

$-\frac{1}{2}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

1 (۲)

-1 (۱)

۱۰۳ - یکی از جواب‌های معادله $2^{\sin x} = \sqrt[4]{\sin x}$ کدام است؟

$rk\pi - \frac{\pi}{2}$ (۴)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۳)

$k\pi$ (۲)

$k\pi + \frac{\pi}{2}$ (۱)

۱۰۴ - دوره تناوب تابع $y = \cos^4(1-2x) + \cos(2-4x)$ کدام است؟

$\frac{\pi}{8}$ (۴)

$\frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}$ (۲)

π (۱)

۱۰۵ - اگر بیشترین مقدار تابع $A = \frac{-4}{\Delta + f(x)}$ برابر $\frac{1}{4}$ باشد، کمترین مقدار عبارت $f(x) = a + \sin bx \cos bx$ کدام است؟


$\frac{3}{4}$ (۴)

$-\frac{3}{4}$ (۳)

$-\frac{16}{17}$ (۲)

$\frac{16}{17}$ (۱)

۱۰۶ - اگر خط L بر تابع f در نقطه x=a مماس باشد، مقدار af(a)f'(a) چقدر است؟




3 (۱)

2 (۲)

4 (۳)

$\frac{1}{2}$ (۴)

۱۰۷ - اگر نمودار f(x) به صورت زیر باشد، دامنه تابع $y = \sqrt{xf(2x-1)}$ به صورت $[-\frac{1}{2}, a] \cup [b, c]$ خواهد بود، مقدار a+b+c کدام است؟



$\frac{3}{2}$ (۱)

$\frac{1}{2}$ (۲)

1 (۳)

$\frac{5}{2}$ (۴)

۱۰۸ - جواب کامل معادله $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1}{4} + \sin^4 x + \cos^4 x$ کدام است؟

$rk\pi + \frac{\pi}{4}$ (۴)

$\frac{k\pi}{2}$ (۳)

$k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۲)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۱)

۱۰۹ - اگر باشد، جواب معادله $f(x) = 2x^4 - 1$ () باشد، جواب معادله $f(f(x))(\cos x) = \cos x$ کدام است؟

$$\begin{cases} x = k\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = \frac{k\pi}{2} \end{cases}$$
 (۴)

$$\begin{cases} x = \frac{rk\pi}{2} \\ x = \frac{r\pi}{4} \end{cases}$$
 (۳)

$$\begin{cases} x = \frac{rk\pi}{2} \\ x = \frac{r\pi}{5} \end{cases}$$
 (۲)

$$\begin{cases} x = \frac{rk\pi}{2} \\ x = \frac{k\pi}{2} \end{cases}$$
 (۱)

۱۱۰ - در صورتی که $\cot\alpha - \tan\alpha = \frac{9}{41}$ باشد، به شرطی که 4α در ناحیه دوم قرار داشته باشد، $\tan 2\alpha$ کدام است؟


$$-\frac{9}{40} \quad (4)$$

$$\frac{9}{40} \quad (3)$$

$$-\frac{40}{9} \quad (2)$$

$$\frac{40}{9} \quad (1)$$

۱۱۱ - نمودار زیر، مربوط به چندجمله‌ای $f(x) = x^7 + bx^5 + cx + d$ بر $x-1$ کدام است؟



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۱۲ - اگر باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $x^6 - 6x^5 + x^3 + ax$ بر $x+1$ برابر ۳ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{x^6 + 1}}$ کدام است؟

$$-7 \quad (4)$$

$$-8 \quad (3)$$

$$7 \quad (2)$$

۸ (۱)

۱۱۳ - اگر $|f(x)| = 3 - |3-x|$ در این صورت ضابطه $(f \circ f \circ f)(x)$ کدام است؟

$$f(x)-1 \quad (3)$$

$$3-f(x) \quad (2)$$

$$f(x) \quad (1)$$

۱۱۴ - اگر $f(1+x) < f(3x-4)$ جواب نامعادله $f(x) = (\frac{1}{3})^x + \log_{\frac{1}{2}} x$ کدام است؟

$$(\frac{4}{3}, \frac{5}{2}) \quad (4)$$

$$(\circ, \frac{3}{4}) \quad (3)$$

$$(\circ, \frac{5}{2}) \quad (2)$$

$$(\frac{3}{4}, \frac{5}{2}) \quad (1)$$

۱۱۵ - تابع $f(x) = (x+1)^m + m(x-1)^n + n(x+1)^p + k(x+3)^q$ در هر بازه هم صعودی و هم نزولی است. $f(1)+f(-1)$ کدام است؟

$$64 \quad (4)$$

$$16 \quad (3)$$

$$32 \quad (2)$$

۱) صفر



آزمون شماره ۱۴

جمعه ۱۰/۲۲/۱۴۰۲

آزمون‌های سراسری کاج

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

پاسخنامه تشریحی دفترچه شماره (۴)

پایه دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه	تعداد سؤال: ۱۱۵

عنوانین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایش علوم تجربی، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال		شماره سؤال	مدت پاسخگویی
		از	تا		
۱	زیست‌شناسی	۱	۴۰	۱	۴۰ دقیقه
۲	فیزیک	۲۵	۶۱	۲۱	۹۵ دقیقه
۳	شیمی	۲۵	۶۶	۶۶	۹۰ دقیقه
۴	ریاضیات	۲۵	۹۱	۹۱	۱۱۵ دقیقه

دوازدهم تجربی

آزمودهای سراسری کاج

ویراستاران علمی	طراحان	دروص
مهدی وارسته - مجید فرهمندپور محدثه کارگرد - مجتبی رضازاد علی عرب - ندا فرهنخی - مینا نظری	سیروس نصیری	ریاضیات
ابراهیم زرهیوش - سامان محمدی نیا ساناز فلاحتی	رضا نظری - علی زراعت پیش پوریا خاتمی - آزاد فلاحت آرمان داداش بیرون - جواد ابدالرول غلامرضا عبدالهی سحر زرافشان - سیحان بهاری	زیست‌شناسی
سجاد صادقی‌زاده مروارید شاهحسینی سارا دانایی کجani	محمد آهنگر - سجاد صادقی‌زاده سید رضا احلاّی - سعید احمدی علیرضا ایبدلخانی - حسین عبدولی‌نژاد	فیزیک
ایمان زارعی - میلاد عزیزی رضبه فرمائی	پریا الفصل	شیمی

آماده‌سازی آزمون

بازبینی و نظارت نهایی: مانا نظری

برنامه‌ریزی و هماهنگی: سارا نظری - مینا نظری

بازبینی دفترچه: بهاره سلیمانی - علیه خادمی

ویراستاران فنی: ساناز فلاحتی - مروارید شاهحسینی - هریم پارساییان - سیده‌سادات شریفی - هریم علیبور

سوپرست واحد فنی: سعیده قاسمی

صفحه‌اواز: فرهاد عبیدی

طراح شکل: ازو گلفر

حروف‌نگاران: مینا عباسی - حدیث فیض‌الهی - فرزاده رجبی - زبایه الطافی - فاطمه میرزایی - سحر فاضلی



فریوشنگاه مرکزی کاج: تهران - خیابان انقلاب
نیشن بازارچه کتاب

اطلاع رسانی: ۰۲۱-۴۲۰۷۳۸۷

نشانی: اینترنتی www.gaj.ir



۴ مطابق شکل، اگر رمز ششمین آمینواسید در رشته الگوی دنای هموگلوبین CAT باشد، آمینواسید والین (Val) به زنجیره پلی‌پیتیدی افزوده می‌شود.



بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) مطابق شکل، اگر رمزه ششمین آمینواسید در رنای پیک هموگلوبین، GUA باشد، آمینواسید والین به زنجیره پلی‌پیتیدی افزوده می‌شود.


۲) مطابق شکل، اگر پادرمزه ششمین آمینواسید در رنای ناقل هموگلوبین، CUU باشد، یعنی رنای ناقل مکمل رمزه GAA در رنای پیک است و در

نتیجه آمینواسید گلوتامیک اسید (Glu) به زنجیره پلی‌پیتیدی افزوده می‌شود.

۳) مطابق شکل، اگر رمز ششمین آمینواسید در رشته رمزگذار دنای هموگلوبین، GTA باشد، یعنی در رشته مقابل (الگو) CAT قرار دارد و در

نتیجه آمینواسید والین به زنجیره پلی‌پیتیدی افزوده می‌شود.

۵) اتصال مالتوز به فعال‌کننده، سبب اتصال آن به جایگاه اتصال فعال‌کننده و آغاز رونویسی می‌شود؛ در نهایت یک رنای پیک و سه نوع رشته پلی‌پیتیدی تشکیل می‌گردد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) تا قبل از اتصال مالتوز به فعال‌کننده، پروتئین فعال‌کننده به دنا متصل نیست.

۲) پروتئین فعال‌کننده، ابعاد کوچک‌تری نسبت به رنیسپاراز دارد.

۳) جایگاه اتصال فعال‌کننده، ابعاد بزرگ‌تری نسبت به راهانداز دارد، علاوه‌بر آن مالتوز به هیچ نوع توالی‌ای در دنا نمی‌تواند متصل شود.

۶) بررسی گزینه‌ها:

۱) و ۲) اگر زوتیپ آندوسپرم به صورت ABB باشد، ال A از والد نر و ال B از والد ماده گرفته شده است؛ در نتیجه حالات مطرح شده ممکن است.

۳) و ۴) اگر آندوسپرم AAB باشد، دگره تکراری (A) که مربوط به کیسه روبانی بوده، باید در یاخته خورش مادر شرکت داشته باشد یعنی ممکن است AA با AB باشد، ولی در گزینه (۴) زوتیپ یاخته خورش به صورت BB ذکر شده که درست نیست.

۷) وقتی احتمال تولد پسر بیمار وجود نداشته باشد، یعنی مادر سالم و خالص ($X^H X^H$) است. پس پدر باید بیمار ($X^h Y$) باشد تا تمام دختران آن‌ها ناخالص ($X^H X^h$) شوند و بتوانند هم پسرانی سالم و هم بیمار به دنیا آورند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) و ۳) مادر سالم ($X^H X^H$ یا $X^H X^h$) قطعاً می‌تواند پسرانی سالم داشته باشد.

۲) اگر احتمال تولد پسر بیمار وجود ندارد، پس مادر سالم و خالص ($X^H X^H$) است و اگر پدر هم سالم باشد، همه دختران هم سالم خالص ($X^H X^H$) می‌شوند و نمی‌توانند دختران هموفیل داشته باشند.

زیست‌شناسی



۱) فقط مورد «الف» صحیح است. منظور صورت سؤال، آنزمیم اتصال دهنده آمینواسید به رنای ناقل است.

بررسی موارد:

(الف) همه پروتئین‌های دن انسان، نقش مهمی در فرآیندهای پاخته‌ای به عهده دارند.

(ب) آنزمیم اتصال دهنده آمینواسید به رنای ناقل دارای سه جایگاه فعل در ساختار خود می‌باشد. یک جایگاه برای اتصال آمینواسید، یک جایگاه برای اتصال رنای ناقل و یک جایگاه برای قرارگیری و تجزیه ATP.

(ج) این آنزمیم همانند دیگر پروتئین‌های تولیدشده توسط رناتن‌های آزاد در سیتوپلاسم از جمله هیستون‌ها در ساختار ریزکیسه قرار نمی‌گیرند.

(د) الگوی ساخت پروتئین‌ها mRNA می‌باشد. دقت کنید که ماده وراثتی، mRNA است، نه DNA.

۲) فقط مورد «ج» صحیح است. امروزه انواعی از مایه‌پنیرها وجود دارد که از گیاهان (بیکاریوت‌ها) و ریزجانداران (پروکاریوت‌ها) به دست می‌آیند.

بررسی موارد:

(الف) آغاز ترجمه پیش از پایان رونویسی، فقط در پروکاریوت‌ها مشاهده می‌شود.

(ب) در پروکاریوت‌ها برخلاف پروکاریوت‌ها هسته وجود ندارد.

(ج) همزمانی ترجمه توسط چندین رناتن از روی یک مولکول رنای پیک در پوکاریوت‌ها همانند پروکاریوت‌ها مشاهده می‌شود.


(د) دنا، رناتها و پروتئین‌ها مولکول‌های مرتبط با زن می‌باشند که از این میان انواع رناتها مستقیماً از روی زن ساخته می‌شوند. در پوکاریوت، گروهی از این رناتها توسط یک نوع آنزمیم رونویسی می‌شوند (در پوکاریوت‌ها سه نوع رنیسپاراز وجود دارد)، اما در پروکاریوت‌ها برخلاف پروکاریوت‌ها، فقط یک نوع رنیسپاراز همه انواع مختلف رناتها را می‌سازد.

۳) در هسته پوکاریوت‌ها، عوامل رونویسی برای شروع و نیز افزایش میزان سرعت و مقدار رونویسی به توالی‌های غیرزنی دنا یعنی راهانداز و توالی افزاینده متصل می‌شوند، نه به توالی زنی.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) نوکلئوتیدهای سدفقاته ریبوزید آزاد به هنگام رونویسی به کار گرفته می‌شوند، بنابراین میزان به کارگیری آن‌ها (سرعت رونویسی) می‌تواند نوعی تنظیم بیان زن حین رونویسی باشد.

(۲) به طور معمول، بخش‌های فشرده فامتن کمتر در دسترس رنیسپاراز قرار می‌گیرند، بنابراین باخته می‌تواند با تغییر در میزان فشرده‌گی فامتن در بخش‌های خاصی، دسترسی رنیسپاراز را به زن مورد نظر تنظیم کند. مطابق شکل، واحدهای نکراری در کروماتین، نوکلوزوم یا هسته‌ن می‌باشد که به صورت کروی شکل هستند.



(۳) مولکول میانجی بین دنا و رناتن، رنای پیک است. اتصال بعضی رناتهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان زن پس از رونویسی است. با اتصال این رناتها، از کار رناتن جلوگیری می‌شود. در نتیجه، عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) جدایی تولیدمثی می‌تواند از نوع دگرمهنه باشد و بدون نیاز به خطای میوزی یا میتوزی اتفاق افتد، علاوه بر آن وقوع انتخاب طبیعی ارتباطی به وقوع خطای میوزی و یا میتوزی ندارد.

(۲) برای جهش شرایط محبیتی خاصی تعریف نشده است. جهش در هر جانداری در هر شرایطی می‌تواند رخ دهد.

(۳) تنها جهش می‌تواند دگرۀ جدیدی در جمعیت ایجاد کند و انتخاب طبیعی دگرۀ جدیدی به جمعیت نمی‌افزاید.

۱۲ در سؤال درباره صفت رنگ بدن بحث شده است که در این مسئله، ال سیاهی بر هر دو ال دیگر بازیست داشته و بین دو ال دیگر رابطه بازیست ناقص وجود دارد. ال سیاهی را S داکستری را K و سفیدی را W در نظر می‌گیریم. اثواب زنوتیپ‌های مورد نظر برای این صفت شامل: SW SK KK .WW KW و SS می‌باشد که از این حالات، ۳ حالت رخنمود سیاه، یک حالت رخنمود سفید، یک حالت رخنمود داکستری و یک حالت تیز حد واسط داکستری و سفید است. موشی با رخنمود سفید دارای زن نمود WW است. موش با زن نمود ناخالص SW KW SW (SK) در آمیزش با موش سفید، در حالتی که یکی از موش‌ها است، نصف زاده‌ها می‌توانند دارای رخنمود سیاه باشند، هم‌چنین در حالتی که یکی از موش‌ها SK است نیز نصف زاده‌ها می‌توانند دارای رخنمود سیاه باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) رخنمود داکستری مربوط به زن نمود خالص (KK) است. از آمیزش این موش با موشی با زن نمود (WW)، تمام زاده‌ها رخنمودی حد واسط دارند.

(۲) موشی با رخنمود داکستری مربوط به زن نمود KK است. از آمیزش این موش با موشی با زنوتیپ خالص (KK و SS و WW) هیچ زاده‌ای دارای رخنمود سفید نیست.

(۴) موش با زن نمود حد واسط دارای زن نمود KW است. این موش در نتیجه آمیزش با موش سیاهی با زن نمود SW، $\frac{1}{4}$ (برخی) از زاده‌های دارای رخنمود سفید هستند.

۱۳ دقت کنید در صورت سؤال ذکر شده است «باخته تخم فقط به دنبال کراسینگ‌اور در هو دو سلول راینده‌گامت باید ایجاد شود».

زن‌هایی که بر روی یک کروموزوم فوار دارند، یعنی $\frac{bc}{bc}$ و $\frac{BC}{BC}$ می‌توانند با انعام کراسینگ‌اور باعث ایجاد گامت‌های جدید و نوترکیب $\frac{Bc}{bC}$ و $\frac{Bc}{Bc}$ شوند.

بنابراین اگر گامت نر (A $\frac{Bc}{Bc}$) و گامت ماده (a $\frac{Bc}{Bc}$) در نظر گرفته شوند (کرم کبد هرمافروdit و خودللاح است)، تخم $\frac{Bc}{Bc}$ Aa قابل تشکیل است.

دقت کنید در مورد گزینه (۲) تنها یکی از گامت‌ها بر اثر کراسینگ‌اور به وجود آمده است.

۱۴ همه موارد صحیح هستند. لاکتوز موجود در محیط به باکتری وارد می‌شود و با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می‌دهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از ایتراتور جدا می‌کند و نیز مانع از اتصال آن به ایتراتور می‌شود. برداشته شدن مانع سر راه، ریسپاراز می‌تواند رونویسی زن‌ها را الجام دهد. محصولات این زن‌ها تجزیه لاکتوز را ممکن می‌کند.

بررسی موارد:

(الف) محصول رنای پیک تولیدشده در اثر فعالیت ریسپاراز، آنژیم‌هایی بروتیپی هستند که در جایگاه فعلی آن‌ها، مولکول لاکتوز به عنوان پیش‌ماده قرار می‌گیرد.

۸ منظور صورت سؤال مردان می‌باشد که نمی‌توانند ناقل بیماری هموفیلی باشند کروموزوم‌های همتا، از لحاظ محل قرارگیری مشابه‌اند و جهش مضاعف‌شده‌گی در بین آن‌ها قابل رخ دادن است که سبب می‌شود تا در یکی از کروموزوم‌های همتا، از یک زن تک‌جایگاهی دو نسخه دیده شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) جهش مضاعف‌شده‌گی در مردان (که هیچ‌گاه نمی‌توانند ناقل هموفیلی باشند)، در بین کروموزوم‌های جنسی قابل رخ دادن نیست. در زنورهای عسل، فقط بعضی از زنورهای حاصل از لقاد (ماده ملکه برخلاف ماده کارگر) قادر به تولید گامت هستند.

(۳) جهش‌های کوچک و برحی جهش‌های بزرگ در کاربوب قلل ردبیلی نیستند.

(۴) در صورتی که یا هم به ارت رسیدن الها بر اثر خطای میوزی (جدانشدن کروموزوم‌های جفت ۱ در آنفاز ۱) باشد، نیازی به آنژیم‌های نوکلار و پیلمار نیست.

۹ با توجه به شکل سؤال، بخش (۱) \leftarrow مولکول دنا و بخش (۲)

\rightarrow پنچ کربنی هستند. هم قند موجود در دنا (دئوکسی‌ریبوز) و هم قند موجود در رنا (ریبوز) مولکول اکسیژن دارد؛ با این تفاوت که ریبوز دارای یک اکسیژن بیشتر از دئوکسی‌ریبوز است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) دقت کنید اگر رشتة رنای در حال ساخت، از نوع ناقل باشد، آن‌گاه می‌تواند بین برحی از مونومرهای آن بیوند هیدروژنی برقرار گردد. رنای پیک فاقد بیوند هیدروژنی میان واحدهای سازنده خود است.

(۲) اگر این فرایند در اندامک‌های دوغشایی یا خانه یوکاریوت یعنی میتوکندری و کلروپلاست رخ دهد، این گزینه در مورد هیچ‌کدام صحیق نمی‌کند.

(۴) هیچ‌کدام از ساختارهای (۱) و (۲) همه‌سایع بازهای آنی را ندارند. در ساختار دنا، باز آنی بوراسیل و در ساختار رنا، باز آنی تیجن مشاهده نمی‌شود.

۱۰ موارد «الف»، «ب» و «ج» عبارت سؤال را به نادرستی تکمیل می‌کنند. نخستین بروتیپی که ساختار آن شناسایی شد، می‌گلوبین است.

بررسی موارد:

الف) بیونوکلوتیدهای واحدهای سازنده رنای در هر سه مرحله آغاز، طویل شدن و پایان با بیوند فسفو دی‌استر به یک دیگر متصل می‌شوند.

ب) دقت کنید که راهنماز زن، جزء توالی تنظیمی می‌باشد و بخشی از زن به حساب نمی‌آید، بنابراین رونویسی از روی آن انجام نمی‌شود و بیوندهای هیدروژنی آن بدون تغییر می‌ماند.

ج) رشتة رنای در حال ساخت ایندا در مرحله طویل شدن (مرحله دوم) از رشتة الکو جدا می‌شود تا دو رشتة دنای قبل راهنماز به یکدیگر متصل شوند و رونویسی ادامه پیدا کند.

د) در مراحل طویل شدن و پایان، رنای در حال ساخته شدن به تدریج از رشتة الکو دنا جدا می‌شود، اما در مرحله اول (آغاز رونویسی)، همه نوکلوتیدهای رونویسی شده از رشتة الکو زن متصل به رشتة الکو باقی می‌مانند.


۱۱ در صورت سؤال به نیروی انتخاب طبیعی و جهش اشاره شده است. انتخاب طبیعی افراد سارکارتر با محیط را برعی‌گزیند و از فراوانی افراد ناسارکار می‌کاهد و جهش نوعی نیروی نصافی است که موجب می‌شود الهای جدید سارکار یا ناسارکار در جمعیت ایجاد شود. جهش با تأثیر بر فرد و انتخاب طبیعی با تأثیر بر جمعیت موجب می‌شوند فراوانی نسبی دگرهای و زنوتیپ‌ها در جمعیت تغییر کنند.

چ) نیتریت موجود در غذاهای نیتریت‌دار نظیر سویس و کالباس، در بدن به ترکیباتی تبدیل می‌شوند که تحت شرایطی قابلیت سلطان زایی دارد، بنابراین مستقیماً موجب سلطان زایی نمی‌شوند.

د) بزرگین در دود سیگار وجود دارد افرادی که دخانیات و سیگار مصرف می‌کنند، به علت تخریب مخاط مژک‌دار تنفسی شان، به سرفهای مکرر متلا هستند. دقت کنید که در سرفه، زبان کوچک برای بستن راه بینی، به سمت بالا حرکت می‌کند.

۱۸ دنا، رنا و پروتئین، مولکول‌های مرتبط با زن (واحدهای سازماندهی اطلاعات و رانی) هستند. ساختار دنا و پروتئین توسط تصاویر حاصل از پرتو ایکس قابل شناسایی می‌باشد. مطابق شکل، نوکلوزوم‌ها ساخته‌هایی کروی شکل و تکراری در فامینه هستند که از دنا و پروتئین‌های هیبتوتی تشکیل شده‌اند.

ترکیبی؛ زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشرگی فامینه هسته، کمتر و به صورت تعددی از رشته‌های درهم است که به آن، فامینه (کروماتین) می‌گویند. هر رشته فامینه دارای واحدهای تکراری به نام هسته‌تن (نوکلوزوم) است. در هر هسته‌تن، مولکول دنا حدود ۲ دور در اطراف ۸ مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.




بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) رنای ناقل (در فرایند ترجمه‌سازی)، بعضی رنایهای کوچک و همچنین دنا می‌توانند با رنای پیک رابطه مکملی (تشکیل پیوند هیدروژنی) برقرار کنند ولی باید دقت کنید که فقط در رتا برخلاف دنا، از نوکلوتیدهای حاوی قندنهای ریبوz استفاده می‌شود.

۳) بیشتر آنزیم‌ها پروتئینی و گروهی نوکلیک اسیدی (رنای راناتی) هستند پروتئین‌ها برخلاف رنای راناتی، از یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه از پلی‌پیتیدها ساخته شده‌اند.

۴) پروتئین‌ها متنوع‌ترین گروه مولکول‌های زیستی از نظر ساختار شمایی و عملکردی هستند که از عنصر C, H, O, N و S تشکیل می‌شوند. عنصر فلور در نوکلیک اسیدها و فسفولیپیدها وجود دارد.

۱۹ ۱) مطابق شکل، در هر دو حالت (۱) و (۲)، رشته‌های رمزنگار دو زن در حال رونویسی متفاوت می‌باشد، ولی در حالت (۱) برخلاف حالت (۲)، راماندار دو زن در نزدیکی هم قرار ندارد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) مطابق شکل در حالت (۱) در بین زن‌های (۱) و (۲)، راماندار مشاهده نمی‌شود ۳) به طور کلی هر زمان رشته‌های رمزنگار دو زن متفاوت از هم باشد، جهت رونویسی نیز در خلاف جهت هم خواهد بود.

۴) در صورتی که این توالی‌ها رمز توالی‌های پایان پروتئین‌سازی باشند، هیچ آمینو اسیدی به رشتة در حال ساخت پلی‌پیتیدی افزوده نمی‌شود.

ب و د) در یاخته‌های پوکاریوئی همانند پوکاریوئی، می‌توان به صورت هم‌زمان تولید چند رنا از روی یک زن را مشاهده کرد. در رابطه با زن آنزیم‌های تجزیه‌کننده لاکتوز، با جدا شدن اپرатор و حرکت رنلبسپاراز متصل به راماندار به سمت زن‌ها، رنلبسپارازهای بعدی به راماندار متصل شده، سپس با حرکت و عبور از روی اپرатор، رونویسی از زن‌ها را انجام می‌دهند.

ج) در رونویسی به جای نوکلوتیدی تی‌مین‌دار، از ربیونوکلوتیدی بوراسیل دار استفاده می‌شود (در ساختار رنا باز آلى T وجود ندارد)، بنابراین مقدار نوکلوتیدهای بوراسیل دار در یاخته کاهش می‌یابد.

۲ دگره ایجادکننده رنگ قرمز، دگره باز است در نتیجه این ذرت دارای یک جایگاه ناچالص و دو جایگاه خالص دارد و توانایی ایجاد ۲ نوع گامت را دارد (هر جایگاه زنی خالص یک نوع و هر جایگاه زنی ناچالص ۲ نوع گامت تولید می‌کند).

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) اگر زن تومود دارای سه جایگاه ناچالص باشد (AaBbCc) و یا دو جایگاه ناچالص و یک جایگاه خالص بازی نهفته (برای مثال AABbCc) باشد، تعداد جایگاه‌های ناچالص آن بیشتر از تعداد جایگاه‌های خالص آن خواهد بود. ذرت دارای سه جایگاه زنی ناچالص ۸ نوع گامت ($2 \times 2 \times 2 = 8$) ایجاد می‌کند و ذرت دارای دو جایگاه زنی ناچالص طی انجام میوز، ۴ نوع گامت ($2 \times 2 = 4$) ایجاد می‌کند.

۳) ذرت دارای دو نوع دگره نهفته دارای دو جایگاه ناچالص و یک جایگاه خالص باز است مثل AABbCc، که این ذرت می‌تواند ۴ نوع گامت ایجاد کند. یا دارای دو جایگاه خالص نهفته و یک جایگاه خالص باز است (مثل AAbbCc) که فقط می‌تواند یک نوع گامت تولید کند.

۴) ذرت دارای سه جایگاه زنی خالص تنها توانایی ایجاد یک نوع گامت را دارد.



۱۶ در جهش دوبار تی‌مین، دو پیوند اشتراکی بین دو رأس مجاور از حلقه‌ای شش‌ضلعی باز آلى تی‌مین ایجاد می‌شود. باز آلى لیتروزون دار دارای ۴ نوع عنصر است (نیتروزن، هیدروزن، اکسیزن و کربن).

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) دو رأس مجاور هم (نه مقابل هم) از هر نوکلوتید در تشکیل این پیوندها شرکت ندارد.

۲) دوبار تی‌مین بر اثر ایجاد پیوند بین نوکلوتیدهای مجلور هم در یک رشته رخ می‌دهد.

۳) در طی جهش دوبار تی‌مین، دو حلقة شش‌ضلعی با هم پیوند ایجاد می‌کنند. نه حلقه‌های پنج‌ضلعی.

۱۷ ۳ موارد «ب» و «د» صحیح می‌باشند.

بررسی موارد:

الف) دوبار تی‌مین، موجب اختلال در عملکرد آنزیم دنبسپاراز می‌شود که توجه داشته باشید این آنزیم می‌تواند دو نوع واکنش را سرعت بخشد زیرا هم فعالیت سپارازی داشته و هم در عمل ویرایش، فعالیت نوکلئازی دارد.

ب) پرتو فراینش، یکی از عوامل جهش‌زای فیزیکی است. زنبور نیز تواسایی تشخیص پرتو فراینش را توسط گیرنده‌های چشم مرکب خود دارد. دقت کنید که زنبور ماده تواسایی بکرایی نیز دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) عامل مالاریا وقتی گوییچه‌های قرمز فردی ناخالص را آلوده می‌کند، آن‌ها داسی شکل هستند و باعث مرگ انگل مالاریا می‌شوند. مرگ انگل با متوقف شدن فعالیت‌های زیستی آن همراه است.

(۲) در افراد ناخالص، در صورت کاهش اکسیژن محیط، گوییچه‌های قرمز داسی شکل می‌شوند. داسی شکل شدن گوییچه‌های قرمز، منجر به کاهش طول عمر آن‌ها و کم خوبی شدید می‌شود در این حالت یاخته‌های بنيادی میلتوئیدی در مغز استخوان تحت تأثیر هرمون اریتروبویوتین چرخه یاخته‌ای را سریع تر انجام می‌دهند تا گوییچه‌های قرمز بیشتری تولید کنند. با افزایش سرعت چرخه یاخته‌ای، زمان هر مرحله از چرخه از جمله زمان G₁ کاهش پیدا می‌کند.

(۳) در زن مربوط به ساخت زنجیره بتای هموگلوبین، نوکلوتید A جایگزین نوکلوتید T می‌شود. این تغییر باعث می‌شود تا در رنای پیک حاصل از این زن، نوکلوتید U (دارای باز تک‌حلقه‌ای) به جای نوکلوتید A (دارای باز دوحلقه‌ای) قرار گیرد، بنابراین تعداد بازهای تک‌حلقه‌ای این رنای پیک نسبت به حالت طبیعی بیشتر است.

۱ ۲۴ هیچ‌کدام از موارد، عبارت سؤال را به درستی تکمیل نمی‌کند.

بررسی موارد:

(الف) مطابق شکل ۱۲ صفحه ۱۲ کتاب زیست‌شناختی (۳)، در تجمع نوکلوتیدی در محل دوراهی همانندسازی، نوکلوتیدهای دارای باز آلی پوراسیل نیز حضور دارند.

(ب) در محلی که دو رشته دنا از هم جدا می‌شوند، دو ساختار Y-مانند به وجود می‌آید که به هر یک از آن‌ها دوراهی همانندسازی می‌گویند. در محل هر دوراهی همانندسازی، فقط یک آنزیم هلیکاز (نه هلیکازها) فعال است.

(ج) در محل دوراهی همانندسازی و پیش از باز شدن دو رشته دنا، پیوند هیدروپونیک همواره بین حلقه شش‌ضلعی بازهای دوحلقه‌ای و تنها حلقه بازهای تک‌حلقه‌ای (که یک حلقه شش‌ضلعی است) برقرار است و هر حلقه شش‌ضلعی دارای نیتروزن از طریق پیوند اشتراکی به حلقه پنج‌ضلعی باز یا قند متصل می‌شود، بنابراین هیچ‌گاه در دوراهی همانندسازی، دو حلقه آلی شش‌ضلعی با پیوند اشتراکی به هم متصل نمی‌شوند.

(د) دقت داشته باشد که ATP و AMP دارای قند ریبوز هستند و نمی‌توانند در ساختار دنا قرار گیرند.

۲ ۲۵ در یوکاریوت‌ها، به هنگام همانندسازی و رونویسی، آنزیم‌های دناسبازار و رناسبازارهای ۱، ۲ و ۳ توانایی استفاده از نوکلوتیدهای سه‌فکنه آدنین دار به عنوان پیش‌ماده را دارند. همه این آنزیم‌ها توانایی افروزدن نوکلوتیدهای سیتوزین دار به رشته پلی‌نوکلوتیدی در حال ساخت را فقط در مقابل یکی از دو رشته دنا دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در یاخته‌های پروکاریوتی، رناسبازارهای ۱، ۲ و ۳ وجود ندارد. فقط یک نوع آنزیم رناسبازار وجود دارد که رونویسی از زن‌های اندوکلولهای رنا را بررهده دارد.

(۲) آنزیم رناسبازار برخلاف دناسبازار هنگام قرارگیری بر روی مولکول دنا، هر دو رشته دنا را دربر می‌گیرد.

(۳) توجه داشته باشید که آنزیم‌های سیپاراز توانایی ایجاد یک پیوند اشتراکی بین قند یک نوکلوتید و گروه فسفات نوکلوتید دیگر را دارند، نه پیوند بین قند - فسفات درون یک نوکلوتید.

۲۰ ۲ برای بیماری هموفیلی دو حالت و برای بیماری کم خوبی داسی شکل نیز سه حالت در نظر گرفته شده است.

بیماری هموفیلی:

حالات اول: مادر بیمار X^HX^H و پدر سالم X^HY → پسر بیمار - دختر سالم و ناخالص

حالات دوم: مادر سالم و خالص X^HX^H و پدر بیمار Y^H → پسر سالم - دختر سالم و ناخالص

کم خوبی داسی شکل:

حالات اول: مادر خالص و سالم و بیمار → پسر و دختر سالم و ناخالص

حالات دوم: مادر خالص و بیمار و پدر ناخالص و سالم → پسر و دختر سالم و ناخالص - پسر و دختر بیمار

حالات سوم: مادر خالص (بیمار) و پدر خالص و سالم → پسر و دختر سالم و ناخالص

۲۱ ۴ در مرحله چهارم آزمایش‌های گریفت، هم باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده با گرما و هم باکتری‌های بدون پوشینه زنده به بدن موش‌ها تزریق شد. در انتها این مرحله از آزمایش و مشاهده باکتری‌های کپسول‌دار زنده در خون و شش‌های موش‌های مرده، معلوم شد که ماده و راتی می‌تواند از یک یاخته به یاخته دیگر منتقل شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در مرحله سوم آزمایش‌های گریفت، تنها از باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده با گرما استفاده شد در مرحله چهارم آزمایش بود که نتایجی برخلاف انتظار گریفت به وقوع پیوست و به جای این که موش‌ها با تزریق باکتری‌های فاقد پوشینه زنده به همراه باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده، زنده بماند، همه آن‌ها مردند.

(۲) در مرحله اول آزمایش‌های گریفت، از باکتری‌های پوشینه‌دار زنده استفاده شد که همه موش‌ها مردند؛ اما در مرحله سوم آزمایشات گریفت، در نتیجه زنده ماندن موش‌ها با وجود تزریق باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده به آن‌ها، این نتیجه حاصل شد که پوشینه به تهایی عامل مرگ موش‌ها نیست.

(۳) در مرحله دوم آزمایش‌های گریفت، تنها از باکتری‌های فاقد پوشینه زنده استفاده شد، اما در مرحله چهارم آزمایش، در نتیجه انتقال صفات و راتی از باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده به باکتری‌های فاقد پوشینه زنده، آن‌ها نوانابی ساخت پوشینه را به دست آورند.

۲۲ ۱ منظور مقایسه طرح غیرحافظتی (طرحی که در دقیقه ۴۰ آزمایشات مزلسون و استال رد شد) و نیمه حافظتی است. در هر دو طرح، رویه‌روی هر نوکلوتید قدیمی یک نوکلوتید جدید قرار می‌گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) در هر دو مدل پیشنهادی، به دلیل این که هر دنای ساخته شده، دارای رشته نوکلوتیدهای جدید است، در صورت وقوع اشتباه، امکان وقوع فرایند ویرایش در هر دو دنای جدید وجود دارد.

(۳) تنها در مدل غیرحافظتی امکان تشکیل پیوند فسفو دی‌استر بین نوکلوتیدهای جدید و قدیمی در یک رشته پلی‌نوکلوتیدی دنا وجود دارد. در مدل نیمه حافظتی، تمامی نوکلوتیدهای یک رشته دنا یا قدیمی و یا جدید هستند.

(۴) در روش حافظتی، در یکی از دنها، هر دو رشته، جدید و در دیگری هر دو رشته، قدیمی هستند، اما در دو طرح مطرح شده در سؤال، در ساختار هر دنای هم نوکلوتیدهای قدیمی و هم نوکلوتیدهای جدید وجود دارند.

۲۲ ۳ افراد ناخالص مبتلا به بیماری کم خوبی داسی شکل، دارای

ژنوتیپ Hb^AHb^S در یاخته‌های هسته‌دار خود (از جمله لنسفوسیت‌های T) هستند. پروتئین هموگلوبین دارای دو عدد زنجیره بتا و دو عدد زنجیره الfa است. فردی که دارای ژنوتیپ Hb^AHb^S است، اگر در شرایط کمبود اکسیژن قرار گیرد، گوییچه‌های قرمز آن به حالت داسی تبدیل می‌شوند. در این فرد، در زنجیره بتای هموگلوبین، شش‌بنی آمینو اسید زنجیره یعنی گلوتامیک اسید، با آمینو اسید والین جایگزین شده است، یعنی تعداد آمینو اسیدهای گلوتامیک اسید در این زنجیره، کمتر از تعداد این آمینو اسید در یک زنجیره بتای هموگلوبین طبیعی است، بنابراین زنجیره بتا در هر هموگلوبین مشکل دارد، نه هر دو.

۲۰ ۱ زنوتیپ $Hb^A Hb^A$ نسبت به کمبود اکسیژن مقاوم، اما نسبت به انگل مالاریا فاقد مقاومت است. در صورتی که مادر بیمار ($Hb^S Hb^S$) و پدر $Hb^A Hb^A$ باشد، همه فرزندان $Hb^A Hb^S$ شده که نسبت به مالاریا مقاوم‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) برای بیمار شدن فرزندان پسر از نظر هموفیلی، بیمار بودن مادر کافی است.
(۳) در صورتی که مادر از نظر گروه خونی Rh ناخالص و گروه خونی Rh پدر نیز منفی باشد، امکان تولد فرزند با گروه خونی Rh منفی وجود دارد.

(۴) در صورتی که نوزادی با زنوتیپ خالص نهفته از نظر بیماری فیل کتونوری، آمینواسید فیل آلتین را دریافت نکند، دچار بروز علاوه‌نمی شود، علاوه‌بر آن نوزاد متولدشده در بدیو تولد حتی اگر مبتلا به PKU هم باشد آسیب مغزی نشان نمی‌دهد.

۲۱ ۲ برای هر یک از صفات گروه خونی ABO و هموفیلی دو حالت وجود دارد. با توجه به هر دو حالت تنها گزینه (۲) به درستی بیان شده است.

$$\begin{array}{c} \text{فرزندان} \\ \text{والدین} \\ \text{گروه خونی} \end{array} \Rightarrow AO \times BO \Rightarrow AB + OO \Rightarrow \text{حالت اول}$$

$$\Rightarrow AB \times OO \Rightarrow AO + BO \Rightarrow \text{حالت دوم}$$

$$\begin{array}{c} \text{همه فرزندان سالم} \\ \text{همه هموفیلی} \end{array} \Rightarrow X^H X^H \times X^H Y \Rightarrow \text{حالت اول}$$

$$\Rightarrow X^H X^h \times X^H Y \Rightarrow \text{حالت دوم}$$

$$\Rightarrow X^H X^H + X^H X^h + X^H Y + X^h Y \Rightarrow \text{پسر هموفیل}$$


بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) با توجه به سالم بودن پدر و مادر از نظر هموفیلی، امکان تولد دختر بیمار وجود ندارد.

(۳) با توجه به فرض سؤال، پسر فاقد کربویوهدیرات B به طور قطعی دارای زنوتیپ AO بوده و خواهرش BO خواهد بود.

(۴) با توجه به صورت سؤال، پسر فاقد کربویوهدیرات B بر روی غشای گویجا قرمز می‌تواند گروه خونی A و یا O داشته باشد، در صورتی که پسر گروه خونی O داشته باشد (حالت دوم)، قطعاً هیچ کدام از فرزندان AB نخواهد شد.

۲۲ ۲ مولکول دنا دارای پیوندهای هیدروزیلی بین نوکلئوتیدهای خود و دارای ساختار ماربیجی می‌باشد. با توجه به شکل، رنای ناقل در ساختار سه‌بعدی خود دارای پیوند هیدروزیلی و ساختار ماربیجی در بخشی از خود می‌باشد. موارد «الف» و «ج» در مورد هر دوی این نوکلئیک اسیدها صحیح است.



بررسی موارد:

الف) به محل اتصال آمینواسید در رنای ناقل، یک آمینواسید متصل می‌شود. آمینواسیدهای موجود در ساختار پروتئین‌های مانند رنابسیاراز و عوامل رونویسی نیز به مولکول دنا (مثلًا در محل رامانداز و افزاینده) متصل می‌شوند.


(ب) این گزینه تنها در مورد مولکول دنا صحیح است که توسط رنابسیاراز همانندسازی می‌کند. آنزیم رنابسیاراز که رونویسی انجام می‌دهد، خاصیت نوکلئازی ندارد.

(ج) رنای دارای رمزه، رنای پیک است. رنای پیک هنگام تشکیل با دنا، پیوند هیدروزیلی برقرار می‌کند. در هنگام ترجمه نیز رنای ناقل با رمزه‌های رنای پیک،

پیوند هیدروزیلی برقرار می‌کند.

(د) این مورد تنها در مورد رنای ناقل صحیح است، زیرا دنای خطي ۲ پیوند کمتر از تعداد نوکلئوتیدها دارد.

۲۶ ۴ همه موارد درست هستند. جایه‌جایی، نوعی از ناهنجاری فامتنی است که در آن قسمتی از یک فامتن به فامتن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فامتن منتقل می‌شود. اگر قسمتی از یک فامتن به فامتن هم‌جا به‌جا شود، آن‌گاه در فامتن همتا، از آن قسمت دو ت Sanchez دیده می‌شود. به این جهش، مضاعف‌شدنی می‌گویند. طبق کنکور، جهش مضاعف‌شدنی نوعی جهش جایه‌جایی است. دگرهای گروه خونی ABO بر روی جفت کروموزوم شماره ۹ قرار دارند.



بررسی موارد:

الف) در بیماری داسی شدن گویجا قرمز، در صورتی که پدر سالم و خالص و مادر خالص و بیمار باشد، امکان تولد پسری مبتلا به بیماری وجود ندارد.

ب) زنوتیپ مادر سالم و خالص برای بیماری‌های هموفیلی و داسی شدن گویجا قرمز به صورت $X^H X^H$ و $Hb^A Hb^A$ است. در صورتی که پدر مبتلا به هر دو بیماری باشد، امکان تولد دختری سالم و خالص وجود ندارد.

ج) در بیماری داسی شدن گویجا قرمز، در صورتی که پدر سالم و خالص و مادر خالص باشد امکان تولد پسری مبتلا به بیماری وجود ندارد.

د) مادر ناخالص برای صفات داسی شدن گویجا‌های قرمز و هموفیلی به صورت $X^H X^h$ و $Hb^A Hb^S$ است. در این حالت پدر هر زنوتیپی داشته باشد، امکان تولد دختری سالم و ناخالص وجود دارد.

۲۹ ۳ منظور یاخته‌های یوکاریوت است که در آن‌ها بعضی رنایهای کوچک مکمل به رنای پیک متصل شده و از کار رسانان جلوگیری می‌کنند، در نتیجه رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می‌شود. در پی اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده، دنا خم می‌شود طول توالی افزاینده از راهانداز کمتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) طبق شکل ۱۴ صفحه ۲۱ کتاب زیست‌شناسی (۳)، دستگاه گلزاری از کیله‌های روی هم قرار گرفته تشکیل شده است؛ این اندامک برخی پروتئین‌های تولیدشده را توسط کوچک‌ترین کیسه خود دریافت می‌کند.

(۲) در هر رنای پیکی که از ۲ن‌های گسته (دارای اینترون و اکترون) رونویسی شود، هر رونوشت توالی‌های اکترون، حداقل با یک رونوشت توالی اینترون در ارتباط هستند.

(۴) در یوکاریوت‌ها، رونویسی در میتوکندری و کلروپلاست، توسط رنابسیاراز پروکاریوتی (اشرشیاکلای) انجام می‌شود و رنابسیارازهای ۱، ۲ و ۳ در آن دخالتی ندارند.

پاسخ دوازدهم تجربی


چ) دقت داشته باشد که در گویجه‌های قرمز علاوه بر کربوهیدرات‌های مربوط به گروه خونی، کربوهیدرات‌های دیگری نیز وجود دارند که توسط آنزیم A به غشا اضافه نمی‌شوند.

د) در گروه خونی O که دارای زنوتیپ ناخالص است، کربوهیدرات‌های غشایی مربوط به گروه خونی در غشای گویجه‌های قرمز فرا نمی‌گیرد.


۲۷ برای هر فرد به منظور تعیین انواع گامتها، باید برای هر صفت با زنوتیپ ناخالص یک نوع و با زنوتیپ ناخالص دو نوع گامت در نظر گرفته شود و پس در هم ضرب شود و نیز حداکثر انواع گامت‌ها را می‌تواند حاصل می‌شود که صفات باز ناخالص در نظر گرفته شوند.

بررسی گزینه‌ها:


(۱) تنوع گامتی در این گزینه، حداکثر ۸ نوع است.




(۲) تنوع گامتی در این گزینه، حداکثر ۴ نوع گامت است.



(۳) تنوع گامتی در این گزینه، حداکثر ۲ نوع گامت است.



(۴) تنوع گامتی در این گزینه، حداکثر ۴ نوع گامت است.



با

۲۸ در مرحله پایان ترجمه و قبل از ورود عوامل آزادکننده به جایگاه A، هیچ نوع پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی‌کدون تشکیل نمی‌شود. آخرين پیوندهای هیدروژنی در پایان مرحله طوبیل شدن در جایگاه A تشکیل می‌شود، علاوه بر آن در فرایند ترجمه، توالی‌هایی قبل از کدون آغاز و بعد از کدون پایان ترجمه نمی‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در مرحله طوبیل شدن، پس از تشکیل پیوند پیشیدی در جایگاه A (تولید آب)، ریبوزوم به اندازه یک کدون (سه نوکلوتید) جایه‌جا می‌شود.

(۲) در مرحله آغاز، پس از اتصال ریبوزوم حاوی متیونین (با آنتی‌کدون UAC) به توالی AUG، ساختار ریبوزوم تکمیل شده و فقط جایگاه P آن اشغال شده است.

(۳) با توجه به صورت سؤال که نیاز شدید باکتری به پروتئین را مطرح می‌کند همزمان با عمل رونویسی، ترجمه نیز صورت می‌گیرد پس می‌توان همزمان با مرحله طوبیل شدن ترجمه، عمل رونویسی و تشکیل پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا را مشاهده کرد.

۲۹ **بررسی گزینه‌ها:**

۱ و ۲) ماهیجه حرکت‌دهنده کره چشم از نوع ماهیجه‌های اسکلتی است. پاخته‌های ماهیجه‌ای پس از تولد تقسیم نمی‌شوند، بنابراین پس از تولد انسین دنباسیاز در هسته پاخته‌های ماهیجه‌ای به صورت فعل وجود ندارد. هر دو گزینه فقط در رابطه با دنای میتوکندری صحیح است.

(۳) با توجه به مطالعه کتاب زیست‌شناختی (۳)، رنای پیک و رنای رناتی، پیوند هیدروژنی بین بازهای آلوی مکمل خود برقرار نمی‌کند. رنای ناقل نیز هم‌مان با رونویسی بین بازهای آلوی مکمل خود پیوند هیدروژنی برقرار نمی‌کند، بلکه بعد از اتمام رونویسی به علت تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای آلوی مکمل خود دو نوع تاخور دگی پیدا می‌کند.

(۴) به تواحی که در مولکول دنا وجود دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف شده، میانه (اینtron) می‌گویند. به سایر بخش‌های مولکول دنا، که رونوشت آن‌ها حذف نمی‌شوند بینه (اگزون) گفته می‌شود همه مولکول‌های رنای دارای رونوشت توالی‌های اینترونی نیستند. رونوشت اگزون و اینtron فقط در رنای‌های پیک (یوکاریوتی) وجود دارد.

۳۲ موارد «الف» و «د» صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف و ب) در صورت عدم وجود کراسینگ‌اور، فرزندانی با

$\text{Zn}^{\text{N}}\text{mod}\text{hah}$ ABC , AbC , $\text{A}^{\text{B}}\text{C}$ و $\text{a}^{\text{B}}\text{C}$ می‌توانند متولد شوند. در

نتیجه مورد «الف» درست و مورد «ب» نادرست است.

ج) چون یکی از والدین تنها دگرها C دارد و والد دیگر تنها دگرها C دارد، فرزندان این زوج حتماً در این صفت ناخالص هستند.

د) در صورت ایجاد کراسینگ‌اور در فرد دارای $\text{Zn}^{\text{N}}\text{mod}$ AbC و بین دگرهای b و B

امکان تولد فرزندی با $\text{Zn}^{\text{N}}\text{mod}$ ABC وجود دارد که فردی کاملاً ناخالص است.

۳۴ موارد «ج» و «د» صحیح هستند. عواملی مانند رانش دگرهای

جهش، انتخاب طبیعی و ... می‌توانند جمعیت‌های کوچک را از تعادل خارج کرده و در گونه‌زایی دگرگیهی مؤثر باشند.

بررسی موارد:

الف) رانش دگرهای و انتخاب طبیعی، با کاهش تنوع، شناس باقی جمعیت در شرایط محیطی مختلف را کاهش می‌دهند.


ب) عاملی مانند رانش، به صورت تصادفی، گروهی از افراد جمعیت را حذف می‌کند. رانش می‌تواند باعث افزایش فراوانی افراد خالص یا ناخالص شود.

ج) این مورد می‌تواند در رابطه با انتخاب طبیعی صدق کند.

د) جهش می‌تواند بدون تغییر در تعداد افراد جمعیت، باعث پیدا شدن ال جدید شود.

۲۵ ذرت‌هایی که فقط در دو جایگاه زنی ناخالص می‌باشند، در

ستون سوم و پنجم قرار دارند. این ذرت‌ها در فاصله بکان از ذرت‌هایی قرار دارند که در هر سه جایگاه زنی خود، دارای زنوتیپ ناخالص (ستون چهارم) می‌باشند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) ذرت‌هایی که فقط در یک جایگاه زنی خالص دارند در ستون سوم و پنجم قرار دارند. این ذرت‌ها در فاصله یکسانی از ذرت‌هایی که در هر سه جایگاه زنی خود، زنوتیپ خالص و نهفته دارند (ستون اول) قرار نگرفته‌اند.

۲) ذرت‌هایی که فقط در یک جایگاه خود، زنوتیپ ناخالص دارند، در ستون‌های دوم، چهارم و ششم قرار دارند. این ذرت‌ها، با ذرت‌هایی که فقط در دو جایگاه زنی خود، زنوتیپ خالص و بارز دارند (ستون پنجم و ششم) فاصله برابر ندارند.

۳) ذرت‌هایی که فقط در دو جایگاه زنی خالص دارند (ستون‌های دوم، چهارم و ششم) با ذرت‌هایی که فقط در یک جایگاه خود، زنوتیپ خالص و بارز دارند (ستون سوم، چهارم و پنجم)، فاصله یکسانی ندارند.

۲۶ همه موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) فرایند رونویسی در بدن انسان درون هسته و میتوکندری صورت می‌گیرد. گویجه‌های قرمز بالغ قادر هسته و میتوکندری هستند.


ب) گویجه‌های قرمز خون صفت گروه خونی ABO را دارند، اما قادر توانایی انجام تقسیم میوز و حتی میتوز هستند.

برای مقایسه بیشینه تکاله دو نوسانگر می‌توان نوشت: ۴۴

$$\begin{aligned} P_{\max} &= mV_{\max} = mA\omega \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow P_{\max} = mA\sqrt{\frac{k}{m}} = A\sqrt{km} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\max_1}}{P_{\max_2}} = \frac{A_1}{A_2} \times \sqrt{\frac{k_1}{k_2} \times \frac{m_1}{m_2}} = 1 \times \sqrt{1 \times \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

در حرکت نوسانی هماهنگ ساده، در یک مدت زمان معین، حداکثر مسافت طی شده زمانی است که نوسانگر حداکثر سرعت را داشته باشد، یعنی در فواصل مساوی و قرینه نسبت به وضع تعادل حرکت کند. پس مدت زمان داده شده را نصف می‌کنیم و در طرفین نقطه تعادل به کار می‌بریم: ۴۵



$$\begin{cases} x_1 = A \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x_2 = -A \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow l = 2A \frac{\sqrt{3}}{2} = A\sqrt{3}$$

دامتنه نوسان این نوسانگر برابر است با: ۴۶

$$L = 6 \text{ cm} \xrightarrow{L=2A} 2A = 6 \Rightarrow A = 3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

می‌دانیم در انتهای پاره خط نوسان ($x = -A$ با $x = A$)، شتاب نوسانگر بیشینه بوده و بزرگی آن برابر است با:

$$a_{\max} = A\omega^2 \Rightarrow 10^2 = 3 \times 10^{-2} \omega^2 \Rightarrow \omega^2 = 4\pi^2$$

حداکثر انرژی پتانسیل کشانی نوسانگر، همان انرژی مکانیکی نوسانگر بوده و از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$U_{\max} = E \xrightarrow{E=\frac{1}{2}mA^2\omega^2} U_{\max} = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^{-2} \times 4\pi^2$$

$$\Rightarrow U_{\max} = 9 \times 10^{-4} \text{ J} = 900 \mu\text{J}$$

در لحظه موردنظر، انرژی پتانسیل کشانی نوسانگر، درصد کمتر از انرژی جنبشی آن است، بنابراین: ۴۷

$$U = (1 - \epsilon)K \Rightarrow U = \frac{1}{4}K \quad (*)$$

$$U + K = E \xrightarrow{(*)} \frac{1}{4}K + K = E$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4}K = E \Rightarrow \frac{5}{4} \times \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \Rightarrow \frac{5}{4}v^2 = v_{\max}^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{2}v = v_{\max} \xrightarrow{v=\pi\sqrt{5}\frac{m}{s}} v_{\max} = \frac{\sqrt{5}}{2} \times \pi\sqrt{5} = \frac{5\pi}{2} \frac{m}{s}$$

$$\frac{v_{\max}}{\omega} = A\omega \xrightarrow{\omega=2\pi f, f=\frac{25}{4}\text{Hz}} A \times 2\pi \times \frac{25}{4} = \frac{5\pi}{2} \Rightarrow A = 10 \text{ cm}$$

$$\xrightarrow{\text{معادله مکان - زمان}} x = A \cos(\omega t) = 10 \cos\left(\frac{5\pi}{2}t\right)$$

بنابراین با توجه به رابطه شتاب نوسانگر داریم:

$$a = -\omega^2 x \xrightarrow{\omega^2 = \frac{25\pi^2}{4}} a = -\frac{625}{4}\pi^2 \times 10 \cos\left(\frac{5\pi}{2}t\right)$$

$$\Rightarrow a = -\frac{125}{4}\pi^2 \cos\left(\frac{5\pi}{2}t\right)$$

در ساختار دوم پروتئین‌ها، در ساختار صفحه‌ای، گروه R هر آمینواسید تقریباً در محل تاخوردگی‌های صفحات مجاور مشاهده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:


(۱) در ساختار اول، آمینواسیدها ساختاری خطی تشکیل داده و نمی‌توانند نسبت به یکدیگر با زاویه قرار گیرند.

(۲) ساختار دوم می‌تواند صرفاً مشکل از صفحه یا مارپیچ باشد؛ نه لزوماً هر دو نوع.

(۳) هر پروتئین واحد ساختار چهارم لزوماً به ترکیبی معدنی متصل نیست.



۱ شکل زیر، مسیر حرکت جسم را در ۱۰/۰ اینتالی نشان می‌دهد ۴۱



$$\frac{T}{4} + \frac{T}{12} = 10/0 \Rightarrow T = 10/2 \text{ s}$$

در ادامه برای محاسبه ثابت فتر به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow 10/2 = 2\sqrt{10} \times \sqrt{\frac{0/5}{k}} \Rightarrow 10/0/9 = \frac{4 \times 5}{k} \Rightarrow k = \frac{200}{9} \text{ N/m}$$

با توجه به معادله مکان - زمان داده شده داریم:


$$x = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \xrightarrow{x = A \cos(100\pi t)} \frac{2\pi}{T} = 100\pi \Rightarrow T = 10/2 \text{ s}$$

$$t_1 = 10/0 \text{ s} \Rightarrow x_1 = A \cos(\pi) = -A$$

$$t_2 = 10/4 \text{ s} \Rightarrow x_2 = A \cos(4\pi) = +A$$

بازه زمانی ۱۰/۰ تا ۱۰/۴ بازه زمانی ۱۰/۲ است.

بنابراین مسیر حرکت نوسانگر مطابق شکل زیر است:



۱ = ۶A : مسافت طی شده توسط نوسانگر

بنابراین تندی متوسط نوسانگر برابر است با:

$$s_{\text{av}} = \frac{1}{\Delta t} \Rightarrow 10/6 = \frac{6A}{10/3} \Rightarrow A = 10/0/2 \text{ m} = 10/2 \text{ cm}$$

بنابراین بزرگی سرعت متوسط نوسانگر در این بازه زمانی برابر است با:

$$|v_{\text{av}}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{A - (-A)}{\Delta t} = \frac{2A}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow |v_{\text{av}}| = \frac{2 \times 10/2}{10/3} = 2 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

بررسی عبارت‌ها:

(الف) مدت زمان هر نوسان کامل برابر دوره نوسان است. (✓)

(ب) بردارهای مکان و شتاب همواره در خلاف جهت هم هستند. (✗)


(ج) مسافت طی شده در هر دوره تناوب، ۴ برابر دامنه، یعنی ۲ برابر طول پاره خط نوسان است. (✗)

(د) تکاله نوسانگر در نقطه تعادل، بیشینه است و در این نقطه نیروی وارد بر نوسانگر، صفر است. (✓)

(ه) هنگامی که نوسانگر به صورت تندشونده حرکت می‌کند، در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است، بنابراین بزرگی نیروی وارد بر آن و بزرگی شتاب حرکت آن در حال کاهش هستند. (✓)

پاسخ دوازدهم تجربی

۵۲ ابتدا با تقسیم محور عمودی نمودار تکانه - زمان بر جرم جسم‌ها، نمودار سرعت - زمان را به دست می‌آوریم.




در ادامه معادله سرعت - زمان دو متحرک را می‌نویسیم:

$$B = a_B = \frac{16}{2} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow v_B = 2t - 16$$

بنابراین در لحظه $t = 2\text{s}$ که سرعت دو متحرک برابر می‌شود، سرعت آن‌ها برابر $\frac{16}{2} = 8\text{m/s}$ است و معادله سرعت - زمان متحرک A برابر باشد:

$$A = a_A = \frac{-12 - (-24)}{2} = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow v_A = 6t - 24$$

بنابراین نمودار سرعت - زمان دو متحرک به صورت زیر تکمیل می‌شود:




با توجه به این‌که دو متحرک از یک مکان شروع به حرکت کردند و $S_1 = S_2$ است، در لحظه $t = 4\text{s}$ هم دو متحرک از یک مکان فرار دارند.

بازه‌ای که دو متحرک در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، بازه $t < 4\text{s} < 8\text{s}$ است که علامت سرعت آن‌ها مخالف هم می‌باشد. در این بازه، متحرک A به اندازه $|S_4|$ در جهت محور X حرکت می‌کند و متحرک B به اندازه $|S_3|$ در خلاف جهت محور X حرکت می‌کند، پس فاصله آن‌ها به اندازه $|S_4| + |S_3|$ افزایش می‌یابد.

$$|S_4| + |S_3| = \frac{8 \times 4}{2} + \frac{24 \times 4}{2} = 16 + 48 = 64\text{m}$$

با توجه به شکل زیر داریم:



از لحظه صفر تا $t = 2\text{s}$ ، تنها نیرویی که در راستای حرکت بر جسم اثر می‌کند، نیروی اصطکاک جنبشی است. بنابراین داریم:

$$F_{\text{net},y} = 0 \Rightarrow F_N = mg = 2 \times 1 = 2\text{N}$$

$$f_k = \mu_k F_N = 0.5 \times 2 = 1\text{N}$$

$$a_1 = \frac{-f_k}{m} = \frac{-1}{1} = -1 \frac{\text{m}}{\text{s}}^2$$

۴۸ ۱ انرژی جنبشی و پتانسیل در یک لحظه هر دو برابر 10mJ هستند، پس انرژی مکانیکی نوسانگر برابر $E = 10 + 10 = 20\text{mJ}$ است.

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \Rightarrow 20 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times (0.2)^2$$

$$\Rightarrow \omega = 100 \Rightarrow \omega = 10\sqrt{10} \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 10\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

بنابراین تعداد نوسان‌های کامل در هر دقیقه برابر است با:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{Hz}$$

$$f = \frac{n}{t} \Rightarrow n = f \cdot t = 5 \cdot 10 = 50$$

۴۹ ۱ فرض کنیم طول نیم‌دایره L باشد مسافت طی شده در

$$1 = s_{\text{av}} \Delta t = 2 / 24\pi \times 10 / 5 = 1 / 62\pi \text{ (m)}$$

$$1 = \frac{1}{4} \times 2\pi L \Rightarrow 1 / 62\pi = \frac{1}{4} \times 2\pi L \Rightarrow L = 2 / 24\text{m}$$

دوره نوسان برابر است با:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 / 24}{9.8}} = 2 \times 1 / 8 = 3 / 8\text{s}$$

تعداد نوسان‌های کامل در هر ساعت برابر است با:

$$T = \frac{t}{n} \Rightarrow 3 / 6 = \frac{3600}{n} \Rightarrow n = 1000.$$

۵۰ ۱ ابتدا بسامد راوبه‌ای طبیعی همه نوسانگرها را محاسبه می‌کنیم:

$$k_1 = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}}, m_1 = 0.1\text{kg} \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} = \sqrt{\frac{10}{0.1}} = \sqrt{100} = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_2 = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}, m_2 = 0.5\text{kg} \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}} = \sqrt{\frac{50}{0.5}} = \sqrt{100} = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_3 = 20 \frac{\text{N}}{\text{m}}, m_3 = 1\text{kg} \Rightarrow \omega_3 = \sqrt{\frac{k_3}{m_3}} = \sqrt{\frac{20}{1}} = \sqrt{20} = 4.5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_4 = 20 \frac{\text{N}}{\text{m}}, m_4 = 2\text{kg} \Rightarrow \omega_4 = \sqrt{\frac{k_4}{m_4}} = \sqrt{\frac{20}{2}} = \sqrt{10} = 3.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_5 = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}, m_5 = 4\text{kg} \Rightarrow \omega_5 = \sqrt{\frac{k_5}{m_5}} = \sqrt{\frac{100}{4}} = \sqrt{25} = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

بسامد راوبه‌ای جسم‌های m_1, m_2, m_3, m_4 با هم برابر است و هر یک از این‌ها را به نوسان وادر کنیم، دو جسم دیگر دچار تشدید می‌شوند.


بسامد راوبه‌ای جسم‌های m_1, m_2, m_3, m_4 نیز با هم برابر است و هر یک از این‌ها را به نوسان وادر کنیم، جسم دیگر دچار تشدید می‌شود.

پس حداقل ۲ جسم و حداقل ۱ جسم دچار تشدید می‌شوند.


۵۱ ۱ با حذف نیروی \bar{F} ، نیروی عمودی سطح کاهش می‌یابد و در

نتیجه اصطکاک کوچک می‌شود، بنابراین جسم با شتاب بیشتری نسبت به حالت اول، به صورت تندشونده پایین می‌رود.

۵۲ نمودار تغییرات تندی بر حسب زمان در پیش آزاد یک جتبراز در هوا به شکل زیر است:



۱ ۵۶ نمودار مکان - زمان را رسم می کنیم.
 $x = 2t^2 - 12t - 22 \Rightarrow x = 2(t-3)^2 - 50$




در بازه زمانی $t < 3s$ ، متحرک به صورت کندشونده از مبدأ محور X دور می شود. تغییرات تکانه در این بازه زمانی برابر است با:

$$\begin{cases} x = 2t^2 - 12t - 22 \\ x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \frac{m}{s^2} \\ v_0 = -12 \frac{m}{s} \end{cases} \Rightarrow v = 4t - 12$$

$$\begin{cases} t = 0: v_0 = -12 \frac{m}{s} \\ t = 3s: v_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \Delta v = 0 - (-12) = 12 \frac{m}{s}$$

$\Delta p = m\Delta v = 0/2 \times 12 = 2/4 \frac{kg \cdot m}{s}$

۳ ۵۷ شب خط واصل دو نقطه از نمودار تکانه - زمان، برابر نیروی متوسط خالص وارد بر جسم در آن بازه زمانی است.



با توجه به این که اندازه این شب در بازه t_1 تا t_2 بزرگ تر است، اندازه نیروی خالص متوسط هم در این بازه بزرگ تر است.

۲ ۵۸ شتاب گرانش در ارتفاع h برابر است با:

$W = mg \Rightarrow F_g = 81 \times g \Rightarrow g = \frac{64}{81} \frac{m}{s^2}$

با مقایسه شتاب گرانش در سطح زمین و ارتفاع h داریم:

$$\frac{g}{g_e} = \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2 \Rightarrow \frac{64}{1} = \left(\frac{6400}{6400 + h} \right)^2$$
 $\Rightarrow \frac{h}{9} = \frac{6400}{6400 + h} \Rightarrow h = 800 \text{ km}$

۱ ۵۹ می دایم شتاب گرانشی در سطح سیاره فرضی X از رابطه

$M_x = \rho_x V_x = \frac{GM_x}{R_x^2}$


$g_x = \frac{GM_x}{R_x^2} = \frac{G\rho_x V_x}{R_x^2} = \frac{G\rho_x \times \frac{4}{3}\pi R_x^3}{R_x^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho_x R_x$

بنابراین برای مقایسه شتاب گرانش در سطح سیاره مورد نظر (X) با سیاره زمین (e) داریم:

$\frac{g_x}{g_e} = \frac{\rho_x}{\rho_e} \times \frac{R_x}{R_e} = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$

چون $a_1 = -5 \frac{m}{s^2}$ است، پس در ۲ ثانیه اول، سرعت متحرک به اندازه $10 \frac{m}{s}$

کاهش یافته و به $20 \frac{m}{s}$ می برسد. از لحظه $t = 2s$ به بعد، نیروی \bar{F} هم به جسم وارد می شود:



سرعت جسم در لحظه $t = 2s$ برابر $20 \frac{m}{s}$ است و در هر ثانیه، سرعت

آن $15 \frac{m}{s}$ کاهش می یابد، پس در لحظه $t = 4s$ ، جسم متوقف می شود. حال باید $f_{s,max}$ را محاسبه کنیم تا ببینیم آیا جسم بعد از توقف می تواند در

جهت F به حرکت خود ادامه دهد یا نه.


$f_{s,max} = \mu_s F_N = 0.8 \times 20 = 16 \text{ N}$

اندازه F f_s بزرگتر است، پس جسم در خلاف جهت محور X برمی گردد:



پس در لحظه $t = 4s$ جسم از حال سکون با شتاب ثابت در خلاف جهت محور X برمی گردد.

در آخر به کمک سطح زیر نمودار t - v داریم:



$S_1 = \frac{(4 + 2) \times 2}{2} = 6 \text{ s}, S_2 = \frac{2 \times 2}{2} = 2 \text{ s}, S_3 = \frac{4 \times 2}{2} = 4 \text{ s}$

$1 = S_1 + S_2 + S_3 \Rightarrow 1 = 12 \text{ m}$

تندی متوسط جسم در ۱ ثانیه اول حرکت برابر است با:

$s_{av} = \frac{1}{\Delta t} = \frac{12}{1} = 12 \frac{m}{s}$

۲ ۵۵ بیشترین نیروی سطح وارد بر جسم برابر است $R_3 = 25 \text{ N}$ در این شرایط نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر آن برابر است با:


$R = \sqrt{f_s^2 + F_N^2} \Rightarrow 25 = \sqrt{f_s^2 + 2^2} \Rightarrow f_s = 15 \text{ N}$

با توجه به این که در دو حالت دیگر، نیروی اصطکاک ایستایی کمتر از 15 N می شود، می توان نتیجه گرفت که $f_{s,max} \geq 15 \text{ N}$ است و در نتیجه داریم:

$f_{s,max} \geq 15 \Rightarrow \mu_s mg \geq 15 \Rightarrow \mu_s \times 2 \times 1 \geq 15 \Rightarrow \mu_s \geq \frac{15}{2}$

پاسخ دوازدهم تجربی

۶۲ شتاب متحرک از لحظه $t=20\text{s}$ منفی بوده و در جهت منفی محور X است. برای محاسبه شتاب متوسط متحرک در این بازه زمانی، به صورت زیر عمل می‌کنیم:



خلاصیت حرفه‌ای: اگر در یک بازه زمانی، نمودار شتاب-زمان مثلثی شکل باشد، شتاب متوسط در آن بازه زمانی برابر با نصف مقدار شتاب بیشینه است. باراین داریم:

$$a_{av} = \frac{1}{2} \times (-v_0) = -\lambda \frac{m}{s^2} \Rightarrow |a_{av}| = \lambda \frac{m}{s^2}$$

۶۳ متحرک A با سرعت ثابت v_0 حرکت می‌کند پس نمودار مکان - زمان آن خطی مورب با شیب v_0 است و در نتیجه گزینه‌های (۱) یا (۳) می‌توانند صحیح باشند. از طرفی چون سرعت دو متحرک هیچ‌گاه منفی نمی‌شود، شیب نمودار مکان - زمان آن ها نیز هیچ‌گاه منفی نیست و گزینه (۲) نمی‌تواند پاسخ این سؤال باشد. با توجه به این توضیحات فقط گزینه (۱) می‌تواند صحیح باشد.


۶۴ مطابق نمودار سؤال، جسم از لحظه پرتاب تا لحظه توقف، مسافت 30m را طی کرده است. باراین داریم:

$$v_0^2 - v_f^2 = 2a\Delta x \Rightarrow 0 - 9^2 = 2a \times 30 \Rightarrow a = -1/25 \frac{m}{s^2}$$

با توجه به قانون دوم نیوتون داریم:
 $a = -\mu_k g \Rightarrow -1/25 = -\mu_k \times 1 \Rightarrow \mu_k = 1/25$

شیمی

۶۵ هر چهار عبارت بیشینه‌داشته در ازتساطع با اوره ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) درست هستند.



بررسی عبارت‌ها:

- در مولکول‌های روغن زیتون و اوره به ترتیب ۶ و ۱ پیوند دوگانه وجود دارد.
- با توجه به فرمول تقریبی بنزین (C_8H_{18}) این عبارت درست است.
- هر مولکول اسلین گلیکول (($\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$)) شامل ۴ جفت الکترون ناپیوندی است.
- اوره همانند عسل در آب حل می‌شود و درستی این عبارت تأیید می‌شود.

۶۶ به جز عبارت نخست، سایر عبارت‌ها درست هستند.

تیر منیزی شامل منیزیم هیدروکسید است.

برای محاسبه حداقلتر مسافت طی شده در آزمایش هم داریم:



$$F_{net_x} = ma \Rightarrow -f_k = ma \Rightarrow -\mu_k mg = ma \Rightarrow a = -\mu_k g$$

$$v^2 - v_0^2 = 2aL \Rightarrow -v^2 = -2\mu_k gl \Rightarrow l = \frac{v^2}{2\mu_k g}$$

$$\begin{aligned} l_x &= l_e \Rightarrow \frac{v^2}{2\mu_k g_x} = \frac{v_0^2}{2\mu_k g_e} \Rightarrow \mu_k g_x = \mu_k g_e \\ \Rightarrow \frac{\mu_k}{\mu_k g_x} &= \frac{g_x}{g_e} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

۶۰ s_{av} یک عدد مثبت است.

از طرف دیگر فقط هنگامی $|v_{av}| = s_{av}$ است که اولاً متحرک روی خط راست در حرکت باشد. ثانیاً در طی حرکت، تغییر جهت ندهد، به عبارت دیگر همواره $|s_{av}| \geq v_{av}$ است.

بررسی گزینه‌ها:

(۱) اگر $\bar{v}_{av} = s_{av}$ باشد، متحرک بدون تغییر جهت در سوی مثبت محور X در حرکت است. (x)

(۲) اگر $\bar{l} = -s_{av}$ باشد، متحرک بدون تغییر جهت در جهت منفی محور X در حرکت است. (x)

(۳) همواره $|s_{av}| \geq |v_{av}|$ است و نامساوی مطرح شده در این گزینه هیچ‌گاه برقرار نیست. (x)

(۴) اگر $\bar{l} = -s_{av}$ باشد، به خاطر برابری بزرگی آن‌ها متحرک الزاماً تغییر جهت نخواهد داد. (✓)

۶۱ ابتدا X را محاسبه می‌کنیم:

$$|v_{av}| = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{|x_e - x_s|}{\Delta t} \Rightarrow x_e = 26\text{m}$$

مسافت طی شده و تندی متوسط برابر است با:

$$1 = 56 - 36 + |-56| = 76\text{m}$$

$$s_{av} = \frac{1}{\Delta t} = \frac{76}{\Delta t} = 9/5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۶۲ سرعت متحرک هنگام عبور از مکان‌های $X = 36\text{m}$ و $X = 76\text{m}$ برابر است با:

$$\begin{cases} t = 0 \Rightarrow x = 16\text{m} \Rightarrow v_s = \sqrt{x_s} = \sqrt{16} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ x = 76\text{m} \Rightarrow v = \sqrt{76} = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases}$$

زمان رسیدن متحرک به مکان $X = 36\text{m}$ برابر است با:

$$\Delta x = \frac{v + v_s}{2} \times \Delta t \Rightarrow 36 - 16 = \frac{12 + 4}{2} \times \Delta t \Rightarrow \Delta t = 2\text{s}$$

دقت گنید؛ با توجه به معادله $v = \sqrt{2X}$ و مقایسه آن با رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت، می‌توان فهمید که حرکت با شتاب ثابت انجام شده است.


$$\text{pH} = 4/1 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-4/1} = 10^{-4-5} = (10^{-2})^2 \times 10^{-5}$$

$$= 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$? \text{mol HNO}_3 = \epsilon L \times 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 4 \times 10^{-5} \text{ mol HNO}_3$$



$$\frac{0.022 \text{ g N}_2\text{O}_5 \times \frac{\text{P}}{100}}{1 \times 10 \text{ L}} = \frac{4 \times 10^{-5} \text{ mol}}{2} \Rightarrow ? \text{P} = 7.81$$




$$\frac{50 \text{ g} \times \frac{57/2}{100} \times \frac{10}{100}}{2 \times M} = \frac{1/4 \text{ mol}}{1} \Rightarrow M = 226 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{C}_n\text{H}_{(n+1)}\text{COOK}: 226 \Rightarrow 12(n+1) + 2n + 1 + 32 + 39 = 226$$

$$\Rightarrow n = 18$$

بنابراین فرمول صابون $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{COOK}$ بوده و شمار اتم‌های کربن در فرمول آن برابر با ۱۹ است.

۲ ۷۵ به جز نمودار pH بر حسب غلظت H^+ سایر نمودارها درست رسم شده‌اند. نمودار موردنظر به صورت زیر است:



۲ ۷۶ عبارت‌های دوم و سوم درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست.

* امروزه پاک‌گننده‌های غیرصابونی را از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می‌کنند.

* سال‌ها قبل از ارائه مدل آریوس، شیمی‌دان‌ها با برخی ویرگی‌های اسیدها و بازارها و اکتشاف میان آن‌ها آشنا بودند.

۲ ۷۷ شمار مول‌های H^+ و OH^- را در هر کدام از محلول‌ها به دست می‌آوریم:

$$\text{pH} = 1/2 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1/2} = 10^{-2-2} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$? \text{mol H}^+ = 2 \times 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 1/2 \text{ L} = 10^{-4} \text{ mol H}^+$$

$$? \text{mol OH}^- = 1/2 \text{ L} \times [\text{Ba}(\text{OH})_2] \times 2 = 1/2 \text{ L} \times 1/2 \text{ mol} \times 2$$

$$= 2 \times 10^{-4} \text{ mol OH}^-$$

جون شمار مول‌های H^+ بیشتر از OH^- است، محلول خاصیت اسیدی دارد.

$$[\text{H}^+]_{\text{بیشتر}} = \frac{(10^{-4}) - (2 \times 10^{-4})}{(1/4 + 1/2)} = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$


$$\text{pH} = -\log(10^{-4}) = -[\log 10 + \log 10^{-4}]$$

$$= -[4 \log 2 - 4] = 2/1$$

۱ ۶۸ با توجه به وجود ۳ پیوند دوگانه در حلقة بنزنی، می‌توان نتیجه گرفت که زنجیر هیدروکربنی شامل یک پیوند دوگانه است:




$$\frac{\text{جرم}}{\text{O}} = 5 \Rightarrow \frac{12(n+6)}{2 \times 16} = 5 \Rightarrow n = 14$$



$$14 + 27 + 6 + 4 + 1 + 3 + 1 = 56$$



۴ ۶۹



مطلوب معادله‌های بالا، اگر غلظت یون هیدروکسید در محلول شامل سه برابر غلظت یون هیدروکسید در محلول دیگر است، می‌توان نتیجه گرفت که شمار مول‌های BaO ، سه برابر شمار مول‌های K_2O بوده است:

$$\frac{a}{b} = \frac{3 \times 152}{1 \times 94} = 4/88$$

$$\text{pH} = 2/7 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2/7} = 10^{-2-4} = 2 \times 10^{-4}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Rightarrow 4 \times 10^{-4} = \frac{(2 \times 10^{-4})(2 \times 10^{-4})}{M - (2 \times 10^{-4})}$$

$$\Rightarrow M - (2 \times 10^{-4}) = 10^{-4} \Rightarrow M = 3 \times 10^{-4}$$

$$? \text{mol HA} = 3 \times 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 8 \text{ L} = 0.024 \text{ mol HA}$$

۴ ۷۱ تفاوت غلظت مولی OH^- را در دو حالت حساب می‌کنیم.

$$\text{pH} = 12/4 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12/4} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-4}$$

$$= \frac{1}{10^{12/4}} \times \frac{1}{10^{12/4}} = \frac{1}{10^2} = 0.01 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 12 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-4} = 0.01 \text{ mol.L}^{-1}$$

تفاوت غلظت مولی OH^- در دو حالت برابر با 10^{-4} مول بر لیتر است.



$$\text{mg} = \frac{1/15 \text{ mol.L}^{-1} \times 0.4 \text{ L KOH}}{1 \times 226} \Rightarrow m = 16/2 \text{ g}$$

۲ ۷۲ کافیست غلظت H^+ را در چهار محلول حساب کرده و با هم مقایسه کنیم. هر محلولی که غلظت H^+ آن بیشتر باشد، سریع‌تر باسوار می‌زیزیم و اکتشاف می‌دهد.

بررسی گزینه‌ها:

$$1) \text{pH} = 2/1 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2/1} = 10^{-2-4} = (10^{-2})^2 \times 10^{-4}$$

$$= 10^{-4} \text{ M}$$

$$2) [\text{H}^+] = a.M = 0.025 \times 0.026 = 6 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$3) [\text{HNO}_3] = \frac{18.9 \times 10^{-2} \text{ g} \times \frac{\text{mol}}{63 \text{ g}}}{4 \text{ L}} = 1/5 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$4) [\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{(\text{چتالی محلول})(درصد جرمی)}{\text{CH}_3\text{COOH}} \times \frac{\text{جرم مولی}}{\text{جرم مولی}}$$





$$= \frac{10 \times 0.5 \times 1}{60} = \frac{1}{12} \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = a.M = 0.015 \times \frac{1}{6} = 1/25 \times 10^{-4} \text{ M}$$

پاسخ دوازدهم تجربی


۱ هر چهار عبارت پیشنهاد شده درست هستند.

و اکشن های انجام شده در فرایند زنگ زدن آهن در زیر آمده است:



با توجه به معادله های بالا، درستی سه عبارت نخست تأیید می شود.
در ارتباط با عبارت آخر باید گفته، یون هیدرونیوم محیط واکنش را اسیدی
می کند و E° کاهش اکسیژن در محیط اسیدی بیشتر بوده و موجب افزایش
رسخت و واکنش می شود.


۸۵ در ساختار داده شده ۴ نوع اتم کریں با عدد اکسایش مختلف
+ واحد دایر: -۲، -۱، صفر و ۱



۸۶ ۳ معادله تیم و اکنش‌های مورد تظر به صورت زیر است:






اگر ضرایب بیم و اکتسن کاتالوگ را در عدد ۲ ضرب کنیم، شمار الکترون‌های مبادله شده یکسان خواهد شد و می‌توان تناسب زیر را نتیجه گرفت:



$$\frac{1\text{kg Mg}}{1 \times 14} = \frac{x \text{kg CO}_2}{1 \times 44} \Rightarrow x = 2.14 \text{kg CO}_2$$

۸۷ ۳ به جز عبارت آخر، سایر عبارت‌ها درست هستند.


معادله موارنه شده نیم و اکنش های آندی و کاندی به همراه واکنش کلی در زیر
آمده است:



$$\text{emf} = E^{\circ}_{\text{cell}} - E^{\circ}_{\text{solution}} = 1.19 - (-0.19) = 1.38 \text{ V}$$

توجه کنید که گویند اکسید ترکیب PbO_2 یا همان سرب (IV) اکسید است.

۸۸ ۱ فقط عبارت سوم درست است:



بررسی عبارت‌های نادرست:

• سلول موردنظر در صنعت برای تهیه فلز سدیم به کار می‌رود.

* معادله تیم واکنش کاتدی به صورت $\text{Na}^+(l) + e^- \rightarrow \text{Na}(l)$ است.

- افزودن مقداری **گلسمیم** کلرید باعث می شود تا سدیم کلرید در دمای پایین تری ذوب شود.

Telegram: @konkur_in

۳ ۹۵

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - f(\infty)}{\tau(x - \infty)} = \frac{1}{\tau} f'(\infty) = \frac{1}{\tau} \times \frac{1}{1+1} = \frac{1}{\tau}$$

$$b = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\infty) - f(\infty + h)}{\tau h} = -\frac{1}{\tau} f'(\infty) = -\frac{1}{\tau}$$

$$\frac{a}{b} = -\tau$$

$$-1 < \tau < 1 \Rightarrow \tau^2 + \tau x < 0 < \tau x + 1.$$

۱ ۹۶

$$\begin{cases} x^2 + \tau x < 0 \\ \tau x + 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + \tau x - 0 < 0 \Rightarrow -\tau < x < 0 \\ x > -1 \end{cases}$$

$$\cap \rightarrow -1 < x < 0 \xrightarrow{x \in \mathbb{Z}} x = 0$$

$$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow (gof)(x) = g(0) = \tau^0 = 1$$

۳ ۹۷


$$x \notin \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) = -1 \Rightarrow (gof)(x) = g(-1) = \tau^0 = 1$$

بنابراین $(gof)(x) = 1$ است.دو راه تناوب تابع f برابر ۲ است، بنابراین:

$$f(123/25) = f(2 \times 41 + 0/25) = f(0/25) = \frac{1}{1/25} = \frac{100}{125} = \frac{4}{5} = 0.8$$

نمودار تابع را رسم می‌کنیم.

$$f(x) = \begin{cases} (x - \tau)(x - 2) & x \geq 2 \\ -(x - \tau)(x - 2) & x < 2 \end{cases}$$



ملاحظه می‌کنید که نمودار f در بازه $[2, 3]$ اکیداً لزوی و بردا (ان) است.

$$y = (x - \tau)(x - 2) = (x^2 - \tau x + 2\tau) = (x - \tau)^2 - 1$$

$$\Rightarrow 1 + y = (x - \tau)^2 \Rightarrow |x - \tau| = \sqrt{1 + y} \Rightarrow \tau - x = \sqrt{1 + y}$$

$$\Rightarrow x = \tau - \sqrt{1 + y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \tau - \sqrt{1 + x} \quad -1 \leq x \leq 0$$

۱ ۱۰۰

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{[-x] \cos \tau x}{\sqrt{(\sin x - \cos x)^\tau}} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-(\cos^\tau x - \sin^\tau x)}{|\sin x - \cos x|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\sin x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^+} (\cos x + \sin x) = \left(\frac{\sqrt{\tau}}{\tau} + \frac{\sqrt{\tau}}{\tau} \right) = \sqrt{\tau}$$

۱ ۸۹ هر چهار عبارت پیشنهاد شده تادرست هستند.

نیمه‌واکنش‌های آندی و کاتندی در سلول آنکاری، هر دو مربوط به فلزی هستند که قرار است نقش روکش‌دهنده را ایفا کند.

بررسی عبارت‌ها:

- فلز روکش (M) در نقش آند سلول بوده و باید به قطب مشتث بازی وصل شود.
- نمک فلز M باید محلول در آب باشد.


• بیشتر یا کمتر بودن E فلز M در مقایسه با فلز دیگر، هیچ اهمیتی ندارد.

• جریان الکترون در مدار خارجی از سمت فلز M به سمت فلز دیگر است.


۲ ۹۰ به جز عبارت تختست، سایر عبارت‌ها درست هستند.

در این سلول برای انجام واکنش اکسایش - کاهش از نور بپره می‌برند.

معادله نیمه‌واکنش‌های آندی و کاتندی در زیر آمده است:



$$E^\circ = -0.84\text{V}$$



$$E^\circ = -0.83\text{V}$$



۴ ۹۱

$$f(\tau x - 1) > f(\tau - \tau x^\tau) \xrightarrow{\text{اکیدا صعودی}} \tau x - 1 > \tau - \tau x^\tau$$

$$\Rightarrow \tau x^\tau + \tau x - \tau > 0 \Rightarrow x < -\frac{\tau}{\tau} \text{ یا } x > 1 \quad (1)$$

چون دامنه مقادیر مشتث است، پس

$$\tau - \tau x^\tau > 0 \Rightarrow x^\tau < 1 \Rightarrow -\sqrt{\tau} < x < \sqrt{\tau} \quad (2)$$

اشتراک (1)، (2) و (3) جواب مسئله است.

$$(1) \cap (2) \cap (3) \Rightarrow x \in (-\sqrt{\tau}, \sqrt{\tau})$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (ax + b) = 0 \Rightarrow a + b = 0 \Rightarrow b = -a$$

۴ ۹۲

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax - a}{x - \sqrt[3]{x}} = 1 \Rightarrow a \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - \sqrt[3]{x}} \times \frac{x^\tau + x\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x}^\tau}{x^\tau + x\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x}^\tau}$$

$$= a \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \times \tau}{x^\tau - x} = a \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tau(x - 1)}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{\tau}{\tau} a = 1 \Rightarrow a = \frac{\tau}{\tau}$$

$$\lim_{x \rightarrow \tau^+} \frac{a - 1}{\tau ax - \tau} = \lim_{x \rightarrow \tau^+} \frac{-\frac{1}{\tau}}{\tau x - \tau} = \frac{-\frac{1}{\tau}}{\tau} = -\infty$$

$$f(\tau) = \tau, f'(\tau) = \tau$$

۴ ۹۳

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau h}{f^\tau(\tau + h) - f^\tau(\tau)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(\tau + h) - f(\tau)} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau}{f(\tau + h) + f(\tau)}$$

$$= \frac{1}{f'(\tau)} \times \frac{\tau}{2f(\tau)} = \frac{1}{2} \times \frac{\tau}{2 \times \tau} = \frac{\tau}{4}$$

۲ ۹۴ در نقطه E طول مشتث، عرض منفی و تشیب خط مماس $xf(x)f'(\tau)$ خواهد بود.مشتث است، بنابراین $<xf(x)f'(\tau)>$

پاسخ دوازدهم تجربی

$$f(\cos x) = \tau \cos^{\tau} x - 1 = \cos \tau x$$

۲ ۱۰۹

$$(f \circ f)(\cos x) = \tau \cos^{\tau} \tau x - 1 = \cos \tau^2 x$$

$$(f \circ f)(\cos x) = \cos x \Rightarrow \cos \tau^2 x = \cos x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tau x = \tau k\pi + x \\ \tau x = \tau k\pi - x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\tau k\pi}{\tau - 1} \\ x = \frac{\tau k\pi}{\tau + 1} \end{cases}$$

۱ ۱۱۰

$$\frac{\cot \alpha - \tan \alpha}{\cot \alpha + \tan \alpha} = \frac{1}{\tau^2} \Rightarrow \frac{\tau \cot \tau \alpha}{\sin \tau \alpha} = \frac{1}{\tau^2} \Rightarrow \cos \tau \alpha = \frac{1}{\tau^2}$$

$$\tan \tau \alpha = \frac{\tau^2}{1} \quad \text{در ناحیه اول است}$$

۳ ۱۱۱

با توجه به نمودار $f(x) = (x-1)(x-\tau)(x-\Delta)$ خواهد بود.
 $f(\tau) = 1 \times (-1) \times (-\tau) = \tau$

۳ ۱۱۲

$$f(-1) = \tau \Rightarrow -a + 1 - \tau = \tau \Rightarrow a = -\lambda$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{x^{\tau} + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^{\tau}}{x^{\tau}} = a = -\lambda$$

$$f(f(x)) = \tau - |\tau - (\tau - |\tau - x|)| = \tau - |\tau - x| = f(x) \quad ۱ ۱۱۳$$

$$(f \circ f \circ f)(x) = f(x)$$

$$f(x) = \log_{\frac{1}{\tau}} x \quad \text{دو تابع نزولی اکید هستند، بنابراین} \quad ۴ ۱۱۴$$

نزولی اکید خواهد بود.

$$f(1+x) < f(\tau x - \tau) \xrightarrow{\text{نزولی اکید}} 1+x > \tau x - \tau$$

$$\Rightarrow \tau x < \Delta \Rightarrow x < \frac{\Delta}{\tau}$$

از طرفی $D_f = (0, +\infty)$ است، بنابراین:

$$\begin{cases} 1+x > 0 \Rightarrow x > -1 \\ \tau x - \tau > 0 \Rightarrow x > \frac{\tau}{\tau} \end{cases}$$

اشتراع جواب‌های به دست آمده با دامنه بازه $(-\frac{1}{\tau}, \frac{\Delta}{\tau})$ است.

$$4 \quad \text{باید تابع ثابت باشد، بنابراین ضرایب } X^{\tau}, X^{\tau-1} \text{ و } X \text{ باید صفر باشند.}$$

$$1+m=0 \Rightarrow m=-1$$

$$m=-1 \Rightarrow f(x) = (x+1)^{\tau} - (x-1)^{\tau} + n(x+1)^{\tau} + k(x+\tau)$$

$$\Rightarrow f(x) = (\tau x^{\tau} + \tau) + n(x+1)^{\tau} + k(x+\tau)$$

$$\tau + n = 0 \Rightarrow n = -\tau$$

$$n = -\tau \Rightarrow f(x) = (\tau x^{\tau} + \tau) - \tau(x+1)^{\tau} + k(x+\tau)$$

$$\Rightarrow f(x) = \tau - \tau(\tau x + 1) + k(\tau x + 1)$$

$$-\tau^2 + k = 0 \Rightarrow k = \tau^2 \Rightarrow f(x) = \tau - \tau + \tau^2 = \tau^2$$

$$f(1) + f(-1) = \tau^2 + \tau^2 = 2\tau^2$$

$$\lim_{x \rightarrow \tau^-} \frac{|x| - [-x] - \tau k - 1}{-\tau x^{\tau} + x^{\tau} + \tau x + \lambda} = \lim_{x \rightarrow \tau^-} \frac{\tau - (-\tau) - \tau k - 1}{(\tau - \tau)(-\tau x^{\tau} - \tau x - \tau)} = +\infty$$

$$\Rightarrow \frac{\tau - \tau k}{\tau} = +\infty \Rightarrow \tau - \tau k > 0 \Rightarrow k < \frac{\tau}{\tau}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (ax + b) = 0 \Rightarrow a + b = 0 \Rightarrow b = -a \quad ۳ ۱۰۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-1)}{\sqrt[\tau]{x-1}} = a \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[\tau]{x^{\tau}} - 1)(\sqrt[\tau]{x^{\tau}} + \sqrt[\tau]{x} + 1)}{\sqrt[\tau]{x-1}} = \tau$$

$$\Rightarrow \tau a = \tau \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ab(x+1)^{\tau}}{x \sqrt[\tau]{x^{\tau} + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^{\tau}}{x |\tau x|} = \frac{1}{\tau}$$

۳ ۱۰۳

$$\tau \sin x = \sqrt[\tau]{\sin x} \Rightarrow \tau \sin x = \sqrt[\tau]{\sin x} \Rightarrow \tau \sin x = \sqrt{\sin x}$$

$$\frac{\sin x - A}{\tau} \rightarrow \tau A = \sqrt{A} \Rightarrow \tau A^{\tau} - A = 0 \Rightarrow A(\tau A - 1) = 0$$

$$\begin{cases} A = 0 \Rightarrow \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \\ A = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \sin x = \frac{1}{\tau} \end{cases}$$

۳ ۱۰۴

$$y = \frac{1 + \cos(\tau - \tau x)}{\tau} + \cos(\tau - \tau x) = \frac{1}{\tau} + \frac{\tau}{\tau} \cos(\tau - \tau x)$$

$$\Rightarrow T = \frac{\pi}{|\tau|} = \frac{\pi}{\tau}$$

$$f(x) = a + \frac{1}{\tau} \sin \tau bx \Rightarrow a + \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau} \Rightarrow a = -\frac{1}{\tau} \quad ۲ ۱۰۵$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\tau} \sin \tau bx \Rightarrow \min(f) = -\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau} = -\frac{2}{\tau}$$

$$\min\left(\frac{-\tau}{\Delta + f(x)}\right) = \frac{-\tau}{\Delta - \frac{2}{\tau}} = -\frac{1}{\tau}$$


$$m_L = f'(a) = \frac{\tau - 0}{a + \tau a} = \frac{1}{a} \quad ۱ ۱۰۶$$

$$L: y = \frac{1}{a} x + \tau \Rightarrow f(a) = \tau$$

$$af'(a)f(a) = a \times \frac{1}{a} \times \tau = \tau$$

۱ با فرایند زیر، نمودار $f(\tau x - 1)$ را رسم می‌کیم.

$$f(x) \rightarrow f(x-1) \rightarrow f(\tau x - 1)$$



$$xf(\tau x - 1) \geq 0 \Rightarrow x \in [-\frac{1}{\tau}, 0] \cup [\frac{1}{\tau}, 1] \Rightarrow a + b + c = \frac{\tau}{\tau}$$

$$-\frac{1}{\tau} \sin^{\tau} \tau x = 1 - \frac{\tau}{\tau} \sin^{\tau} \tau x + \frac{1}{\tau} \Rightarrow \sin^{\tau} \tau x = 1 \quad ۲ ۱۰۸$$

$$\sin^{\tau} \tau x = \sin^{\tau} \frac{\pi}{\tau} \Rightarrow \tau x = k\pi \pm \frac{\pi}{\tau} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{\tau} \pm \frac{\pi}{\tau}$$

نماینده نقاط $\frac{k\pi}{\tau} \pm \frac{\pi}{\tau}$ مطابق هستند.