




مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک (۳)
تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۲	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحات: ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج از کشور در نوبت دی ماه ۱۴۰۲			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.

ردیف	ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	۱	در هر قسمت، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و به پاسخ برگ انتقال دهید: الف) یکای شتاب متوسط در SI، (متر بر مربع ثانیه - متر در مربع ثانیه) است. ب) نمودار مکان - زمان در حرکت با سرعت ثابت، به شکل (سهیمی - خط راست) است. پ) در حرکت با شتاب ثابت، اختلاف جایه جایی در دو ثانیه متوالی برابر (سرعت - شتاب) متحرک است. ت) در حرکت بر خط راست و بدون تغییر جهت، مسافت پیموده شده (برابر با - بیشتر از) جایه جایی است.	۱
۲	۲	نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. الف) در چه لحظه ای جهت حرکت متحرک تغییر می کند؟ ب) در کدام بازه زمانی حرکت متحرک تندشونده با شتاب منفی است? پ) چرا در بازه زمانی $t_۱$ تا $t_۳$ جایه جایی متحرک برابر صفر است؟	۰/۲۵
۳	۱/۲۵	گلوله ای را در شرایط خلا از ارتفاع معینی رها می کنیم. اندازه سرعت متوسط گلوله در ثانیه سوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2$)	۱/۲۵
۴	۱/۲۵	درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت های (د) یا (ن) مشخص کنید. الف) نیروهای کشش و واکنش همواره به دو جسم وارد می شوند و هم نوع اند. ب) وزن یک جسم بر خلاف جرم آن، به مکان آن جسم بستگی ندارد. پ) نیروی عمودی سطح، ناشی از تغییر شکل سطح تماس دو جسم است. ت) ضریب اصطکاک ایستایی به عامل هایی مانند جنس سطح تماس دو جسم، میزان صافی و زبری آن ها بستگی ندارد. ث) مکعب دوره گردش ماهواره به دور زمین، متناسب با مربع فاصله ماهواره از مرکز زمین است.	۱/۲۵
۵	۱/۵	در شکل زیر، جسم ۴ کیلوگرمی با تندي ثابت رو به پایین در حرکت است. با رسم نیروهای وارد بر جسم، اندازه \vec{F} را حساب کنید. ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2$)	۱/۵
۶	۰/۵	گلوله ای به جرم $g = ۲۰ \text{ kg}$ با تکانه $F = ۰/۰۸ \text{ N}$ در حال حرکت است. انرژی جنبشی گلوله چند زول است؟	۰/۵
		ادامه سوالات در صفحه دوم	


مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک (۳)
تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۲	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحات: ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج از کشور در نوبت دی ماه ۱۴۰۲			

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
۷	۰/۷۵	یک تلسکوپ فضایی در ارتفاع تقریبی ۱۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین به دور زمین می‌چرخد. اندازهٔ شتاب گرانشی در این فاصله، چند برابر اندازهٔ شتاب گرانشی در سطح زمین است؟ ($R_e = ۶۴۰۰ \text{ km}$)
۸	۱/۲۵	به پرسش‌های زیر، پاسخ کوتاه دهید: الف) در حرکت هماهنگ ساده سامانه وزنه - فنر، بسامد زاویه‌ای چه رابطه‌ای با ثابت فنر دارد؟ ب) کدام نوع امواج برای انتشار، احتیاج به محیط مادی دارد؟ پ) در یک دورهٔ تناوب، مسافتی که هر جزء محیط انتشار موج طی می‌کند، چند برابر دامنهٔ نوسان آن است؟ ت) بسامدی که گوش انسان از صوت درک می‌کند، چه نام دارد؟ ث) وقتی چشمۀ صوتی از ناظر ساکن دور می‌شود، بسامدی که ناظر می‌شنود، چگونه تغییر می‌کند؟
۹	۰/۷۵	معادلهٔ حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SI به صورت $x = ۰/۰۴ \cos \frac{\pi}{4} t$ است.
	۰/۵	الف) دامنه و دورهٔ تناوب نوسانگر را تعیین کنید. ب) در چه زمانی پس از لحظهٔ صفر، برای سومین بار انرژی جنبشی نوسانگر به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟
۱۰	۰/۷۵	نمودار جایی - مکان دو موج صوتی A و B که در یک محیط منتشر شده‌اند، به صورت مقابل است. دامنه، بسامد و تندی انتشار این دو موج صوتی را با هم مقایسه کنید. 
۱۱	۰/۵	دورهٔ آونگ ساده‌ای ۲ ثانیه است. طول این آونگ چقدر است؟ ($\pi^2 \approx g$)
۱۲	۰/۷۵	کمترین فاصله بین شما و یک دیوار بلند برای آن که پژواک صدای خود را از صدای اصلی تمیز دهید، برابر ۱۷ m است. تندی انتشار صوت در هوا چند متر بر ثانیه است؟
۱۳	۱	در شکل زیر، پرتوی فرویدی که شامل نورهای قرمز و آبی است، از شیشه وارد هوا شده است. با ذکر دلیل مشخص کنید کدام یک از دو پرتو (۱) و (۲)، قرمز و کدام یک آبی است? 
۱۴	۰/۷۵	شکل رو به رو، به کدام پدیدهٔ فیزیکی اشاره دارد؟ و در چه صورتی رخ می‌دهد? 
		ادامه سوالات در صفحه سوم

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک (۳)
تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۲	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحات: ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج از کشور در نوبت دی ماه ۱۴۰۲			

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)					
۱۵	۰/۵ ۰/۲۵	رشته‌ای از بسامدهای تشیدیدی یک تار با دو انتهای بسته عبارت‌اند از: ۱۵۰ Hz، ۲۲۵ Hz، ۳۰۰ Hz و ۳۷۵ Hz در این رشتہ دو بسامد (کم تر از ۵۲۵ Hz) جا افتاده است. الف) این دو بسامد را مشخص کنید? ب) بسامد هماهنگ هشتم چند هرتز است؟					
۱۶	۱/۲۵	در جدول زیر هر کدام از موارد ستون اول، با کدام مورد از ستون دوم در ارتباط است؟ آن‌ها را مشخص کنید. توجه: یک مورد در ستون دوم اضافی است.					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ستون دوم</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ستون اول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> (a) رشتة لیمان (b) مدل بور (c) گسیل خودبه‌خود (d) رشتة بالمر (e) طیف گسیلی خطی (f) اثر فوتوالکتریک </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> الف) طیف حاصل از گاز کم فشار هیدروژن اتمی ب) خروج الکترون از سطح فلز پ) توانایی در تبیین پایداری اتم ت) گسیل فوتون در جهت کاتورهای ث) ناحیه طیفی فرابنفس و مرئی </td> </tr> </tbody> </table>	ستون دوم	ستون اول	(a) رشتة لیمان (b) مدل بور (c) گسیل خودبه‌خود (d) رشتة بالمر (e) طیف گسیلی خطی (f) اثر فوتوالکتریک	الف) طیف حاصل از گاز کم فشار هیدروژن اتمی ب) خروج الکترون از سطح فلز پ) توانایی در تبیین پایداری اتم ت) گسیل فوتون در جهت کاتورهای ث) ناحیه طیفی فرابنفس و مرئی	
ستون دوم	ستون اول						
(a) رشتة لیمان (b) مدل بور (c) گسیل خودبه‌خود (d) رشتة بالمر (e) طیف گسیلی خطی (f) اثر فوتوالکتریک	الف) طیف حاصل از گاز کم فشار هیدروژن اتمی ب) خروج الکترون از سطح فلز پ) توانایی در تبیین پایداری اتم ت) گسیل فوتون در جهت کاتورهای ث) ناحیه طیفی فرابنفس و مرئی						
۱۷	۰/۵ ۰/۲۵	بسامد آستانه برای اثر فوتوالکتریک در یک فلز معین برابر $1 / 25 \times 10^{15}$ Hz است. الف) تابع کار این فلز بر حسب الکترون ولت چقدر است؟ ($h = 4 \times 10^{-19}$ eV.s) ب) اگر طول موج آستانه این فلز ۲۴۸ nm باشد، آیا این پدیده با طول موج ۲۳۰ nm ایجاد می‌شود؟					
۱۸	۰/۷۵	کوتاه‌ترین طول موج در رشتة براکت ($R = 0 / 0.1 \text{ nm}^{-1}$) هیدروژن اتمی را به دست آورید.					
۱۹	۰/۵ ۰/۵	الف) دو ویژگی بارز نیروی هسته‌ای چیست؟ ب) گرافیت و بور هر کدام در راکتورهای شکافت هسته‌ای چه نقشی دارند؟					
۲۰	۱	الف) معادله واپاشی روبه رو را کامل کنید: ب) پس از گذشت ۱۳۰ روز، تعداد هسته‌های پرتوزای یک نمونه، به $\frac{1}{32}$ تعداد موجود در آغاز کاهش یافته است. نیمه عمر ماده چند روز است؟					
۲۰	جمع بارم	همگی موفق و پیروز باشید					

تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۲	رشته: ریاضی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: فیزیک (۳)
ساعت شروع: ۱۰ صبح	تعداد صفحات: ۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج از کشور در نوبت دی ماه ۱۴۰۲

ردیف	بارم	الف) متر بر مربع ثانیه	ب) خط راست	پ) شتاب	ت) برابر با	هر مورد (۰/۲۵)	ردیف	
۱						۱۳، ۱۱، ۳	۱	
۲	۱/۵	الف) در لحظه t_2 (۰/۲۵)، پ) مساحت بین نمودار سرعت- زمان و محور زمان برابر جایه جایی است (۰/۲۵) و جایه جایی در بازه زمانی t_1 تا t_2 برابر با منفی جایه جایی در بازه زمانی t_2 تا t_3 است (۰/۵)، پس جایه جایی کل این بازه، صفر می شود. (۰/۲۵) <u>ص ۲۷</u>					۲	
۳	۱/۲۵	$v = -gt$ (۰/۲۵) <u>ص ۲۳</u>	$v_2 = -10 \times 2 = -20 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)	$v_3 = -10 \times 3 = -30 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)	$v_{av} = \frac{v_2 + v_3}{2}$ (۰/۲۵)	$v_{av} = \frac{-20 + (-30)}{2} = -25 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)	۳	
۴	۱/۲۵	هر مورد (۰/۲۵) <u>ص ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۴۱، ۵۶</u>	(ن) (ن) (ن) (ن)	(د) (پ) (ب) (الف)			۴	
۵	۱/۵	 <u>ص ۵۹</u>	$mg - f_k = 0$ (۰/۲۵) $f_k = \mu_k F_N$ (۰/۲۵) $40 = 0.1 F$	$f_k = mg = 40 \text{ N}$ (۰/۲۵) $F_N = F$ $F = 400 \text{ N}$ (۰/۲۵)		رسم نیروهای وارد بر جسم (۰/۵)		۵
۶	۰/۵	<u>ص ۴۷</u>	$K = \frac{p^2}{2m}$ (۰/۲۵)	$K = \frac{(8 \times 10^{-2})^2}{2 \times 2 \times 10^{-2}} = 0.16 \text{ J}$ (۰/۲۵)				۶
۷	۰/۷۵	<u>ص ۶۰</u>	$\frac{g_2}{g_1} = \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2$ (۰/۲۵)	$\frac{g_2}{g_1} = \left(\frac{6400}{6400 + 1600} \right)^2$ (۰/۲۵)	$\frac{g_2}{g_1} = 0.64$ (۰/۲۵)			۷
۸	۱/۲۵	هر مورد (۰/۲۵) <u>ص ۶۵، ۶۹، ۷۴، ۸۱، ۸۳</u>	ب) مکانیکی ث) کاهش پیدا می کند	الف) با جذر ثابت فنر نسبت مستقیم دارد پ) چهار برابر	ت) ارتفاع صوت			۸
۹	۱/۲۵	<u>ص ۸۵</u>	$A = 0.4 \text{ m}$ (۰/۲۵)	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ (۰/۲۵)	$\frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = 8 \text{ s}$ (۰/۲۵)		الف)	۹
۱۰	۰/۷۵	<u>ص ۸۸</u>	$t = \frac{T}{4}$ (۰/۲۵)		$t = 8 \times 2 = 16 \text{ s}$ (۰/۲۵)		ب)	۱۰
						ادامه پاسخها در صفحه دوم		

تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۲	رشته: ریاضی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: فیزیک (۳)
ساعت شروع: ۱۰ صبح	تعداد صفحات: ۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج از کشور در نوبت دی ماه ۱۴۰۲

ردیف	بارم	
۱۱	۰/۵ <u>۶۷</u> $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ (۰/۲۵) <u>۹۳</u> $\tau = 4\pi^2 \frac{L}{g}$ $L = 1 \text{ m}$ (۰/۲۵)	
۱۲	۰/۷۵ $2d = v \Delta t$ (۰/۲۵) $2 \times 17 = v \times 0 / 1$ (۰/۲۵) $v = 340 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)	
۱۳	۱ <u>۱۱۲</u> پرتو (۱) آبی (۰/۲۵) و پرتو (۲) قرمز (۰/۲۵) است، زیرا ضریب شکست شیشه برای نور آبی بیشتر از نور قرمز است (۰/۵).	
۱۴	۰/۷۵ <u>۱۰۲</u> پراش (۰/۲۵)، وقتی موج در عبور از یک شکاف با پهنایی از مرتبه طول موج، به اطراف گستردگی شود (۰/۵).	
۱۵	۰/۷۵ <u>۱۱۴</u> $f_A = \Delta f_1 = 600 \text{ Hz}$ (۰/۲۵) (ب) هر مورد (۰/۲۵) 450 Hz و 75 Hz (الف)	
۱۶	۱/۲۵ <u>۱۲۰</u> (ب) f : اثر فتوالکتریک (۰/۲۵) هر مورد (۰/۲۵) (ث) d : رشتہ بالمر (۰/۲۵) (الف) e : طیف گسیلی خطی (۰/۲۵) (ت) c : گسیل خودبه خود (۰/۲۵)	
۱۷	۰/۷۵ <u>۱۲۴</u> $W_o = hf_o$ (۰/۲۵) $W_o = 4 \times 10^{-15} \times 1 / 25 \times 10^{15} = 5 \text{ eV}$ (۰/۲۵) (الف) (ب) بله (۰/۲۵)	
۱۸	۰/۷۵ <u>۱۲۳</u> $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_0^2} \right)$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{100} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{\infty} \right)$ (۰/۲۵) $\lambda = 1600 \text{ nm}$ (۰/۲۵)	
۱۹	۱ <u>۱۵۱</u> (الف) کوتاه برد (۰/۲۵) و مستقل از بار (۰/۲۵) (ب) گرافیت: کندساز نوترون‌ها، بور: تنظیم آهنگ واکنش شکافت (یا تعداد نوترون‌ها)	
۲۰	۱/۵ <u>۱۴۷ و ۱۴۴</u> $^{210}_{82}\text{Pb} \rightarrow ^{210}_{83}\text{Bi} + _{-}^0\text{e}^-$ (۰/۵) (الف) $N = \frac{N_o}{2^n}$ (۰/۲۵) (ب) $N = \frac{1}{32} N_o = \frac{1}{3^5} N_o$ (۰/۲۵) $n = \frac{t}{T}$ (۰/۲۵) $T = \frac{130}{5} = 26$ روز (۰/۲۵) جمع بارم	