

بیماری‌های دهان

۱- نمای بالینی رایج در خصوص کیست دنتی ژروس (Dentigerous Cyst) کدامیک از موارد زیر است؟

رویش دندان و رشد قدامی خلفی و بدون علامت این ضایعه

عدم رویش دندان و اتصال کیست به گردن دندان در نمای گرافی

عود بالا و تورم وسیع در ضایعات بزرگ

احتمال زیاد ایجاد بدخیمی در جداره کیست (Cyst) و عود بالا

۲- کدام آزمایش زیر قبل از درمان تهاجمی دندانپزشکی برای بیماری که دارای سابقه انفارکتوس میوکارد می‌باشد، و داروی وارفارین مصرف می‌کند، باید انجام شود؟

B.T

C.T

INR

PFA100

۳- خانمی ۲۰ ساله با شکایت از زخم‌های دهانی منتشر دردناک، که از ۳ روز پیش شروع شده، مراجعه نموده است. مخاط گونه، زبان و لبیال درگیر می‌باشد، و بر روی لب دلمه‌های خونی مشاهده می‌شود، اولین تشخیص احتمالی شما کدامیک از موارد زیر است؟

پمفیگوس ولگاریس

Gingivostomatitis herpetic

اریتم مولتی فرم

پمفیگوئید مخاطی

۴- اولین اقدام برای بیمار مبتلا به دیابت نوع II، که در حین درمان دندانپزشکی دچار اضطراب، تعریق، تاکی کاردی و گیجی می‌شود، چیست؟

کنترل علائم حیاتی

تجویز اکسیژن

بازکردن راه هوایی

تجویز محلول قندی

۵- کدام دارو را در زمان بارداری بدون رعایت احتیاط می‌توان تجویز کرد؟

Nitroglycerin

Diphenhydramine

Naloxone

Epinephrine

آسیب شناسی دهان

۶- کدام یک از تومورهای ادنتوژنیک نیاز به درمان مهاجم (Aggressive) ندارد؟

تومور آملوبلاستوما

میگزوم ادنتوژنیک

تومور پیندبورگ

آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور

۷- مادری مضطرب به شما مراجعه نموده و از یک برجستگی پرخون و سیاه رنگ روی ریج آلوئول در ناحیه سانترال شیری فک پائین کودک ۶ ماهه خود ابراز ترس می‌نماید. اولین تشخیص شما چیست؟

همانژیوم

هماتوم رویشی

فیبروم

پیوژنیک گرانولوما

۸- در کدام ناحیه‌ها غدد بزاقی فرعی وجود ندارد؟

کام نرم / لثه

کام سخت / کام نرم

زبان / خلف کام سخت

لثه / قدام کام سخت

۹- در صورت شک بالینی به کدام یک از موارد زیر انجام بیوپسی در مطب کنتراندیکاسیون دارد؟

پیوژنیک گرانولوما

سرطان سلول سنگفرشی

مالفورماسیون عروقی داخل استخوانی

آنژیوسارکوم

رادیولوژی دهان

۱۰- کدام یک از موارد زیر از مزیت‌های کاربرد استفاده از رادیوگرافی پانورامیک می‌باشد؟

تشخیص بیماری پریدنتال در مراحل اولیه

مشاهده دقیق سطوح اینترپروگنیمال در ناحیه پره مولرها

وضوح تصویر زیاد در ناحیه قدامی فکین

رعایت کنترل عفونت راحت‌تر

۱۱- جهت اصلاح خطای Elongation در رادیوگرافی پری اپیکال ماگزینا چه اقدامی انجام می‌شود؟

کاهش زاویه افقی

کاهش زاویه عمودی

افزایش زاویه عمودی

افزایش زاویه افقی

۱۲- کدام رادیوگرافی برای بررسی عدم تقارن صورت کاربرد دارد؟

Revers town

Posterior anterior cephalogram

Lateral cephalogram

Waters projection

۱۳- در افتراق بین مراحل اولیه پری اپیکال سمتواسئوس دیسپلازی از گرانولوم پری اپیکال کدام یک بیشتر کمک کننده است؟

تست وایتالیتی

حدود ضایعه

ساختار داخلی

محل ضایعه نسبت به ریشه

دندانپزشکی کودکان

۱۴- اندازه خمیر دندان فلوراید دار برای کودکان زیر ۳ سال و ۳ تا ۶ سال به ترتیب کدام است؟

به اندازه دانه برنج (rice grain size) - به اندازه دانه برنج

به اندازه دانه برنج - به اندازه نخود (pea size)

زیر ۳ سال ممنوع است - به اندازه دانه برنج

زیر ۳ سال ممنوع است - به اندازه دانه نخود

۱۵- در خصوص انتخاب دندان جهت انجام فیشورسیلانت (Fissure sealant therapy) کدام گزینه صحیح بیان شده است؟

در کودکان دارای پوسیدگی رمپانت (Rampant caries) انجام فیشورسیلانت دندان دائمی اقدام مناسبی است.

در صورت وجود پوسیدگی بین دندانی، فیشورسیلانت منع کاربرد دارد.

انجام فیشورسیلانت در کودکان غیرهمکار برای پیشگیری از پوسیدگی مناسب است.

فیشورسیلانت دندان شیری منع کاربرد دارد.

۱۶- بهترین زمان جهت شروع مشاوره‌ی دندانپزشکی با والدین و ایجاد یک برنامه دندانپزشکی پیشگیری برای کودک کدام است؟

قبل از تولد

نوزادی

نویابی

سن پیش دبستانی

17- احتمال درگیری کدام دندان در الگوی Early childhood caries کمتر است؟

سنترال ماگزیلا

مولر اول شیری مندیبل

لترال ماگزیلا

سنترال مندیبل

18- اولین مرحله تراش حفرات کلاس II به جهت ترمیم دندان های شیری کدام است؟

برداشت پوسیدگی

بازکردن عمیق ترین پیت یا فیشور

بازکردن مارجینال ریج

بازکردن پیت دیستال

19- در صورت آسیب شکستگی دندان بدون باز شدگی پالپ (Exposure)، اولین معاینه مجدد پس از تروما چه زمانی صورت می پذیرد؟

۲ ماه بعد

۴ هفته بعد

۲ هفته

بعد

نیازی به مراجعه مجدد نمی باشد

اندودانتیکس

۲۰- در هنگام درمان ریشه دندان، در کدام یک از حالات زیر، احتمال ایجاد لج (Ledge) کمتر است؟

کانال‌های با انحنای (Curve) بیشتر

کانال‌های بلندتر

استفاده از فایل با نوک pyramidal

استفاده از فایل نیکل تیتانیوم

۲۱- کدام یک از موارد زیر از مزایای استفاده از تکنیک Obturation تراکم جانبی (lateral condensation) می‌باشد؟

کنترل طول مناسب مواد پرکننده کانال

قابلیت استفاده در موارد تحلیل داخلی

تطابق بهتر گوتا با نامنظمی‌های دیواره‌های کانال

نیاز به تیپرینگ (Tapering) بالای کانال برای اجرای تکنیک

۲۲- کدام یک از موارد زیر منجر به پیشگیری از ایجاد Strip perforation در هنگام درمان ریشه دندان می‌شود؟

Recapitulation

Anti-curvature filing

Standardized (single length) preparation

Circumferential filing

۲۳- کاربرد کدام یک از ترکیبات زیر در برداشتن لایه اسمیر (Smear Layer) از کانال ریشه مناسب‌تر است؟

هیپوکلریت سدیم، بتادین

کلرهگزیدین، بتادین

هیپوکلریت سدیم، EDTA

کلرهگزیدین، EDTA

۲۴- در رادیوگرافی تعیین طول تهیه شده از دندان مولر اول ماگزینا، ریشه مزیوباکال و پالاتال روی هم سوپرایمپوز (Superimposed) شده‌اند. علت این حالت کدام است؟

زاویه عمودی زیاد می‌باشد

زاویه عمودی کم می‌باشد

زاویه افقی مزیالی می‌باشد

زاویه افقی دیستالی می‌باشد

دندانپزشکی ترمیمی

۲۵- در صورتی که بخواهیم بر روی دندان مولر فک پایین ترمیم آمالگام کلاس II و V را انجام بدهیم، رعایت کدام یک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

ترمیم همزمان هر دو حفره ترمیمی

تهیه حفره، و ترمیم حفره کلاس V و سپس حفره کلاس II

تهیه حفره کلاس V قبل از تهیه حفره کلاس II

تهیه حفره، و ترمیم حفره کلاس II و سپس حفره کلاس V

۲۶- در صورتی که پس از اتمام پرکردگی کامپوزیتی (پالیش کردن)، متوجه ایجاد حباب شویم و یا دوباره بخواهیم ماده ترمیمی را به نقاطی اضافه نماییم، مراحل درمان چگونه است؟

استفاده از باندینگ (Bonding) مناسب و کامپوزیت

اضافه کردن کامپوزیت مناسب به ناحیه

Etching، شستشوی ناحیه، باندینگ و اضافه کردن کامپوزیت

استفاده از کامپوزیت Flow به همراه کامپوزیت به ناحیه

۲۷- کدام یک از حالت‌های زیر، اقدام به تعویض یک ترمیم آمالگام قدیمی نمی‌شود؟

آمالگام بلو

وجود اورهنگ

وجود کریپ

کانتور آناتومیک نامناسب

۲۸- در هنگام پوشش مستقیم پالپ (Direct Pulp Capping)، بی‌خطرترین ماده جهت کنترل خونریزی پالپ کدام است؟

هیپوکلریت سدیم

آب یا سالین

اسیدفسفریک

مواد بند آورنده خون

۲۹- بعد از جراحی افزایش طول تاج کلینیکی حداقل چه مدت زمان لازم است تا بتوان ترمیم نهایی را انجام داد؟

۶ ماه

۴ ماه

۶ هفته

۲ هفته

۳۰- در دهان بیمار، واکنش آلرژیک به آمالگام مشابه کدام یک از نماهای کلینیکی ضایعات زیر می‌باشد؟

Pemphigoid

Cancker sore

Pemphigus

Lichen planus

پروتزهای دندانی

۳۱- در هنگام تراش دندان برای روکش فلز-سرامیک، در صورتی که نیاز است تا تراش بر روی ریشه دندان گسترش یابد، مناسب ترین خط خاتمه تراش کدام یک از موارد زیر است؟

شولدر بول (Bevel shoulder)

نایف اج (Knife edge)

شولدر (Shoulder)

چمفر (Chamfer)

۳۲- در صورتیکه قوس فک بالا مثلثی باشد و دندان‌های سانترال و لترال از دست رفته باشند و بیمار کاندید درمان با پروتز ثابت باشد، کدام دندان‌ها به عنوان پایه انتخاب می‌شود؟

دندان‌های کانین دو طرف

دندان‌های کانین و پره مولرهای اول دو طرف

دندان‌های کانین دو طرف به علاوه یکی از پره مولرهای اول

دندان‌های کانین و پره مولرهای اول و دوم دو طرف

۳۳- کدام مورد زیر از معایب خط خاتمه تراش Knife edge در تراش روکش متال-سرامیک (PFM) محسوب می‌شود؟

اعمال استرس بیشتر به دندان

Over contouring

تخریب بیشتر ساختار دندانی

کاهش استحکام روکش

۳۴- کدام یک از موارد زیر از علل پاره شدن قالب آلژینات در هنگام خارج کردن آن از دهان بیمار می باشد؟

درجه حرارت نامناسب و دیر درآوردن تری از دهان

عدم تطابق با محل قالب گیری و عدم نشاندن درست تری

دیرخارج کردن تری قالب گیری از دهان

کوچک بودن تری و استفاده از حجم ناکافی آلژینات

۳۵- بیماری که به تازگی به او پروتز کامل تحویل داده شده است، در اولین جلسه پیگیری (Followup) بیان می کند که در اوایل روز گیر پروتز خوب است، ولی بعد از گذشت چند ساعت پروتز لق می شود. علت این حالت کدام یک از موارد زیر است؟

نقص در سیل خلفی

خطای اکلوزالی

VDO نامناسب

بلندی لبها و یا بوردهای پروتز

۳۶- جمع شدن جرم روی دندان های یک طرف در پروتز کامل نشانه چیست؟

بهداشت نامناسب

زیاد بودن VDO

مدلاژ نامناسب همان سمت

تداخل اکلوزن

۳۷- در طراحی پروتز متحرک پارسیل، محل مناسب برای قرار دهی بازوی متقابل (Reciprocal Arm)، کدام ناحیه از دندان پایه می‌باشد؟

یک سوم سرویکالی

یک سوم اکلوزالی

مرز یک سوم میانه (Middle) و یک سوم اکلوزالی

مرز یک سوم میانه (Middle) و یک سوم سرویکالی

۳۸- در بیماری که دندان‌های قدامی (کانین تا کانین) خود را از دست داده است، در صورتی که بخواهیم از پروتز پارسیل استفاده نماییم، بهتر است بازوی نگهدارنده غیرمستقیم در کدام ناحیه قرار گیرد؟

دیستو اکلوزال پره مولر دوم

مزियो اکلوزال پره مولر اول

دیستو اکلوزال مولر دوم

مزियो اکلوزال مولر اول

۳۹- بالانس اکلوژن، در پروتز پارسیل متحرک دوطرفه فک بالا، می‌بایست چگونه باشد؟

تماس همزمان دوطرفه در Working و Non-working

تماس در حالت سنتریک

تماس در طرف Non-working

تماس در طرف Working

پریودانتیکس

۴۰- بیماری ۴۲ ساله و سالم با تورم بیضی شکل و درد در مجاورت دندان مولر اول فک پائین مراجعه نموده است. دندان زنده (Vital) بوده و دارای پاکت عمیق است. لته قرمز و ادمای توم می باشد، تشخیص احتمالی شما کدام یک از موارد زیر است؟

آبسه پریودنتال حاد

آبسه پری اپیکال حاد

آبسه پری اپیکال مزمن

آبسه لته ای

۴۱- در خانم بارداری که در ماه ۵ بارداری است و بدلیل شکایت از تورم لته مراجعه نموده است، به جهت جلوگیری از حالت Supine hypotensive syndrome، که با کاهش فشار خون بیمار همراه است، نحوه قرارگیری بیمار روی صندلی دندانپزشکی چگونه باید باشد؟

Supine و استفاده از اکسیژن

Semi- supine و استفاده از داروی ضد فشارخون

چرخاندن و تمایل بیمار به سمت چپ

چرخاندن و تمایل بیمار به سمت راست

۴۲- به منظور کنترل پلاک موثرتر در ناحیه بین دندانی که فاقد پاپیلا می باشد، استفاده از کدام یک از وسایل زیر را به بیمار توصیه می کنید؟

Single-Tufted Brush

Triangular wooden tips

Interproximal brush

Rubber-Tip

۴۳- مناسب‌ترین روش در دست گرفتن (Grasp) و تکیه‌گاه (Rest) در هنگام استفاده از وسایل اولتراسونیک در هنگام جرم‌گیری به ترتیب کدام یک از موارد زیر است؟

Intraoral Fulcrum-Pen Grasp

External Fulcrum-Modified Pen Grasp

Intraoral Fulcrum-Modified Pen Grasp

External Fulcrum-Pen Grasp

۴۴- ترومای حاصل از مسواک زدن عامل اصلی بروز کدام یک از مشکلات زیر می‌تواند باشد؟

پاکت پریودنتال در سطوح رادیکولر

Loss of Attachment در سطوح رادیکولر

پاکت پریودنتال در سطوح پروگزیمال

Loss of Attachment در سطوح پروگزیمال

جراحی دهان و فک و صورت

۴۵- بیماری پس از تزریق بلاک دندان‌های فک پایین که در روز قبل بدلیل درمان‌های مختلف دندانپزشکی داشته است، با شکایت از محدودیت در باز شدن دهان (Trismus)، مراجعه نموده است. علت احتمالی کدام یک از موارد زیر است؟

حساسیت به ماده بی‌حسی

آسیب به عضله Buccinator

آسیب به عضله Medial pterygoid

مصرف کم داروی بی‌حسی

۴۶- استفاده از کمپرس سرما و گرما به منظور کاهش تورم پس از جراحی دهان در چه زمانی مناسب تر است؟

سرما در روز اول و دوم و گرما در انتهای روز عمل

سرما در روز اول و گرما در روز سوم بعد از عمل

سرما در روز اول و دوم و گرما از انتهای روز دوم عمل

سرما روز اول و سوم و گرما در روز دوم پس از عمل

۴۷- کدام یک از علائم زیر در هنگام ایجاد حفره خشک (Dry Socket) ممکن است مشاهده نمی شود؟

دارای طعم و مزه بد در دهان

تب و تورم به میزان کم

دارای درد نبض دار است

شروع درد از همان ابتدا

۴۸- در تزریق بلاک به روش اکینوزی وزیرانی کدام ناحیه بی حس نمی شود؟

دندانهای فک پایین تا خط وسط

تنه مندیبل و ناحیه تحتانی راموس

دو سوم خلفی زبان

موکریپوست باکال

۴۹- متداول ترین عاملی که باعث دشواری در خارج سازی دندان مولر سوم ماگزیلامی شود، کدام است؟

مورفولوژی غیر طبیعی ریشه ها

موقعیت باکوپالاتالی دندان

نزدیکی به دندان مولر دوم

موقعیت مزیدیستالی دندان

۵۰- کدام یک از نخ‌های زیر قابل جذب محسوب می‌شود؟

silk

کرومیک gut

نایلون

stainless steel

سلامت دهان

۵۱- کاربرد فیشور سیلنت در اجتماع با توجه به کدام یک از رویکردهای پیشگیری مناسب است؟

رویکرد عامل خطر مشترک

رویکرد مبتنی بر جمعیت هدف

رویکرد مبتنی بر جمعیت

رویکرد مبتنی بر پرخطری

۵۲- جهت یافتن مقالات با موضوع مقایسه اثر خمیر دندان و دهانشویه فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی کدام پروتکل زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

Tooth paste OR Rinse Or Caries AND prevention

Fluoridated AND (Tooth paste OR Rinse) OR Caries prevention

“ Tooth paste “ AND “ mouth rinse “ AND caries AND prevention

Fluoridated OR (Tooth paste AND Rinse) AND Caries prevention

۵۳- در سطح بندی شواهد (هرم شواهد) جهت تصمیم گیری بالینی، مطالعات مقطعی-توصیفی در کدام سطح قرار می گیرند؟

در پایین ترین سطح

بین مطالعات آزمایشگاهی و مطالعات هم گروهی (Cohort)

یک سطح پایین تر بعد از متا آنالیزها

هم سطح با مطالعات مداخله ای یا کارآزمایی های بالینی

۵۴- توصیه مبتنی بر شواهد برای همه بیماران در خصوص مسواک زدن کدام است؟

حداقل روزی یکبار مسواک زدن

حداقل روزی دوبار مسواک زدن

حداقل روزی یکبار مسواک زدن با خمیردندان حاوی فلوراید

حداقل روزی دوبار مسواک زدن با خمیردندان حاوی فلوراید

ارتودانتیکس

۵۵- در کودکی که دندان مولر دوم شیری خود را قبل از رویش مولر اول دائمی از دست داده است، استفاده از کدام فضا نگهدارنده را پیشنهاد می کنید؟

بند و لوپ

دیستال شو

لینگوال آرچ

نانس

۵۶- اگر دندان شیرینی زود از دست برود، تا زمان رویش دندان دایمی زیرین حداقل چه مدت باید فاصله وجود داشته باشد تا فضا نگهدار اندیکاسیون پیدا کند؟

۳ ماه

۶ ماه

۹ ماه

۱۲ ماه

۵۷- مهمترین نکته برای ارزیابی عملکرد مفصل تمپورومندیبولار در هنگام معاینه کدام گزینه است؟

حداکثر باز شدن دهان

حداکثر حرکت پیشگرایی

حداکثر حرکت طرفی

وجود یا عدم وجود درد در لمس

۵۸- دختری ۶ ساله با عادت مکیدن انگشت مراجعه نموده است، نخستین اقدام شما در درمان چیست؟

صحبت مستقیم با بیمار

reminder therapy

تجويز Quad helix

برقراری سیستم جایزه (reward system)

۵۹- علت اصلی بروز مجدد کرو دینگ در ثنایای پایین افراد بزرگسالی که قبلاً ارتدنسی شده اند، چیست؟

فشار دندان عقل در حال رویش

رشد backward فک پایین

رشد تاخیری فک پایین

استفاده از ریتینر (Retainer) ثابت مندیبل

۶۰- در فک بالا در اثر مکیدن انگشت، شکل قوس فکی به چه شکل مشاهده می‌شود، و نیز در کدام ناحیه تنگی قوس فکی بیشتر ایجاد می‌شود، به ترتیب عبارتند از:

V-shape / مولراول

V-shape / کانین

U-shape / مولراول

U-shape / کانین

Konkur.in

دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی بهمن ۱۴۰۲

کلید اولیه

د	۳۱	ب	۱
ب	۳۲	ج	۲
ب	۳۳	ج	۳
د	۳۴	د	۴
ج	۳۵	ب	۵
د	۳۶	د	۶
د	۳۷	ب	۷
ج	۳۸	د	۸
الف	۳۹	ج	۹
الف	۴۰	د	۱۰
ج	۴۱	ب	۱۱
الف	۴۲	ب	۱۲
د	۴۳	الف	۱۳
ب	۴۴	ب	۱۴
ج	۴۵	ب	۱۵
ب	۴۶	الف	۱۶
د	۴۷	د	۱۷
ج	۴۸	ج	۱۸
الف	۴۹	ج	۱۹
ب	۵۰	د	۲۰
ب	۵۱	الف	۲۱
ج	۵۲	ب	۲۲
ب	۵۳	ج	۲۳
د	۵۴	ج	۲۴
ب	۵۵	د	۲۵
ب	۵۶	ج	۲۶
الف	۵۷	الف	۲۷
الف	۵۸	ب	۲۸
ج	۵۹	ج	۲۹
ب	۶۰	د	۳۰