

۱- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، گروهی از فرایندهای شیمیایی موجب بازتولید NAD^+ در یاخته‌های ماهیچه‌های متصل به استخوان‌های دنده می‌شوند. ویژگی مشترک این فرایندها، کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) ماده تولیدشده در انتهای این فرایندها سبب فساد مواد غذایی می‌شود.
 (ب) می‌توانند سبب تولید مولکولی (هایی) با توانایی کاهش pH، در بدن فرد شوند.
 (ج) نوعی مولکول واجد سطح ساختاری سوم، در ذخیره گیرنده نهایی الکترون این فرایندها نقش ایفا می‌کند.
 (د) در این فرایندها تولید آدنوزین تری فسفات در اسیدی ترین بخش راکیزه (میتوکندری) دور از انتظار است.

- (۱) الف - ب
 (۲) ب - ج
 (۳) ب - د
 (۴) ج - د

۲- شکل زیر نشان دهنده برگ نوعی گیاه C_4 می‌باشد که در هنگام حضور نور کافی (حالت ۱) و کاهش میزان نور محیط (حالت ۲) در یک فصل معین، مساحت بخش‌های سبزرنگ خود را تغییر می‌دهد. در این خصوص کدام گزینه درست است؟



- (۱) در حالت (۱) همانند حالت (۲)، مولکول‌های آب در تیلاکوئیدهای متعلق به یاخته‌های میانبرگ تجزیه می‌شوند.
 (۲) در حالت (۲) برخلاف حالت (۱)، فعالیت بیش از یک نوع آنزیم ATP ساز قرار گرفته در نوعی غشا مشاهده می‌شود.
 (۳) در حالت (۲) همانند حالت (۱)، در فضای درون تیلاکوئیدهای یاخته‌های نگهبان روزنه، نوعی حامل الکترون ساخته می‌شود.
 (۴) در حالت (۲) برخلاف حالت (۱)، رنگیزه فتوسنتزی غالب در همه یاخته‌های برگ گیاه، سبزینه a است.

۳- در خصوص نوعی مولکول حامل الکترون که برخلاف حامل دیگر الکترون، به نوعی در کاهش یافتن همه اجزای زنجیره انتقال الکترون در غشای راکیزه (میتوکندری) نقش دارد، کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- (۱) در واکنشی از مرحله نخست تنفس یاخته‌ای، همراه با تولید اسید دوفسفاته تولید می‌شود.
 (۲) هرگاه مولکول کربن دی اکسید درون یک یاخته تولید شود، بلافاصله این مولکول تولید می‌گردد.
 (۳) در طی وقوع تنفس هوازی، انرژی ذخیره شده در این مولکول آزاد و صرف تولید ATP بیشتر می‌شود.
 (۴) پس از تشکیل اولین ترکیب شش کربنی بدون فسفات در تنفس هوازی، در طی واکنش‌هایی ایجاد می‌شود.

۴- کدام ویژگی، واکنش (های) تولید مولکول $FADH_2$ را از تولید حامل الکترون دیگر در چرخه کربس، متمایز می‌سازد؟

- (۱) تنوع واکنش دهنده‌ها بیشتر از تنوع فرآورده (ها) است.
 (۲) با دریافت یک الکترون توسط مولکول پذیرنده، مولکولی خنثی تولید می‌شود.
 (۳) در یک محدوده دمایی خاص انجام شده و به تداوم نوعی واکنش زیستی کمک می‌کند.
 (۴) فرآورده این واکنش، در مجاورت یکی از اجزای کاملاً آب‌گریز غشای چین خورده راکیزه، مصرف می‌شود.

۵- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- «در یک اسپیروژیر، در بخش‌هایی از که در مجاورت غشای یاخته‌ای قرار گرفته است،»
 (الف) کلروپلاست - معمولاً تعداد سبزینه‌های بیشتری تجمع یافته است
 (ب) هسته یاخته - امکان جابه‌جایی مواد بین سیتوپلاسم و هسته وجود دارد
 (ج) کلروپلاست - رنگیزه‌های فتوسنتزی، برخی طول موج‌ها را بیشتر جذب می‌کنند
 (د) هسته یاخته - گروهی از آنزیم‌های بسیاری، فعالیت نوکلئازی نیز انجام می‌دهند

- (۱) ۱
 (۲) ۲
 (۳) ۳
 (۴) ۴

۶- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«اگر بنا باشد که شود، باید گردد.»

- (۱) تخمیر توسط یاخته‌های درخت حرا، تحمل - لاکتیک اسید تولیدی در هر یاخته، توسط ریشه گیاه، دفع
 - (۲) گلیکوزن برای تولید ATP در یاخته‌های کبدی، تجزیه - ابتدا اسیدهای چرب در این یاخته‌ها، تجزیه
 - (۳) سیانید سبب مرگ نوعی یاخته پوششی - واکنش مربوط به اکسایش نوعی حامل الکترون، بلافاصله متوقف
 - (۴) فعالیت همه پمپ‌های غشای درونی راکیزه بدون اثر مواد سمی، متوقف یا کم‌تر - تولید NADH در فرایندهای یاخته، قطع
- ۷- با توجه به اطلاعات کتاب زیست شناسی ۳، در فضای درونی ساختارهایی از یک یاخته گیاهی که دارای دو غشا هستند، نوعی آنزیم دو واکنش متفاوت را به انجام می‌رساند. کدام گزینه ویژگی مشترک همه این آنزیم‌ها است؟

- (۱) در هر واکنشی که با مصرف نوعی ترکیب کربن‌دار همراه است، مولکولی با تعداد کربن بیشتر می‌سازند.
 - (۲) با شرکت در واکنش‌های سوخت و سازی یاخته از نوع ترکیب، منجر به ساخت نوعی بسپار زیستی می‌شوند.
 - (۳) در هر واکنشی که توسط آن‌ها انجام می‌شود، نوعی مولکول فسفات‌دار در جایگاه فعال آنزیم قرار می‌گیرد.
 - (۴) در هر بار فعالیت خود، همواره پیوند(های) اشتراکی را در همه مولکول‌های واکنش‌دهنده، تحت تأثیر قرار می‌دهند.
- ۸- با فرض این که در یاخته‌های بدن انسان، یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازی به واسطه مسمومیت با ماده شیمیایی مهار شده باشند. کدام مورد در رابطه با فعالیت این یاخته‌ها، به طور حتم درست است؟

- (۱) نهایتاً فعالیت هر آنزیم موجود در غشاهای چین‌خورده راکیزه (میتوکندری)، متوقف می‌شود.
 - (۲) یکی از ویژگی‌های حیات که با غذاخوردن جانداران مرتبط است، در معرض خطر قرار گرفته است.
 - (۳) به دنبال قرار گرفتن در معرض سیگار یا دود خارج‌شده از خودروها، تولید ATP دستخوش اختلال شده است.
 - (۴) در صورت مشاهده کربن‌مونواکسید درون حبابک‌ها، قطعاً جایگاه‌های اکسیژن در نوعی پروتئین خواب اشغال شده است.
- ۹- بلافاصله پس از استفاده از نوعی مولکول سه‌بخشی در چرخه کالوین، قند پنج‌کربنه دوفسفاته در یاخته‌های میانبرگ گل رز بازتولید می‌شود. این مولکول آلی، کدام نقش دیگر را نیز می‌تواند عهده‌دار باشد؟

- (۱) به دنبال استفاده آن در نوعی فرایند مؤثر در جابه‌جایی مواد، در هل‌دادن شیره خام به سمت بالا نقش دارد.
 - (۲) انرژی مورد نیاز برای اتصال استیل و ترکیب کمک‌کننده به عملکرد آنزیم را در راکیزه فراهم می‌آورد.
 - (۳) با همکاری سانتریول‌ها و رشته‌های دوک، در رشد و ترمیم اندام‌های جوان گیاه نقش دارد.
 - (۴) با همکاری پروتئین‌ها، در تداوم زنجیره انتقال الکترون در سامانه‌های غشای چین‌خورده سبز دیسه نقش دارد.
- ۱۰- چند مورد، فقط درباره بعضی از مولکول‌های آدنوزین تری فسفات (ATP) در یک یاخته چند هسته‌ای ماهیچه دوسر ران، درست است؟

- (الف) ساختار شیمیایی قند آن‌ها تا حدودی به ساختار شیمیایی قندهای موجود در دنا، شباهت دارد.
 - (ب) ضمن مصرف یک مولکول هیدروژن‌دار می‌توانند، به آدنوزین و گروه‌های فسفات تجزیه شوند.
 - (ج) فسفات مورد نیاز برای تولید آن‌ها، از یک ترکیب فسفات‌دار (پیش‌ماده) تأمین شده است.
 - (د) به دنبال انتقال الکترون‌ها در یک ساختار یاخته‌ای، بلافاصله زمینه جداسازی فسفات از آن‌ها فراهم می‌شود.
- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۱- برای تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

«به طور معمول در تخمیرهایی که در یاخته‌های یک گیاه نهان‌دانه می‌توانند انجام شوند، به طور حتم.....»

- (۱) فقط بعضی از - بنیان اسیدی سه‌کربنی تولیدشده در مرحله اول فرایند، کربن‌دی‌اکسید آزاد می‌کند
- (۲) همه - NADH هم‌زمان با تولید ترکیب نهایی تخمیر، مصرف شده و نوعی پذیرنده الکترون بازسازی می‌شود
- (۳) فقط بعضی از - پیرووات در محل تولید خود در یاخته، الکترون‌های ترکیب دیگری را دریافت می‌کند
- (۴) همه - ترکیبی با تعداد اتم کربن یکسان با قندهای تک‌فسفاته قندکافت، الکترون‌های NADH را دریافت می‌کند

۱۲- کدام گزینه، در خصوص هر مولکول آبی که طی تنفس یاخته‌ای به واسطه عملکرد پروتئین‌های قرار گرفته در غشای داخلی راکیزه تولید می‌شود، درست است؟

(۱) به دنبال ترکیب گروه‌های OH و H جدا شده از دو ساختار مختلف تولید می‌شود.

(۲) توسط پروتئینی که بخش عمده آن در فضای بین دو غشای راکیزه قرار دارد، ایجاد می‌گردد.

(۳) سبب کاهش فشار اسمزی مایع قرار گرفته در اطراف دناهای حلقوی می‌گردد.

(۴) برای تولید آن، الکترون‌های موجود در زنجیره انتقال الکترون، مصرف می‌گردد.

۱۳- با توجه به این‌که فرایند قندکافت (گلیکولیز) فرایندی است که به کمک آنزیم‌های متعددی در چهار مرحله انجام می‌پذیرد، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«فقط در بعضی از مراحل فرایند قندکافت که، ترکیبی با دو پیوند اشتراکی بین کربن قند(ها) و گروه(های) فسفات تولید می‌شود.»

(الف) در طی آن‌ها، نوعی ترکیب شیمیایی آلی با یک گروه فسفات تولید می‌شود

(ب) در آن‌ها، فراورده‌هایی با سطح انرژی کم‌تر از پیش‌ماده‌ها تولید می‌گردند

(ج) پیش‌ماده و فراورده غیرنوکلیئوتیدی با تعداد کربن برابر، در جایگاه فعال آنزیم دیده می‌شود

(د) نوعی ترکیب شیمیایی آلی فسفات و دارای بیش از سه اتم کربن، مصرف می‌گردد

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۴- در دستگاه تولیدمثلی مردی سالم و بالغ، نوعی یاخته از مجرای اسپرم‌بر به میزراه جابه‌جا می‌شود. چند مورد درباره روش‌های تأمین انرژی در این یاخته‌ها به درستی بیان شده است؟

(الف) در هر بخشی از آن که امکان تولید اکسایشی ATP وجود دارد، تعدادی مولکول ATP برای شروع فرایند(های) زیستی مصرف می‌شود.

(ب) حداکثر میزان ATP که در بهترین شرایط و در حضور اکسیژن کافی تولید می‌شود، به ازای مصرف هر گلوکز، ۳۰ مولکول ATP است.

(ج) در هر بخشی از آن که امکان تولید ATP در سطح پیش‌ماده وجود دارد، آنزیم‌هایی وجود دارند که همگی درون یاخته فعالیت می‌کنند.

(د) در هر بخشی از یاخته که انواعی از مولکول‌های حامل اطلاعات وراثتی وجود دارد، بیش از یک نوع ترکیب نوکلئوتیدی دوفسفات طی واکنش‌های تنفس یاخته‌ای مصرف می‌شود.

(۱) ب - د (۲) الف - د

(۳) الف - ج (۴) ب - ج

۱۵- بخش عمده فتوسنتز توسط جاندارانی غیر از گیاهان انجام می‌شود که درون آب یا خشکی زندگی می‌کنند. کدام گزینه، درباره گروهی از این جانداران، که به رنگ سبز دیده می‌شوند، درست است؟

(۱) بعضی از آن‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی دارند که توسط غشایی دولایه در بر گرفته شده‌اند.

(۲) همه آن‌ها به دنبال وقوع فتوسنتز، غلظت اکسیژن محیط را تغییر می‌دهند.

(۳) همه آن‌ها، کمبود الکترونی رنگیزه‌های فتوسنتزی خود را از ترکیبی اکسیژن‌دار تأمین می‌کنند.

(۴) بعضی از آن‌ها، می‌توانند با داشتن سامانه(هایی) در غشا، انرژی نور را به انرژی شیمیایی تبدیل کنند.

۱۶- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«هر جزئی از اجزای زنجیره(های) انتقال الکترون در غشای به طور حتم»

(۱) تیلاکوئید که میزان pH فضای درون تیلاکوئید را افزایش می‌دهد - از P_{680} الکترون‌های حاوی انرژی را دریافت می‌کند


(۲) تیلاکوئید که الکترون‌ها را مستقیماً از نوعی فتوسیستم دریافت می‌کند - فقط در تماس با بخش‌های فسفات‌دار غشا قرار دارد

(۳) درونی راکیزه که با گلیسرول فسفولیپیدهای هر دو لایه غشا در تماس نیست - الکترون را حداکثر از دو محل دریافت می‌کند

(۴) درونی راکیزه که در خلاف جهت شیب غلظت یون‌های هیدروژن، آن‌ها را جابه‌جا می‌کند - دارای بخشی برای عبور پروتون‌ها است

۱۷- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«با توجه به شکل زیر که برش برگ نوعی گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد، می‌توان گفت در این گیاه به طور حتم و در بخش مشخص شده با شماره می‌شود.»



- (۱) در انواعی از یاخته‌های زنده برگ، فقط طی روز کربن تثبیت می‌شود - (۲)، طی شرایطی، تنفس نوری به میزان زیادی انجام
- (۲) هنگام روز، فرایند(هایی) مانع وقوع چرخه کالوین می‌شوند - (۱)، نوعی ترکیب شش کربنی دوفسفاته تولید و سپس تجزیه
- (۳) جهت تبدیل CO_2 به مولکول قندی، اسید چهارکربنی تولید می‌شود - (۴)، طی شب نوعی اسید سه کربنی با CO_2 ترکیب

(۴) میزان CO_2 در محل فعالیت روبیسکو بالا نگه داشته می‌شود - (۳)، در مرحله‌ای از چرخه کالوین، نوعی حامل الکترون مصرف

۱۸- چند مورد، وجه مشترک همه یاخته‌های یوکاریوتی است که از ترکیب CO_2 و نوعی ماده دیگر، ماده آلی می‌سازند؟

- (الف) در آن‌ها نوعی محصول که مستقیماً حاصل از مصرف CO_2 است، ترکیبی ناپایدار است.
 - (ب) حداقل در بخشی از عمر خود، با حذف رونوشت اینترون‌ها از رنای پیک نابالغ، از طول آن می‌کاهند.
 - (ج) رنگیزه‌هایی برای به دام انداختن نور خورشید و سامانه‌هایی برای تبدیل انرژی آن به انرژی شیمیایی دارند.
 - (د) در ماده زمینه سیتوپلاسم آن‌ها، در هر فرایندی که گلوکز مصرف می‌شود، مصرف و تولید ATP مشاهده می‌شود.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹- در خصوص گیاهان نهان دانه، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ارتباط با همه گیاهان فتوسنتز کننده که می‌توان گفت که قطعاً»

- (۱) ریبولوز بیس فسفات را در انواعی از یاخته‌های میانبرگ مصرف می‌کنند - طی واکنش‌های تولید و مصرف هر مولکول پنج کربنی، CO_2 آزاد می‌شود
- (۲) کربن دی‌اکسید جو را فقط هنگام روز تثبیت می‌کنند - آنزیم کربوکسیلاز تنها در یاخته‌هایی دیده می‌شود که چرخه کالوین را انجام می‌دهند
- (۳) انواعی اسید سه کربنی را در یاخته‌های میانبرگ خود تولید می‌کنند - هنگام شب، میزان ذخایر قند در گروهی از یاخته‌های تمایز یافته روپوستی آن‌ها افزایش می‌یابد

(۴) تثبیت کربن جو را فقط به کمک چرخه کالوین انجام می‌دهند - در طی شرایطی می‌توانند قند ریبولوز بیس فسفات را با اکسیژن ترکیب کنند

۲۰- براساس مطلب کتاب درسی و مقایسه ساختارهای نخستین گیاهان نهان دانه علفی تک‌لپه و دولپه با قطر برابر، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ساختار برگ هر گیاهی که در برش عرضی ریشه آن به طور حتم»

- (۱) یاخته‌های آوندی بر روی یک دایره‌ای فرضی قرار گرفته‌اند - رگبرگ‌های آن در فاصله دورتری از روپوست پایینی نسبت به روپوست بالایی قرار دارند
- (۲) تعداد یاخته‌های رایج‌ترین بافت سامانه بافتی زمینه‌ای پوست، کم‌تر است - در همه یاخته‌های بین دو روپوست، پیرووات تولید و مصرف می‌شود
- (۳) یاخته‌های واجد دیواره‌ای چوبی شده در مرکز آن قرار گرفته‌اند - در هر یاخته روپوستی زنده، امکان تولید ATP به روش اکسایشی وجود دارد
- (۴) در بخش‌های آوندی، آوند آبکش به یاخته‌های روپوستی نزدیک‌تر است - رگبرگ‌های آن‌ها توسط یاخته‌های غلاف آوندی احاطه شده‌اند

۲۱- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«با در نظر گرفتن واکنش‌های کالوین و گلیکولیز در میانبرگ اسفنجی نوعی گیاه نهان دانه، می‌توان گفت این دو فرایند از لحاظ با هم شباهت دارند، اما از لحاظ با هم متفاوت هستند.»

- (الف) شکسته شدن پیوند بین دو کربن در نوعی ترکیب فسفات‌دار - تولید قند سه کربنی تک‌فسفاته با مصرف حامل الکترون
- (ب) بازسازی پذیرنده الکترون بدون تغییر در تعداد کربن - تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار در اولین مرحله خود
- (ج) مصرف ATP هم‌زمان با تولید پذیرنده الکترون - مصرف دو عدد ATP به ازای مصرف هر مولکول شش کربنی
- (د) مشاهده هر قند سه کربنی در اتصال با یک گروه فسفات - تولید قند شش کربنی دو فسفاته

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۲- کدام مورد، فقط دربارهٔ بعضی از روش‌هایی صادق است که به طور حتم در همهٔ جانداران فتوسنتزکننده، به ساخته شدن ATP منجر می‌شوند؟

- (۱) ضمن مصرف نوعی نوکلئوتید دوفسفاته، مولکول آب تولید می‌شود.
- (۲) الکترون‌های انواع مختلفی از مولکول‌های حامل الکترون، در زنجیره‌ای در طول غشا جابه‌جا می‌شوند.
- (۳) انرژی حاصل از جابه‌جایی یون‌های H^+ ، در تشکیل پیوند بین فسفات‌ها نقش دارد.
- (۴) مستقیماً از انرژی الکترون‌ها برای تولید شکل رایج انرژی در یاخته استفاده می‌شود.

۲۳- مطابق مطالب کتاب درسی، هر جاندار یوکاریوتی فتوسنتزکننده که می‌تواند تحت شرایطی همه یا بعضی از کلروپلاست(های) خود را از دست بدهد، چه مشخصه‌ای دارد؟

- (۱) دومین سطح سازمان‌یابی در پیکر آن، حاصل همکاری یاخته‌ها با یکدیگر است
- (۲) توسط نوعی آنزیم رنابسپاراز و هم‌چنین محصول آن، نوعی آنزیم تولید کند
- (۳) همانند پارامسی نوعی آغازی است که در شرایطی از مواد آلی تغذیه می‌کند
- (۴) همهٔ مولکول‌های رنگیزهٔ خود را در کلروپلاست(ها) نگهداری می‌کند

۲۴- کدام گزینه، نادرست است؟

- (۱) سیانوباکتری برخلاف باکتری گوگردی ارغوانی، به کمک کلروفیل a موجود در نوعی غشای زیستی، انرژی نور را به دام می‌اندازد.
- (۲) باکتری گوگردی ارغوانی همانند اوگلنا، با استفاده از نور خورشید، گلوکز می‌سازد و فاقد توانایی تولید گازی بی‌رنگ با بوی شبیه تخم مرغ گندیده است.
- (۳) باکتری نیترات‌ساز برخلاف توبره واش، می‌تواند از واکنش‌های اکسایشی جهت تأمین انرژی مورد نیاز برای نوعی فرایند سوخت و سازی استفاده کند.
- (۴) باکتری گوگردی ارغوانی همانند باکتری نیترات‌ساز، بدون نیاز به تجزیهٔ نوری آب، فرایند تولید مواد آلی از مواد معدنی را صورت می‌دهد.

۲۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در واکنش‌های فتوسنتز در کلروپلاست نوعی جلبک سبز، به ازای می‌شود.»

- (۱) وابسته به نور - تجزیهٔ دو مولکول آب در تیلاکوئید، فقط یک مولکول $NADP^+$ دچار کاهش
- (۲) مستقل از نور - تولید هر مولکول ADP در داخل بستره، یک مولکول NADPH مصرف
- (۳) وابسته به نور - تولید دو مولکول حامل الکترون، یک مولکول اکسیژن در داخل تیلاکوئید تولید
- (۴) مستقل از نور - خروج هر قند فسفات از چرخه‌ای از واکنش‌های آنزیمی، دوازده مولکول NADPH دچار اکسایش



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱

مطابق با اطلاعات کتاب درسی، گروهی از فرایندهای شیمیایی موجب بازتولید NAD^+ در یاخته‌های ماهیچه‌های متصل به استخوان‌های

دنده می‌شوند. ویژگی مشترک این فرایندها، کدام یک از موارد زیر است؟

زنجیره انتقال الکترون در تنفس یاخته‌ای +
تخمیر لاکتیکی

الف) ماده تولید شده در انتهای این فرایندها سبب فساد مواد غذایی می‌شود.

ب) می‌توانند سبب تولید مولکولی (هایی) با توانایی کاهش pH، در بدن فرد شوند.

ج) نوعی مولکول واحد سطح ساختاری سوم، در ذخیره گیرنده نهایی الکترون این فرایندها نقش ایفا می‌کند.

د) در این فرایندها تولید آدنوزین تری فسفات در اسیدی ترین بخش راکیزه (میتوکندری) دور از انتظار است.

۲) ب - ج

۱) الف - ب

۴) ج - د

۳) ب - د

پاسخ: گزینه ۳

خودت حل کنی بهتره ماهیچه‌هایی که به استخوان‌های دنده متصل‌اند و آن‌ها را حرکت می‌دهند، از نوع اسکلتی هستند. در یاخته‌های

ماهیچه اسکلتی دو روش برای بازتولید NAD^+ وجود دارد:

۱) زنجیره انتقال الکترون راکیزه (طی تنفس یاخته‌ای و همراه با مصرف O_2)

۲) تخمیر لاکتیکی (روش مستقل از اکسیژن)

پاسخ تشریحی موارد «ب» و «د» مناسب هستند.

بررسی همه موارد:

الف) باکتری‌هایی که تخمیر لاکتیکی انجام می‌دهند، موجب فساد غذا می‌شوند؛ در واقع لاکتیک اسید (لاکتات) مولکولی است که طی تخمیر

(نه تنفس یاخته‌ای) تولید می‌شود و می‌تواند سبب فاسد شدن مواد غذایی شود.

نکته تخمیر لاکتیکی هم می‌تواند در تولید محصولات غذایی مانند خیارشور و هم می‌تواند در فاسد شدن مواد غذایی مانند ترش شدن

شیر نقش داشته باشد.

ب) تخمیر لاکتیکی موجب تولید لاکتیک اسید می‌شود. در زنجیره انتقال الکترون تنفس هوازی نیز به دنبال اکسایش $NADH$ و $FADH_2$ ،

تعدادی یون H^+ ایجاد می‌شود، پس هر دو واکنش می‌توانند به نوعی باعث کاهش pH در بخش‌هایی از بدن شوند.

ج) میوگلوبین نمونه‌ای از پروتئین‌ها با ساختار سوم است. این پروتئین در ذخیره اکسیژن در

ماهیچه‌های اسکلتی نقش دارد. می‌دانید اکسیژن، پذیرنده نهایی الکترون در تنفس هوازی است،

اما پذیرنده نهایی الکترون در تخمیر لاکتیکی پیرووات است که خب در میوگلوبین ذخیره نمی‌شود.

د) طبق متن کتاب درسی، پروتون‌ها (یون‌های هیدروژن) براساس شیب غلظت خود، از فضای بین دو غشای راکیزه به بخش درونی آن می‌روند،

پس می‌توان نتیجه گرفت مقدار پروتون‌ها در بخش داخلی راکیزه کم‌تر از فضای بین دو غشای آن است پس این بخش، pH بیشتری نسبت به

فضای بین دو غشا دارد؛ در تنفس هوازی، تولید ATP در بخش داخلی راکیزه (با خاصیت اسیدی کم‌تر) انجام می‌شود. هم‌چنین تولید ATP


در طی فرایند تخمیر در ماده زمینه سیتوپلاسم (خارج از راکیزه) انجام می‌گیرد.

نکته بخش‌هایی از یاخته که در آن‌ها، امکان تولید ATP وجود دارد: ۱) ماده زمینه سیتوپلاسم طی قندکافت و ۲) بخش داخلی راکیزه

در نتیجه عملکرد آنزیم ATP ساز مستقر در غشای داخلی راکیزه و آنزیم فعال در چرخه کربس.

آزمون ششم آنلاین

رشته تجربی





پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۲

شکل زیر نشان دهنده برگ نوعی گیاه C_۳ می باشد که در هنگام حضور نور کافی (حالت ۱) و کاهش میزان نور محیط (حالت ۲) در یک فصل معین، مساحت بخش های سبزرنگ خود را تغییر می دهد. در این خصوص کدام گزینه درست است؟



(۱) در حالت (۱) همانند حالت (۲)، مولکول های آب در تیلاکوئیدهای متعلق به یاخته های میانبرگ تجزیه می شوند.

(۲) در حالت (۲) برخلاف حالت (۱)، فعالیت بیش از یک نوع آنزیم ATP ساز قرار گرفته در نوعی غشا مشاهده می شود.

(۳) در حالت (۲) همانند حالت (۱)، در فضای درون تیلاکوئیدهای یاخته های نگهبان روزنه، نوعی حامل الکترون ساخته می شود.

(۴) در حالت (۲) برخلاف حالت (۱)، رنگیزه فتوسنتزی غالب در همه یاخته های برگ گیاه، سبزینه a است.

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی: در گیاهان، حضور نور کافی و همچنین کاهش میزان نور محیط، می تواند اثرات متفاوتی روی برگ های گیاهان داشته باشد. با توجه به کتاب درسی، در برگ بعضی گیاهان، بخش های غیرسبز، مثلاً سفید، زرد، قرمز یا بنفش، دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های سبز در برگ ها می شود. در حالت (۲) همانند حالت (۱)، نور وجود دارد و همچنین در گروهی از یاخته های برگ (نگهبان روزنه و میانبرگ) کلروفیل مشاهده می شود؛ پس در هر دو حالت امکان وقوع واکنش های وابسته به نور فتوسنتز و در نتیجه تجزیه مولکول آب در تیلاکوئید وجود دارد.

نکته: نور می تواند دو اثر متفاوت در گیاهان داشته باشد؛ در گروهی از گیاهان کاهش نور محیط سبب افزایش بخش های سبزرنگ آنها می شود که این تغییر در راستای حداکثر استفاده از نور محیط برای فتوسنتز است. در گروهی دیگر، مثلن با کم شدن نور (کاهش طول روز) ساختار سبزدیسه ها به رنگ دیسه تغییر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

(۲) با توجه به وجود واکنش های نوری در حالت های (۱) و (۲)، امکان فعالیت اجزای زنجیره انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید و در نتیجه تولید نوری ATP (فعالیت آنزیم ATP ساز) طی واکنش های وابسته به نور فتوسنتز وجود دارد. از طرفی در این یاخته ها، میتوکندری و تنفس هوازی هم روی می دهد که طی آن تولید اکسایشی ATP با کمک آنزیم ATP ساز غشای درونی میتوکندری رخ می دهد.

نکته: در میتوکندری آنزیم ATP ساز، در غشای درونی میتوکندری قرار دارد، اما در کلروپلاست این آنزیم در غشای تیلاکوئید قرار دارد. به عبارتی در هر دو اندامک این آنزیم در درونی ترین غشای مربوط به اندامک دیده می شود.

(۳) در هر دو حالت، واکنش های وابسته به نور انجام می شوند و مولکول های NADPH (حامل الکترون) تولید می شوند؛ اما دقت کنید که حامل های الکترون طی این واکنش ها، در فضای بستره تولید می شوند؛ نه در فضای درون تیلاکوئید.

نکته: واکنش هایی از فتوسنتز که در تیلاکوئید رخ می دهند: (۱) زنجیره انتقال الکترون (۲) تجزیه نوری آب واکنش هایی از فتوسنتز که در بستره کلروپلاست رخ می دهند: (۱) تولید ATP و NADPH (۲) چرخه کالوین

(۴) دقت کنید همه ی یاخته های برگ سبزینه ندارند. برای مثال یاخته های آوند چوبی و آبکش فاقد سبزینه اند. هر چه قدر، یک بخش گیاه، سبزتر باشد یعنی کلروفیل بیشتر دارد. به طور کلی در برگ های گیاه، سبزینه ها (a و b) نسبت به کاروتنوئیدها، رنگیزه غالب تری هستند.

تست و پاسخ ۳

NADH

در خصوص نوعی مولکول حامل الکترون که برخلاف حامل دیگر الکترون، به نوعی در کاهش یافتن همه اجزای زنجیره انتقال الکترون در غشای راکیزه (میتوکندری) نقش دارد، کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت است؟

(۱) در واکنشی از مرحله نخست تنفس یاخته ای، همراه با تولید اسید دوفسفاته تولید می شود.

(۲) هرگاه مولکول کربن دی اکسید درون یک یاخته تولید شود، بلافاصله این مولکول تولید می گردد.

(۳) در طی وقوع تنفس هوازی، انرژی ذخیره شده در این مولکول آزاد و صرف تولید ATP بیشتر می شود.

(۴) پس از تشکیل اولین ترکیب شش کربنی بدون فسفات در تنفس هوازی، در طی واکنش هایی ایجاد می شود.

پاسخ: گزینه ۲



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

خودت حل کنی بهتره NADH نوعی حامل الکترون است که برخلاف $FADH_2$ ، به نوعی در کاهش یافتن همه اعضای زنجیره انتقال الکترون در غشای راکیزه نقش دارد. الکترون‌های NADH وارد اولین جزء زنجیره می‌شوند و تا انتها پیش می‌روند، اما الکترون‌های $FADH_2$ از جزء دوم زنجیره تا انتهای آن، جابه‌جا می‌شوند.

پاسخ تشریحی ۲) برخلاف سایر گزینه‌ها نادرست بیان شده است.

در یک یاخته، طی واکنش‌های مختلفی امکان تولید CO_2 وجود دارد مثل تنفس نوری، اکسایش پیرووات، چرخه کربس و همین‌طور تخمیر الکلی! طبق مطالب کتاب درسی، می‌دانیم در طی اکسایش پیرووات و چرخه کربس، NADH تولید می‌شود؛ اما طی تخمیر الکلی، بعد از آزاد شدن CO_2 ، NADH مصرف و NAD^+ تولید می‌گردد.

نکته از آنجایی که الکترون‌های NADH از هر سه پمپ زنجیره انتقال الکترون می‌توانند عبور می‌کنند، پس در پمپ H^+ و ایجاد شیب آن از فضای بین دو غشا به سمت بخش داخلی نقش بیشتری دارند (در مقایسه با $FADH_2$)؛ پس در تولید ATP هم نقش بیشتری دارند به عبارتی به ازای هر NADH نسبت به $FADH_2$ ، ATP بیشتری ساخته می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در واکنش‌های قندکافت در همه یاخته‌های زنده، در واکنشی که منجر به تشکیل یک اسید دوفسفاته از قندفسفاته می‌شود، مولکول NADH هم تولید می‌شود.

۳) در طی تنفس یاخته‌ای هوازی، انرژی ذخیره شده در مولکول NADH آزاد و صرف تولید ATP بیشتر (به واسطه انجام زنجیره انتقال الکترون) خواهد شد.

نکته در کدام واکنش‌های تنفس یاخته‌ای، ATP به طور مستقیم تولید می‌شود؟ قندکافت + کربس + فعالیت آنزیم ATP ساز. کدام واکنش‌های تنفس یاخته‌ای، مولکول (هایی) تولید می‌کنند که در تولید ATP نقش دارند؟ قندکافت و اکسایش پیرووات با تولید NADH + کربس با تولید NADH و $FADH_2$ + زنجیره انتقال الکترون با تأمین شیب H^+ لازم برای فعالیت آنزیم ATP ساز.

۴) در طی چرخه کربس، از ترکیب استیل کوآنزیم A و ترکیبی چهار کربنی، به دنبال آزاد شدن کوآنزیم A، اولین ترکیب شش کربنی بدون فسفات ایجاد خواهد شد، سپس در ادامه طی واکنش‌های آنزیمی در این چرخه، NADH تولید می‌شود.

$FADH_2$	NADH
مولکول‌های آلی‌ای هستند که الکترون‌ها را حمل می‌کنند و در ساختار خود دو نوکلئوتید دارند.	
هر دو، در ساختار خود دارای باز آلی آدین هستند.	
در چرخه کربس تولید می‌شود. (در تنفس هوازی!)	در قندکافت، اکسایش پیرووات و چرخه کربس تولید می‌شود.
در یاخته یوکاریوتی فقط در راکیزه (بخش داخلی آن) تولید می‌شود.	در یاخته یوکاریوتی درون (بخش داخلی) و یا بیرون از راکیزه تولید می‌شود.
در تنفس هوازی، هر کدام دو الکترون را وارد زنجیره انتقال الکترون می‌کنند که در نهایت به اکسیژن مولکولی می‌رسد.	
الکترون‌های خود را به صورت مستقیم به اولین بخش پروتئینی زنجیره انتقال الکترون، انتقال می‌دهد.	الکترون‌های خود را به صورت مستقیم به دومین جزء زنجیره انتقال الکترون، انتقال می‌دهد.
در تخمیر، الکترون‌های خود را به نوعی ماده آلی ۲ کربنه (تخمیر الکلی) و یا ۳ کربنه (تخمیر لاکتیکی) انتقال می‌دهد.	در تخمیر، الکترون‌های خود را به نوعی ماده آلی ۲ کربنه (تخمیر الکلی) و یا ۳ کربنه (تخمیر لاکتیکی) انتقال می‌دهد.
الکترون‌هایی که حمل می‌کند، می‌تواند در تولید اکسایشی ATP نقش داشته باشد. (اگر در تخمیر مصرف شود، منجر به تولید ATP نمی‌شود).	الکترون‌هایی که حمل می‌کند، می‌تواند در تولید اکسایشی ATP نقش داشته باشد. (اگر در تخمیر مصرف شود، منجر به تولید ATP نمی‌شود).



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس




تست و پاسخ ۴

کدام ویژگی، واکنش(های) تولید مولکول $FADH_2$ را از تولید حامل الکترون دیگر در چرخه کربس، متمایز می‌سازد؟

- (۱) تنوع واکنش‌دهنده‌ها بیشتر از تنوع فراورده(ها) است.
- (۲) با دریافت یک الکترون توسط مولکول پذیرنده، مولکولی خنثی تولید می‌شود.
- (۳) در یک محدوده دمایی خاص انجام شده و به تداوم نوعی واکنش زیستی کمک می‌کند.
- (۴) فراورده این واکنش، در مجاورت یکی از اجزای کاملاً آب‌گریز غشای چین‌خورده راکیزه، مصرف می‌شود.

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی: دو نوع حامل الکترون $NADH$ و $FADH_2$ در چرخه کربس، مطابق واکنش‌های زیر تولید می‌شوند:



مولکول $FADH_2$ توسط دومین جزء زنجیره انتقال الکترون راکیزه چهار اکسایش (مصرف) می‌شود. این جزء کاملن آب‌گریز است و فقط با بخش‌های آب‌گریز فسفولیپیدهای غشایی (اسیدهای چرب) در تماس است. هم‌چنین دقت کنید که $NADH$ توسط نخستین جزء زنجیره مصرف می‌شود که این جزء به طور کامل آب‌گریز نمی‌باشد.

نکته

پروتئین‌ها و فسفولیپیدها، مولکول‌هایی هستند که هم بخش‌های آب دوست دارند و هم آب‌گریز. مثلن سرهای فسفولیپید و بخش‌هایی از پروتئین که در سطح خارجی مولکول قرار دارند، آب‌دوست هستند و اسیدهای چرب هم، جزء بخش‌های آب‌گریز محسوب می‌شوند یا بخش‌هایی از پروتئین که در بخش‌های داخلی مولکول قرار دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) طبق واکنش‌های نشان داده‌شده، در هر دو واکنش، تنوع واکنش‌دهنده‌ها بیشتر از فراورده‌ها است.
- ۲) طبق متن کتاب درسی، در رابطه با واکنش تولید $NADH$ ، می‌توان گفت، NAD^+ (پذیرنده الکترون) با دریافت یک الکترون خنثی می‌شود (NAD) اما در واکنش تولید $FADH_2$ ، مولکول پذیرنده (FAD) از اول خودش خنثی است و نیازی به خنثی شدن ندارد، از طرفی با دریافت الکترون، بار منفی پیدا می‌کند.
- ۳) هر دو واکنش، وابسته به حضور آنزیم(ها) هستند. طبق اطلاعات فصل ۱ زیست شناسی ۳، می‌دانیم آنزیم‌ها در یک محدوده دمایی خاص فعالیت می‌کنند. مولکول‌های $NADH$ و $FADH_2$ نیز در تداوم زنجیره انتقال الکترون راکیزه و در نتیجه تولید ATP نقش دارند؛ پس این گزینه در رابطه با هر دو مولکول صادق است.

تست و پاسخ ۵

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- «در یک اسپروژیر، در بخش‌هایی از که در مجاورت غشای یاخته‌ای قرار گرفته است،»
- (الف) کلروپلاست – معمولاً تعداد سبزینه‌های بیشتری تجمع یافته‌است
 - (ب) هسته یاخته – امکان جابه‌جایی مواد بین سیتوپلاسم و هسته وجود دارد
 - (ج) کلروپلاست – رنگیزه‌های فتوسنتزی، برخی طول موج‌ها را بیشتر جذب می‌کنند
 - (د) هسته یاخته – گروهی از آنزیم‌های بسپارازی، فعالیت نوکلئازی نیز انجام می‌دهند

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی موارد «الف» و «ج» عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل می کنند.

درس نامه



برای بررسی تأثیر طول موج های نور مرئی بر میزان فتوسنتز، می توان با استفاده از اسپروژیر (جلبک سبز رشته ای)، نوعی باکتری هوازی، چشمه نور و منشور (برای تجزیه نور) آزمایشی را انجام داد. اسپروژیر سبز دیسه های نواری و دراز دارد. اگر همه طول موج های نور به یک اندازه در فتوسنتز مؤثر باشند، انتظار

داریم که تراکم اکسیژن در اطراف جلبک رشته ای یکسان باشد. در آزمایشی که برای بررسی این فرض انجام شد. جلبک را روی سطحی ثابت کردند و درون لوله آزمایشی شامل آب و باکتری های هوازی قرار دادند. لوله آزمایش در برابر نوری قرار گرفت که از منشور عبور کرده و به طیف های متفاوت تجزیه شده بود. بعد از گذشت مدتی، مشاهده شد که باکتری های هوازی در بعضی قسمت ها بیشتر تجمع یافته اند.

بررسی طول موج های مختلف نور در فتوسنتز

- مراحل آزمایش
- ← ثابت کردن جلبک اسپروژیر بر روی یک سطح
 - ← قراردادن جلبک درون لوله آزمایش دارای آب و باکتری هوازی
 - ← جلبک اسپروژیر برای انجام فتوسنتز و ادامه زندگی به آب نیاز دارد.
 - ← با مصرف آب، جلبک طی فتوسنتز اکسیژن آزاد می کند و باکتری هوازی این اکسیژن را مصرف می کند.
 - ← قراردادن لوله آزمایش در برابر طیف های مختلف نور (نور را از منشور عبور می دهیم تا طیف های مختلف آن نمایان شود).
 - ← مشاهده تجمع باکتری های هوازی در بخش هایی از لوله آزمایش (تجمع در بخش هایی صورت می گیرد که O_2 بیشتری تولید شده است).

- نتیجه گیری
- ← طول موج های مختلف نور مرئی تأثیر یکسانی در میزان فتوسنتز ندارند.
 - ← بیشترین میزان فتوسنتز در محدوده آبی و قرمز نور مرئی ← تجمع باکتری ها در این بخش ها بیشتر است.
 - ← بیشتر بودن میزان فتوسنتز در بخش هایی که جذب نور توسط کلروفیل های a و b زیاده تر است ← کلروفیل رنگیزه اصلی در فتوسنتز است.
 - ← جلبک اسپروژیر در هر طول موجی از نور مرئی توانایی فتوسنتز دارد (حتی به میزان خیلی کم) و O_2 تولید می کند.

بررسی همه موارد:

الف) همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید سبزینه ها در بخش های خاصی از کلروپلاست نواری شکل بیشتر تجمع پیدا کرده اند (بخش های تیره تر یا سبتر) که این بخش ها اغلب (نه همواره!) در مجاورت غشا قرار دارند. (تأیید مورد الف)

ب و د) دقت کنید که هسته (ساختر گرد در مرکز یاخته) همواره در میانه یاخته قرار گرفته است و امکان مشاهده آن در مجاورت غشای یاخته وجود ندارد. هم چنین دقت کنید که رشته های مجاور هسته (ساختر ستاره ای شکل)، رشته های سیتوپلاسمی هستند که تا نزدیکی غشا امتداد یافته اند. (رد مورد «ب» و «د»)



ج) اسپروژیر همانند گیاهان، سبزینه های a و b دارد؛ رنگیزه های فتوسنتزی، طبق شکل کتاب درسی، در طول موج ۴۰۰ تا ۵۰۰ و همچنین ۶۵۰ تا ۷۰۰ نانومتر میزان نور بیشتری جذب می کنند دقت کنید در یک طول موج معین ممکن است فقط یکی از رنگیزه ها حداکثر جذب نوری خود را داشته باشد (تأیید مورد «ج»).



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۶

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«اگر بنا باشد که شود، باید گردد.»

- (۱) تخمیر توسط یاخته‌های درخت حرا، تحمل - لاکتیک اسید تولیدی در هر یاخته، توسط ریشه گیاه، دفع
- (۲) گلیکوژن برای تولید ATP در یاخته‌های کبدی، تجزیه - ابتدا اسیدهای چرب در این یاخته‌ها، تجزیه
- (۳) سیانید سبب مرگ نوعی یاخته پوششی - واکنش مربوط به اکسایش نوعی حامل الکترون، بلافاصله متوقف
- (۴) فعالیت همه پمپ‌های غشای درونی راکیزه بدون اثر مواد سمی، متوقف یا کمتر - تولید NADH در فرایندهای یاخته، قطع

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی: الکترون‌های حاصل از اکسایش NADH از هر سه پمپ زنجیره عبور می‌کنند، اما الکترون‌های $FADH_2$ از پمپ‌های ۲ و ۳ عبور می‌کنند؛ پس برای این‌که فعالیت همه پمپ‌های یون هیدروژن در غشای داخلی راکیزه کاملن متوقف یا کمتر شوند، لازم است تا تولید NADH، نیز متوقف گردد. اگر $FADH_2$ وجود داشته باشد، پمپ‌های ۲ و ۳ کار می‌کنند، اما چون الکترون‌های کم‌تری از آن‌ها عبور می‌کنند، فعالیت آن‌ها کمتر خواهد بود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) دقت کنید برخی یاخته‌های گیاه مانند یاخته‌های آوند چوب و بافت اسکلرانسیم مرده هستند و توانایی انجام تخمیر لاکتیکی ندارند.
- (۲) یاخته‌های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیره قندی کبد (گلیکوژن) برای تأمین انرژی استفاده می‌کنند. در صورتی که این منابع کافی نباشند، آن‌ها برای تولید ATP به سراغ تجزیه چربی‌ها و پروتئین‌ها می‌روند. در نتیجه ابتدا گلوکز و گلیکوژن ذخیره شده تجزیه می‌شوند؛ سپس چربی‌ها و پروتئین‌ها.

نکته جاهایی که بدن می‌رود سراغ تجزیه چربی‌ها یا پروتئین‌ها: (۱) کمبود منابع گلوکز یا گلیکوژن (۲) استفاده از اسیدهای چرب در انقباض‌های طولانی ماهیچه‌ها (۳) دیابت شیرین به دنبال کمبود گلوکز در دسترس یاخته‌ها.

(۳) سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهار می‌کند؛ در نتیجه بلافاصله واکنش تولید آب متوقف می‌شود و در ادامه به دلیل اختلال در فعالیت سایر مولکول‌های زنجیره، اکسایش حامل‌های الکترون نیز متوقف می‌شود.

تست و پاسخ ۷

با توجه به اطلاعات کتاب زیست شناسی ۳، در فضای درونی ساختارهایی از یک یاخته گیاهی که دارای دو غشا هستند، نوعی آنزیم دو واکنش متفاوت را به انجام می‌رساند. کدام گزینه ویژگی مشترک همه این آنزیم‌ها است؟

رنابسپاراز + دنابسپاراز + روبیسکو

- (۱) در هر واکنشی که با مصرف نوعی ترکیب کربن‌دار همراه است، مولکولی با تعداد کربن بیشتر می‌سازند.
- (۲) با شرکت در واکنش‌های سوخت و سازی یاخته از نوع ترکیب، منجر به ساخت نوعی بسپار زیستی می‌شوند.
- (۳) در هر واکنشی که توسط آن‌ها انجام می‌شود، نوعی مولکول فسفات‌دار در جایگاه فعال آنزیم قرار می‌گیرد.
- (۴) در هر بار فعالیت خود، همواره پیوند(های) اشتراکی را در همه مولکول‌های واکنش‌دهنده، تحت تأثیر قرار می‌دهند.

پاسخ: گزینه ۳

خود حل کنی بهتره ساختارهای دوغشایی در یاخته گیاهی شامل پلاست‌ها (کلروپلاست)، هسته و میتوکندری است. آنزیم روبیسکو در کلروپلاست (فعالیت کربوکسیلازی و اکسیژنازی)، دنابسپاراز (فعالیت بسپارازی و نوکلئازی) و رنابسپاراز (بسپارازی و جداکننده دو رشته دنا از هم) آنزیم‌هایی هستند که می‌توانند دو واکنش مختلف را به انجام برسانند.

پاسخ تشریحی: روبیسکو از قند ریبولوز بیس فسفات به عنوان پیش‌ماده استفاده می‌کند. دنابسپاراز و رنابسپاراز هم، از دنا و نوکلئوتیدهای فسفات‌دار استفاده می‌کنند که همگی دارای فسفات هستند. این مولکول‌ها در جایگاه فعال آنزیم‌ها قرار می‌گیرند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته آنزیم‌های دنابسپاراز و رنابسپاراز علاوه بر هسته در میتوکندری و کلروپلاست‌ها هم می‌توانند فعالیت کنند، اما روبیسکو، آنزیمی است که در یوکاریوت‌ها، فقط در کلروپلاست فعالیت دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) طی فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مولکولی با تعداد کربن بیشتر تولید نمی‌شود، چرا که طی آن اکسیژن به قند ۵ کربنی متصل می‌شود. هم‌چنین طی فعالیت نوکلفازی دنابسپاراز نیز، جدا شدن نوکلئوتید رخ می‌دهد و طول رشته پلی‌نوکلئوتیدی کاهش می‌یابد.

نکته به دنبال فعالیت بسپارازی آنزیم دنابسپاراز، مولکول دناپی با تعداد نوکلئوتید بیشتر نسبت به دناپی اولیه ساخته نمی‌شود چراکه این آنزیم، رشته دنا را الگو قرار می‌دهد و دناپی می‌سازد که از نظر نوع و تعداد نوکلئوتیدها، مشابه دناپی اولیه است، فقط فعالیت آن سبب می‌شود از هر مولکول دنا، دو مولکول دنا ساخته شود.

۲) رنابسپاراز و دنابسپاراز علاوه بر واکنش‌های ترکیب (ساخت بسپارهای رنا و دنا) در واکنش‌های تجزیه‌ای هم نقش دارند (مانند شکستن پیوند فسفودی استر توسط دنابسپاراز و شکستن پیوندهای هیدروژنی توسط رنابسپاراز). طی واکنشی که در آن، روبیسکو ماده‌ای دیگر را می‌سازد (چه اکسیژنازی و چه کربوکسیلازی)، بسپار زیستی ساخته نمی‌شود.

۳) دقت کنید در زمان فعالیت بسپارازی دنابسپاراز و رنابسپاراز، پیوندهای اشتراکی پیش‌ماده (مثل دنا) تغییری نمی‌کند، بلکه پیوندهای اشتراکی جدید ساخته می‌شود.

هسته	کلروپلاست (سبز دیسه)	میتوکندری (راکیزه)	
در یاخته‌های یوکاریوتی (برخی چند هسته دارند مثل ماهیچه اسکلتی و برخی هسته ندارند مثل گویچه قرمز بالغ).	یاخته‌های یوکاریوتی فتوسنتزکننده مثل گیاهان و آغازیان فتوسنتزکننده (نظیر اسپروژیر و اوگلنا و اکثر گیاهان)	اغلب یاخته‌های یوکاریوتی (گویچه قرمز بالغ راکیزه ندارد)	در چه جاندارانی
—	فتوسنتز (انرژی به ماده)	تنفس یاخته‌ای (ماده به انرژی)	نوع تبدیل انرژی
دو غشا (وجود منافذ هسته ارتباط بین هسته و سیتوپلاسم را برقرار می‌کنند).	۲ غشای اصلی اندامک، به همراه سامانه غشایی به نام تیلاکوئید	۲ غشا (بیرونی، صاف و درونی، چین خورده به سمت داخل)	تعداد غشا
توسط غشای درونی احاطه شده است و دارای بیشترین میزان ماده وراثتی (دنا) یاخته است.	۱) بستره ۲) فضای درون تیلاکوئید ۳) فضای بین دو غشای اندامک	۱) بخش درونی ۲) فضای بین دو غشا	فضای درون اندامک
خطی (فام‌تن‌ها)	حلقوی	حلقوی	نوع دنا
دارد. (هم دنا و هم رنا)	دارد. (رنا)	دارد. (رنا)	نوکلئیک اسید خطی
ندارد (رناهای ساخته‌شده در هسته برای ترجمه به سیتوپلاسم می‌آیند).	فقط بعضی از پروتئین‌های مورد نیاز اندامک، توسط خود اندامک تولید می‌شوند.		تولید پروتئین
می‌شود (میتوز یا میوز) - در گروهی از یاخته‌ها مثل ماهیچه اسکلتی یا نوروها تقسیم نمی‌شوند.	همراه با یاخته و نیز مستقل از آن	همراه با یاخته و نیز مستقل از آن	تقسیم
مرکز اصلی تنظیم فعالیت‌های یاخته به دلیل داشتن ماده وراثتی اصلی!	فتوسنتز (تولید قند) + مقداری هم ATP طی ساخته شدن نوری ATP	وقوع واکنش‌های تنفس یاخته‌ای در آن مثل اکسایش پیرووات + ساخته شدن اکسایشی ATP و در چرخه کربس (تأمین ATP مورد نیاز یاخته)	عملکرد اصلی



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

۸

تست و پاسخ

با فرض این که در یاخته‌های بدن انسان، یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازی به واسطهٔ مسمومیت با مادهٔ شیمیایی مهار شده باشند. کدام مورد در رابطه با فعالیت این یاخته‌ها، به طور حتم درست است؟

- (۱) نهایتاً فعالیت هر آنزیم موجود در غشاهای چین‌خوردهٔ راکیزه (میتوکندری)، متوقف می‌شود.
- (۲) یکی از ویژگی‌های حیات که با غذاخوردن جانداران مرتبط است، در معرض خطر قرار گرفته است.
- (۳) به دنبال قرارگرفتن در معرض سیگار یا دود خارج شده از خودروها، تولید ATP دستخوش اختلال شده است.
- (۴) در صورت مشاهدهٔ کربن مونواکسید درون حبابک‌ها، قطعاً جایگاه‌های اکسیژن در نوعی پروتئین خنوب اشغال شده است.



پاسخ: گزینه ۲

خودت حل کنی بهتره مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاخته‌ای و مرگ یاخته می‌شوند. از جمله این مواد، می‌توان به سیانید و کربن مونواکسید اشاره کرد.

پاسخ تشریحی یکی از ویژگی‌های حیات، جذب و استفاده از انرژی است. این ویژگی با غذاخوردن و تنفس یاخته‌ای (تبدیل انرژی ذخیره‌شده در مادهٔ مغذی به انرژی ذخیره‌شده در ATP) ارتباط دارد. با اختلال در عملکرد زنجیرهٔ انتقال الکترون (تنفس هوازی)، این فرایند مختل می‌شود.

نکته به طور کلی، همهٔ ویژگی‌های حیات برای این که بتوانند در جانداران بروز داشته باشند، مستلزم مصرف ATP توسط یاخته‌(های) جاندار هستند، پس همگی به عملکرد صحیح عوامل مؤثر در تنفس یاخته‌ای نیاز دارند.

درس نامه

(۱) سیانید:

واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به O_2 را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرهٔ انتقال الکترون می‌شود. سیانید ابتدا در فعالیت پمپ سوم زنجیرهٔ انتقال الکترون ایجاد می‌کند! اما کم‌کم کل زنجیره از کار می‌افتد. در صورت اثر سیانید بر زنجیرهٔ انتقال الکترون، ابتدا تولید یون اکسید و در نتیجه مولکول آب متوقف می‌شود، ولی تا زمانی که اختلاف غلظت یون هیدروژن بین دو سمت غشای داخلی به صفر نرسد، تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز ادامه خواهد یافت.

(۲) گاز کربن مونواکسید (CO):

گاز کربن مونواکسید از دو طریق در تنفس یاخته‌ای اختلال ایجاد می‌کند:
اول: با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می‌شود. — به آسانی از هموگلوبین جدا نمی‌شود. — ظرفیت حمل اکسیژن در خون کاهش می‌یابد — اختلال در تنفس یاخته‌ای
دوم: باعث توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون‌ها به اکسیژن در زنجیرهٔ انتقال الکترون می‌شود. — ممانعت از تشکیل آب — از بین رفتن شیب پروتونی لازم جهت ساخت ATP!

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ سیانید و کربن مونواکسید به طور مستقیم موجب اختلال (توقف) عملکرد پمپ سوم زنجیرهٔ انتقال الکترون و در نهایت موجب توقف کل زنجیرهٔ انتقال الکترون می‌شوند. دقت کنید یکی از وظایف اصلی این زنجیره، بازسازی NAD^+ و FAD است که برای وقوع سایر فرایندهای تنفس یاخته‌ای الزامی است. با اختلال در تولید این مولکول‌ها، سایر فعالیت‌های آنزیمی مربوط به تنفس یاخته‌ای هم مختل (متوقف) می‌شود. اما دقت کنید میتوکندری فقط یک غشای چین‌خورده دارد نه غشاها!

نکته فندکافت که شروع‌کنندهٔ تنفس یاخته‌ای و تخمیر است برای این که بتواند رخ دهد، به ATP برای شروع شدن و NAD^+ برای ادامه یافتن نیاز دارد پس اگر NAD^+ نباشد، فندکافت متوقف و سایر فرایندهای تنفس یاخته‌ای هم مختل خواهد شد.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

غشای خارجی راکیزه	غشای داخلی راکیزه
برخی مولکول‌های تولیدشده در قندکافت از آن‌ها عبور می‌کنند، مثل NADH و پیرووات.	فاقد زنجیره انتقال الکترون و آنزیم ATP ساز است.
دارای زنجیره انتقال الکترون و آنزیم ATP ساز است.	از مولکول‌های فسفولیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است.
از هر دو غشا، مولکول دو کربنی تولیدشده در واکنش‌های تنفس نوری، عبور می‌کند.	فاقد چین‌خوردگی است.
فضایی را احاطه می‌کند که درون آن، یون هیدروژن تجمع می‌یابد.	به سمت داخل دارای چین‌خوردگی است. (کمک به افزایش کارایی آن در تنفس یاخته‌ای)
فضایی را احاطه می‌کند که درون آن، فرایندهایی همانندسازی، رونویسی، ترجمه، چرخه کربس و ... انجام می‌گیرد. (بخش داخلی)	نسبت به دیگری مساحت کم‌تری دارد.
نسبت به دیگری مساحت بیشتری دارد.	گاز اکسیژن و کربن دی‌اکسید از هر دو غشا با انتشار ساده عبور می‌کند.

۳ این مورد فقط در رابطه با کربن مونواکسید صادق است و برای سیانید صدق نمی‌کند. دود خارج‌شده از خودروها و سیگار، از منابع تولید کربن مونواکسید هستند.

۴ کربن مونواکسید، جایگاه اتصال اکسیژن به هموگلوبین را اشغال می‌کند. هموگلوبین درون گویچه‌های قرمز وجود دارد، نه در خوناب و جزء پروتئین‌های خوناب محسوب نمی‌شود. دقت کنید که این مورد تنها در حالتی رخ می‌دهد که علت اختلال در کار یاخته‌ها، وجود کربن مونواکسید باشد و برای حالتی که سیانید علت اختلال باشد، نیز صادق نیست.

تست و پاسخ ۹

بلافاصله پس از استفاده از نوعی مولکول سه‌بخشی در چرخه کالوین، قند پنج کربنه دوفسفاته در یاخته‌های میانبرگ گل رز باز تولید می‌شود. این مولکول آلی، کدام نقش دیگر را نیز می‌تواند عهده‌دار باشد؟

ATP

- به دنبال استفاده آن در نوعی فرایند مؤثر در جابه‌جایی مواد، در هل دادن شیره خام به سمت بالا نقش دارد.
- انرژی مورد نیاز برای اتصال استیل و ترکیب کمک‌کننده به عملکرد آنزیم را در راکیزه فراهم می‌آورد.
- با همکاری سانتریول‌ها و رشته‌های دوک، در رشد و ترمیم اندام‌های جوان گیاه نقش دارد.
- با همکاری پروتئین‌ها، در تداوم زنجیره انتقال الکترون در سامانه‌های غشای چین‌خورده سبز دیسه نقش دارد.

پاسخ: گزینه ۱

خودت حل کنی بهتره در چرخه کالوین، بازتولید ریبولوز بیس فسفات (قند پنج کربنه دوفسفاته) به دنبال مصرف ATP رخ می‌دهد. هر مولکول ATP از سه بخش (قند ریبوز + باز آلی آدنین + گروه‌های فسفات) تشکیل شده است.

پاسخ تشریحی از زیست دهم به یاد دارید که فشار ریشه‌ای یکی از عواملی است که موجب جابه‌جایی مواد در آوندهای چوبی می‌شود (هل دادن شیره خام به سمت بالا). انتقال فعال یون‌های معدنی از یاخته‌های درون پوست و لایه ریشه‌زا به درون آوندهای چوبی، موجب ایجاد فشار ریشه‌ای در گیاهان می‌شود. انتقال فعال، با مصرف ATP همراه است.

نکته هر فرایند انتقال فعالی که در یاخته رخ می‌دهد، با مصرف ATP همراه نیست؛ مثلاً می‌تواند از انرژی حاصل از جابه‌جایی الکترون و یا حتی مولکول‌های دیگر استفاده کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲ کوآنزیم‌ها مواد آلی هستند که به فعالیت آنزیم‌ها کمک می‌کنند. اتصال کوآنزیم A به استیل، در راکیزه انجام می‌گیرد. توجه کنید طبق اطلاعات کتاب درسی، در این واکنش ATP مصرف نمی‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته هر مولکولی که به عملکرد صحیح آنزیمها کمک می کند، لزومن ماده آلی نیست بلکه می تواند مواد معدنی مثل آهن، مس و ... باشد.

۲۳ تقسیم میتوز در رشد و ترمیم اندامهای گیاه مؤثر است و نیازمند صرف انرژی زیستی (ATP) است اما توجه کنید یاخته های گیاه گل رز سانتیپول (میانک) ندارند. این اندامک در یاخته های جانوری یافت می شود.

نکته همه ی یاخته های گیاهی توانایی تقسیم ندارند، مثلن یاخته های مؤثر در تولید گامت ها و پارانثیمی ها، توان تقسیم دارند، اما مثلن آوندهای آبکشی با این که زنده هستند تقسیم نمی شوند، تشکیل بخش های مرتبط با این یاخته ها، به دنبال یاخته های مرستمی رخ می دهد.

۲۴ ATP در فعالیت سامانه های تبدیل کننده انرژی در غشای تیلاکوئید (فتوسیستمها) نقش ندارد؛ هم چنین توجه داشته باشید که غشای تیلاکوئید صاف است، نه چین خورده. تداوم زنجیره انتقال الکترون، سبب ساخت ATP در کلروپلاست می شود.

تست و پاسخ ۱۰

چند مورد، فقط درباره ی بعضی از مولکول های آدنوزین تری فسفات (ATP) در یک یاخته چندهسته ای ماهیچه دوسر ران، درست است؟

(الف) ساختار شیمیایی قند آنها تا حدودی به ساختار شیمیایی قندهای موجود در دنا، شباهت دارد.

(ب) ضمن مصرف یک مولکول هیدروژن دار می توانند، به آدنوزین و گروه های فسفات تجزیه شوند.

(ج) فسفات مورد نیاز برای تولید آنها، از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) تأمین شده است.

(د) به دنبال انتقال الکترون ها در یک ساختار یاخته ای، بلافاصله زمینه جاداشدن فسفات از آنها فراهم می شود.

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

پاسخ: گزینه ۲

درس نامه •• ساختار ATP

۱) نوکلئوتیدی است که از باز آلی آدنین، قند پنج کربنی ریبوز (که با هم آدنوزین نامیده می شوند) و سه گروه فسفات تشکیل شده است.

• آدنین ← نوعی باز آلی نیتروژن دار دو حلقه ای است (یکی ۵ ضلعی و دیگری ۶ ضلعی) که از سمت حلقه ۵ ضلعی خود به قند متصل است.

• ریبوز ← نوعی مونوساکارید ۵ کربنی است.


۲) با اتصال فسفات به آدنوزین امکان تشکیل ATP وجود دارد؛ مراحل افزوده شدن فسفات به آدنوزین با توجه به شکل روبه رو می تواند این گونه باشد:

(الف) اضافه شدن یک فسفات به آدنوزین → تشکیل آدنوزین مونوفسفات (AMP)

(ب) اضافه شدن یک فسفات به AMP → تشکیل آدنوزین دی فسفات (ADP)

(ج) اضافه شدن یک فسفات به ADP → تشکیل آدنوزین تری فسفات (ATP)

۳) بین فسفات های ATP پیوندهای پرانرژی بین فسفاتی وجود دارد که با آزاد شدن یک فسفات از ATP مقدار بیشتری انرژی آزاد می شود. (در مقایسه با سایر پیوندها)



پاسخ تشریحی فقط مورد «ج» درست است.

بررسی همه موارد:

(الف) مولکول ATP دارای قند ریبوز است. ریبوز از لحاظ ساختار شیمیایی تا حدودی به دئوکسی ریبوز (قند دنا) شباهت دارد. تفاوت ریبوز با دئوکسی ریبوز، در وجود یک اکسیژن بیشتر در ریبوز است و گر نه در سایر بخش ها، مشابه هم هستند. توجه کنید این مورد برای همه مولکول های ATP صادق است، نه فقط بعضی از آنها.

(ب) مولکول ATP با مصرف یک مولکول آب (مولکول هیدروژن دار)، به ADP و یک گروه فسفات، تجزیه می شود؛ از طرفی اگر آنزیمی بتواند هر سه گروه فسفات را با هم جدا کند، تبدیل شدن به آدنوزین و گروه های فسفات، در مورد همه آنها رخ می دهد نه فقط بعضی از آنها!

(ج) بعضی از مولکول های ATP در سطح پیش ماده تولید می شوند. در این روش، پیش ماده، دارای فسفاتی است که آن را به ADP منتقل می کند تا ATP تشکیل شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته فسفات لازم برای ساخت ATP می‌تواند از فسفات‌های آزاد یاخته باشد مثل آنزیم ATP ساز که در غشای درونی راکیزه است، از فسفات معدنی برای ساخت ATP استفاده می‌کند.

د) بعضی از مولکول‌های ATP به روش اکسایشی تولید می‌شوند. در روش اکسایشی، ATP به کمک گروه فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون‌ها در راکیزه (ساختار یاخته‌ای) ساخته می‌شود. توجه کنید این انتقال الکترون، زمینه افزوده شدن فسفات و تولید ATP را فراهم می‌کند! نه زمینه تفکیک (جدا شدن) فسفات.

مقایسه انواعی از آنزیم‌های تولیدکننده ATP در یاخته‌ها:

آنزیم تولیدکننده ATP از کراتین فسفات	آنزیم تولیدکننده ATP از اسیددو فسفات در قندکافت	آنزیم ATP ساز در غشای درونی میتوکندری	آنزیم ATP ساز در غشای تیلاکوئیدها (کلروپلاست)
به روش تولید در سطح پیش ماده، ATP را تولید می‌کنند.	در روش اکسایشی تولید ATP نقش دارند.	در روش نوری تولید ATP نقش دارند.	در روش نوری تولید ATP نقش دارند.
همگی از جنس پروتئین هستند؛ در نتیجه پیوندهای اشتراکی (پپتیدی و غیرپپتیدی) و غیراشتراکی (هیدروژنی و یونی) را دارند.			
فقط در یاخته‌های ماهیچه‌ای فعال است.	در همه یاخته‌های زنده وجود دارد.	در یاخته‌های یوکاریوتی واجد راکیزه در غشای درونی اندامک وجود دارد.	در یاخته‌های یوکاریوتی فتوسنتزکننده وجود دارد.
بر میزان فسفات آزاد در محیط واکنش بی تأثیر هستند.	از میزان فسفات آزاد در محیط انجام واکنش می‌کاهند.	از فسفات آزاد برای اضافه کردن به ADP استفاده می‌کنند.	انرژی حاصل از جابه جایی H^+ در جهت شیب غلظت یون‌های هیدروژن در ساخت ATP توسط آن‌ها نقش دارد.
عملکرد آن‌ها به شیب H^+ در محیط واکنش وابسته نیست.	خارج از ساختارهای غشایی یاخته‌ها قرار دارند.	در غشای درونی راکیزه قرار دارد و در بخش داخلی آن، ATP می‌سازد.	در غشای تیلاکوئید قرار دارد و در بستره کلروپلاست، ATP می‌سازد.

تست و پاسخ ۱۱

برای تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

تخمیر الکلی + تخمیر لاکتیکی

«به طور معمول در تخمیرهایی که در یاخته‌های یک گیاه نهان دانه می‌توانند انجام شوند، به طور حتم.....»

- فقط بعضی از - بنیان اسیدی سه کربنی تولید شده در مرحله اول فرایند، کربن دی اکسید آزاد می‌کند
- همه - NADH هم‌زمان با تولید ترکیب نهایی تخمیر، مصرف شده و نوعی پذیرنده الکترون بازسازی می‌شود
- فقط بعضی از - پیرووات در محل تولید خود در یاخته، الکترون‌های ترکیب دیگری را دریافت می‌کند
- همه - ترکیبی با تعداد اتم کربن یکسان با قندهای تک فسفات قندکافت، الکترون‌های NADH را دریافت می‌کند

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی در یاخته‌های گیاهی، هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی قابل مشاهده است. [۴] برخلاف سایر گزینه‌ها نادرست است. قندهای تک فسفات تولید شده در طی گلیکولیز، سه کربنه هستند. در تخمیر الکلی، اتانال (دوکربنی) و در تخمیر لاکتیکی، پیرووات (سه کربنی)، الکترون‌های NADH را دریافت می‌کنند.

نکته در تنفس یاخته‌ای، پذیرنده نهایی الکترون، O_2 است که مولکولی غیر آلی محسوب می‌شود، اما در تخمیر اتانول یا پیرووات الکترون دریافت می‌کنند که هر دو آلی هستند. طی تخمیر، الکترون‌های $FADH_2$ مصرف نمی‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- پیرووات، بنیان اسیدی سه کربنی تولید شده در فرایند گلیکولیز (مرحله اول تنفس یاخته‌ای) می‌باشد. پیرووات در تخمیر الکلی با از دست دادن کربن دی اکسید به اتانال تبدیل می‌شود، اما در تخمیر لاکتیکی، از پیرووات، کربن دی اکسید آزاد نمی‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته طی اکسایش پیرووات در تنفس یاخته‌ای هم از پیرووات، CO_2 آزاد می‌شود و استیل دوکربنی تولید می‌شود.

۲ هم‌زمان با تولید لاکتات در تخمیر لاکتیکی و هم‌زمان با تولید اتانول در تخمیر الکلی، NADH اکسایش می‌یابد و پذیرنده آلی نهایی (پیرووات و اتانول)، کاهش می‌یابد. در نتیجه NAD^+ (نوعی پذیرنده الکترون) بازسازی می‌شود.

۳ در هر دو نوع تخمیر، پیرووات که طی قندکافت در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم تولید شده است، در همان بخش از یاخته می‌ماند و در همین جا هم مصرف می‌شود. در تخمیر لاکتیکی، پیرووات با گرفتن الکترون‌های NADH به لاکتات تبدیل می‌شود، اما در تخمیر الکلی، پیرووات الکترون نمی‌گیرد، بلکه اول CO_2 از دست می‌دهد و اتانال حاصل از این واکنش، الکترون دریافت می‌کند.

تخمیر لاکتیکی	تخمیر الکلی
تأمین انرژی لازم برای گروهی از یاخته‌ها مثل یاخته‌های گیاهی و ماهیچه‌ها در شرایط کمبود O_2	ورآمدن خمیر نان + تأمین انرژی برخی یاخته‌ها (مثل گیاهی‌ها) در شرایط کمبود یا نبود O_2
۱) قندکافت → تولید پیرووات، NADH و ATP ۲) بازسازی NAD^+ از طریق انتقال الکترون‌های NADH به پیرووات و تولید لاکتات	۱) قندکافت → تولید پیرووات + NADH و ATP ۲) از دست دادن CO_2 توسط پیرووات و تشکیل اتانال ۳) بازسازی NAD^+ از طریق انتقال الکترون‌های NADH به اتانال و تولید اتانول
×	✓
تولید CO_2	اتانال (نوعی ماده آلی)
پیرووات (نوعی ماده آلی)	اتانول
لاکتیک اسید (لاکتات)	✓ (تولید نان)
✓ (تولید فراورده‌های شیری + خیارشور)	—
سبب فاسد شدن مواد غذایی می‌شود؟	ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم
محل انجام	تأثیر بر دستگاه عصبی مرکزی + کبد + انواع سرطان + سکته قلبی + ...
ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم	انجام قندکافت + از دست دادن CO_2 توسط پیرووات + بازسازی NAD^+
اثر محصول نهایی فرایند در بدن انسان	×
انجام قندکافت و تولید نوعی ترکیب سه کربنی + بازسازی NAD^+	در کدام یاخته‌های بدن انسان؟
ماهیچه‌های مخطط + گویچه قرمز بالغ	جاندارانی مثل باکتری‌ها، گیاهان و مخمر
باکتری‌ها، گیاهان و جانوران	در کدام جانداران

شکل



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۲

کدام گزینه، در خصوص هر مولکول آبی که طی تنفس یاخته‌ای به واسطهٔ عملکرد پروتئین‌های قرارگرفته در غشای داخلی راکیزه تولید می‌شود، درست است؟

- (۱) به دنبال ترکیب گروه‌های OH و H جداشده از دو ساختار مختلف تولید می‌شود.
- (۲) توسط پروتئینی که بخش عمدهٔ آن در فضای بین دو غشای راکیزه قرار دارد، ایجاد می‌گردد.
- (۳) سبب کاهش فشار اسمزی مایع قرار گرفته در اطراف دناهای حلقوی می‌گردد.
- (۴) برای تولید آن، الکترون‌های موجود در زنجیرهٔ انتقال الکترون، مصرف می‌گردد.

پاسخ: گزینه ۳

خودت حل کنی بهتره منظور، مولکول (های) آب تولیدشده در پی واکنش نهایی زنجیرهٔ انتقال الکترون و همچنین مولکول آب تولیدشده همراه با تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز است.

پاسخ تشریحی

دناهای حلقوی راکیزه‌ها، در بخش داخلی آن‌ها قرار دارد، مولکول‌های آب هم در همین بخش از راکیزه تشکیل می‌شوند پس هر دوی این واکنش‌ها سبب کاهش فشار اسمزی مایع قرار گرفته در بخش داخلی راکیزه (در اطراف دناهای حلقوی) می‌گردند.


نکته واکنش‌های سنتز آب‌دهی با تولید آب همراه هستند. تولید ATP هم جزء این دسته از واکنش‌ها است؛ پس هر جا که ATP تولید شود، آب هم تولید می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت طی تنفس یاخته‌ای، علاوه بر انتهای زنجیره، طی قندکافت و چرخهٔ کربس هم آب تولید می‌شود، چراکه در آن‌ها هم، ATP تشکیل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) این گزینه در مورد آب تولیدشده توسط آنزیم ATP ساز صحیح است، اما آبی که در پی فعالیت زنجیرهٔ انتقال الکترون تولید می‌شود، به دنبال ترکیب یون‌های هیدروژن و یون اکسید ایجاد می‌شود.
- (۲) پمپ سوم زنجیره، بخش عمده‌اش در خود غشای درونی راکیزه است و بخش‌هایی هم به سمت بخش داخلی راکیزه و فضای بین دو غشای آن دارد. بخش بزرگ‌تر پروتئین تولیدکنندهٔ ATP نیز، در بخش داخلی راکیزه قرار دارد و بخش کوچک‌تر آن در غشای راکیزه قرار دارد. هیچ بخشی از این آنزیم، در فضای بین دو غشا نیست.
- (۴) تنها برای تولید آب حاصل از واکنش H^+ و O^{2-} ، الکترون مصرف می‌شود.

نکته آخرین واکنش تنفس یاخته‌ای، تولید آب در نتیجهٔ عملکرد زنجیره نیست، بلکه تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز است؛ البته در این واکنش هم، آب تولید می‌شود.

شکل نامه در شکل زیر تبدیل ATP و ADP را به یکدیگر می‌بینید.



تشکیل ATP از ADP، با مصرف انرژی و تولید آب همراه است، ولی تبدیل آن به ADP همراه با آزاد شدن انرژی و مصرف آب است. این انرژی می‌تواند از مواد مغذی تأمین شود، مثل آن چیزی که در قندکافت رخ می‌دهد و انرژی مولکول گلوکز منجر به تولید ATP می‌شود.

تولید ATP از ADP و فسفات همواره به انرژی نیاز دارد، ولی این انرژی لزومن از مواد مغذی تأمین نمی‌شود. مثلاً در تولید نوری ATP، انرژی نور خورشید تأمین کنندهٔ انرژی لازم برای تولید ATP است.

تولید ATP باعث کاهش فسفات آزاد در یاخته و مصرف ATP باعث افزایش آن در یاخته می‌شود. دقت کنید که طبق شکل، انرژی از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود. انرژی ذخیره شده در مواد غذایی طی فرایندهایی به شکل مولکول ATP درمی‌آید تا یاخته بتواند از آن استفاده کند. بخشی از این انرژی به شکل گرما آزاد می‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۳

با توجه به این که فرایند قندکافت (گلیکولیز) فرایندی است که به کمک آنزیم‌های متعددی در چهار مرحله انجام می‌پذیرد، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

مرحله اول + مرحله سوم

«فقط در بعضی از مراحل فرایند قندکافت که ترکیبی با دو پیوند اشتراکی بین کربن قند(ها) و گروه(های) فسفات تولید می‌شود.»

(الف) در طی آن‌ها، نوعی ترکیب شیمیایی آلی با یک گروه فسفات تولید می‌شود

(ب) در آن‌ها، فراورده‌هایی با سطح انرژی کم‌تر از پیش‌ماده‌ها تولید می‌گردند

(ج) پیش‌ماده و فراورده غیرنوکلئوتیدی با تعداد کربن برابر، در جایگاه فعال آنزیم دیده می‌شود

(د) نوعی ترکیب شیمیایی آلی فسفات و دارای بیش از سه اتم کربن، مصرف می‌گردد

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)


پاسخ: گزینه ۱

خودت حل کنی بهتره در مراحل اول و سوم قندکافت، ترکیبی تولید می‌شود که دارای دو پیوند اشتراکی بین کربن قند(ها) و گروه فسفات است؛ (تولید فروکتوز فسفات در مرحله ۱ و تولید NADH در مرحله ۳).

پاسخ تشریحی فقط مورد «الف» عبارت را به صورت نادرست تکمیل می‌کند.

نکته NADH ترکیبی دونوکلئوتیدی است، پس دو گروه فسفات دارد که هر یک به یکی از قندهای آن متصل شده‌اند.

شکل نامه قندکافت



● در یاخته‌های زنده انجام می‌گیرد. (در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم)

● برای انجام شدن، نیازی به حضور اکسیژن نیست!

● مجموعه‌ای از واکنش‌های آنزیمی ولی غیر چرخه‌ای است.

● در مراحل مختلفی انجام می‌شود.

● مولکول‌های گلوکز، فسفات، ATP، ADP، NAD⁺ مصرف می‌شود.

● مولکول‌های پیرووات، ATP و NADH محصولات واکنش هستند.

● دو نوع مولکول دارای انرژی تولید می‌شود. (ATP و NADH)

● کربن دی‌اکسید نه تولید نه مصرف می‌شود.

● قند فسفات (مولکول قندی ۳ کربنی)، دو الکترون از دست می‌دهد که

باعث تشکیل NADH می‌شود.

الکترون‌های آزاد شده از مولکول‌های آلی، به همراه یک پروتون به NAD⁺ منتقل می‌شوند.

● در قندکافت مولکول ATP به روش در سطح پیش‌ماده تولید می‌شود.

● در این واکنش‌ها، مولکول‌های ۶ کربنی و ۳ کربنی مشاهده می‌شود.

● مولکول با خاصیت قندی هم تولید (مثل قند فسفات) و هم مصرف می‌شود. در مرحله اول ۲ مولکول ATP مصرف و در انتها، ۴ مولکول

ATP تولید می‌شود؛ پس بازده خالص قندکافت، ۲ مولکول ATP است.

● همه ATP‌ها در مرحله آخر، یک‌بار تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه طی دو واکنش مجزا تشکیل می‌شوند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

بررسی همه موارد :

(الف) در مرحله دوم قندکافت، قند سه کربنی فسفات و در مرحله چهارم قندکافت به دنبال تشکیل اولین مولکولهای ATP، ترکیب تکفسفات تولید می شود. در ارتباط با مرحله چهارم دقت کنید که طبق شکل کتاب درسی، جداسدن فسفات از اسید دوفسفاته طی دو مرحله، صورت می گیرد پس در این بین، امکان مشاهده مولکولی تکفسفات وجود دارد. این مورد برای تکمیل عبارت فوق نامناسب است. (نادرست)

(ب) در مرحله سوم و چهارم با تولید ترکیبات پرانرژی (ATP و NADH)، فراوردهای با سطح انرژی کمتر از پیش ماده (واکنش دهنده) تولید خواهد شد. چراکه باید مولکول اولیه، انرژی بالایی داشته باشد تا امکان تشکیل ATP و NADH فراهم شود. همچنین در مرحله اول قندکافت نیز ADP تولید می شود که از ATP مصرف شده در این مرحله سطح انرژی کمتری دارد، در مرحله دوم نیز قندهای سه کربنی نسبت به فروکتوز فسفات انرژی کمتری دارند. فقط در مرحله اول و سوم، واقعاً صورت سؤال رخ می دهد. (درست)

(ج) در مرحله اول مولکولهای گلوکز و فروکتوز فسفات، در مرحله سوم قند و اسید سه کربنه و در مرحله چهارم اسید فسفات و پیرووات به ترتیب پیش ماده و فراوردهای غیرنوکلیئوتیدی با تعداد کربن برابر هستند. از این بین فقط در مرحله اول و سوم واقعاً صورت سؤال رخ می دهد. (درست)

(د) در تمام مراحل فرایند قندکافت، نوعی ترکیب شیمیایی آلی فسفات و دارای بیش از سه اتم کربن (ATP، فروکتوز فسفات، NAD^+ ، ADP) مصرف می شود که از بین این مراحل، در مرحله اول و سوم، واقعاً صورت سؤال رخ می دهد. (درست)

تست و پاسخ ۱۴

در دستگاه تولیدمثلی مردی سالم و بالغ، نوعی یاخته از مجرای اسپرم به میزراه جابه جا می شود. چند مورد درباره روش های تأمین انرژی در این یاخته ها به درستی بیان شده است؟

(الف) در هر بخشی از آن که امکان تولید اکسایشی ATP وجود دارد، تعدادی مولکول ATP برای شروع فرایند(های) زیستی مصرف می شود.

(ب) حداکثر میزان ATP که در بهترین شرایط و در حضور اکسیژن کافی تولید می شود، به ازای مصرف هر گلوکز، ۳۰ مولکول ATP است.

(ج) در هر بخشی از آن که امکان تولید ATP در سطح پیش ماده وجود دارد، آنزیم هایی وجود دارند که همگی درون یاخته فعالیت می کنند.

(د) در هر بخشی از یاخته که انواعی از مولکول های حامل اطلاعات وراثتی وجود دارد، بیش از یک نوع ترکیب نوکلئوتیدی دوفسفاته طی واکنش های تنفس یاخته ای مصرف می شود.

اسپرم

(۴) ب - ج

(۳) الف - ج

(۲) الف - د

(۱) ب - د

پاسخ: گزینه ۲

خودت حل کنی بهتره اسپرم ها، با عبور از مجرای اسپرم به درون میزراه وارد می شوند. در سر و تنه آن، ماده زمینه سیتوپلاسم وجود دارد پس قندکافت در این بخش ها رخ می دهد، همچنین، در تنه آن به دلیل وجود میتوکندری ها، تولید اکسایشی ATP هم رخ می دهد.

پاسخ تشریحی موارد الف و د به درستی بیان شده اند.

(الف) تولید اکسایشی ATP در میتوکندری رخ می دهد و میتوکندری های اسپرم ها، در قسمت میانی (تنه) آن ها قرار دارند. در این بخش از یاخته ماده زمینه سیتوپلاسم هم وجود دارد که در آن با مصرف ATP امکان شروع قندکافت وجود دارد. از طرفی درون میتوکندری همانندسازی، رونویسی و ترجمه هم رخ می دهد که برای شروع این فرایندها هم ATP می تواند مصرف شود.

(ب) طبق کتاب درسی در بهترین شرایط، ۳۰ مولکول ATP به ازای تجزیه کامل یک مولکول گلوکز تولید می شود، اما دقت کنید که اسپرم ها از فروکتوز به عنوان قند مصرفی خود استفاده می کنند. انرژی لازم برای حرکت اسپرم از فروکتوزی تأمین می شود که ویکول سمینال می سازد و به مسیر حرکت اسپرم ها وارد می کند.

نکته یاخته ها، لزوماً از قند (گلوکز) برای تأمین انرژی خود استفاده نمی کنند، بلکه می توانند از مواد مغذی دیگری مثل چربی ها و پروتئین ها هم به عنوان منبع ماده مغذی، استفاده کنند.

(ج) تولید ATP در سطح پیش ماده در قندکافت (در ماده زمینه ای سیتوپلاسم) و در چرخه کربس (در میتوکندری) صورت می گیرد. می دانیم که در سر اسپرم مقداری سیتوپلاسم وجود دارد؛ پس امکان تولید ATP در سطح پیش ماده در سر اسپرم وجود دارد. در این بخش آنزیم های تارک تن مشاهده می شوند که در خارج یاخته فعالیت می کنند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

د) رنا و دنا مولکول‌های حامل اطلاعات وراثتی هستند که در سر و تنه اسپرم وجود دارند. در هر دو بخش قندکافت رخ می‌دهد که طی واکنش آن ترکیبات نوکلئوتیدی دوفسفاته ADP و NAD^+ مصرف می‌شوند. در میتوکندری یاخته نیز، مولکول‌های دو فسفات NAD^+ ، FAD ، $FADH_2$ و NADH (به ترتیب طی کربس و طی زنجیره انتقال الکترون) هم مصرف می‌شوند.

بخش‌های مختلف اسپرم	
سر	- دارای یک هسته بزرگ، مقداری سیتوپلاسم و کیسه‌ای پر از آنزیم به نام تارکتن است. - تارکتن، کلاه‌مانند و در بخش جلویی هسته قرار دارد. - تنها بخشی از اسپرم است که در زمان لقاح به درون اووسیت ثانویه وارد می‌شود. (هسته آن وارد اووسیت ثانویه می‌شود). - آنزیم‌های درون تارکتن به اسپرم کمک می‌کنند تا بتواند در لایه حفاظت کننده اووسیت نفوذ کند. - در این بخش از اسپرم، دناى خطی مشاهده می‌شود، ۲۲ فام‌تن غیرجنسی و ۱ فام‌تن جنسی (یا X یا Y) درون هسته وجود دارد. - تولید مولکول ATP در این بخش اسپرم، می‌تواند طی قندکافت (به روش در سطح پیش‌ماده) صورت بگیرد. - نسبت به سایر بخش‌های اسپرم، ضخامت بیشتری دارد.
تنه	- در این بخش تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد که در تأمین ATP لازم برای حرکت اسپرم نقش دارند. - در این بخش از اسپرم، دناى حلقوی مشاهده می‌شود. - این بخش در زمان لقاح نمی‌تواند به درون اووسیت ثانویه وارد شود؛ پس دناى حلقوی نسل بعد فقط از مادر به ارث می‌رسد. - تولید ATP در این بخش به روش‌های در سطح پیش‌ماده (در فرایند قندکافت و چرخه کربس) و اکسایشی صورت می‌گیرد.
دُم	- دم با حرکات خود سبب به جلو راندن اسپرم می‌شود. - در تمام طول خود، ضخامت یکسانی ندارد و در بخش انتهایی نازک‌تر است. - اسپرم‌ها توانایی استفاده از این بخش را در اپیدیدیم بعد از طی حداقل ۱۸ ساعت به دست می‌آورند.

تست و پاسخ ۱۵

بخش عمده فتوسنتز توسط جاندارانی غیر از گیاهان انجام می‌شود که درون آب یا خشکی زندگی می‌کنند. کدام گزینه، درباره گروهی از این جانداران، که به رنگ سبز دیده می‌شوند، درست است؟

سیانوباکتری‌ها +
باکتری‌های گوگردی سبز +
جلبک‌های سبز +
اوگلنا

- بعضی از آن‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی دارند که توسط غشایی دولایه در بر گرفته شده‌اند.
- همه آن‌ها به دنبال وقوع فتوسنتز، غلظت اکسیژن محیط را تغییر می‌دهند.
- همه آن‌ها، کمبود الکترونی رنگیزه‌های فتوسنتزی خود را از ترکیبی اکسیژن‌دار تأمین می‌کنند.
- بعضی از آن‌ها، می‌توانند با داشتن سامانه‌های (هایی) در غشا، انرژی نور را به انرژی شیمیایی تبدیل کنند.

پاسخ: گزینه ۱

پاسخ تشریحی بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می‌دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی‌کنند. انواعی از باکتری‌ها و آغازیان در محیط‌های متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می‌کنند. از میان این جانداران، باکتری‌های اکسیژن‌زا (مثل سیانوباکتری‌ها)، برخی از باکتری‌های غیراکسیژن‌زا (مثل گوگردی‌های سبز) و گروهی از آغازیان (مانند اسپروژیتر و اوگلنا) به رنگ سبز دیده می‌شوند. همه جانداران دارای حداقل نوعی رنگیزه فتوسنتزی هستند که می‌تواند انرژی نور را به دام بیندازد. در باکتری‌ها، این رنگیزه‌ها درون سامانه‌هایی قرار دارند که در غشای جاندار قرار گرفته‌اند. در جانداران یوکاریوت هم، این رنگیزه‌ها در تیلاکوئیدهای هستند که توسط غشای کلروپلاست و غشای یاخته احاطه شده‌اند.

نکته هر جاندار که تثبیت کربن انجام می‌دهد، لزومن رنگیزه فتوسنتزی ندارد، مثل شیمیوسنتزکننده‌ها؛ اما هر جاندار که فتوسنتز می‌کند، به طور قطع رنگیزه فتوسنتزی دارد. برای فتوسنتز نور الزامی است و برای جذب نور هم، وجود رنگیزه الزامی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- باکتری‌های غیراکسیژن‌زا (مانند باکتری‌های گوگردی سبز)، الکترون‌های مورد نیاز خود را از ماده‌ای غیر از آب تأمین می‌کنند (از H_2S تأمین می‌کنند)؛ بنابراین در پی فتوسنتز خود، اکسیژن تولید نمی‌کنند (گوگرد تولید می‌کنند).
- باکتری‌های گوگردی سبز، الکترون‌های مورد نیاز خود را از مولکولی مانند گاز هیدروژن سولفید (H_2S) تأمین می‌کنند که اکسیژن ندارد.
- یکی از شرط‌های فتوسنتز، وجود سامانه‌ای برای تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی است. در باکتری‌ها این سامانه‌ها در غشای یاخته‌ای جاندار و در یوکاریوت‌ها، در غشای تیلاکوئیدی است.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

مقایسهٔ باکتری‌های فتوسنتزکننده:

باکتری‌های فتوسنتزکنندهٔ غیراکسیژن‌زا	باکتری‌های فتوسنتزکنندهٔ اکسیژن‌زا
مانند باکتری‌های گوگردی ارغوانی و سبز	مانند سیانوباکتری‌ها
باکتریوکرووفیل دارند.	سبزین دارند. مثلن سیانوباکتری‌ها، سبزینۀ a دارند.
کربن دی‌اکسید در آن‌ها مصرف می‌شود.	کربن دی‌اکسید در آن‌ها مصرف می‌شود.
منبع تأمین الکترون آن‌ها به جای آب مولکول‌های دیگری است؛ مثلن H_2S در گوگردی‌ها.	منبع تأمین الکترون آن‌ها آب است.
اکسیژن تولید نمی‌کنند و غیراکسیژن‌زا هستند و ترکیبات دیگری مثل گوگرد می‌سازند.	اکسیژن تولید می‌کنند و اکسیژن‌زا هستند.

تست و پاسخ ۱۶

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟


«هر جزئی از اجزای زنجیره (های) انتقال الکترون در غشای به طور حتم»

- (۱) تیلاکوئید که میزان pH فضای درون تیلاکوئید را افزایش می‌دهد - از $P680$ الکترون‌های حاوی انرژی را دریافت می‌کند
- (۲) تیلاکوئید که الکترون‌ها را مستقیماً از نوعی فتوسیستم دریافت می‌کند - فقط در تماس با بخش‌های فسفات‌دار غشا قرار دارد
- (۳) درونی راکیزه که با گلیسرول فسفولیپیدهای هر دو لایهٔ غشا در تماس نیست - الکترون را حداکثر از دو محل دریافت می‌کند
- (۴) درونی راکیزه که در خلاف جهت شیب غلظت یون‌های هیدروژن، آن‌ها را جابه‌جا می‌کند - دارای بخشی برای عبور پروتون‌ها است

پاسخ: گزینهٔ ۴

پاسخ تشریحی

اولین، سومین و پنجمین جزء زنجیرهٔ انتقال الکترون غشای راکیزه، یا همان پمپ‌های هیدروژنی زنجیره، یون‌های هیدروژن را در خلاف جهت شیب غلظتشان جابه‌جا می‌کنند. هر سه‌تای این پروتئین‌ها جابه‌جاکنندهٔ H^+ هستند؛ پس حتمن بخشی جهت عبور این یون‌ها دارند.



نکته پروتئین‌های جابه‌جاکننده مواد از غشا، ممکن است کانالی باشند که در این حالت کانالی دارند که مولکول‌ها از آن عبور می‌کنند؛ هم‌چنین این‌ها ممکن است دریچه‌دار هم باشند که فقط در شرایطی اجازهٔ عبور مواد را می‌دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:


۱) آنزیم ATP‌ساز؛ با خارج کردن H^+ از فضای درون تیلاکوئید، میزان pH فضای درون تیلاکوئید را افزایش می‌دهد، ولی دقت کنید که این پروتئین جزئی از زنجیره‌های انتقال الکترون محسوب نمی‌شود. فتوسیستم ۲ (به دلیل مشارکت در تجزیهٔ آب) و پروتئین سرتاسری (جزء دوم) زنجیرهٔ انتقال الکترون اول (به دلیل پمپ H^+ به فضای درون تیلاکوئید) میزان pH این فضا را کاهش می‌دهند. آخرین جزء زنجیرهٔ انتقال الکترون دوم هم با مصرف H^+ (به دلیل ساخت NADPH) در تغییر pH فضای بستره نقش دارد.

۲) اجزایی که بلافاصله بعد از فتوسیستم‌های ۱ و ۲ در غشای تیلاکوئید قرار دارند، الکترون‌ها را به طور مستقیم از نوعی فتوسیستم دریافت می‌کنند. در این بین فقط جزئی که بلافاصله بعد از فتوسیستم ۱ قرار دارد، فقط در تماس با بخش فسفات‌دار غشا قرار دارد. جزء دیگر هم در تماس با گروه فسفات و هم در تماس با اسیدهای چرب فسفولیپیدهای غشایی است.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس



۳ پمپ‌های زنجیره که با فسفولیپیدهای هر دو لایه سازنده غشا در تماس هستند. دومین و چهارمین جزء زنجیره انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه با گلیسرول‌های فسفولیپیدهای هر دو لایه غشا در تماس نیستند. در این بین دومین جزء زنجیره، علاوه بر این که محل اکسایش $FADH_2$ است (الکترون را از $FADH_2$ را دریافت می‌کند). الکترون‌های حاصل از اکسایش $NADH$ را نیز از اولین پمپ زنجیره دریافت می‌کند؛ در حالی که چهارمین جزء زنجیره فقط از پروتئین (پمپ) قبلی خود الکترون را دریافت می‌کند.

انواع زنجیره‌های انتقال الکترون در یاخته‌های یوکاریوتی	زنجیره بین فتوسیستم ۱ و ۲	زنجیره بین فتوسیستم ۱ و $NADP^+$	زنجیره مستقر در غشای درونی میتوکندری
در نوعی غشا در ساختار اندامک قرار دارد؟	✓	✓	✓
نسبت به سایرین تعداد اجزای بیشتری دارد؟	×	×	✓
در تولید مولکول(های) نوکلئوتیدی پراثری تأثیر گذار است؟	✓	✓	✓
فعالیت آن منجر به تولید ATP می‌شود؟	✓	✓	✓
در بین اعضای خود، پمپ پروتئینی دارد؟	✓	×	✓
حامل(های) الکترونی را اکسایش می‌دهد؟	×	×	✓
نوعی حامل الکترونی را کاهش می‌دهد؟	×	×	×
اعضای آن سبب تغییر مقدار یون‌های هیدروژن در دو سمت غشای محل استقرار زنجیره می‌شوند؟	✓ (به واسطه داشتن پمپ)	✓ (به واسطه تولید $NADPH$)	✓ (به واسطه داشتن پمپ‌ها)
الکترون درون زنجیره را در نهایت به مولکولی آلی می‌رسانند؟	✓ (به فتوسیستم ۱)	✓ (به $NADP^+$)	×
الکترون درون زنجیره را در نهایت به مولکولی معدنی می‌رسانند؟	×	×	✓ (به O_2)

رشته تجربی

آزمون ششم آنلاین




پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۷

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«با توجه به شکل زیر که برش برگ نوعی گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد، می‌توان گفت در این گیاه به طور حتم و در بخش مشخص شده با شماره می‌شود.»



گیاه تک‌لپه


- (۱) در انواعی از یاخته‌های زنده برگ، فقط طی روز کربن تثبیت می‌شود - (۲)، طی شرایطی، تنفس نوری به میزان زیادی انجام
- (۲) هنگام روز، فرایند(هایی) مانع وقوع چرخه کالوین می‌شوند - (۱)، نوعی ترکیب شش کربنی دوفسفاته تولید و سپس تجزیه
- (۳) جهت تبدیل CO_2 به مولکول قندی، اسید چهار کربنی تولید می‌شود - (۴)، طی شب نوعی اسید سه کربنی با CO_2 ترکیب
- (۴) میزان CO_2 در محل فعالیت روبیسکو بالا نگه داشته می‌شود - (۳)، در مرحله‌ای از چرخه کالوین، نوعی حامل الکترون مصرف

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی

شکل مربوط به نوعی گیاه C_4 تک‌لپه می‌باشد و بخش‌های مشخص از ۱ تا ۴ به ترتیب: یاخته‌های غلاف آوندی، یاخته‌های روپوست زیرین، یاخته‌های نگهبان روزنه و گروهی از یاخته‌های میانبرگ هستند.

با توجه به شکل، می‌بینید که یاخته‌های غلاف آوندی، سبزیسه دارند. در این گیاهان، به علت وقوع تثبیت کربن دومرحله‌ای، میزان CO_2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو، بالا نگه داشته می‌شود. یاخته‌های نگهبان روزنه توانایی فتوسنتز دارند، پس چرخه کالوین در آن‌ها رخ می‌دهد که طی این چرخه، در مرحله‌ای که اسید سه کربنی به قند سه کربنی تبدیل می‌شود؛ NADPH (حامل الکترون) مصرف می‌شود.



نکته انواع یاخته‌هایی که توانایی فتوسنتز دارند: (۱) یاخته‌های نگهبان روزنه در همه گیاهان فتوسنتزکننده (۲) گروهی از یاخته‌های پارانشیمی (۳) یاخته‌های غلاف آوندی در گروهی از گیاهان (گیاهان C_4)

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ در گیاهان C_4 ، تثبیت کربن در یاخته‌های نگهبان روزنه، میانبرگ اسفنجی و غلاف آوندی انجام می‌شود که این تثبیت، فقط در طول روز انجام می‌شود. یاخته روپوست معمولی کلروپلاست ندارد و فتوسنتز نمی‌کند، پس نمی‌تواند محل وقوع تنفس نوری نیز باشد.

نکته تنفس نوری واکنشی است که به واسطه عملکرد اکسیژنازی آنزیم روبیسکو رخ می‌دهد و زمانی که نسبت O_2 به CO_2 زیاد باشد، این آنزیم فعالیت اکسیژنازی انجام می‌دهد. آنزیم روبیسکو فقط در یاخته‌های فتوسنتزکننده وجود دارد و فعالیت می‌کند. دقت کنید که در گیاهان C_4 ، این آنزیم در یاخته‌های غلاف آوندی فعالیت می‌کند و در یاخته‌های میانبرگ فعالیت ندارد.

۲ طبق متن کتاب درسی، در گیاهان C_4 تنفس نوری به ندرت رخ می‌دهد و طبق سؤال کنکور اصلن رخ نمی‌دهد. در یاخته‌های غلاف آوندی چرخه کالوین انجام می‌شود که طی مرحله اول آن، ترکیب ناپایدار شش کربنی دوفسفاته تجزیه می‌شود.

نکته انواع ترکیب‌های شش کربنه‌ای که در فرایندهای سوخت و سازی یک یاخته گیاهی فتوسنتزکننده تجزیه می‌شوند: (۱) فروکتوز فسفات طی قندکافت (۲) ترکیب شش کربنی بدون فسفات طی کربس (۳) ترکیب شش کربنی ناپایدار طی چرخه کالوین.

۳ در فرایند تثبیت کربن در گیاهان C_4 ، اسید چهار کربنی تولید می‌شود. در این گیاهان روزنه‌های هوایی در روز باز شده و مولکول‌های کربن دی‌اکسید به برگ وارد می‌شوند و ترکیب شدن CO_2 با اسید سه کربنی و تولید اسید چهار کربنی در روز و در یاخته‌های میانبرگ رخ می‌دهد. تولید اسید چهار کربنی در پی تثبیت اولیه کربن در طی شب مربوط به گیاهان CAM است.

نکته در گیاهان C_3 ، طی چرخه کالوین، CO_2 تثبیت می‌شود که از جو وارد گیاه شده است، اما در گیاهان C_4 و CAM، CO_2 تثبیت شده طی چرخه کالوین، مستقیم از جو نیامده، بلکه از یک اسید چهار کربنی در گیاه آزاد شده است و CO_2 جو، به صورت یک اسید چهار کربنی، تثبیت می‌شود.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

شکل نامه مقایسه برگ گیاه تک‌لپه و دولپه (در حد کتاب درسی):

نمونه‌ای از گیاه تک‌لپه	نمونه‌ای از گیاه دولپه
- تعداد روزنه‌ها در روپوست زیرین بیشتر از روپوست رویی است. (کمک به حفظ بیشتر آب در گیاه) - روپوست تک‌لایه دارند که در سطح خارجی آن پوستک وجود دارد. - برگ‌ها در آن، ساختاری نواری شکل و رگبرگ‌های موازی با هم دارند. - فاقد دمبرگ است. - یاخته‌های نگهبان روزنه (جزء سامانه پوششی) و میانبرگ (جزء سامانه زمینه‌ای) و غلاف آوندی از جمله یاخته‌هایی با توانای فتوسنتز هستند. - یاخته‌های غلاف آوندی، پهن و کوتاه هستند که اطراف آوندهای چوب و آبکش را احاطه کرده‌اند.	- تعداد روزنه‌ها در روپوست زیرین بیشتر از روپوست رویی است. (کمک به حفظ آب در گیاه) - می‌توانند روپوست تک‌لایه داشته باشند که در سطح آن، پوستک وجود دارد. - برگ‌ها، شکلی پهن با رگبرگ‌های منشعب دارند. - دمبرگ و پهن‌برگ دارند. - یاخته‌های نگهبان روزنه (جزء سامانه پوششی) و میانبرگ ندره‌ای و اسفنجی (جزء سامانه زمینه‌ای) فتوسنتزکننده هستند. - یاخته‌های غلاف آوندی، باریک و کشیده هستند، فتوسنتز نمی‌کنند و اطراف آوندها را احاطه کرده‌اند.

آزمون ششم آنلاین

رشته تجربی

تست و پاسخ ۱۸

چند مورد، وجه مشترک همه یاخته‌های یوکاریوتی است که از ترکیب CO_2 و نوعی ماده دیگر، ماده آلی می‌سازند؟

یاخته‌های فتوسنتزکننده +
یاخته‌های اوره‌ساز در کبد

(الف) در آن‌ها نوعی محصول که مستقیماً حاصل از مصرف CO_2 است، ترکیبی ناپایدار است.

(ب) حداقل در بخشی از عمر خود، با حذف رونوشت اینترون‌ها از رنای پیک نابالغ، از طول آن می‌کاهند.

(ج) رنگیزه‌هایی برای به دام انداختن نور خورشید و سامانه‌هایی برای تبدیل انرژی آن به انرژی شیمیایی دارند.

(د) در ماده زمینه سیتوبلاسم آن‌ها، در هر فرایندی که گلوکز مصرف می‌شود، مصرف و تولید ATP مشاهده می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۱

خود حل کنی بهتره برای پاسخ به این سؤال باید فتوسنتزکنندگان یوکاریوتی (بعضی از یاخته‌های گیاهی و بعضی از آغازیان) و هم‌چنین یاخته‌هایی مانند یاخته‌های کبد انسان که با مصرف آمونیاک (نوعی ماده معدنی) و کربن دی‌اکسید، نوعی ماده آلی (اوره) می‌سازند، در نظر گرفته شوند.

نکته گوچه‌های قرمز، با داشتن آنزیم کربنیک انیدراز، می‌توانند با ترکیب آب و کربن دی‌اکسید، کربنیک اسید بسازند. اما دقت کنید که این اسید نوعی ماده آلی نیست.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی فقط مورد «ب» صحیح است.

بررسی همه موارد:

الف) برای اوره صادق نیست؛ زیرا این ماده پایدار است.

ب) همه یاخته‌های یوکاریوتی حداقل در بخشی از عمر خود می‌توانند رونویسی داشته باشند و رنای پیک نابالغ بسازند که طی فرایند پیرایش، رنای پیک بالغ، ساخته می‌شود.

ج) برای یاخته‌های کبدی صادق نیست. این مورد تنها درباره فتوسنتزکننده‌ها در یاخته‌های فتوسنتزکننده صادق است.

د) طی مصرف گلوکز در قندکافت، مصرف شکل رایج انرژی در یاخته (مرحله اول) مقدم بر تولید آن (مرحله آخر) است؛ اما دقت کنید که طبق فصل ۱ زیست دهم، در یاخته‌های کبدی مصرف گلوکز می‌تواند جهت تولید گلیکوژن و در گیاهان مصرف این مولکول می‌تواند جهت تولید سلولز، نشاسته و ... باشد. در این فرایندها ATP مصرف می‌شود، اما تولید نمی‌شود.

در هر جاندار فتوسنتزکننده وجود دارد.	فقط در گروهی از جانداران فتوسنتزکننده وجود دارد.	
✓	—	مولکول‌های جذب‌کننده انرژی نور خورشید
✓	—	دناي حلقوی
✓	—	نوکلئیک اسید خطی
—	✓ (فقط فتوسنتزکننده اکسیژن‌زا)	آزاد کردن گاز اکسیژن
—	✓ (فقط فتوسنتزکننده اکسیژن‌زا)	مصرف مولکول‌های آب به عنوان منبع تأمین الکترون
✓ (استفاده از CO_2)	—	استفاده از پیش ماده کربن دار آنزیم کربنیک انیدراز
—	✓ (فقط یوکاریوت‌ها)	استفاده از عوامل رونویسی برای بیان ژن‌ها
—	✓ (فقط یوکاریوت‌ها)	انواعی از آنزیم‌های رونویسی کننده (رناسپاراز)
✓	—	تولید نوری ATP
—	✓ (فقط یوکاریوت‌ها)	وجود دیسه (پلاست)
✓	—	تولید مولکول آب
✓	✓ (باکتری‌های گوگردی، سبزینه a ندارند.)	وجود سبزینه a
✓	—	امکان اندازه گیری میزان فتوسنتز براساس CO_2 مصرف شده
✓	—	سامانه تبدیل کننده انرژی نوری به انرژی شیمیایی
—	✓ (فقط فتوسنتزکننده اکسیژن‌زا)	امکان اندازه گیری میزان فتوسنتز براساس O_2 تولید شده
—	✓ (مثلن سیانوباکتری‌های همزیست با گیاهان فتوسنتزکننده)	استفاده از محصولات فتوسنتزی یک جاندار دیگر
—	✓ (مثلن گروهی از سیانوباکتری‌ها)	توانایی تثبیت نیتروژن
—	✓	زندگی در محیط خشکی
—	✓ (فقط پروکاریوت‌ها)	وجود رنگیزه فتوسنتزی در غشای یاخته
✓ (انجام قندکافت در همه یاخته‌های زنده)	—	توانایی تولید NADH



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۱۹

در خصوص گیاهان نهان دانه، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ارتباط با همه گیاهان فتوسنتزکننده که می توان گفت که قطعاً»

- (۱) ریبولوزیسی فسفات را در انواعی از یاخته های میانبرگ مصرف می کنند - طی واکنش های تولید و مصرف هر مولکول پنج کربنی، CO_2 آزاد می شود
- (۲) کربن دی اکسید جو را فقط هنگام روز تثبیت می کنند - آنزیم کربوکسیلاز تنها در یاخته هایی دیده می شود که چرخه کالوین را انجام می دهند
- (۳) انواعی اسید سه کربنی را در یاخته های میانبرگ خود تولید می کنند - هنگام شب، میزان ذخایر قند در گروهی از یاخته های تمایز یافته روپوستی آن ها افزایش می یابد
- (۴) تثبیت کربن جو را فقط به کمک چرخه کالوین انجام می دهند - در طی شرایطی می توانند قند ریبولوزیسی فسفات را با اکسیژن ترکیب کنند

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ تشریحی: گیاهان C_3 تثبیت کربن را فقط در چرخه کالوین انجام می دهند. در گیاهان C_3 در صورتی که در مجاورت آنزیم روبیسکو، میزان O_2 بیشتر از CO_2 باشد، امکان انجام تنفس نوری در دمای بالا و شدت زیاد نور وجود دارد که در ابتدای آن، ریبولوزیسی فسفات با اکسیژن ترکیب می شود.

نکته: یکی از عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم ها، غلظت (مقدار) پیش ماده است. O_2 و CO_2 هر دو جزء پیش ماده های آنزیم روبیسکو هستند، پس مقدار هر کدام از آن ها که بیشتر باشد، می تواند در جایگاه فعال خود در آنزیم روبیسکو قرار بگیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) یاخته های میانبرگ انواع مختلفی دارند مثل نرده ای و اسفنجی که در گیاهان مختلف، هر دو نوع آن قابلیت فتوسنتز دارند. طی این فرایندها، امکان مصرف شدن ریبولوزیسی فسفات در چرخه کالوین یا تنفس نوری وجود دارد. در چرخه کربس در حین تولید و مصرف مولکول ۵ کربنی، CO_2 آزاد شده، اما در چرخه کالوین در حین تولید و مصرف ترکیب پنج کربنی (ریبولوز فسفات و ریبولوزیسی فسفات)، CO_2 تولید نخواهد شد.

۲) گیاهان C_3 و C_4 کربن دی اکسید را فقط هنگام روز تثبیت می کنند. دقت کنید در این گیاهان هر یاخته تثبیت کننده کربن، دارای آنزیم کربوکسیلاز برای اضافه کردن کربن دی اکسید به نوعی ترکیب آلی می باشد. در یاخته های میانبرگ C_4 ، آنزیم کربوکسیلاز وجود دارد که CO_2 را با اسید سه کربنی ترکیب می کند. این آنزیم در چرخه کالوین فعالیت نمی کند. چرخه کالوین این گیاهان در یاخته های غلاف آوندی رخ می دهد.

۳) تمام گیاهان فتوسنتزکننده طی مرحله سوم و چهارم گلیکولیز، ترکیب اسیدی سه کربنی تولید می کنند. حتی طی تخمیر لاکتیکی هم که در گیاهان می تواند رخ دهد، اسید سه کربنی تولید می شود؛ اما دقت کنید که باز شدن روزه های هوایی (افزایش میزان ساکارز در یاخته های نگهبان روزه) در شب فقط مربوط به گیاهان CAM می باشد.

فتوسنتز در گیاهان مختلف	گیاه C_3	گیاه C_4	گیاه CAM
مثال	اکثر گیاهان مانند گل رز	گروهی از گیاهان مانند ذرت	آناناس، بعضی کاکتوس ها
مراحل تثبیت کربن	فقط چرخه کالوین	(۱) ترکیب CO_2 با اسید سه کربنی (۲) چرخه کالوین	(۱) ترکیب CO_2 با اسید سه کربنی (۲) چرخه کالوین
تثبیت دومرحله ای	x	✓	✓
محل تثبیت کربن (CO_2)	در یاخته های میانبرگ (فتوسنتزکننده)	در یاخته های میانبرگ و غلاف آوندی	در یاخته های میانبرگ



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

گیاه CAM	گیاه C_4	گیاه C_3	فتوستنز در گیاهان مختلف
✓ هنگام تثبیت اولیه CO_2	✓ هنگام تثبیت اولیه CO_2	x	تولید اسید ۴ کربنی در فتوستنز
✓ چرخه کالوین در یاخته‌های میانبرگ	✓ چرخه کالوین در یاخته‌های غلاف آوندی	x	مرحله دوم تثبیت کربن
کلروپلاست یاخته‌های میانبرگ و نگهبان روزنه	کلروپلاست یاخته‌های غلاف آوندی و نگهبان روزنه	کلروپلاست یاخته‌های میانبرگ و نگهبان روزنه	محل فعالیت روبیسکو در برگ
—	به ندرت	✓ (در دمای بالا و شدت زیاد نور)	تنفس نوری
تثبیت اول: در شب تثبیت دوم: در روز	فقط در طول روز	فقط در طول روز	زمان تثبیت کربن
شب	روز	روز	زمان بازبودن روزنه‌های هوایی
دارای برگ و ساقه گوشتی و پر آب هستند. واکوئول‌هایی دارند که دارای ترکیبات نگه‌دارنده آب است.	—	—	توانایی ذخیره آب

تست و پاسخ ۲۰

بر اساس مطلب کتاب درسی و مقایسه ساختارهای نخستین گیاهان نهان دانه علفی تک لپه و دولپه با قطر برابر، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ساختار برگ هر گیاهی که در برش عرضی ریشه آن به طور حتم»

(۱) یاخته‌های آوندی بر روی یک دایره‌ای فرضی قرار گرفته‌اند - رگبرگ‌های آن در فاصله دورتری از روپوست پایینی نسبت به روپوست بالایی قرار دارند

(۲) تعداد یاخته‌های رایج‌ترین بافت سامانه بافتی زمینه‌ای پوست، کم‌تر است - در همه یاخته‌های بین دو روپوست، پیرووات تولید و مصرف می‌شود

(۳) یاخته‌های واجد دیواره‌ای چوبی شده در مرکز آن قرار گرفته‌اند - در هر یاخته روپوستی زنده، امکان تولید ATP به روش اکسایشی وجود دارد


(۴) در بخش‌های آوندی، آوند آبکش به یاخته‌های روپوستی نزدیک‌تر است - رگبرگ‌های آن‌ها توسط یاخته‌های غلاف آوندی احاطه شده‌اند

پاسخ: گزینه ۳


پاسخ تشریحی در مرکز ریشه گیاهان علفی و نهان‌دانه دولپه، آوندهای چوبی قرار گرفته‌اند. یاخته‌های آوند چوبی، دیواره پسین ضخیم و چوبی شده دارند. دقت کنید که تمام یاخته‌های روپوستی برگ زنده هستند و هسته و میتوکندری هم دارند، بنابراین می‌توانند ATP را به روش اکسایشی تولید کنند.

نکته در گروهی از یاخته‌های روپوستی امکان تولید ATP به هر سه روش (سطح پیش‌ماده، نوری و اکسایشی) وجود دارد. کدام یاخته‌ها؟ یاخته‌های نگهبان روزنه.

بررسی سایر گزینه‌ها:



ریشه تک‌لپه



ریشه دولپه

(۱) در ساختار ریشه گیاهان نهان‌دانه تک‌لپه، دسته‌های آوندی بر روی یک دایره فرضی جای گرفته‌اند. طبق شکل برگ، در برگ گیاه دولپه رگبرگ به روپوست پایینی نزدیک‌تر است، اما در برگ گیاه تک‌لپه، رگبرگ تقریباً در وسط قرار دارد.

(۲) در ریشه گیاه نهان‌دانه دولپه نسبت به ریشه نهان‌دانه تک‌لپه، ضخامت پوست بیشتر است، پس تعداد یاخته‌های پارانشیمی (رایج‌ترین بافت سامانه بافت زمینه‌ای) در پوست ریشه دولپه نیز بیشتر از پوست ریشه تک‌لپه است. از بین یاخته‌هایی که بین دو روپوست رویی و زیرین قرار دارند، عنصر آوندی و تراکئید مرده هستند و تنفس یاخته‌ای ندارند.




پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

نکته در دسته‌های آوندی، به جزء آوندها، یاخته‌های دیگری مثل پارانشیمی و فیبرها هم دیده می‌شوند. فیبرها یاخته‌های مرده و دارای دیوارهٔ پسین چوبی هستند.

۲ در ریشهٔ گیاهان تک‌لپه، نسبت به گیاهان دولپه، آوندهای آبکش به روپوست نزدیک‌تر هستند. دقت داشته باشید که به مجموع آوندهای چوبی و آبکش و یاخته‌های احاطه‌کنندهٔ آن‌ها در برگ (غلاف آوندی)، رگبرگ گفته می‌شود؛ بنابراین خود غلاف آوندی بخشی از ساختار رگبرگ است و نمی‌تواند آن را احاطه کند.

شکل نامه ساختار برگ گیاهان تک‌لپه و دولپه:



گیاه تک‌لپه

گیاه دولپه

- ۱ در برگ گیاه دولپه و تک‌لپه سه بخش (روپوست، میانبرگ و دسته‌های آوندی) دیده می‌شود.
- ۲ در گیاهان دولپه‌ای و تک‌لپه‌ای، هر دو روپوست رویی و زیرین، دارای روزن و یاخته‌های نگهبان روزنه هستند.
- ۳ تعداد روزن‌ها در روپوست زیرین بیشتر از روپوست رویی است. (تعداد روزنه‌های هوایی در روپوست پایینی بیشتر از بالایی است.)
- ۴ در بعضی گیاهان علفی دولپه، روزنه‌های آبی در حاشیهٔ برگ و در بعضی گیاهان علفی تک‌لپه، روزنه‌های آبی در انتهای برگ قرار دارند.
- ۵ در برگ گیاه دولپه، رگبرگ به روپوست پایینی نزدیک‌تر است، اما در گیاه تک‌لپه رگبرگ تقریباً در وسط برگ قرار دارد.
- ۶ در برگ گیاه تک‌لپه، رگبرگ‌ها موازی بوده و تا انتهای برگ امتداد می‌یابند. در برگ گیاهان دولپه، رگبرگ‌ها منشعب هستند.
- ۷ در برگ گیاهان دولپه‌ای، در مجاورت روپوست رویی، یاخته‌های میانبرگ نرده‌ای وجود دارند. این یاخته‌ها، ظاهر استوانه‌ای شکل دارند و به هم فشرده هستند.
- ۸ در گروهی از گیاهان مثل گیاه تک‌لپه شکل کتاب درسی، یاخته‌های میانبرگ اسفنجی در برگ دیده می‌شود، این یاخته‌ها، ظاهری کروی شکل دارند و فضای بین یاخته‌ای زیادی دارند. میانبرگ اسفنجی در مجاورت روپوست زیرین برگ گیاهان دولپه‌ای قرار دارد و در برگ گیاهان تک‌لپه‌ای، هم در مجاورت روپوست رویی و هم زیرین دیده می‌شود.
- ۹ همهٔ یاخته‌های میانبرگ نرده‌ای و اسفنجی در گیاهان فتوسنتزکننده، دارای سبز دیسه هستند.
- ۱۰ در گیاهان C_3 ، یاخته‌های غلاف آوندی فاقد سبز دیسه هستند، اما در گیاهان C_4 ، یاخته‌های غلاف آوندی، سبز دیسه دارند. بین یاخته‌های غلاف آوندی نیز فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد.
- ۱۱ در گیاهان دولپه و تک‌لپه، بلافاصله در زیر روزنه‌های هوایی، فضای هوادار وجود دارد که در تبادل گازها به گیاه کمک می‌کند.

تست و پاسخ ۲۱

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«با در نظر گرفتن واکنش‌های کالوین و گلیکولیز در میانبرگ اسفنجی نوعی گیاه نهان‌دانه، می‌توان گفت این دو فرایند از لحاظ با هم شباهت دارند، اما از لحاظ با هم متفاوت هستند.»

- الف) شکسته شدن پیوند بین دو کربن در نوعی ترکیب فسفات‌دار – تولید قند سه کربنی تک‌فسفات با مصرف حامل الکترون
- ب) بازسازی پذیرندهٔ الکترون بدون تغییر در تعداد کربن – تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار در اولین مرحلهٔ خود
- ج) مصرف ATP هم‌زمان با تولید پذیرندهٔ الکترون – مصرف دو عدد ATP به ازای مصرف هر مولکول شش کربنی
- د) مشاهدهٔ هر قند سه کربنی در اتصال با یک گروه فسفات – تولید قند شش کربنی دوفسفات

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ تشریحی موارد «الف» و «د» درست بیان شده‌اند.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

درس نامه...

آزمون ششم آنلاین

مراحل فرایند
قندکافت طبق
کتاب درسی!

گلوکز فروکتوز فسفات	● مواد مصرفی ← یک مولکول گلوکز و دو مولکول ATP ● مواد تولیدی ← یک مولکول فروکتوز فسفات و دو مولکول ADP ● این مرحله قندکافت، انرژی‌خواه است. ● فسفات‌های جدا شده از دو ATP به کربن‌های ابتدایی و انتهای گلوکز متصل می‌شوند. در این مرحله، ۳ مولکول دوفسفات از دو نوع تولید می‌شود. دو مولکول ADP و یک فروکتوز فسفات! ● در این مرحله، مولکول‌های قندی مصرف و تولید می‌شوند.	۱
فروکتوز فسفات قند فسفات	● مواد مصرفی ← یک مولکول فروکتوز فسفات ● مواد تولیدی ← دو مولکول قند فسفات ● تعداد کربن و فسفات هر یک از محصولات، نصف ماده مصرفی است. ● پیوند اشتراکی بین کربن‌ها شکسته می‌شود! ● در این مرحله، مولکول قندی مصرف و تولید می‌شود.	۲
قند فسفات اسید دوفسفات	● مواد مصرفی ← دو مولکول قند فسفات + دو مولکول NAD^+ ● مواد تولیدی ← دو مولکول اسید دوفسفات + دو مولکول $\text{NADH} + \text{H}^+$ ● در این مرحله از فسفات‌های آزاد در سیتوپلاسم استفاده می‌شود. ● برای تشکیل NADH لازم است تا قند فسفات اکسایش یابد؛ به عبارتی این مولکول با از دست دادن دو الکترون و دو پروتون (H^+) اکسایش می‌یابد و NAD^+ با دریافت این الکترون‌ها و یک پروتون به NADH تبدیل می‌شود. ● در این مرحله، مولکول قندی مصرف ولی مولکولی با خاصیت اسیدی تولید می‌شود.	۳
اسید دوفسفات پیروات	● مواد مصرفی ← دو مولکول اسید دوفسفات + چهار مولکول ADP ● مواد تولیدی ← دو مولکول پیروات + ۴ مولکول ATP ● در این مرحله از هر اسید دوفسفات به ترتیب طی دو واکنش، دو مولکول ATP ایجاد می‌شود. ● پیروات ترکیبی فاقد فسفات است. ● ATP‌ها به روش در سطح پیش ماده، تولید می‌شوند. ● در این مرحله، ۶ مولکول دوفسفات از دو نوع مصرف می‌شود.	۴



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

شکل نامه چرخه کالوین شکل کتاب درسی:

(۱) در یوکاریوت‌های فتوسنتزکننده، چرخه کالوین در بستره کلروپلاست رخ می‌دهد و مستقیم به انرژی نور خورشید نیاز ندارد، ولی به محصولات واکنش‌های وابسته به نور فتوسنتز (ATP و NADPH) نیاز دارد.

(۲) این چرخه مجموعه‌ای از واکنش‌های آنزیمی است که طی آن، در نهایت مولکول اولیه چرخ، دو بار تولید می‌شود. طی واکنش‌های آن، CO_2 ورودی به چرخه به مولکول‌های قند تبدیل می‌شود.

(۳) مرحله اول:

● مواد مصرفی ← مولکول‌های CO_2 + مولکول‌های ریبولوز بیس فسفات

● مواد تولیدی ← مولکول‌های اسیدی ۶ کربنه دوفسفاته ناپایدار که به مولکول‌های اسید سه کربنی تبدیل می‌شوند.

(۴) مرحله دوم:

● مواد مصرفی ← مولکول‌های اسیدی ۳ کربنه و تک فسفاته پایدار + مولکول‌های ATP + مولکول‌های NADPH

● مواد تولیدی ← مولکول‌های قند ۳ کربنی و تک فسفاتی + مولکول‌های ADP + فسفات آزاد + مولکول‌های NADP^+

● اتفاقات: اسید ۳ کربنه تک فسفاته ← دریافت فسفات از مولکول ATP ← دوفسفاته شدن ← دریافت الکترون و پروتون از مولکول NADPH ← جداسازی فسفاتی که از ATP آمده است ← ایجاد قند ۳ کربنه.

(۵) مرحله سوم:

● در این مرحله از ۱۲ مولکول قند ۳ کربنی تک فسفاته ایجاد شده در مرحله قبل، ۲ مولکول خارج می‌شود که از آن برای تولید گلوکز و ترکیبات آلی دیگر استفاده می‌شود.

(۶) مرحله چهارم:

● مواد مصرفی ← مولکول‌های قند ۳ کربنی و تک فسفاته

● مواد تولیدی ← مولکول‌های قند ۵ کربنی و تک فسفاته (ریبولوز فسفات) + آزاد شدن تعدادی فسفات

(۷) مرحله پنجم:

● مواد مصرفی ← مولکول‌های قند ۵ کربنی و

تک فسفاته (ریبولوز فسفات) + مولکول‌های ATP

● مواد تولیدی ← مولکول‌های قند ۵ کربنی و

دوفسفاته (ریبولوز بیس فسفات) + مولکول‌های ADP

بررسی همه موارد:

(الف) در هر دو چرخه کالوین و فرایند گلیکولیز، نوعی ترکیب شش کربنی دوفسفاته (ترکیب شش کربنی دوفسفاته ناپایدار و فروکتوز فسفات) ایجاد می‌شود که در ادامه، با شکستن پیوند بین دو کربن، تجزیه می‌شوند. در چرخه کالوین، قند سه کربنی تک فسفاته با مصرف ATP و حامل الکترون (NADPH) تولید می‌شود. در گلیکولیز مصرف حامل الکترون مشاهده نمی‌شود.

(ب) در فرایند گلیکولیز پذیرنده الکترون (NAD^+) مصرف شده و حامل الکترون (NADH) تولید می‌شود. بازسازی NAD^+ طی مرحله تخمیر و یا در زنجیره انتقال الکترون رخ می‌دهد؛ اما در چرخه کالوین حامل الکترون (NADPH) مصرف شده و پذیرنده الکترون (NADP^+) تولید می‌شود. طی این واکنش، اسید سه کربنی به قند سه کربنی تبدیل می‌شود. در گام اول چرخه کالوین ترکیب شش کربنی دوفسفاته ناپایدار و در گام اول چرخه گلیکولیز، فروکتوز فسفات (شش کربنی دوفسفاته پایدار) تولید می‌شود.

(ج) در گام اول گلیکولیز ATP مصرف می‌شود؛ اما دقت کنید که در این فرایند تولید پذیرنده الکترون رخ نمی‌دهد؛ اما در کالوین مصرف ATP و تولید NADP^+ رخ می‌دهد. در گلیکولیز به ازای مصرف هر مولکول شش کربنی گلوکز، دو عدد ATP و در چرخه کالوین سه عدد ATP مصرف می‌شود.

(د) قندهای سه کربنی تولید شده در مرحله دوم گلیکولیز و قندهای سه کربنی تولید شده در چرخه کالوین، همگی دارای یک گروه فسفات هستند. در گلیکولیز برخلاف چرخه کالوین، تولید قند شش کربنی دوفسفاته (فروکتوز فسفات) مشاهده می‌شود. در چرخه کالوین، قند پنج کربنی دوفسفاته دیده می‌شود. دقت کنید ترکیب شش کربنی ناپایدار در چرخه کالوین، نوعی قند نیست.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۲۲

کدام مورد، فقط درباره بعضی از روش‌هایی صادق است که به طور حتم در همه جانداران فتوسنتزکننده، به ساخته شدن ATP منجر می‌شوند؟

- (۱) ضمن مصرف نوعی نوکلئوتید دوفسفاته، مولکول آب تولید می‌شود. **تولید نوری ATP + در سطح پیش ماده**
- (۲) الکترون‌های انواع مختلفی از مولکول‌های حامل الکترون، در زنجیره‌ای در طول غشا جابه‌جا می‌شوند.
- (۳) انرژی حاصل از جابه‌جایی یون‌های H^+ ، در تشکیل پیوند بین فسفات‌ها نقش دارد.
- (۴) مستقیماً از انرژی الکترون‌ها برای تولید شکل رایج انرژی در باخته استفاده می‌شود.

پاسخ: گزینه ۳

خودت حل کنی بهتره سه روش ساخته شدن ATP، می‌تواند در یاخته‌های فتوسنتزکننده دیده شود: (۱) ساخته شدن ATP در سطح

پیش‌ماده (۲) ساخته شدن اکسایشی ATP (۳) ساخته شدن نوری ATP.

گیاهان و انواعی از آغازیان و باکتری‌ها علاوه بر مصرف O_2 طی تنفس هوازی، توانایی انجام فتوسنتز نیز دارند، اما خب همه جانداران فتوسنتزکننده لزوماً هوازی نیستند، پس در همه آن‌ها، تولید اکسایشی ممکن است رخ ندهد؛ به عبارتی می‌توان گفت در جانداران فتوسنتزکننده حداقل دو روش ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده (در قندکافت) و ساخته شدن نوری ATP ممکن است رخ دهد. حال باید دنبال گزینه‌ای بگردیم که یا درباره ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده درست باشد یا درباره ساخته شدن نوری ATP.

پاسخ تشریحی طی واکنش‌های وابسته به نور فتوسنتز، پروتون‌ها براساس شیب غلظت خود، از بخش کانالی آنزیم ATP‌ساز، از بخش دارای H^+ بیشتر به H^+ کم‌تر می‌روند و این جابه‌جایی H^+ ، انرژی مورد نیاز برای تشکیل ATP از ADP و گروه فسفات را فراهم می‌کند. در گلیکولیز (ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده) غلظت پروتون‌ها نقشی در تأمین انرژی لازم برای ساخت ATP ندارد.

نکته در تولید نوری ATP، شیب H^+ در نتیجه عملکرد زنجیره انتقال الکترون و تجزیه نوری آب ایجاد می‌شود (پمپ H^+ توسط اجزای زنجیره). این H^+ هم تأمین‌کننده انرژی لازم برای فعالیت آنزیم ATP‌ساز است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) این مورد مربوط به فرایند تولید ATP است که طبق شکل کتاب درسی، همراه با تولید آب است و در همه روش‌ها دیده می‌شود.
- (۲) این مورد مربوط به تولید ATP به روش اکسایشی است. در روش نوری ساخت ATP و در سطح پیش‌ماده، حامل الکترون اکسایش نمی‌یابد. دقت کنید طی زنجیره انتقال الکترون واکنش‌های فتوسنتزی، حامل الکترون تشکیل می‌شود.
- (۴) در هیچ‌یک از روش‌های مذکور، انرژی الکترون‌ها مستقیماً برای تولید ATP مصرف نمی‌شوند.

درس نامه •• انواع روش‌های تولید ATP

تولید نوری	تولید اکسایشی	تولید در سطح پیش‌ماده	
x	✓	✓	همراه با تجزیه ماده مغذی است؟
یاخته‌های فتوسنتزکننده	یاخته‌های هوازی	هر نوع یاخته زنده	در چه نوع یاخته‌هایی رخ می‌دهد؟
✓	✓	x	از انرژی انتقال الکترون‌ها استفاده می‌شود؟
درون کلروپلاست	درون میتوکندری	ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم + درون میتوکندری	در یوکاریوت‌ها در کجای یاخته رخ می‌دهد؟
x	✓	x	تولید ATP نیازمند حضور اکسیژن است.



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

تست و پاسخ ۲۳

مطابق مطالب کتاب درسی، هر جاندار یوکاریوتی فتوسنتز کننده که می تواند تحت شرایطی همه یا بعضی از کلروپلاست (های) خود را از دست بدهد،

چه مشخصه ای دارد؟

اوگلنا + بعضی گیاهان

- (۱) دومین سطح سازمان یابی در پیکر آن، حاصل همکاری یاخته ها با یکدیگر است.
- (۲) توسط نوعی آنزیم رنابسپاراز و هم چنین محصول آن، نوعی آنزیم تولید کند.
- (۳) همانند پارامسی نوعی آغازی است که در شرایطی از مواد آلی تغذیه می کند.
- (۴) همه مولکول های رنگیزه خود را در کلروپلاست (ها) نگهداری می کند.

پاسخ: گزینه ۲

خود حل کنی بهتره اوگلنا در حضور نور فتوسنتز می کند و در صورتی که نور نباشد، سبز دیسه های خود را از دست می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات مورد نیاز خود را به دست می آورد؛ هم چنین در فصل ۶ زیست دهم خواندید که در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبز دیسه ها در بعضی گیاهان تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می شود.



درس نامه ●● آغازیان نقش مهمی در تولید ماده آلی از ماده معدنی دارند.

جلبک های سبز، قرمز و قهوه ای از آغازیان هستند و فتوسنتز می کنند.

اوگلنا جاندار تک یاخته ای و مثالی از آغازیان فتوسنتز کننده است. این جاندار در:

- (۱) حضور نور → با فتوسنتز مواد آلی مورد نیاز خود را تأمین می کند.
- (۲) در عدم حضور نور → سبز دیسه های خود را از دست می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات مورد نیاز خود را به دست می آورد.

پاسخ تشریحی هر دو جاندار می توانند توسط رنابسپاراز نوع ۱، رنای رناتنی (rRNA) بسازند. rRNA می تواند در ساختار رناتن ها قرار

بگیرد و با داشتن نقش آنزیمی، طی ترجمه، آنزیم های پروتئینی بسازد.

بررسی سایر گزینه ها:

(۱) اوگلنا تک یاخته ای می باشد و فاقد بافت به عنوان دومین سطح سازمان یابی حیات است. در جانداران تک یاخته ای، دومین سطح حیات، می تواند جمعیت باشد.

(۳) فقط برای اوگلنا صادق است.

نکته همه گیاهان فتوسنتز کننده فقط از مواد معدنی استفاده نمی کنند؛ مثلاً گروهی از این گیاهان، گوشت خوار (حشره خوار) هستند که می توانند از حشرات که مواد آلی دارند، استفاده کنند.

(۴) گیاهان، کاروتنوئیدها را که جزء رنگیزه ها هستند، در رنگ دیسه نیز نگهداری می کنند. در کلروپلاست هم، علاوه بر کلروفیل ها، کاروتنوئیدها دیده می شوند، اما در کروموپلاست ها، کلروفیل دیده نمی شود.

تست و پاسخ ۲۴

کدام گزینه، نادرست است؟

- (۱) سیانوباکتری برخلاف باکتری گوگردی ارغوانی، به کمک کلروفیل a موجود در نوعی غشای زیستی، انرژی نور را به دام می اندازد.
- (۲) باکتری گوگردی ارغوانی همانند اوگلنا، با استفاده از نور خورشید، گلوکز می سازد و فاقد توانایی تولید گازی بی رنگ با بوی شبیه تخم مرغ گندیده است.
- (۳) باکتری نیترات ساز برخلاف توبره واش، می تواند از واکنش های اکسایشی جهت تأمین انرژی مورد نیاز برای نوعی فرایند سوخت و سازی استفاده کند.
- (۴) باکتری گوگردی ارغوانی همانند باکتری نیترات ساز، بدون نیاز به تجزیه نوری آب، فرایند تولید مواد آلی از مواد معدنی را صورت می دهد.

پاسخ: گزینه ۳



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

آزمون ششم آنلاین

پاسخ تشریحی طبق کتاب، در باکتری نیترات ساز، انرژی لازم برای ساخت مواد آلی از معدنی، از واکنش های اکسایشی تأمین می شود، اما دقت کنید که توپره واش نیز می تواند با استفاده از واکنش های اکسایشی، انرژی مورد نیاز برخی از فرایندهای سوخت و سازی خود را تأمین نماید؛ مثلاً در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری، اکسایش NADH و FADH_2 در تأمین انرژی لازم برای تولید ATP (ایجاد شیب H^+ لازم برای فعالیت آنزیم) نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هر دو جاندار می توانند انرژی نور را به دام بیندازند، اما کلروفیل a در سیانوباکتری وجود دارد، ولی باکتری گوگردی ارغوانی برای به دام انداختن نور، از باکتریوکلروفیل استفاده می کند. این رنگیژه های فتوسنتزی در غشای باکتری قرار دارند.

نکته در همه جانداران فتوسنتز کننده، رنگیژه فتوسنتزی وجود دارد که انرژی نور را به دام می اندازد، اما این رنگیژه لزوماً کلروفیل نیست.

۲) باکتری های گوگردی به جای اکسیژن، گوگرد (نه هیدروژن سولفید) تولید می کنند. هیدروژن سولفید گازی بی رنگ است و بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد. هر دو جاندار مطرح شده، می توانند با استفاده از نور فتوسنتز کنند و قند بسازند.

۳) باکتری گوگردی ارغوانی به جای تجزیه آب، با تجزیه هیدروژن سولفید الکترون های مورد نیاز خود را به دست می آورد. باکتری نیترات ساز نیز از انرژی نور خورشید استفاده نمی کند، لذا فاقد توانایی تجزیه نوری آب است.

سبزیسه ندارند، ولی رنگیژه های جذب کننده نور را دارند.

باکتری های
فتوسنتز کننده

بعضی از باکتری ها سبزینه دارند، مثل سیانوباکتری که سبزینه a دارد.

همانند گیاهان با استفاده از CO_2 و نور، ماده آلی می سازند.

همانند گیاهان در فرایند فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند.

رنگیژه فتوسنتزی این باکتری ها، باکتریوکلروفیل است.

کربن دی اکسید را جذب می کنند، اما اکسیژن تولید نمی کنند؛ زیرا منبع تأمین

الکترون در آن ها ترکیبی به غیر از آب است.

باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز از این گروه اند.

این باکتری ها کربن دی اکسید را جذب می کنند، اما اکسیژن تولید نمی کنند؛

زیرا منبع تأمین الکترون در آن ها ترکیبی به غیر از آب است.


در باکتری های گوگردی منبع تأمین الکترون H_2S است و به جای اکسیژن،

گوگرد ایجاد می شود.

از این باکتری ها در تصفیه فاضلاب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می کنند.

هیدروژن سولفید گازی بی رنگ است و بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد.

واکنش فتوسنتز در این باکتری ها:



تست و پاسخ ۲۵

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در واکنش های فتوسنتز در کلروپلاست نوعی جلبک سبز، به ازای می شود.»

۱) وابسته به نور - تجزیه دو مولکول آب در تیلاکوئید، فقط یک مولکول NADP^+ دچار کاهش

۲) مستقل از نور - تولید هر مولکول ADP در داخل بستره، یک مولکول NADPH مصرف

۳) وابسته به نور - تولید دو مولکول حامل الکترون، یک مولکول اکسیژن در داخل تیلاکوئید تولید

۴) مستقل از نور - خروج هر قند فسفات از چرخه ای از واکنش های آنزیمی، دوازده مولکول NADPH دچار اکسایش


پاسخ: گزینه ۳



پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی خیلی سبز

زیست پلاس

پاسخ تشریحی در واکنش‌های وابسته به نور فتوسنتز، طبق واکنش‌های نشان داده شده، برای تولید هر مولکول NADPH، به دو الکترون نیاز است و به ازای تجزیه نوری هر مولکول آب نیز دو یون هیدروژن و دو الکترون و نصف مولکول اکسیژن آزاد می‌شوند. لذا برای تولید دو مولکول حامل الکترون به $4e^-$ و $4H^+$ نیاز داریم، پس ۲ بار باید واکنش تجزیه H_2O رخ دهد و این یعنی مجموعاً یک مولکول اکسیژن تولید می‌گردد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) مطابق واکنش‌های فوق، به ازای تجزیه دو مولکول آب، ۴ الکترون حاصل می‌گردد و بنابراین دو مولکول $NADP^+$ دچار کاهش می‌شود.

۲) در چرخه کالوین شکل کتاب درسی، به ازای مصرف ۱۸ مولکول ATP (تولید ۱۸ مولکول ADP) ۱۲ مولکول NADPH مصرف و ۲۴ الکترون از آن آزاد می‌شود؛ پس میزان مصرف ATP و NADPH با هم برابر نیست!

۴) طبق شکل چرخه کالوین در کتاب درسی، به ازای مصرف ۱۲ مولکول NADPH، ۲ مولکول قند سه کربنه از چرخه کالوین خارج می‌شوند تا برای تولید گلوکز و سایر مواد آلی مصرف شوند؛ پس به ازای خروج هر مولکول قند سه کربنی از چرخه کالوین، ۶ مولکول NADPH مصرف می‌شود.