


پایان تشرییح تنور داخل سور ۱۴۰۷ اردیبهشت ماه باللیه هجدهم سازمان سنجش

۱. چند مورد درباره استخوان های ستون مهره یک فرد سالم صادق است؟ با فرض اینکه فرد به حالت قائم قرار دارد.

 - الف نخستین استخوان مهره گردن با یکی از استخوان های جمجمه مفصل شده است.
 - ب مهره های ناحیه کمر از مهره هایی که در ناحیه گردن قرار گرفته اند بزرگ ترند.
 - ج مهره های ناحیه پشت از طریق زائده های پهلوی خود به دو دنده متصل اند.
 - د یکی از استخوان های ستون مهره که تعدادی حفره کوچک دارد با دو استخوان نیم لگن مفصل شده است.



၃(၄) ၄(၃) ၁(၂) ၂(၁)

الف درست است مهره اطلس به استخوان پس سری مفصل داره

ب درسته شکلیه دیگه


ج همه مهره های پشتی این جوری نیستند شکل روبه رو رو بنگر

له شی طراح اناتومی سه بعدی که من با بچه ها کار کردم به کار

امد

د درسته اینم شکلشو برات گذاشتمن سمت چیه! حالا در پایین بخشی از جزوه من رو بین حالشو بیر برا توجهی اش اسم رو گوگل کن

استخوان: بخشی از اسکلت



۲. در خصوص بخشی از دستگاه گوارش انسان که با ترشح آنزیم هایی در تجزیه فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی بیشترین نقش را دارد کدام مورد درست است؟

- (۱) خون خارج شده از آن ابتدا با خون خارج شده از نوعی اندام لنفی به هم می پیوندد.
- (۲) تحرک و ترشح در آن مستقیماً توسط شبکه های یاخته های عصبی تنظیم می شود.
- (۳) ترشحات بزرگترین اندام مرتبط با لوله گوارش را دریافت می کند.
- (۴) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی شروع به ترشح می کند.

۲ پاسخ گزینه ۴ است.

منظور اندام پانکراس می باشد. گزینه یک که مربوط به طحال میشه که با سیاهرگ کوچک معده ادغام می شود گزینه دوم شبکه عصبی روده ای اصلا به پانکراس کاری نداره چون مربوط به لوله گوارش میشه گزینه سوم به مجرای مشترک پانکراس و صفرا اشاره داره که با توجه به کلید سازمان سنجش نمیتوانیم بگیم ترشحاتش رو پانکراس دریافت کرده بلکه مجرای پانکراس این ترشحات رو در بخشی از انتهای خودش دریافت میکنه گزینه ۴ منظور پانکراس، که یکی از اعضای مهم سیستم گوارش است، به دلیل تحریک های شیمیایی فعال می شود و شروع به ترشح آنزیمها می کند. این آنزیمها کمک می کنند تا غذا در دستگاه گوارش تجزیه و جذب شود. پیک شیمیایی می تواند ناشی از ورود غذا به معده باشد که باعث تحریک گیرنده های شیمیایی می شود و سیگنال هایی را به پانکراس می فرستد تا آنزیمها لازم را ترشح کند.

۳. کدام عبارت در ارتباط با یک مرد جوان و سالم نادرست است؟

- (۱) هورمونی که رشد غده پروستات را تحریک می کند با سازوکار باز خورد منفی تنظیم می شود.
- (۲) هورمونی که صفات ثانویه را ایجاد میکند منحصرآ توسط یاخته های بینایینی ترشح میشود.
- (۳) هورمونی که باعث رشد ماهیچه ها و استخوان ها میشود برای فعالیت یاخته های سرتولی ضروری است.
- (۴) هورمونی که بر فعالیت یاخته های دیواره لوله های زامه (اسپرم) ساز مؤثر است توسط غده هیپوفیز تولید میشود.

۳ پاسخ گزینه ۲ است.


گزینه یک تستسترون که باز خورد منفی داره گزینه دوم که تستسترون باشه از فوق کلیه هم ترشح میشه پس غلط تستسترون و هورمون های تیروئیدی بر روی سرتوری اثرگذاند و گزینه اخر هم منظور FSH هستش

۴. کدام مورد طی فرایند تنفس نوری در گیاهان $3C$ ، رخ می دهد؟

- (۱) در این فرایند همانند فرایند ثبیت کربن در گیاهان ، C_4 NADPH و ATP تولید میشود.
- (۲) در این فرایند همانند فرایند تنفس یاخته ای در گیاهان CO_2 در داخل راکیزه (میتوکندری) آزاد می شود.
- (۳) در این فرایند برخلاف فرایند ثبیت کربن در گیاهان CAM CO_2 در محل آنزیم روپیسکو بالا نگه داشته می شود.
- (۴) در این فرایند برخلاف فرایند ثبیت کربن در گیاهان $3C$ روپیسکو بیس فسفات با کمک ترکیبی سه کربنی بازسازی می شود.

۴ پاسخ گزینه ۲ است.

(۱) تنفس نوری و ساخت ATP و انا دی اچ؟(۲) تنفس دیگه باید ماده الی بسوزه و CO_2 تولید بشه (۳) بر عکس میزان اکسیژن در اطراف آنزیم روپیسکو بالاست (۴) توی هر دوی این فرایندها بازسازی توسط یک ترکیب سه کربنی اتفاق می افتند. ما تو جزو و کلاس هامون اینجوری به بچه ها درس میدیم خلاصه تنفس نوری رو در پایین بین که مثل عدسی و قرنیه کروی و صاف شین خخخ





۵. درباره فقط بعضی از مهره داران ماده ای که ساختار ویژه و کارآمدی جهت اکسیژن گیری از آب دارند که به نواحی خاصی محدود شده است کدام مورد صدق میکند؟

- (۱) در درون بدن آنها ممکن است تخمکی با دیواره ژله ای و چسبناک تولید شده باشد.
- (۲) در دو طرف بدن و در روی پوست آنها کانال هایی حاوی یاخته های مزکدار وجود دارد.
- (۳) در پی ترشح آنزیم های لوله گوارش آنها فرایند گوارش برون یاخته ای انجام می شود.
- (۴) خون آنها پس از تبدلات گازی ابتدا به اندام های مختلف بدن می رود.

(۵) پاسخ گزینه ۱ است.

ماهی و نوزاد دوزیست. گزینه ۱ برای این که نوزاد دوزیست توانایی تولید تخمک نداره برا همین جوابه گزینه دو کانال های در زیر پست گزینه ۳ و ۴ که برای همه این جانورانه

۶. مطابق با اطلاعات کتاب درسی مایع زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای بخش هایی از چشم انسان فراهم می کند. چند مورد ویژگی مشترک این بخش ها را در یک چشم سالم نشان می دهد؟




- الف: سطح کاملاً کروی و صافی دارند.
- ب: محیط شفافی را به وجود می آورند.
- ج: توسط جسم مژگانی احاطه شده اند.
- د: مجاور مایع ژله ای و شفاف چشم هستند.

۱۱۱ ۳(۲) ۲(۳) ۴(۴)

(۶) پاسخ گزینه ۳ است.

الف و ب رو درست گرفته عدسی و قرنیه رو میگه چون سالمه الف برادر دو درسته فقط خواهشا به معنی کلمات دقت نکنید که به فنا میرید مثل من کتاب و تغییرش رو با دقت برآ کنکور تیر از نظر بگذروند ب برادر دو شفاف هستش ج قرنیه رواحاطه نمیکند د قرنیه با زجاجیه مجاورت نداره که!

۷. با فرض اینکه ژن های مورد نظر بر روی فام تن (کروموزوم) های جنسی انسان قرار دارد کدام زاده حاصل گامت نوترکیب است؟ علامت «—» نشان دهنده فام تن y است.



(۷) پاسخ گزینه ۴ است.

کراس بین جایی که ضبردر زدم انجام شده

۸. مطابق با اطلاعات کتاب درسی و در ارتباط با جانوری که برای تأمین بیشترین انرژی خالص از صدف هایی با اندازه متوسط استفاده میکند کدام مورد صحیح است؟

- (۱) از نظر روش اصلی برای تنفس به ستاره دریایی شباهت دارد.
- (۲) از نظر ساختار ویژه دفع و تنظیم اسمزی به زنبور شباهت دارد.
- (۳) از نظر اساس حرکت با انسان تفاوت دارد.
- (۴) از نظر نوع اسکلت با شته تفاوت دارد.

(۸) پاسخ گزینه ۱ است.

خرچنگ و ستاره دریایی هر دو آبشش دارند. (۲) خرچنگ نفریدی داره و حشرات لوله های مالپیگی (۳) مشابه است خخخ


۹. کدام مورد در ارتباط با یاخته های زنده پیراپوست (پریدرم) تنہ یک درخت مسن نادرست است؟
- (۱) همه آنها در منطقه پوست درخت قرار گرفته اند.
 - (۲) فقط بعضی از آنها در مجاورت چوب پسین هستند.
 - (۳) همه آنها جزو سامانه بافت پوششی گیاه محسوب میشوند.
 - (۴) فقط بعضی از آنها دائماً تقسیم میشوند و در افزایش قطر ساقه نقش اصلی را دارند.
- (۹) پاسخ گزینه ۲ است.

۱۰. پوست درخت میشه پیراپوست به علاوه آبکش پسین^(۲) پارانشیم کنار ابکش پسین هستش نه چوب!^(۳) پیراپوسته دیگه در اندام های مسن^(۴) کج پ رو میگه خخخ

۱۰. به طور معمول کدام مورد وقایع پس از لقاح در انسان را نشان میدهد؟
- (۱) همزمان با تشکیل حفره درون بلاستوسیست نوعی توده یاخته ای در تخمدان به فعالیت خود ادامه میدهد.
 - (۲) همزمان با تشکیل تروفوبلاست لایه های زاینده جنینی هم به وجود می آیند.
 - (۳) همزمان با تشکیل توده یاخته ای درونی هورمون HCG ترشح میشود.
 - (۴) همزمان با تشکیل مورو لا فرایند جایگزینی به انجام میرسد.
- (۱۰) پاسخ گزینه ۱ است.

همزمان با بلاستولا تو تخدمان جسم زرد رو داریم که داره اس و پرو ترشح میکنه^(۲) بزا بر سه به رحم بعد جایگزین بشه تازه لایه زاینده بسازیم!^(۳) این هورمونه که از کوریون میاد^(۴) بلاستولا جایگزین میشه که یه جمع بندی خفن از جزو هام تو این مبحث بین چقدر خوب جمش کردم

از قاعده‌ی تاباردلی



۱۱. در انسان طی یک گرددش ششی، خون دو سیاهرگ ششی نسبت به سیاهرگ های ششی دیگر مسیر کوتاه تری را طی میکند تا از طریق منافذی به قلب وارد شود چند مورد درباره این منافذ صادق است؟
- الف به گره سینوسی - دهلیزی نزدیک اند.
 - ب در سطح پشتی قلب قرار دارند.
 - ج از منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین دورند.
 - د در مجاورت دریچه سینی سرخرگ ششی قرار دارند.

۱(۴)


۲(۳)

۳(۲)

۴(۱)

(۱۱) پاسخ گزینه ۳ است.

دهلیز چپ رو میگه که در سطح پشتی قلب این منافذ هستن و از سیاهرگ های بزرگ دورند پس ب وج درسته ولی الف و د فاصله دارند حق!



۱۲. کدام مورد در ارتباط با یاخته ماهیچه دلتایی انسان، نادرست است؟

(۱) با حضور آدنوزین تری فسفات موقعیت سر میوزین نسبت به دم آن تغییر میکند.


(۲) طی مدت برقراری پل اتصال میوزین به اکتین موقعیت سر میوزین نسبت به دم آن تغییر میکند.

(۳) دقیقاً قبل از جدا شدن میوزین از اکتین موقعیت سر میوزین نسبت به رشته اکتین به حالت قائم است.

(۴) با نزدیک شدن اکتین به بخش میانی میوزین موقعیت سر میوزین نسبت به رشته اکتین به حالت غیر قائم در می آید.


(۱۲) پاسخ گزینه ۳ است.

قبل جدا شدن که حالت غیر قائم داره که گزینه های دیگه رو تو تصویر زیر گفتم که



۱۳. در ارتباط با واکنش های تثبیت کربن در برگ گیاه مولکول پنج کربنی را با توجه به واکنش هایی که پس از ایجاد ترکیب ناپایدار رخ می دهد کدام مورد در یک چرخه پیش از سایرین به انجام میرسد؟
- (۱) خروج گروه فسفات از چرخه
 - (۲) تولید مولکول پنج کربنی فسفات دار
 - (۳) خروج نوعی مولکول دوفسفاته از چرخه
 - (۴) استفاده از الکترون های نوعی مولکول پرانرژی
- (۱۳) پاسخ گزینه ۳ است.

تو خلاصه ای که نوشتتم قسمت زرد رنگ که ادب زودتره که واکنش های مستقل از نور: واکنش های تثبیت کربن



۱۴. با توجه به دیواره سه لایه ای قلب انسان ویژگی مشترک دو لایه ای که با خصیم ترین لایه این دیواره مجاور هستند کدام است؟

- (۱) یاخته هایی دارند که به یکدیگر بسیار نزدیک اند.
- (۲) بیشتر از یاخته های بافت ماهیچه ای تشکیل شده اند.
- (۳) یاخته های آنها در ساختار دریچه ها به کار رفته اند.
- (۴) یاخته های مخطط آنها از طریق صفحات بینایینی به هم مربوطند.

(۱۴) پاسخ گزینه ۱ است.


درون شامه و پیراشامه هر دو بافت پوششی دارند پس بزن گزینه ۱ رو

۱۵. نوعی هورمون گیاهی میتواند عمر سبزی خوردن را بعد از برداشت افزایش دهد کدام دو نقش زیر به این هورمون تعلق دارد؟

- (۱) ایجاد ریشه در گیاهان پسته و گردو و ریزش میوه در گیاه پنبه
 - (۲) القای تقسیم در یاخته های کال و رشد جوانه های جانبی در گیاهان بوته ای
 - (۳) جانشین سرما در جوانه زنی دانه ها و ممانعت از رویش و رشد علف های هرز
 - (۴) به خواب رفتن جوانه ها در گیاهان چوبی و جلوگیری از رویش دانه در داخل میوه
- (۱۵) پاسخ گزینه ۲ است.

منظورش جیرلین که هم القای تقسیم میکنه هم در نبود چیرگی راسی تو جوانه جانبی رشد میکنه (۱) اکسین-اتیلن رو میگه (۳) ابسیزیک اسید-اکسین

(۴) ابسیزیک-ابسیزیک رو میگه



۱۶. در خصوص یاخته های یوکاریوتی کدام مورد یا موارد زیر صحیح است؟
- الف طول هر بیانه اگزون آنها از طول میانه (اینترون) مجاورش بیشتر است.
 - ب در میان نوکلئوتیدهای دو انتهای tRNA آنها پیوند هیدروژنی وجود دارد.
 - ج نوکلئوتیدهای آدنین دار با جرم ها و نقش های متفاوت در سیتوپلاسم آنها یافت میشود.
 - د آمینواسید خارج شده از جایگاه P رناتن آنها از سمت گروه کربوکسیل خود با آمینو اسید جایگاه A پیوند برقرار میکند.

(۱) «ج» و «د» (۲) «الف» و «ب» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج»

۱۶ پاسخ گزینه ۱ است. الف کمتر است ب پیوند ندارندج هیچ کس اشاره نکرد که ناده و ادپی ات پی ام پی داریم تو یاخته دیگه و د هم که دیگه اصل پیوند پیتیدی هستش

۱۷. در ارتباط با بزرگترین اندام لنفی یک فرد بزرگسال به غیر از مغز استخوان که فعالیت زیادی دارد کدام مورد نادرست است؟

- ۱) محتویات خود را از طریق رگ های لنفی به مجرای لنفی چپ وارد میکند.
- ۲) در بالا بردن ظرفیت حمل اکسیژن خون نقش مؤثری دارد.
- ۳) بزرگترین گویچه های سفید تک هسته ای را تولید می کند.
- ۴) یاخته های خونی غیر طبیعی را تخریب می کند.

۱۷ پاسخ گزینه ۳ است.

حابچی مون (جمع حاجی و ابجی خخخ) طحال رو میگه که ۱ و ۲ و ۴ داره به نقش طحال اشاره میکنه که محل تخریب گویچه قرمز هستش و اهنگ بر ساخت دوباره گویچه استفاده میشه و ظرفیت اکسیژن رو افزایش میده و لنفس هم میریزه به مجرای لنفی چپ

۱۸. با توجه به شکل ۱ و ۲ که به ترتیب به گل های شماره ۱ و ۲ تعلق دارد



شکل (۱)



شکل (۲)

(۱) در گل ۱ و ۲ تعداد برچه ها بیش از تعداد فضای خالی درون مادگی است.

(۲) گل ۲ نسبت به گل ۱ تعداد کالاله کمتری دارد.

(۳) در گل ۱ و ۲ به تعداد یکسان تخمک وجود دارد.

(۴) گل ۲ نسبت به گل ۱ تعداد خامه بیشتری دارد.

(۱۸) پاسخ گزینه ۴ است.

(۱) توی ۱ تعداد برچه ها برابر با تعداد فضای خالی درون مادگی است (۲) بیشتر (۳) نایکسان خیخ شکل ۲ شش و شکل ۱ یک تخمک داره (۴) منطقیه

۱۹. کدام عبارت در ارتباط با رفتار جیرجیرک نر مطرح شده در کتاب درسی صادق است؟

(۱) برای جانور نر هزینه اندکی دارد.

(۲) بر تغییر خزانه ژنی جمعیت نسل آینده بی تأثیر است.

(۳) باعث میشود تا بیشترین زاده های سالم را داشته باشد.

(۴) مستقل از ژن نمود (زنوتیپ) جیرجیرک جنس مخالفش است.

(۱۹) پاسخ گزینه ۳ است.

شکل جزوه رو دریاب!

جنس انتخاب گردن

مُصرَّه صرف انرژی و هزینه بیشتر برای تولید مثل

اساس انتخاب؛ بزرگ بودن جیرجیرک ماده

چهارایی اساس؛ تخمک های بیشتر

نظام چفت گیدی؛ چند همسری

رقابت بین؛ ماده ها



۲۰. با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام مورد در ارتباط با ساختار و یا عملکرد آنزیم های بدن انسان نادرست است؟

(۱) در آنزیم اتصال دهنده متیونین به رنا محل استقرار توالی پادرمزه (آتنی کدون) با فاصله زیادی از جایگاه متیونین قرار دارد.

(۲) در آنزیم مولد کراتین از کراتین فسفات گروه های فسفات پیش ماده ها با فاصله بسیار زیادی از هم قرار می گیرند.

(۳) در پی تغییر شکل گذرای پمپ سدیم - پتاسیم تمایل این آنزیم به پیش ماده هایش عوض میشود.

(۴) در حضور آب دو نوع مونوساکارید از جایگاه فعل آنزیم تجزیه کننده ساکارز خارج میشود.

(۲۰) پاسخ گزینه ۲ است.

(۱) ساختار ال مانند رنای ناقل در مکان های با فاصله زیاد قرار دارند (۲) مجاور هم هستن که! (۳) هفتی و هشتی میشه ساختار پمپ! (۴) ابکافت باید بکنیم

اب میخوایم

۲۱. به منظور تقسیم سیتوپلاسم یاخته مریستمی ریشه لوپیا لازم است چند مورد زیر رخ دهد؟
الف: صفحه یاخته ای در بخش میانی یاخته به وجود آید.

ب با استفاده از غشای ریز کیسه وزیکول های گلزی غشاهای جدیدی شکل بگیرد.

ج ریز کیسه وزیکول های غنی از پیش سازهای تیغه میانی در بخشی از یاخته تجمع یابند.

د اندامک های استوانه ای حاوی دسته های سه تایی از لوله های پروتئینی دو برابر شود.

(۲۱) پاسخ گزینه ۳ است.

الف (پس يادمون باشه تقسيم ياخته های مریستمی با تقسيم مساوی سیتوپلاسم هستش) و ب و ج رو درسته و د که ضایع است سانتریول نداره گیاهی

۲۲. کدام مورد ویژگی مشترک هر دو لوب شش چپ انسان را نشان میدهد؟

(۱) در نزدیکی حلقه های غضروفی C شکل مجرای تنفسی قرار دارند.

(۲) توسط آخرین دندنه های قفسه سینه احاطه می شوند.

(۳) نخستین انشعابات نایژه اصلی را دریافت می کنند.

(۴) در تماس با ماهیچه میان بند دیافراگم قرار می گیرند.

(۲۲) پاسخ گزینه ۴ است.

نکته شکلی قشنگی بود ۱. برای لوب کوچیکه نه ۲. آخرین دندنه ها زیر دیافراگم رو حفاظت میکنند ۳. انگار فقط به لوب بزرگه میره ۴. از سطح قاعده ای

با دیافراگم تماس دارند

۲۳. در خصوص یکی از پرده هایی که از نخاع انسان محافظت میکند و زوائد تارمانندی دارد کدام مورد نادرست

است؟

(۱) به ماده سفید نخاع چسبیده است.


(۲) در تماس با مایع مغزی - نخاعی قرار دارد.

(۳) در مجاورت مویرگ های پیوسته قرار دارد.

(۴) محل هایی را برای عبور رشته های عصب نخاعی فراهم کرده است.

(۲۳) پاسخ گزینه ۱ است.

خوب لایه عنکبوتیه که با ماده خاکستری مغز و سفید در نخاع چسبیده نی که ولی بقیه اکیه



۲۴. کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ در انسان فقط آن بخش از آنزیم ATP ساز که در داری راکیزه میتوکندری قرار دارد.

(۱) غشای - حاوی تعدادی قطعات مجزا است


(۲) فضای - میتواند به عبور پروتون ها کمک کند

(۳) فضای - منبع رایج انرژی ياخته را رها می سازد.

(۴) غشای - میتواند الکترون بگیرد یا از دست بدهد

(۲۴) پاسخ گزینه ۳ است.

غشا میشه بخش کanalی فضا میشه بستره میتو جون! هر دو از تکه هایی ساخته شدن و پروتون از خودشون عبور نمیدن هیچ کدام الکترون از خودشون عبور نمیدن



۲۵. با فرض اینکه در گیاه آلبالو یاخته باقیمانده از تقسیم یاخته بافت خورش حامل ژن B و ژن نمود (ژنوتیپ) یاخته سازنده دانه گرده AB باشد کدام ژن نمود را میتوان برای تخم اصلی و تخم ضمیمه محتمل دانست؟

- (۱) AAB و AA (۲) BBB و BB (۳) AAA و AB (۴) AAB و BB

(۲۵) پاسخ گزینه ۲ است.

در گزینه ۱ چون اندوسپرم بی داره باید تخم اصلی هم بی داشته باشه پس رد گزینه سه چون تخم اصلی بی داره باید تخم ضمیمه هم بی داشته باشه پس رد گزینه ۴ هم چون تخم اصلی فقط بی داره باید تخم ضمیمه هم فقط بی داشته باشه پس رد حال کردی تحلیل رو خدایش!

۲۶. با توجه به رفتار بیرون انداختن پوسته های تخم شکسته شده از لانه توسط پرنده، کاکایی چند مورد زیر درباره این رفتار صادق است؟


- الف به تدریج و در مدت زمان طولانی به انجام میرسد.
ب تحت تأثیر یکی از عوامل تغییر دهنده تعادل جمعیت شکل می گیرد.
ج به سالم ماندن تخم های سفیدرنگ پرنده و بقای جوجه های آن می انجامد.
د نشانه ای از داشتن ژن های مربوط به صفات سازگارکننده در پرنده است.

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

(۲۶) پاسخ گزینه ۳ است.

رفتار غریزی دیگه که حالا الف در مدت کوتاهی بوده پس رد ب انتخاب طبیعی رو میگه پس راست میگه ج تخم هاش که سفید نی پس رد د واقعا نشانه هست شاید ایمان بیارید!

۲۷. با توجه به شکل زیر و با فرض اینکه مناطق مورد نظر در داخل بدن جانور قرار گرفته باشند کدام عبارت نادرست است؟



- (۱) در حدود منطقه ۴ بخشی وجود دارد که اوریک اسید و آب موجود در هموლنف، ابتدا به آن وارد می شود.
- (۲) در حدود منطقه ۳ بخشی وجود دارد که ارتباط یاخته های بدن را با محیط فراهم میکند.
- (۳) در حدود منطقه ۱ بخشی وجود دارد که با طناب عصبی شکمی در ارتباط است.
- (۴) در حدود منطقه ۲ بخشی وجود دارد که همولنف را به حفره های بدن پمپ میکند.

(۲۷) پاسخ گزینه ۴ است.

۱. محدوده روده است که لوله مالپیگی میپاچه محتواش رو داخل روده ۲. لوله های نایدیس رو میگه که منافذش در سطح شکمی هستن و انشعاباتشون به اون بخش رسیده ۳) حالا اعصاب با یاخته های سطح پشتی در ارتباط هستند که چیز غلطی نی ولی ۴. قلبش تو سطح پشتیش هست نه شکمیش عشقه


۲۸. کدام عبارت در ارتباط با دستگاه درون ریز بدن یک خانم جوان درست است؟

- (۱) هر غده ای که هورمون جنسی ترشح میکند در ناحیه شکم قرار دارد.
- (۲) هر غده ای که بر تراکم بافت استخوان مؤثر است در زیر حنجره قرار دارد.
- (۳) هر غده ای که باعث حفظ تعادل آب در بدن میشود در ناحیه مغز قرار گرفته است.
- (۴) هر غده ای که باز جذب ماده ای را به خون افزایش میدهد مستقیماً تحت تأثیر هورمون محرک هیپوفیز است.

(۲۸) پاسخ گزینه ۱ است.

افوق کلیه و تخمدان رو میگه که راست میگه ۲. هیپوفیز مثال رد شده ۳) الدوسترون از فوق کلیه نوج ۴. پاراتیروئیدی رو میگه که نوج نظر شریفتوں رو به جمع بندی هامون تو کلاس ها جلب میکنم شاید ایمان بیارید

آلدوسترون بالا: سدیم خون بالا- جسم خون بالا- فشار خون بالا- ادرار پایین




که بدون اتصال به تنظیم کننده هیپوتا و هیپوف پیشین تغییری در هیزان ترشحاتشان میدهند



۲۹. با توجه به بخشی از یک چرخه کربس که در آن نوعی پیوند اشتراکی بین فسفات و نوعی نوکلتوتید برقرار میشود. کدام مورد نادرست است؟ محل ورود استیل کوانزیم A به چرخه به عنوان محل آغاز چرخه در نظر گرفته میشود.
- (۱) بعد از این بخش آخرین مولکول چهار کربنی به وجود می آید.
 - (۲) بعد از این بخش دو نوع مولکول حامل الکترون تولید میشود.
 - (۳) قبل از این بخش نوعی ماده آلی آزاد میشود که برای فعالیت آنزیم ضروری است.
 - (۴) قبل از این بخش نوعی مولکول ایجاد میشود که غالباً از طریق ترکیب با هموگلوبین در خون حمل میشود.

(۲۹) پاسخ گزینه ۴ است.

قبلش که دی اکسید کربن خارج نمیشه از چرخه



۳۰. بخشی از مغز گوسفند که کف بطن چهارم را میسازد چه مشخصه ای دارد؟

- (۱) در زیر مرکز هماهنگ کننده فعالیت ماهیچه ها و حرکات موزون بدن قرار دارد.
- (۲) با تحریک این منطقه رفتارهای احساسی جانور برانگیخته میشود.
- (۳) در فعالیت های شنوایی بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد.
- (۴) تشنجی گرسنگی و خواب را تنظیم می کند.

(۳۰) پاسخ گزینه ۱ است.

کفش بصل نخاعه که خوب زیر مخچه است ۲. لیمیک رو میگه ۳. مغز میانی ۴. هیپوتالاموس رو میگه

۳۱. با توجه به نمونه های مطرح شده در کتاب درسی چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

هر تغییر ساختاری در ماده ژنتیکی که را تحت تأثیر قرار میدهد در تشکیل فامتنی (کروموزومی) نقش دارد
که نسبت به حالت اولیه خود است.

- الف فقط یک فامتن (کروموزوم) - فاقد بعضی از ژن ها
ب فامتن (کروموزوم) های غیر همتا - دارای طول متفاوتی
ج فامتن کروموزوم های همتا - دارای دو نسخه از بعضی ژن ها
د فقط یک فامتن (کروموزوم) - از نظر موقعیت سانتروم متفاوت

۳(۱) ۴(۲) ۱(۳) ۲(۴)

(۳۱) پاسخ گزینه ۳ است.

الف میشه حذف و جایه جایی واژگون شدن رو میگه که حالا فقط حذف ژن ها رو میده میره پس الف نادرسته ب میشه جهش جایی قطعا طول کروموزوم تغییر میکند پس درسته ج روی کروموزم های همتا هم مضاعف شدگی میشه هم کراسینگ اور در صورتی که کراسینگ اور دو نسخه نمیده پس غلطه د هم مثل الف حذف و جایه جایی واژگونی رو میگه که قطعی نیست پس اخیری رو هم غلطه! تو سوال نگفته ممکن است یا قطعا برا همین خبلی له شه طراح

۳۲. در انسان کدام مورد نسبت به سایرین به نوعی بافت پیوندی که سطح خارجی تنہ استخوان ران را احاطه کرده نزدیک تر است؟

- (۱) سامانه های هاورسی است که توسط مغز استخوان احاطه شده اند.
- (۲) یاخته های استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
- (۳) مغز استخوانی است که در درون حفره های متعدد تیغه های استخوانی جای دارد.
- (۴) یاخته های استخوانی است که به صورت متحدم مرکز در درون ماده زمینه استخوانی قرار گرفته اند.

(۳۲) پاسخ گزینه ۴ است.

منطقی این گزینه است ولی ۱. که توسط مغز احاطه نمیشه ۲. نامنظم که مال اسنفجی است ۳. مغز اون وسط مسط هاست.


۳۳. با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام مورد در خصوص کاربرد زیست فناوری نادرست است؟

- (۱) استفاده از بعضی انواع فراورده های حاصل از دیسک نوترکیب در ساختار انسولین
- (۲) قرار دادن و تکثیر فقط یاخته های بنیادی در محیط کشت بر روی داربست به منظور بازسازی غضروف آسیب دیده
- (۳) انتقال دیسک نوترکیب به تخمک لقاح یافته گوسفند به منظور تولید پروتئین های انسانی با استفاده از دام های تراژنی
- (۴) آماده سازی محیط کشت حاوی باکتری های فاقد دیسک و دارای دیسک نوترکیب در جریان تولید نوعی آنزیم پرکاربرد صنعتی

(۳۳) پاسخ گزینه ۲ است.

۱. زنجیره ای و بی انسولین رو میگه ۳. پروتئین انسانی ۴. امیلاز رو میگه

۳۴. شکل زیر بخشی از دستگاه گوارش نوعی جانور را نشان میدهد با توجه به بخش های مورد نظر کدام مورد درست است؟



- (۱) در بخش ۱ برخلاف بخش ۴ آنزیم های گوارشی جانور ترشح می شود.
- (۲) در بخش ۱ همانند بخش ۳ غذایی نیمه جویده و کاملاً جویده یافت می شود.
- (۳) در بخش ۴ برخلاف بخش ۲ آب مواد غذایی تا حدودی جذب می شود.
- (۴) در بخش ۲ همانند بخش ۳ جذب اصلی مواد غذایی صورت می گیرد.

(۳۴) پاسخ گزینه ۲ است.

۱. شیردان انزیم گوارشی ترشح میکنه که شماره ۴ هستش ۳) هزار لا آب جذب میکنه که شماره ۲ هستش ۴. جذب اصلی در روده است

۳۵. در صورتی که مغز گوسفند را طوری در ظرف تشریح قرار دهیم که شیار بین دو نیمکره مخ به سمت بالا باشد در خصوص محلی که در آن بخشی از آسه اکسون های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مخ مقابل میرود کدام مورد صادق است؟

- (۱) در مجاورت لوب های بویایی قرار دارد.
- (۲) بخشی از مغز میانی محسوب میشود.
- (۳) نسبت به اپی فیز در سطح پایین تری قرار دارد.
- (۴) با محل پردازش اولیه اطلاعات بینایی مجاور است.

(۳۵) پاسخ گزینه ۳ است.

صورت داره به کیاسماه بینایی اشاره میکنه ۱ و ۴ مجاورش نیست و در گزینه ۲ بخشی از میانی نیست ولی در سطح پایین تر از اپی فیز هست

۳۶. ویژگی مشترک یاخته های درون پوست (اندودرم) و یاخته های لایه ریشه زایی که در منطقه ریشه گیاه ادریسی قرار دارند کدام مورد یا موارد زیر است؟
- الف به ناحیه پوست ریشه تعلق دارد.
 - ب در فرایند بارگیری چوبی نقش دارد.
 - ج میتوانند مواد را به روشن سیمپلاستی انتقال دهند.
 - د در دیواره آنها منحصراً پکتین و رشتہ های سلولزی وجود دارد.
- (۱) «د» (۲) «ب» و «ج» (۳) «الف» و «د» (۴) «الف»، «ب» و «ج»
- ۳۶ پاسخ گزینه ۲ است.

- الف لایه ریشه زانه و دسوبرین در اندودرم هم هست هر دوزنده آن و در بارگیری چوبی نقش دارند هر دو مسیر سیم اتفاق میافته
۳۷. در خصوص فرایند تنظیم بیان ژن در هسته یاخته میانبرگ، لوبيا کدام مورد زیر به طور حتم صحیح است؟
- گروهی از لیپیدها در این فرایند نقش مؤثری دارند.
 - این فرایند بر تعداد جایگاههای آغاز همانندسازی یاخته بی تأثیر است.
 - فقط نوعی مولکول شیمیایی یا زیستی محرک اولیه این فرایند است.
 - هر پروتئین مؤثر در این فرایند فقط به یک نوع بسپار متصل میشود.
- ۳۷ پاسخ گزینه ۱ است.


- گویا به غشای یاخته اشاره داره که در تنظیم بیان نقش مؤثری داره چون علائمی که از بیرون یاخته میاد خوب باید به گیرنده ای در غشا یا سیتوپلاسم وصل بشه میشه درست ۲. در همانند سازی انزیم نداریم ایا؟^۳ نور هم باعث بیان ژن در گیاهان میشه^۴. برا رنابسپاراز و عوامل رونویسی صادق نیست
۳۸. در ارتباط با مراحل تخمک زایی در یک خانم جوان ۲۰ ساله کدام مورد نادرست است؟
- هر یاخته ای که بتواند پس از لقاح با زامه توده پریاخته ای را ایجاد کند مقدار بیشتری سیتوپلاسم دریافت کرده است.
 - هر یاخته ای که بتواند چرخه تخدمانی را آغاز و ادامه دهد با یاخته های ترشح کننده هورمون جنسی ارتباط نزدیکی دارد.
 - هر یاخته ای که فام تن کروموزوم های دو فامینکی کروماتیدی دارد در درون غده جنسی به وجود آمده است.
 - هر یاخته ای که دارای یک مجموعه فام تن کروموزوم است در اطراف خود یاخته های ترشح کننده دارد.
- ۳۸ پاسخ گزینه ۱ است.

- برا گویچه قطبی صادق نیست مرتضی است!
۲. یاخته های فولیکولی هستند که اطراف یاخته های اووسیت اولیه و ثانویه و تخمک هستند.^۳ اولیه و ثانویه در تخدمان ایجاد میشه^۴. منظور یاخته های فولیکولی هستند که موادی را ترشح میکنند

۳۹. به طور معمول و با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام عبارت درباره ساختارهای مارپیچی شکل و منظم موجود در یاخته ماهیچه توأم انسان صدق میکند؟
- هنگام تشکیل پیوند اشتراکی بین واحدهای سازنده همه آنها فقط مولکول آب آزاد شده است.
 - همه آنها دورشته ای و حاوی اتمهای کربن هیدروژن و اکسیژن هستند.
 - فقط بعضی از آنها جهت فعالیت زیستی به نوعی ماده آلی وابسته اند.
 - فقط بعضی از آنها توسط پوشش دو غشایی احاطه شده اند.
- ۳۹ پاسخ گزینه ۴ است.

دنا و اکتین یاد ادم میاد ۱. برا دنا سازی فسفات هم ازاد میشه^۲. اکتین دو رشتہ نیستند^۴. دنا در میتو وجود داره ولی اکتین نه

۴۰. مطابق با مطالب کتاب درسی به منظور اتصال قطعه‌ای از دنا به ناقل همسانه سازی به کمک آنژیم ECOR1 کدام یک از دیسک‌های فرضی زیر مناسب‌تر است؟



۱۴۰

اون توالي معروف جي ۱۱ تي سی باید یه دونه باشه که مورد سوم این رو داره که تو گزینه ۲ گفته شده

۴۱. کدام عبارت درباره فراوان ترین یاخته های سطحی پر ز رو ده باریک انسان صحیح است؟

- (۱) وظیفه ترشح ماده مخاطی را بر عهده دارند.
 - (۲) مواد را به محیط داخلی بدن وارد میکنند
 - (۳) در مجاورت لایه ماهیچه ای حلقوی قرار دارند.
 - (۴) هسته بیضی شکل آنها به چین های میکروسکوپی یاخته نزدیک است.

۱۴) پاسخ گزینه ۲ است.

یاخته های ریزپر ز دار رو میگه که جذب رو افزایش میدن

۴۲- با هجوم نوعی باکتری به بدن و ورود آنها از راه حلق به گوش میانی کدام اتفاق ممکن است رخ دهد؟

- (۱) پرده انتهای مجرای شنوازی نمیتواند به درستی بلرزد
(۲) دریچه بیضی دیگر نمیتواند مایع درون مجرای نیم دایره ای را به حرکت درآورد.
(۳) اختلاف بار الکتریکی نمیتواند در دو سوی غشای گیرنده های بخش حلزونی برقرار باشد.
(۴) استخوان رکابی نمیتواند ارتعاشات را به میزان کافی به پرده ضخیم مجاور خود منتقل کند.

۱۴۲) پاسخ گزینه ۱ است.

عفونت گوش میانی میتوشه باعث بشه پرده صماخ به درستی نلرزه^۲. نیم دایره ربطی به بیضی نداره^۳) اختلاف بار الکتریکی همیشه هست ربطی به عفونته نداشته^۴. پرده بیضی ضخیم نداریم که نازکه

۴۳. در بررسی نوعی بیماری ژنی که با فقدان عامل انعقادی **VIII** بروز میکند با فرض ممکن بودن ازدواج های زیر کدام مورد نامحتمل است؟

- (۱) تولد پسر سالم از پدر سالم و مادر ناقل
- (۲) تولد پسر بیمار از پدر بیمار و مادر ناقل
- (۳) تولد دختر سالم از پدر سالم و هر مادر خالص
- (۴) تولد دختر بیمار از پدر بیمار و مادر سالم خالص

(۴۳) پاسخ گزینه ۴ است.

مادر خالص سالم دو تا اج بزرگ داره که حتماً یکی رو به دحملش میده پس حتماً دختر سالم ناقل میشه

۴۴. کدام عبارت در ارتباط با آن دسته از گیاهان آوندی که از طریق فرایندی باعث مرگ یاخته های خود شوند.

- (۱) فقط بعضی از آنها میتوانند از طریق فرایندی باعث مرگ یاخته های خود شوند.
- (۲) همه آنها نیتروژن مورد نیاز خود را فقط به صورت یون آمونیوم یا نیترات جذب میکنند.
- (۳) فقط بعضی از آنها میتوانند مواد مضر برای گیاه را به صورت ایمن در خود نگهداری کنند.
- (۴) اغلب آنها از طریق ریشه فقط با انواعی از موجودات فتوسنتز کننده رابطه هم زیستی دارند.

(۴۴) پاسخ گزینه ۳ است.

۱. همه گیاهان مرگ یاخته ای را در یاخته های زنده هسته دار میتوانند داشته باشند.^۲ مثلاً گیاه حشره خوار که داره حشره میخوره که پروتئین و نوکلئیک اسید رو در بدنش داره از اون جا تغذیه میکنه.^۳ متن کتاب هستش لعنتی^۴ ریشه و فتوسنتز؟ جک گفته

۴۵. فرض کنید که فردی اخیراً به چند نوع بیماری عفونی مبتلا شده و بهبود یافته است. نمودار زیر پاسخ اولیه و ثانویه آخرین بیماری این فرد را نشان می دهد کدام مورد با توجه به بخش های مورد نظر به طور حتم صحیح است؟

- (۱) در بخش ۳ فقط یک نوع لنفوسیت B خاطره در خون فرد قابل شناسایی است.
- (۲) در بخش ۲ پادگن های محلول توسط بیگانه خوارها رسوب داده شده اند.
- (۳) در بخش ۱ هر پادتن به دو مولکول پادگن یکسان متصل شده است.
- (۴) در بخش ۴ یاخته های خاطره با سرعت زیادی تقسیم شده اند.

(۴۵) پاسخ گزینه ۴ است.

۱. نه دیگه گفتی به طور حتم یعنی این بنده خدا تا حالا تو عمر با برکتش با میکروب کخی چیزی برخورد نکرده که خاطره کس دیگه ای رو داشته باشه؟^۲ رسوب دادن که کار پادتن هستش^۳

لزومی نداره که به دو تا انتی ژن وصل بشه.^۴ اره خاطره به صورت انفجاری زیاد میشه برا تهیه فایل ورد این سوالات داخل پیام رسان ها و گوگل اسم منو سرج کنید

