



پایه دهم ریاضی

۱۴۰۳ شهريور ماه

تعداد کل سوال‌های آزمون: ۴۰ سوال مقطع نهم + ۵۰ سوال مقطع دهم
مدت پاسخگویی: ۷۵ دقیقه + ۵ دقیقه

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی (دقیقه)
اختصاصي	ریاضی (نهم)	۲۰	۱-۲۰	۳	۳۰ دقیقه
	آشنا				
	علوم نهم (فيزيك و زمين‌شناسي)	۱۰	۲۱-۳۰	۵	۱۵ دقیقه
	علوم نهم (شيمي)	۱۰	۳۱-۴۰	۷	۱۰ دقیقه
	ریاضي دهم	۱۰	۴۱-۵۰	۹	۱۵ دقیقه
	فيزيك دهم	۲۰	۵۱-۷۰	۱۰	۳۰ دقیقه
شيمي دهم	آشنا				
	آشنا	۲۰	۷۱-۹۰	۱۳	۳۰ دقیقه

طراحان

علی سرآبادانی - بهرام حلاج - ابراهيم نجفي - رضا سيدنجفی - نريمان فتحاللهی - محسن اسماعيلپور - شاهين پروازی - علی آزاد -	محمد قرقچيان	رياضي دهم و رياضي نهم
حميدرضا سهرابي - پيرهام صديقي - عرفان عسکريان چايچان - محمد خيري - مجید ميرزاي - ميلاد طاهرعزيزي - آرمن راسخي - كوروش رزمگير - اميرمحمد زمانی		فيزيك دهم و علوم نهم (فيزيك و زمين‌شناسي)
محمد صالح خوبياري - ميرحسن حسيني - آيدين قربانيزاده - ساجد شيري - سيدرحيم هاشمي دهكردي - ميلاد عزيزي - مهدى رحيمي - علی افخمي‌نيا - سيدرضا رضوي - ياسر عليشائى - محمدجواد سورى‌لكى - حسن رحمتى كوكنده		شيمي دهم و علوم نهم (شيمي)

گزینشگران، مسئولين درس و ويراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ويراستاري	مسئول درس
رياضي دهم و رياضي نهم	رضا سيدنجفی	علي مرشد - مسعود برملا - مهدى بحر كاظمى - مهرداد استقلاليان - نريمان فتحاللهی - احسان غنى زاده	اللهه شهباذى
فيزيك دهم و علوم نهم (فيزيك و زمين‌شناسي)	بهنام شاهنى	امير محمودي ازابي - كيارش صانعى - يوسف الهويردى زاده	عليرضا همايون خواه
شيمي دهم و علوم نهم (شيمي)	ساجد شيري طرزم	محمدجواد سورى‌لكى - علی موسوى‌فرد - اميررضا حكمت‌نيا	اميرحسين توحيدى

گروه فني و توليد

سيد على موسوى‌فرد	مدیر گروه
مهدى بحر كاظمى	مسئول دفترچه
مدیر گروه: محيا اصغرى	مستندسازى و مطابقت با مصوبات
مسئول دفترچه: اميرحسين توحيدى	حروف نگار و صفحه آرا
ليلاء عظيمى	ناظر چاپ
حميد عباسى	

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

بنیاد علمي آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۶۳ بنیاد علمي آموزشی قلمچی (وقف عام) تلفن: ۰۶۴۶۳-۰۶۱



دقیقه ۳۰

ریاضی نهم

توان و ریشه / عبارت‌های جبری

فصل ۴ از ابتدای نماد علمی و

فصل ۵

صفحه‌های ۶۵ تا ۹۴

۱- نماد علمی عدد $0/0000042$ به صورت $a/b \times 10^c$ است. اگر a , b و c اعداد صحیح تکرقمی باشند، کدام یک از موارد زیر درست است؟

$$c^a < c^b \quad (۲)$$

$$a^c > b^c \quad (۱)$$

$$a^b = b^a \quad (۴)$$

$$\sqrt[c]{c^b} > \sqrt[b]{c^a} \quad (۳)$$

۲- ربع معکوس عدد $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4}}$ کدام است؟

$$\frac{-1}{\sqrt[15]{2}} \quad (۴)$$

$$1\sqrt[15]{2} \quad (۳)$$

$$\frac{-1}{\sqrt[15]{2}} \quad (۲)$$

$$1\sqrt[15]{2} \quad (۱)$$

۳- اگر $b = \frac{2\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} + \frac{3}{2}$ باشند، حاصل ab کدام است؟

$$2\sqrt[3]{2} \quad (۴)$$

$$3\sqrt[3]{2} \quad (۳)$$

$$3\sqrt{2} \quad (۲)$$

$$2\sqrt{2} \quad (۱)$$

۴- اگر $A = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+2} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}+2}$ باشد، کدام گزینه در مورد A درست است؟

$$3 < A < 4 \quad (۴)$$

$$A = 2 \quad (۳)$$

$$2 < A < 3 \quad (۲)$$

$$A = 4 \quad (۱)$$

۵- اگر مقدار مساحت مربعی به طول ضلع $x+2$ از مقدار محیط مربعی به طول ضلع $x+8$ تا بیشتر باشد، قطر مربع بزرگتر کدام است؟

$$4\sqrt{2} \quad (۴)$$

$$2\sqrt{2} \quad (۳)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$4 \quad (۱)$$

۶- اگر $4 = 5x - \frac{3}{2x}$ باشد، حاصل عبارت $25x^2 + \frac{9}{4x^2}$ کدام است؟

$$32 \quad (۴)$$

$$29 \quad (۳)$$

$$31 \quad (۲)$$

$$24 \quad (۱)$$

۷- اگر $a > b > 0$ و $a^2 + b^2 = ab$ باشند، حاصل عبارت $\frac{a+b}{a-b}$ چند برابر $\sqrt{5}$ است؟

$$2 \quad (۴)$$

$$\frac{3}{5} \quad (۳)$$

$$\frac{4}{3} \quad (۲)$$

$$3 \quad (۱)$$

۸- کدام عامل در تجزیه عبارت $(x^2 - 2x)^2 - x^2 + 2x - 6$ وجود ندارد؟

$$x-3 \quad (۴)$$

$$x^2 - 2x + 2 \quad (۳)$$

$$x^2 - 2x + 3 \quad (۲)$$

$$x+1 \quad (۱)$$

۹- در تجزیه و ساده‌سازی عبارت $\frac{a^4 - 81}{\sqrt{a} - \sqrt{3}}$ به عبارت $(\sqrt{a} + k)(a + m)(a^2 + n)$ می‌رسیم، حاصل mnk کدام است؟

$$81\sqrt{3} \quad (۴)$$

$$12\sqrt{3} \quad (۳)$$

$$21\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$27\sqrt{3} \quad (۱)$$

۱۰- اگر مجموعه A جواب نامعادله $\frac{2}{3}(x+1) \geq 1 - \frac{2x+1}{2}$ باشد، اشتراک مجموعه B جواب نامعادله $\frac{x}{6} \geq \frac{1}{2}(3-x) + \frac{x}{6}$ و مجموعه B جواب نامعادله $\frac{2}{3}(x-1) \geq 1 - \frac{2x+1}{2}$ باشند، دو مجموعه شامل چند عدد صحیح است؟

$$8 \quad (۴)$$

$$7 \quad (۳)$$

$$6 \quad (۲)$$

$$5 \quad (۱)$$



ریاضی نهم - آشنا

۱۱- نماد علمی عدد $a/b \times 10^{-n}$ است. مقدار $a+b+n$ کدام است؟ (b عددی تکرقمی است.)

۹ (۴)

۲۱ (۳)

۱۰ (۲)

۲۰ (۱)

۱۲- اگر $x < y < z$ و $x > 0$ باشند، آن‌گاه حاصل عبارت $x\sqrt{3} + 3\sqrt{y^2} + \sqrt[3]{z^3}$ همواره کدام است؟

$$-(\sqrt[3]{x^2} + 3y + z) \quad (۲)$$

$$-\sqrt[3]{x^2} - 3y + z \quad (۱)$$

$$\sqrt[3]{x^2} + 3y + z \quad (۴)$$

$$\sqrt[3]{x^2} + 3y - z \quad (۳)$$

۱۳- اگر $A = \frac{\sqrt{2} + 5 - \sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 2 + \sqrt{14}}$ باشد، حاصل عبارت $A + 3\sqrt{2}$ کدام گزینه است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{4} \quad (۳)$$

$$2\sqrt{2} \quad (۲)$$

$$\sqrt{2} \quad (۱)$$

۱۴- حجم مکعبی برابر $\frac{\sqrt[3]{3} + 4\sqrt{2}}{2}$ است. ضلع مکعب کدام است؟

$$\sqrt[3]{\sqrt{3}} \quad (۴)$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{2}} \quad (۳)$$

$$\sqrt[3]{3} \quad (۲)$$

$$\sqrt[3]{2} \quad (۱)$$

۱۵- اگر $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ باشد، حاصل کدام عبارت، عدد صحیح است؟

$$x^2 + 2x \quad (۴)$$

$$x^2 + 1 \quad (۳)$$

$$x^2 + x \quad (۲)$$

$$x^2 - x \quad (۱)$$

۱۶- اگر $a+2b=3$ باشد، حاصل عبارت $a(a+2)+4b(b+1)+4ab$ کدام است؟

$$18 \quad (۴)$$

$$17 \quad (۳)$$

$$16 \quad (۲)$$

$$15 \quad (۱)$$

۱۷- کدام عبارت در تجزیه چند جمله‌ای $x^4 - 12x^3 + 36x^2$ وجود ندارد؟

$$x-3 \quad (۴)$$

$$x+3 \quad (۳)$$

$$x-4 \quad (۲)$$

$$x-2 \quad (۱)$$

۱۸- اگر $xy^2 = \frac{4}{3}$ باشد، حاصل $(x+3y^2)^2 - (x-3y^2)^2$ کدام است؟

$$18 \quad (۴)$$

$$16 \quad (۳)$$

$$12 \quad (۲)$$

$$8 \quad (۱)$$

۱۹- اگر مجموعه جواب نامعادله $D = \{x \in \mathbb{R} | x > 4\}$ باشد، مقدار m کدام است؟

$$10.2 \quad (۴)$$

$$\frac{24}{5} \quad (۳)$$

$$28 \quad (۲)$$

$$13 \quad (۱)$$

۲۰- چند عدد صحیح در نامعادله $\frac{1}{x-1} < \frac{4}{x} < \frac{1}{2}$ صدق می‌کند؟

$$7 \quad (۴)$$

$$8 \quad (۳)$$

$$9 \quad (۲)$$

$$10 \quad (۱)$$




۱۵ دقیقه

آثاری از گذشته زمین /
فشار و آثار آن
فصل های ۷ و ۸
صفحه های ۹۴ تا ۷۳

علوم فنی
(فیزیک و زمین شناسی)

۲۱- در شکل زیر، طبق اصل پاسکال در یک بالابر هیدرولیکی کدام گزینه همواره صحیح است؟



۱) نیروی وارد بر پیستون کوچک بیشتر است.

۲) نیروی وارد بر پیستون ها با هم برابر است.

۳) فشار وارد بر پیستون بزرگ کمتر است.

۴) فشار وارد بر پیستون ها برابر است.

۲۲- چند مورد از گزینه های زیر صحیح می باشند؟

الف) از ویژگی های فسیل های راهنمایی می توان به تشخیص آسان آنها اشاره کرد.

ب) همه موجودات می توانند تمام بدن شان به فسیل تبدیل شوند.

پ) فسیل راهنمای همانند جعبه سیاه هواپیما می باشد با این تفاوت که برای بررسی حوادث حال و گذشته بررسی می شود.

ت) همواره در توالی های لایه رسوی هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی تر است.

۴ (۴)

۱ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۲۳- قطعه آجری به ابعاد $(20 \times 10 \times 5)$ سانتی متر روی زمین قرار دارد. نسبت بیشترین فشار به کمترین فشاری که آجر می تواند به سطح زمین

وارد کند، کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

 $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{5}$ (۱)

۲۴- کدام ویژگی سنگ های رسوی به دانشمندان برای پی بردن به تاریخچه زمین، کمک بیشتری می کند؟

۲) راه های مختلف تشکیل

۱) سهولت تشخیص

۴) قدیمی بودن

۳) لایه لایه بودن

۲۵- برای فسیل شدن کامل یک پشه، کدام محیط مناسب تر است؟

۲) ماقما

۱) تپه های ماسه ای

۴) صمغ گیاهان

۳) خاکستر آتشفسانی



۲۶- دانشآموزی به جرم ۶۰ کیلوگرم بر روی سطح زمین ایستاده است. اگر مساحت کف کفش‌های او ۲۰۰ سانتی‌مترمربع باشد، فشاری که هر پای شخص به زمین وارد می‌کند، چند کیلو پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

۷۵ (۴)

۶۰ (۳)

۳۵ (۲)

۳۰ (۱)

۲۷- فسیل‌های یافته شده از کدام یک از جانداران زیر فراوان‌تر است؟

(۴) ماموت

(۳) دایناسور

(۲) دو کفه‌ای

(۱) خر خاکی

۲۸- در گزینه‌های زیر، شناس تشکیل فسیل از کدام جانور بیشتر از بقیه است؟


(۴) زالو

(۳) مار ماهی

(۲) لیسه

(۱) کرم خاکی

۲۹- با توجه به توالی لایه‌ها در شکل زیر، کدام یک از موارد درست می‌باشد؟ (از زمان تشکیل لایه‌ها جابه‌جا نشده‌اند).



الف) فسیل موجود در لایه D از همه جدیدتر است.

ب) در لایه F هیچ فسیلی یافت نمی‌شود.

پ) در لایه B، فسیل راهنمایی به سن ۲۰۰ میلیون سال و در لایه A به سن ۱۸۰ میلیون سال وجود دارد.

ت) فسیل موجود در لایه A، ساختمان بدن پیچیده‌ای دارد.

(۴) (ب) و (پ)

(۳) (ب) و (ت)

(۲) (الف) و (ب)

(۱) فقط (ب)

۳۰- چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟

الف) ذغال سنگ یک سوخت فسیلی محسوب می‌شود و منشا آن گیاهی است.

ب) طبق اصل پاسکال، نیروی وارد بر یک مایع محصور در ظرف، بدون کاهش به تمام نقاط آن مایع منتقل می‌شود.

پ) وجود فسیل مرجان‌ها در سنگ‌های رسوبی کوهستان، بیانگر محیط گرم و کم عمق دریا در گذشته است.

۴) صفر

۲ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)



۱۰ دقیقه

علوم نهم - شیمی

(فتار اتم‌ها با یکدیگر)**فصل ۲ از ابتدای داد و ستد الکترون و****پیوند یونی تا پایان فصل****صفحه‌های ۱۷ تا ۲۴****۳۱- کدام گزینه درست است؟**

۱) برای تشکیل یک مولکول آب هر مولکول هیدروژن یک الکترون به اشتراک می‌گذارد.

۲) میان مولکول‌های آب پیوند اشتراکی وجود دارد به همین دلیل روی هم می‌لغزند.

۳) در یک مولکول کربن دی‌اکسید اتم‌ها توسط چهار پیوند اشتراکی کنار هم قرار گرفته‌اند.

۴) مولکول آب سه اتمی است که از سه نوع عنصر تشکیل شده است و در طبیعت به سه حالت یافت می‌شود.

۳۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱) کات کبود برخلاف اتیلن گلیکول یک ترکیب یونی است که از کاتیون و آنیون تشکیل شده است.

۲) اتم Na ، بعد از تبدیل شدن به یون سدیم، اندازه‌اش بزرگتر می‌شود.

۳) با حل شدن نمک‌ها در آب، نقطه‌جوش آن افزایش می‌یابد.

۴) در ترکیبات یونی، از آنجایی که مجموع بار الکتریکی مثبت و منفی برابر است، ترکیباتی خنثی می‌باشند.

۳۳- کدام گزینه درست است؟

۱) اغلب واکنش‌های شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند.

۲) از واکنش گاز کل سفید رنگ و فلز سدیم یک ترکیب یونی تشکیل می‌شود که از لحاظ بار الکتریکی خنثی است.

۳) نسبت بار کاتیون به بار آنیون در منیزیم اکسید با نسبت بار آنیون به بار کاتیون در سدیم کلرید برابر است.

۴) اتم‌ها تمایل دارند با انجام واکنش‌های شیمیایی به ذرهای تبدیل شوند که ۸ الکترون دارند.

۳۴- اگر در اثر واکنش شیمیایی بین اتم X و Z ترکیب XZ_3 تشکیل شود، نسبت تعداد الکترون‌های از دست داده شده توسط یک اتم X به**تعداد الکترون‌های گرفته شده توسط یک اتم Z کدام گزینه است؟**

$$\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

۳۵- همه گزینه‌های زیر درست‌اند، بهجز ...

۱) حل شدن نمک خوراکی در آب سبب تغییر خواص شیمیایی آن می‌شود.

۲) ترکیبات یونی شکننده‌اند و در اثر ضربه خرد می‌شوند.

۳) ترکیبات یونی در حالت مذاب و محلول رسانای الکتریکی هستند.


۴) آنیون‌ها یون‌هایی با بار الکتریکی منفی هستند و کاتیون‌ها یون‌هایی با بار الکتریکی مثبت هستند.



- ۳۶- چند مورد از مطالب زیر، در ارتباط با ترکیب Al_2O_3 صحیح است؟ (O_۸, Al_۲)
- آ) اتم آلومینیم باز دست دادن سه الکترون به ذرهای با مدار آخر ۸ الکترونی تبدیل می‌شود.
 - ب) برای تشکیل یک واحد آلومینیم اکسید (Al_2O_3)، ۶ عدد الکترون جایه‌جا می‌شود.
 - پ) پیوند بین ذرهای سازنده آلومینیم اکسید (Al_2O_3) همانند پیوند بین ذرهای متان (CH_۴) است.
 - ت) تعداد الکترون در مدار آخر آئیون ترکیب Al_2O_3 برابر ۸ است.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

- ۳۷- اگر از واکنش فلز سدیم با گاز فلور، ترکیب یونی سدیم فلورید به دست آید، کدام گزینه آرایش الکترونی یون فلورید را به درستی نمایش می‌دهد؟ (نماد شیمیایی عنصرهای سدیم و فلور به ترتیب ^{۱۱}Na و ^{۹}F می‌باشد.)



- ۳۸- چند مورد از موارد زیر در رابطه با یون سدیم (Na^+) صحیح است؟
- پس از یون آهن فراوان‌ترین کاتیون موجود در خون است.
 - در حالت محلول رسانای جریان الکتریکی است.
 - یکی از وظایف اصلی این یون، ایجاد جریان الکتریکی در مغز و اعصاب و ماهیچه‌های بدن به ویژه قلب است.
 - مصرف کم ماده‌ای که می‌تواند مقدار مورد نیاز این یون را در بدن تأمین کند در افراد مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون توصیه می‌شود.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

- ۳۹- کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) بدن ما برای ساخت هموگلوبین به یون آهن (Fe^{3+}) نیاز دارد.
- ۲) برای درمان کم خونی و جیران کمبود آهن، قرص آهن (فروس سیلیکات) تجویز می‌شود.
- ۳) در افراد مبتلا به کم خونی، می‌بایست مصرف جگر و گوشت کاهش یابد.
- ۴) گلوبول‌های قرمز خون به دلیل داشتن اتم‌های آهن می‌توانند گاز اکسیژن را از شش گرفته و به یاخته‌های بدن برسانند.

- ۴۰- کدام گزینه نادرست است؟ (نماد عنصرهای هیدروژن و اکسیژن به ترتیب H_۱ و O_۸ است)

- ۱) هر اتم هیدروژن می‌تواند یک یا بیشتر از یک پیوند اشتراکی تشکیل دهد.
- ۲) در هر مولکول آب (H_۲O)، مجموعاً ۴ الکترون به اشتراک گذاشته می‌شود.
- ۳) هنگام ترکیب شدن اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در تشکیل مولکول آب، میان آن‌ها الکترونی داد و ستد نمی‌شود.
- ۴) در مولکول کربن‌دی‌اکسید (CO_۲)، اتم‌های اکسیژن با دو پیوند اشتراکی به اتم کربن متصل می‌شوند.



۱۵ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله /
مثلاً
فصل ۱ و فصل ۲ تا پایان
دایره مثبت
صفحه‌های ۱ تا ۴۱

ریاضی دهم

۴۱- اگر $n(A' - B') + 2n(A'B' - A') = 12$ و $n(A) + n(B) = 26$ باشد، آنگاه حاصل کدام است؟

۲۶ (۴)

۱۶ (۳)

۱۴ (۲)

۱۲ (۱)


۴۲- با توجه به الگوی مقابل در شکل بیستم چه تعداد از دایره‌ها رنگی نیستند؟

۳۸۰ (۱)

۴۰۴ (۲)

۳۸۴ (۳)

۱۹۴ (۴)



۴۳- جملات دنباله ...-۵, ۸, ۳۳, ۷۰,... از حاصل ضرب جملات متناظر یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۳ و یک الگوی خطی با جملة دوم ۱ به دست آمده است. حاصل جمع جمله ۱۰ الگوی خطی و جمله ۲۰ دنباله حسابی کدام است؟

۷۱ (۴)

۸۱ (۳)

۶۹ (۲)

۷۹ (۱)


۴۴- جمله چندام دنباله حسابی ...-۳, ۰, ۳,... با تعداد دایره‌های الگوی زیر در مرحله یازدهم برابر است؟

۲۲ (۱)

۲۳ (۲)

۲۴ (۳)

۲۵ (۴)

۴۵- در یک دنباله هندسی با جملات مثبت، اگر مجموع ۲ جمله اول دنباله، $\frac{2}{3}$ برابر مجموع جملات سوم و چهارم آن باشد، قدرنسبت این دنباله کدام است؟ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱)

۴۶- در یک دنباله حسابی غیر ثابت جملات سوم، هفتم و نهم به ترتیب سه جمله متولی از یک دنباله هندسی هستند. کدام جمله این دنباله حسابی برابر با صفر می‌باشد؟


۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

۴۷- در مثلث ABC شکل زیر، نسبت ارتفاع BH وارد بر ضلع AC به ارتفاع CH' وارد بر ضلع AB کدام است؟

 $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $\sqrt{2}$ (۱) $\sqrt{3}$ (۳)۴۸- اگر $\alpha > 0$ باشد، α در کدام ربع دایره مثبت قرار دارد؟

۱) اول

۲) دوم یا چهارم

۳) چهارم

۴) دوم

۴۹- اگر $\tan x = 4$ باشد، حاصل عبارت $\frac{4\sin x - 5\cos x}{4\cos x + \sin x}$ برابر کدام است؟ $\frac{4}{3}$ (۴)

-1 (۳)

 $\frac{7}{3}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۱)۵۰- در صورتی که زاویه بین خط L با جهت مثبت محور x ها بین 30° تا 60° متغیر بوده و محور x ها را در نقطه‌ای به طول $\sqrt{3}$ قطع کند، عرض از مبدأ این خط کدام نمی‌تواند باشد؟ $-\frac{7}{2}$ (۴)- $\sqrt{7}$ (۳)

-2 (۲)

- $\sqrt{3}$ (۱)




۳۰ دقیقه

فیزیک و اندازه‌گیری /

ویژگی‌های فیزیکی مواد
فصل ۱ و فصل ۲ تا ابتدای
فسارسنجد (بارومتر)
صفحه‌های ۱ تا ۳۷

فیزیک دهم

- ۵۱- نمودار حجم بر حسب جرم دو مایع A و B به صورت شکل زیر است. اگر ۲۰۰ گرم از مایع A را با $\frac{1}{3}$ لیتر از مایع B مخلوط کنیم، چگالی مخلوط چند برابر چگالی مایع A خواهد شد؟ (در اثر اختلاط، تغییر حجم رخ نمی‌دهد)



- (۱) $\frac{65}{44}$
(۲) $\frac{44}{65}$
(۳) $\frac{13}{11}$
(۴) $\frac{13}{15}$

- ۵۲- چه تعداد از عبارات زیر نادرست است؟

- الف) نیروی رانشی مولکول‌های مایع در فواصل نزدیک، باعث می‌شود که مایعات تقریباً تراکم‌ناپذیر باشند.
ب) با تغییر قطر لوله موبین، سطح جیوه در لوله موبین تغییر چندانی نمی‌کند.
پ) کاهش دما باعث کاهش کشش سطحی یک مایع می‌شود.
ت) اثر موبینگی ناشی از تفاوت در نیروهای همچسبی و دگرچسبی بین مولکول‌هاست.

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۴

- ۵۳- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) وجه مشترک فیزیک و معماری دقت است.
ب) در طول زمان مدل اتمی ۳ بار تغییر کرده است.
ج) در هنگام مدل‌سازی باید اثرهای کلی تر را نادیده بگیریم.


- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

- ۵۴- چند مورد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

- الف) فاصله ذرات سازنده مایع بسیار بیشتر از فاصله ذرات سازنده جامد است.
ب) حالت ماده فقط به چگونگی حرکت ذره‌های سازنده ماده بستگی دارد.
پ) دلیل پخش ذرات نمک در آب حرکت نامنظم و کاتورهای ذرات سازنده نمک است.
ت) وقتی مایعی را به آرامی سرد کنیم اغلب جامدات بلوغین تشکیل می‌شوند.

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

- ۵۵- درون یک بشکه استوانه‌ای محتوی آب با سطح مقطع $1/6 \text{m}^2$ ، مکعب مربعی به هر گونه‌ای قرار دارد که سطوح آن با سطح مقطع بشکه موازی است و اختلاف فشار بالا و پایین این مکعب $2 \times 10^3 \text{ Pa}$ است. اگر مکعب را از بشکه خارج کنیم، سطح آب بشکه چقدر پایین



$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$$

- (۱) ۲۰mm (۲) ۵mm (۳) ۲۰cm (۴) ۵cm



۵۶- «چگالی وزنی» به صورت نسبت وزن به حجم یک جسم تعریف می‌شود. چگالی وزنی آب چند پوند-نیرو (lbf) بر فوت مکعب می‌باشد؟
هر پوند-نیرو برابر با نیروی وزن وارد بر جرمی به اندازه یک پوند است، هر پوند (lb) برابر 45.0g و هر فوت برابر 30cm است.

$$\rho = \frac{g}{cm^3}, g = 10 \frac{N}{kg}$$

۲۷ (۴)

۲۷۰ (۳)

۶۰ (۲)

۶ (۱)

۵۷- استوانهای به شعاع مقطع 4cm و ارتفاع 35cm از ماده‌ای با چگالی $\frac{g}{cm^3} 8$ ساخته شده است. اگر داخل استوانه حفره‌ای به حجم

$$(g = 10 \frac{m}{s^2}) 180\text{cm}^3$$

۱۰۰۰۰۰ (۴)

۲۵۰۰۰ (۳)

۲۸۰۰۰ (۲)

۶۲۵۰ (۱)

۵۸- بخشی از یک جسم به جرم 5kg را مطابق شکل زیر درون استوانهای با سطح مقطع 20cm^2 که حاوی گلیسیرین است، قرار می‌دهیم. اگر در طی این عمل، 125 g گرم گلیسیرین از ظرف خارج شود، چند درصد از حجم جسم درون مایع قرار گرفته است؟


$$\rho_{\text{جسم}} = 10 \frac{g}{cm^3}, \rho_{\text{گلیسیرین}} = 1/25 \frac{g}{cm^3}$$

۲۰ (۱)


۴۰ (۲)

۶۰ (۳)

۸۰ (۴)



۵۹- مطابق شکل زیر، ظرف استوانه‌ای A پر از آب است. اگر تمام آب موجود در ظرف استوانه‌ای A را به ظرف B منتقل کنیم، با توجه به ابعاد ظرف‌ها، نیروی وارد شده بر کف ظرف B چند برابر حالت A است؟



۴ (۱)

۱ (۲)

 $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴)

۶۰- شناگری از کنار لبه استخری با زاویه 37° درجه نسبت به افق به درون آب شیرجه می‌زند و با طی کردن مسیری 8 m در همان راستا به نقطه A می‌رسد. اگر مساحت پرده گوش‌های شناگر $2/5\text{cm}^2$ باشد در نقطه A به پرده گوش‌های شناگر از طرف آب چند نیوتون نیرو وارد می‌شود؟

$$(g = 10 \frac{N}{kg}, \cos 37^\circ = 0.8, \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3})$$

۱۲۰ (۴)

۱۲۰×10^۴ (۳)

۱۲ (۲)

۱۲×10^۴ (۱)



فیزیک دهم - آشنا

۶۱- جرم و زمان از ... و کیلوگرم و ثانیه از ... می باشند.

- (۱) یکاهای اصلی - کمیت های فرعی
 (۲) یکاهای اصلی - کمیت های فرعی
 (۳) کمیت های اصلی - یکاهای اصلی
 (۴) کمیت های اصلی - کمیت های فرعی

۶۲- چند مورد از کمیت های زیر در SI جزء کمیت های اصلی هستند؟

- الف - نیرو
 (۱) ۱۰
 (۲) ۲
 (۳) صفر
 (۴) طول
 (۵) ۳

۶۳- کار انجام شده توسط متحرکی $\frac{(دسی\ متر)\times مگاگرم}{(میکرو\ ثانیه)} = \frac{۱}{۵\times ۱۰^۵}$ است. مقدار این کار بر حسب یکاهای SI کدام است؟

- (۱) ۴×۱۰^{۱۰}
 (۲) ۴×۱۰^۵
 (۳) ۴×۱۰^{۱۱}
 (۴) ۴×۱۰^۸

۶۴- با چند آجر کوچک مکعبی شکل به ابعاد ۴cm، ۳dm و ۲۰۰mm، می توان حجم استخری مکعبی به ابعاد $\frac{۱}{۳}$ هکتومتر، ۱۰ دکامتر و ۴×۱۰^{-۶} مگامتر را به طور کامل پر نمود؟

- (۱) ۵×۱۰^۷
 (۲) ۵×۱۰^۶
 (۳) ۵×۱۰^۵
 (۴) ۵×۱۰^۴


۶۵- یک زیردریایی با سرعت ۳۶ فاتوم بر دقیقه در زیر آب حرکت می کند. یک فاتوم به طور دقیق معادل 6 ft است. سرعت این زیردریایی چند متر بر ثانیه است؟ ($1\text{ m} \approx 3\text{ ft}$)

- (۱) ۱
 (۲) ۱/۲
 (۳) ۱/۵
 (۴) ۲

۶۶- سرعت صوت در هوا برابر با $\frac{\text{m}}{\text{s}} = ۳۴۰$ است. این سرعت به صورت نمادگذاری علمی چند میلی متر بر میکرو ثانیه است؟

- (۱) ۳×۱۰^{-۳}
 (۲) ۳×۱۰^{-۱}
 (۳) ۳×۱۰^۳
 (۴) ۳×۱۰^۵

۶۷- یک خطکش مدرج و صفحه نمایش یک کولیس رقمی در شکل نشان داده شده است. دقت کدام وسیله بیشتر و مقدار آن کدام است؟



- (۱) 1 cm
 (۲) 0.1 mm
 (۳) 0.5 cm
 (۴) $10\mu\text{m}$

۶۸- حجم قطعه فلزی ۲۰۰ سانتی متر مکعب و چگالی آن $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = ۷۸۰۰$ می باشد. وزن آن چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰\frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- (۱) ۱۵۶
 (۲) ۷۸۰
 (۳) ۷۸
 (۴) ۱۵۶

۶۹- مکعب همگنی که هر بعد آن 4 سانتی متر است 256 گرم جرم دارد. چگالی آن چند واحد SI است؟

- (۱) ۶۴۰۰
 (۲) ۶۴۰
 (۳) ۴۰۰۰
 (۴) ۱۵۶

۷۰- سطح مقطع یک استوانه همگن 25 سانتی متر مربع و ارتفاع آن 10 سانتی متر و چگالی آن $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = ۷۸۰۰$ می باشد، جرم این استوانه چند گرم است؟

- (۱) ۱۹۵
 (۲) ۱۹۵۰
 (۳) ۹۷۵
 (۴) ۹۷۵



۳۰ دقیقه

شیمی دهم

گیهان زادگاه الفبای هستی

فصل ۱ تا پیان ساختار اتم

صفمههای ۱ تا ۲۷

شیمی دهم

۷۱- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- یک نمونه طبیعی از هیدروژن، مخلوطی از ۷ ایزوتوپ است که ۵ گونه آن پرتوزا است.
- در بین همه ایزوتوپ‌های هیدروژن، کمترین و بیشترین تعداد نوترن برابر ۱ و ۶ است.
- فقط در یکی از ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن نسبت شمار نوترن به پروتون بیش از ۱/۵ است.
- هرچه فراوانی یک ایزوتوپ بیشتر باشد، پایداری آن بیشتر است.

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۷۲- در یک نمونه از عنصر A که شامل ۳ ایزوتوپ با جرم‌های اتمی ۴۸، ۵۰ و ۵۲ amu است، فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ ۲ برابر سبک‌ترین ایزوتوپ است. اختلاف درصد فراوانی ایزوتوپ‌های پایدارتر نمونه کدام است؟ (جرم اتمی میانگین A در این نمونه برابر $\frac{50}{2}$ amu است).

۲۰) ۴

۳) صفر

۵۰) ۲

۴۰) ۱

۷۳- چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟

- غده پروانه‌ای شکل همراه با جذب یون ید، یون تکنسیم را نیز جذب می‌کند.
- فراوان‌ترین عنصر تشکیل دهنده مشتری جرم اتمی میانگین معادل $\frac{1}{0} \text{amu}$ دارد.
- غلب هسته‌هایی که نسبت $\frac{Z}{A} = 0/4$ داشته باشند، ناپایدارند.
- مهبانگ سبب پراکنده شدن ذرات زیراتمی در سراسر کیهان شد.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۷۴- کدام مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟ ($O = 16, N = 14, H = 1 : g/mol^{-1}$)

- ۱۰۰ گرم اوزون (O_3)، بیش از ۶ برابر عدد آوگادرو اتم اکسیژن دارد.
- ۱۷۰ گرم آمونیاک (NH_3) حاوی ۴۰ مول از اتم‌های سازنده‌اش است.
- تعداد اتم‌های اکسیژن در ۲۳ گرم NO_2 ، بیش‌تر از ۳۰ گرم NO است.
- ماده‌ای که به تقریب، $5/55$ مول از آن ۱۰۰ گرم جرم دارد می‌تواند یک ترکیب اکسیژن‌دار باشد.

۷۵- چه تعداد از مقایسه‌های زیر به درستی بیان نشده است؟

- الف) میزان انحراف پرتو هنگام عبور از منشور: بنفش > سبز > آبی
- ب) فاصله میان دو قله متواالی: امواج رادیویی > امواج گاما > اشعه ایکس
- پ) انرژی حمل شده توسط موج: فروسخ > نور نارنجی > ریزموچها
- ت) طول موج: فرابینش > ایکس > گاما

۳) ۴

۲) ۳

۱) ۲

۱) صفر

۷۶- تعداد اتم‌های در ۵ گرم $CaCO_3$ ، $2/5$ برابر تعداد اتم‌های اکسیژن در چند گرم H_3PO_4 است؟

$$(Ca = 40, C = 12, O = 16, P = 31, H = 1 : g/mol^{-1})$$

۱۲/۲۵) ۴

۶/۱۲۵) ۳

۲/۴۵) ۲

۴۹) ۱

۷۷- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- آ) از لامپ زنون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشه‌های نورانی سرفام استفاده می‌شود.
- ب) موقعیت (گروه اول و دوره سوم) در جدول تناوبی مربوط به عنصری است که رنگ شعله آن سرخ است.
- پ) رنگ شعله ترکیب مس (II) سولفات نسبت به لیتیم طول موج بلندتری دارد.
- ت) همه خطوط طیف نشری خطی عنصرها در ناحیه مرئی قرار دارد.

۴) ۴


۳) ۳

۲) ۲

۱) صفر

۷۸- چند مورد درست است؟

- بور برای توجیه طیف نشری خطی اتم هیدروژن مدل کوانتوسی را پیشنهاد کرد.
- دانشمندان برای بررسی طیف نشری خطی اتم‌هایی با بیش از یک الکترون مدل کوانتوسی را پیشنهاد کردند.
- در مدل کوانتوسی انرژی مشابه بالا رفتن از سطح شیبدار مبادله می‌شود.
- هر نوار زنگی در طیف نشری خطی هر عنصر، پرتوهای بازنشر شده در هنگام بازگشت الکترون‌ها را از لایه‌های بالاتر به لایه‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد.



۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر

۷۹- با توجه به شکل رویه‌رو، کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) مدل لایه‌ای اتم را نشان می‌دهد و الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابد.
- ۲) نیاز بور به کمک این مدل توانست طیف نشری هیدروژن را به خوبی توضیح دهد.
- ۳) الکترون هنگام انتقال از یک لایه به لایه دیگر، انرژی را به صورت پیمانه‌ای یا بسته‌های معین جذب یا نشر می‌کند.
- ۴) طول موج نور نشر شده در جایه‌جایی الکترونی b از a کوتاه‌تر است.

- ۸۰- در اتم هیدروژن هرچه اختلاف انرژی لایه‌های متواالی ... باید سطح انرژی لایه‌ها ... می‌شود و می‌توان گفت انرژی حاصل از انتقال الکترون از لایه دوم به اول ... از انتقال الکترون از لایه سوم به دوم است.

۲) کاهش - کمتر - بیشتر

۱) افزایش - کمتر - کمتر

۴) کاهش - بیشتر - بیشتر

۳) افزایش - بیشتر - کمتر

شیمی دهم - آشنا

۸۱- با مقایسه درصد فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری می‌توان دریافت که:

- ۱) گازهای نجیب بیشتری در کره زمین وجود دارد.
 - ۲) عنصرهایی مانند هلیم، نیتروژن، کربن، اکسیژن نسبت به عنصر هیدروژن، درصد کمتری از سیاره مشتری را تشکیل می‌دهند.
 - ۳) در هر دو سیاره، عنصرهای فلزی وجود دارد اما درصد این عنصرها در سیاره مشتری، بیشتر است.
 - ۴) به جز عنصر آهن، بقیه عنصرها کمتر از ۵۰ درصد فراوانی در کره زمین دارند.
- ۸۲- نسبت تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن به تعداد ایزوتوپ‌های پرتوزای آن، چند برابر نسبت تعداد نوترون‌ها به تعداد پروتون‌ها در سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن است؟

۳
۱۵۵
۶

۰ / ۳

۰ / ۴

- ۸۳- حدود ۷۸٪ عناصر شناخته شده می‌باشند و نخستین عنصر ساخته شده دست بشر است که در کاربرد دارد.

۲) طبیعی - اورانیم - نیروگاه‌ها

۱) مصنوعی - اورانیم - نیروگاه‌ها

۴) طبیعی - تکنسیم - پزشکی

۳) مصنوعی - تکنسیم - پزشکی

- ۸۴- در کدامیک از گزینه‌های داده شده، نام یا نماد شیمیایی عنصرهای موجود به درستی بیان نشده است؟

Rb	Rn	Ra
روبیدیم	رادیم	رادون

Se	Sc	Sr
سلنیم	اسکاندیم	استرانسیم

Sn	Si	Sb
قلع	سیلیسیم	آنیتیموان

N	O	F
نیتروژن	اکسیژن	فلوئور



۸۵- عنصر A دارای ۳ ایزوتوپ است. در ایزوتوپ سنگین آن با عدد جرمی ۴۴، اختلاف تعداد نوترون‌ها و پروتون‌های آن برابر ۴ است، ایزوتوپ متوسط آن ۲ نوترون بیشتر از تعداد پروتون‌هایش دارد و ایزوتوپ سبک آن که درصد فراوانی آن برابر ۶۰ درصد است، تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های برابری دارد. به ازای هر ایزوتوپ متوسط در مخلوط این عنصر، چند ایزوتوپ سبک وجود دارد؟ (جرم اتمی میانگین عنصر A برابر 41amu است.)


۴ (۴)

۲ (۳)

۶ (۲)

۳ (۱)

- ۸۶- کدام موارد از مطالب زیر نادرست‌اند؟ (کامل‌ترین گزینه را انتخاب کنید.)
- (آ) تعداد خطوط طیف نشری خطی در محدوده مرئی، در اتم He بیش‌تر از اتم H است.
- (ب) در طیف نشری خطی عنصر لیتیم همانند عنصر هیدروژن، ۴ خط در محدوده مرئی مشاهده می‌شود.
- (پ) همه نمک‌ها شعله رنگی دارند که رنگ نشرشده، فقط باریکه بسیار کوتاهی از گستره طیف مرئی را در بر می‌گیرد.
- (ت) هرچه عدد اتمی یک عنصر بزرگ‌تر باشد، در طیف نشری خطی آن خطوط مرئی بیش‌تری مشاهده می‌شود.



۴ (۴) پ ، ت و ث

۳ (۳) پ و ت

۶ (۲) آ ، پ و ب

- ۸۷- پاسخ درست به پرسش‌های زیر، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟
- (الف) در گستره مرئی طیف نشری خطی عنصر هیدروژن، وجود چند خط تایید شده است؟
- (ب) مدل بور برای توجیه طیف نشری خطی چه عنصر یا عنصرهایی مناسب بود؟
- (پ) مناسب‌ترین شیوه از دست دادن انرژی برای یک الکترون چیست؟

(۱) پنج - فقط عنصر هیدروژن - نشر نور

(۲) چهار - فقط عنصر هیدروژن - آزادسازی گرما

(۳) چهار - همه عناصر - آزادسازی گرما

(۴) چهار - هر فلزی طیف نشری خطی منحصر به فردی دارد.

(۵) انرژی نیز همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی پیوسته یا کوانتومی است.

(۶) نیلز بور با در نظر گرفتن این که الکترون در اتم هیدروژن انرژی معینی دارد، مدلی کاربردی برای عنصر هیدروژن و برخی عناصر دیگر ارائه کرد.

- ۸۸- در جدول زیر اطلاعات مربوط به ۴ نوع رنگ متفاوت داده شده است. با توجه به آن، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورهای رنگی جدول، به درستی مقایسه شده است؟
- | رنگ | ماده |
|-----|---|
| A | رنگ شعله سدیم کلرید |
| B | رنگ تابلوهای تبلیغاتی دارای لامپ نفون |
| C | رنگ شعله مس (II) سولفات |
| D | رنگ نور مرئی با بیش‌ترین انحراف در رنگ‌های رنگین کمان |

D > A > C > B (۴)

D > C > A > B (۳)

B > C > A > D (۲)

B > A > C > D (۱)

- ۹۰- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟

(الف) میزان انرژی نور آبی در طیف پیوسته نور خورشید، از نور قرمز بیشتر است.

(ب) نور خورشید تنها شامل گستره مرئی طیف پرتوهای الکترومغناطیس می‌شود.

(پ) طول موج پرتوهایی به رنگ شعله سوختن ترکیب مس (II) کلرید، کوتاه‌تر از پرتوهایی به رنگ شعله سوختن سدیم سولفات است.

(ت) در یک محیط، طول موج نور نارنجی از طول موج نور نیلی، بلندتر و انرژی آن، کمتر است.

۴ (۴)

۲ (۳)

۶ (۲)

۱ (۱)



دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۲ شهریور

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه


گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حميد لنجانزاده اصفهانی
ویراستار	حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراح	حميد اصفهانی، نیلوفر امینی، حمید گنجی، مرجان جهان بانی، فاطمه راسخ، فرزاد شیرمحمدی، سجاد محمدنژاد
حروف چینی و صفحه آرایی	مصطفی روحانیان
ناظر چاپ	حميد عباسی

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.

مدت زمان پاسخگویی
۳۰ دقیقه

استعداد تحلیلی



- ۲۵۱ - هدف سازنده تصویر زیر کدام است؟

۱) ایجاب رابطه مستقیم بین موقعیت ظاهری و احساسات

۲) سلب لزوم وجود رابطه مستقیم بین موقعیت ظاهری و احساسات

۳) اثبات محدودیت خواسته‌ها و توانایی‌ها

۴) اثبات نامحدود بودن خواسته‌ها و توانایی‌ها

- ۲۵۲ - تصویر زیر کدام رفتار را به یاد می‌آورد؟

۱) نفاق

۲) پرخاش

۳) عزلت

۴) غرور



* متن زیر از کتاب «قدرت بی‌قدرتان» از «نشر نو» برگزیده شده است. بر اساس استدلال‌های متن، به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

ایدئولوژی که تفسیر ساختار قدرت از واقعیت است، همیشه در نهایت تحت الشاعع منافع ساختار قدرت قرار می‌گیرد. بنابراین، در دل ایدئولوژی گرایشی طبیعی برای جدایکردن خودش از واقعیت و خلق جهانی از ظواهر و تبدیل‌شدن به یک آینین وجود دارد. در جوامعی که رقبابتی عمومی برای کسب قدرت وجود دارد و در نتیجه آن، قدرت تحت نظارت عمومی است، طبیعتاً نحوه مشروعیت‌بخشیدن ایدئولوژیک قدرت به خودش هم تحت نظارت عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین در چنین شرایطی همیشه عوامل تصحیح‌کننده معینی وجود دارند که به نحو مؤثری نمی‌گذارند ایدئولوژی به طور کلی دست از واقعیت بشوید. اما در نظام‌های توتالیتر خبری از این عوامل تصحیح‌کننده نیست، و در نتیجه چیزی نیست که بتواند جلوگیری هرچه دورتر شدن ایدئولوژی از واقعیت و تبدیل‌شدن تدریجی‌اش به آن چیزی شود که در نظام‌های پساتوتالیتر می‌بینیم: جهانی از ظواهر، آینین صرف، زبانی صوری و تشریفاتی که هیچ ربط معنایی به واقعیت ندارد و بدل به مجموعه‌ای از علائم آینین شده است که شبه‌واقعیت را به جای واقعیت می‌نشاند.

- ۲۵۳ - با استدلال‌های متن بالا، کدام واژه‌ها عبارات زیر را بهتر کامل می‌کند؟

الف) امکان رسیدن به قدرت برای عموم مردم... استحاله ایدئولوژی به یک آینین است.

ب) قدرتی که تحت نظارت عمومی باشد، برای استحاله ایدئولوژی به سود خود، توانایی... دارد.

۱) مانع - بیشتری

۲) تسهیل گر - کمتری

۳) تسهیل گر - بیشتری

-۲۵۴- فارغ از صحت، کدام گزینه استدلالی در مخالفت با گفته‌های متن بالا نیست؟

- (۱) ایدئولوژی‌ها از آغاز نیز اموری صوری و زبانی و دور از واقعیت بوده‌اند و تغییرات آنان به مرور زمان، یک فرایند طبیعی و تدریجی در حیات بشری است.
- (۲) ایدئولوژی که از جهان واقع جدا شده باشد، امری ظاهری و ثابت و گسترش منافع صاحبان قدرت، از کاربردهای افزوده‌شده آن است.
- (۳) وجود عوامل تصحیح‌کننده در یک جامعه، به معنای منحصر نشدن ایدئولوژی به یک آیین نیست، بلکه صرفاً ماهیت آیین هاست که متفاوت است.
- (۴) باورهای انسان‌ها به امور متفاوت است، بنابراین واقعیت منحصر به‌فردی وجود ندارد که معیار قضاوت درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی باشد.

-۲۵۵- به کدام ویژگی جالینوس طبیب در متن زیر اشاره شده است؟

یکی را از مشاهیر شهر اسکندریه به عهد جالینوس سر دست درد گرفت و بی قرار شد و هیچ نیارامید. جالینوس را خبر کردند. مرهم فرستاد که بر سر کتف او نهند. همچنان کردند که جالینوس فرموده بود. در حال درد بنشست و بیمار تندرست گشت و اطبا عجب بماندند. پس از جالینوس پرسیدند که: «این چه معالجه بود که کردی؟» گفت: «آن عصب که بر سر دست درد می‌کرد مخرج او از سر کتف است. من اصل را معالجه کردم فرع به شد.»

- | | |
|----------------|----------|
| (۱) رقیق‌الخلق | (۲) مؤمن |
| (۳) جید‌الحدس | (۴) شریف |

* در دو پرسش بعدی، تعیین کنید پس از مرتب‌کردن عبارت‌ها برای ساخت یک متن درست، کدام گزینه در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

-۲۵۶-

الف) بخش دوم کتاب درباره تاریخ کرمان است و مؤلف ضمن شرح برخی رویدادهای سلطنت، به اهتمام او در امور وقفی پرداخته است.

ب) «تاریخ شاهی» کتابی به پارسی درباره دوران حکومت سلسله قراختائیان کرمان در سده هفتم است.

ج) ناصرالدین منشی، مؤلف تاریخ شاهی را خواجه شهاب‌الدین ابوسعید معرفی کرده‌است که آن را در دو بخش تنظیم کرده است.

د) هریک از بخش‌های کتاب فصول متعددی دارد، بخش نخست از سیاست مدن، اخلاق و خصال پادشاهان و وزیران و ... است.

- | | |
|---------|-------|
| (۱) الف | (۲) ب |
| (۳) ج | (۴) د |

-۲۵۷-

الف) نخست از پیکر کشته در آن یم / نبیند هیچ غیر از نوک پرچم

ب) دلیل اولینش گردی آب / به دریا اندر آ، این نکته دریاب

ج) زمین گرد است مانند گلوله / نیوتون کرده واضح این مقوله

د) کسی کو بیندی یم را به ساحل / شود از دور با کشته مقابله

- | | |
|---------|-------|
| (۱) الف | (۲) ب |
| (۳) ج | (۴) د |

- ۲۵۸- برای پیدا کردن رقم یکان عدد A ، عدد حاصل از عملیات زیر، کدام داده(ها) کافی است؟

$$A = 11 + 12 + 13 + 14 + \dots + n$$

الف) n عددی دورقمی و مضرب ۷ است.

ب) باقی‌مانده تقسیم n بر عدد ۱۳، عدد ۲ است.

۱) داده «الف» کافی است. به داده «ب» احتیاجی نداریم.

۲) داده «ب» کافی است. به داده «الف» احتیاجی نداریم.

۳) هیچ‌یک از دو داده به تنها یکی کافی نیست اما اگر هر دو داده باشد، به پاسخ می‌رسیم.

۴) با وجود هر دو داده نیز به پاسخ نمی‌رسیم.

- ۲۵۹- شخصی ادعا می‌کند با محاسبات ریاضی بدون آن که سنّ شما را بپرسد، آن را به درستی حدس می‌زند. برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید.

الف) عدد سنّ خود را - بدون آن که به ما بگویید - با عدد چهار جمع کنید.

ب) عدد حاصل را در عدد پنج ضرب و سپس n واحد به آن اضافه کنید.

ج) از دو برابر عدد حاصل، شصت و چهار واحد کم کنید و صفر را از یکان بردارید.

د) عدد حاصل، سنّ شماست.

برای آن که محاسبات بالا همواره درست باشد، به جای n باید چه عددی قرار داد؟

۸ (۲)

۴ (۱)

۱۶ (۴)

۱۲ (۳)

- ۲۶۰- عدد حاصل از تقاضل عددی طبیعی از مربع خودش ...

۲) حتماً فرد است.

۱) حتماً زوج است.

۴) ممکن است عددی زوج یا عددی فرد، اوّل یا غیر اوّل باشد.

۳) قطعاً عددی اوّل نیست.

* در دو پرسش بعدی بر اساس داده‌های هر سؤال، اگر مقدار «الف» بزرگ‌تر است گزینه «۱»، اگر مقدار «ب» بزرگ‌تر است گزینه «۲»، اگر مقادیر

«الف» و «ب» با هم مساوی است گزینه «۳» و اگر با اطلاعات داده‌شده نسبت این دو معلوم نیست، گزینه «۴» را انتخاب کنید.

- ۲۶۱- در یک انتخابات فرضی، آقای «الف» با ۳۵٪ و آقای «ب» با ۳۰٪ آرا به ترتیب اوّل و دوم شدند ولی چون هیچ‌یک نتوانستند آرای اکثریت (بالای ۵۰٪) را

کسب کنند، انتخابات بین این دو تن به دور دوم کشیده شد. در دور دوم، ۱۰٪ از واجدان شرایط رأی دادن که در انتخابات رأی نداده بودند، به آقای

«الف» و ۷۰٪ از ایشان به آقای «ب» رأی دادند. تعداد رأی آقایان «الف» و «ب» در دور دوم انتخابات ...

۲۶۲ - در یک فضای آزمایشگاهی اثبات شده است با نابود شدن هر واحد از «الف»، سه واحد به «ب» اضافه می‌شود. اگر فضا را به گونه‌ای تنظیم کنیم که در

آغاز ۱۰۰۰ واحد «الف» و ۵۰۰ واحد «ب» داشته باشیم و در هر ۳ ثانیه، ۲ واحد «الف» نابود شود، سه دقیقه پس از شروع فرایند ...

۲۶۳ - اگر مهره‌هایی را که داریم به بسته‌های ۵ تایی یا ۱۱ تایی تقسیم کنیم، ۴ مهره اضافه می‌ماند. اگر مهره‌ها را به بسته‌های ۷ تایی تقسیم کنیم، ۲ مهره اضافه می‌ماند. می‌دانیم عدد تعداد مهره‌هایی که داریم، کمترین عدد ممکن است که شرایط بالا را دارد. اگر مهره‌ها را هشت تا هشت تا تقسیم کنیم، چند مهره اضافه می‌ماند؟

۲ (۲)

۱ (۱)

۶ (۴)

۳ (۳)

۲۶۴ - از معادله زیر که ضرب یک عدد سه رقمی در یک عدد دورقمری است، حاصل $\square + \bigcirc \times \Delta$ کدام است؟

$$\begin{array}{r} \bigcirc \Delta \quad \square \\ \times \quad \bigcirc \quad \square \\ \hline \bigcirc \square \square \quad 4 \end{array}$$

۱ (۲)

۱) صفر

۳ (۴)

۲ (۳)

۲۶۵ - مژگان متولد ۲۶ خرداد ۱۳۲۰ هجری خورشیدی است. سن او را طبق جدول زیر با M نشان می‌دهیم.

۱۳۲۰ خرداد ۲۶	۱۳۲۱ خرداد ۲۶	۱۳۲۲ خرداد ۲۶
M = ۰	۱	۲

روزی که $M = 21$ شد، نخستین فرزند مژگان، «رها» به دنیا آمد. دقیقاً دو سال بعد، فرزند دوم مژگان «دنیا» نیز به دنیا آمد. سن رها و دنیا را نیز

مطابق با جدول بالا، با R و D نشان می‌دهیم. تعیین کنید از زمانی که D عددی در دسته اعداد طبیعی است، تا پایان سده چهاردهم میلادی،

چند بار حاصل تقسیم $\frac{M}{R+D}$ عددی طبیعی بوده است؟






۲ (۲)

۱ (۱)






۴ (۴)

۳ (۳)


۲۶۶ - کدام گزینه جزئی از شکل زیر نیست؟




۲۶۷ - شکل زیر از تکرار بی دوران کدام گزینه حاصل شده است؟




۲۶۸ - در کدگذاری زیر، گزینه جایگزین علامت سؤال کدام است؟




ABC



BAD



DBC



?


ACD (۲)

DAB (۱)

BDC (۴)

CAB (۳)

۲۶۹ - چند مستطیل در شکل زیر هست که حداقل بخشی از ضلعهای آن، بر حداقل بخشی از مثلث رنگی شکل مماس باشد؟




۱۲ (۱)

۱۳ (۲)

۱۴ (۳)

۱۵ (۴)

۲۷۰ - چند مستطیل در شکل زیر هست؟



۲۴ (۱)

۲۸ (۲)

۳۲ (۳)

۳۶ (۴)

خودارزیابی توجه و تمرکز

آزمون ۲ شهریور ۱۴۰۳ Shifting attention

دانش آموز عزیزا

توجه و تمرکز برای یادگیری، مطالعه و دستیابی به موفقیت تحصیلی بسیار مهم است. این مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا اطلاعات را دریافت کنند، روی کارها و تکالیف متوجه باشند و به طور موثر زمان و منابع خود را مدیریت کنند. بهبود توجه و تمرکز می‌تواند منجر به درک بهتر مطالب، نمرات بالاتر و به طور کلی تجربه یادگیری موثرتر شود. برای کمک به ارزیابی ظرفیت‌های توجه خود، از شما دعوت می‌کنیم با سوالات زیر خود را ارزیابی کنید. مهم است که به هر سؤال صادقانه پاسخ دهید. با درک نقاط قوت و زمینه‌های پیشرفت، می‌توانید برای ارتقای عملکرد تحصیلی خود قدم ببردید.

سوالات را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در پاسخبرگ علامت بزنید. دقت داشته باشید که سوالات از شماره ۲۷۱ شروع شده است.

۲۷۱. من می‌توانم بدون از دست دادن تمرکز و به سرعت از یک کار به کار دیگر ، توجهم را تغییر دهم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۲. من می‌توانم در طول مدرسه به راحتی توجهم را از یک موضوع به موضوع دیگر تغییر دهم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۳. وقتی یک فعالیت جدید شروع می‌شود، من می‌توانم به سرعت توجه خود را دوباره متوجه کنم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۴. من می‌توانم بدون از دست دادن تمرکز، خود را با تغییرات برنامه درسی هماهنگ کنم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۵. من می‌توانم در طول بحث‌های گروهی توجهم را از یک موضوع به موضوع دیگر تغییر دهم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۶. وقتی معلم موضع تدریس را تغییر می‌دهد، من به سرعت می‌توانم تمرکزم را تغییر دهم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۷. من می‌توانم بین انواع مختلف مسائل و سوالات بدون از دست دادن تمرکز، جابجا شوم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۸. من به راحتی می‌توانم از یک کلاس به کلاس درس جدید دیگر بروم و متوجه باشم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۷۹. من می‌توانم تمرکزم را از یک پروژه به پروژه دیگر بدون مشکل تغییر دهم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه

۲۸۰. وقتی از من خواسته می‌شود تکلیف جدیدی را انجام دهم، می‌توانم به سرعت روی آن تکلیف تمرکز کنم.

۱. هرگز ۲. به ندرت ۳. گاهی اوقات ۴. همیشه