

داخلی	
بیمار آقای ۷۰ ساله با پان سیتوپنی تحت بررسی است، در صورتیکه RDW نرمال داشته باشد در گزارش لام خون محیطی کدام یافته کمتر گزارش می شود؟	۱
الف	گلبول قرمز قطره اشکی
ب	آنیزوسیتوز
ج	پویکیلوسیتوز
د	پلاکت کاهش یافته

داخلی	
بیمار متعاقب عفونت و مصرف کوتریموکسازول دچار هموگلوبینوری به صورت ادرار تیره می شود، در بررسی آنمی با LDH بالا و کاهش هاپتوگلوبین دارد. در لام خون محیطی گلبول قرمز گاز زده دیده می شود. کدام تشخیص مطرح است؟	۲
الف	کمبود G6PD
ب	همولیز اتوایمیون آنتی بادی گرم
ج	همولیز اتوایمیون آنتی بادی سرد
د	اسفروسیتوز ارثی

داخلی	
مهمترین عامل کاهش بقاء در بیماران با تشخیص MDS، کدام مورد زیر است؟	۳
الف	درصد بالای بلاست مغز استخوان
ب	شدت آنمی
ج	درصد بالای رینگ سیدروپلاست مغز استخوان
د	5q- در بررسی ژنتیک

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۴	در لوکمی حاد میلوئیدی کدام اختلال ژنتیکی بهترین شانس درمان کامل بدون پیوند مغز استخوان را دارد؟
الف	بدون اختلال ژنتیکی
ب	T: 9-22
ج	T: 15-17
د	T: 8-21

داخلی	
۵	در بیماری که نیاز به تزریق خون دارد ، تمام تست های زیر جزو بررسی اولیه قبل از تزریق خون است به جز ؟
الف	تعیین گروه خونی ABO-RH
ب	تست اسکرینگ آلوانتی بادی
ج	تعیین گروه های خونی فرعی
د	تست کراس مچ

داخلی	
۶	مهمترین اقدام برای کاهش عارضه تب دار غیرهمولیتیک در تزریق خون کدام است؟
الف	تجویز آنتی هیستامین و تب بر قبل از تزریق خون
ب	تزریق خون کامل
ج	تزریق خون شسته شده
د	تزریق خون کم لکوسیت

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۷	آقای ۴۶ ساله سیگاری با شکایت وجود رگه های خون در خلط از چهار روز پیش و تنگی نفس فعالیتی مراجعه کرده است. وضعیت همودینامیک اولیه طبیعی بوده و میزان اشباع اکسیژن شریانی در هوای اتاق ۹۶٪ می باشد. در سمع ریه ها نکته غیرطبیعی بارز شنیده نمی شود. تمام موارد زیر را برای بیمار درخواست می کنید، <u>بجز</u> :
الف	سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست
ب	درخواست CBC و پروفایل انعقادی
ج	درخواست آزمایش ادرار
د	درخواست سطح سرمی آنزیم های کبدی

داخلی	
۸	خانم ۳۶ ساله با شکایت سرفه از حدود ۴ ماه پیش مراجعه می کند. سمع ریه ها طبیعی بوده و در بررسی های تصویربرداری نکته غیر طبیعی مشاهده نشده است. تست اسپیرومتری بیمار طبیعی بوده و در تست متاکولین افزایش پاسخدهی گزارش نشد. میزان ائووزینوفیل خلط بیمار ۵٪ بوده و در هوای بازدمی میزان بالای نیتریک اکساید گزارش شد. کدام درمان زیر برای بیمار ارجح است؟
الف	استروئید استنشاقی
ب	گاباپنتین خوراکی
ج	گفتاردرمانی
د	لیدوکائین استنشاقی

داخلی	
۹	در جریان ترومبوآمبولی ریه تمام موارد زیر در سیستم تنفسی بیمار روی میدهد، <u>بجز</u> :
الف	افزایش فضای مرده فیزیولوژیک
ب	افزایش فضای مرده آناتومیک
ج	افزایش مقاومت مجاری هوایی
د	افزایش کمپلیانس ریه

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۱۰	برای خانم ۴۲ ساله که به علت کانسر تخمدان تحت عمل جراحی قرار گرفته است، کدامیک از موارد زیر برای پیشگیری از حوادث ترومبوامبولی وریدی در این بیمار ارجح است؟
الف	تجویز روزانه ۴۰ میلی گرم انوکسپارین بمدت یک ماه
ب	تجویز هپارین زیرجلدی به مدت سه روز
ج	استفاده از فونداپارینوکس روزانه به مدت ۷ روز
د	تجویز همزمان ریواروکسابان و آسپرین به مدت یک هفته

داخلی	
۱۱	تمام موارد زیر می توانند از نشانه های بیماری پیشرفته در یک بیمار COPD باشند، <u>بجز</u> :
الف	Hoover sign
ب	Clubbing
ج	Cor pulmonale
د	Cachexia

داخلی	
۱۲	مرد ۲۵ ساله با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است. در معاینه فشارخون سیستیمیک 85/50 mmHg دارد. آزمایش گاز خون بیمار به شرح زیر است:
	<p>PH: 7.2 HCO₃: 10 meq/dl PCO₂: 24 mmHg Na: 140 meq/dl Cl: 96 meq/dl K: 3 meq/dl</p>
	توصیف این گاز خون کدام است؟
الف	اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا
ب	اسیدوز متابولیک + اسیدوز تنفسی
ج	اسیدوز متابولیک + آلکالوز تنفسی
د	اسیدوز تنفسی

داخلی	
۱۳	<p>آقای ۳۵ ساله بدنساز با شکایت تیره شدن ادرار و کاهش حجم آن به اورژانس مراجعه کرده است. در حال حاضر فشارخون سیستمیک 130/80 mmHg می باشد. از درد بدن شاکی است. آزمایش ها به این صورت است:</p> <p>U/A: SG: 1.008 RBC: 0-1 Blood: 3+ WBC: 0-1 Cr: 4 mg/dl Urea: 65 mg/dl</p> <p>کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟</p>
الف	آسیب عروق کلیه
ب	رابدومیولیز
ج	گلوMERULONFRIT
د	نفریت توبولوانترسیشیال

داخلی	
۱۴	<p>کدام مورد در گلوMERULONFRIT ممبرانوس اولیه تشخیصی است؟</p>
الف	HBS Ag +
ب	کاهش C3
ج	Anti PL A2 R Ab
د	Anti GBM

داخلی	
۱۵	<p>خانم ۲۰ ساله با آزمایشات زیر مراجعه می کند. در معاینه دارد. آزمایشات بیمار به شرح زیر است:</p> <p>Blood pressure: 110/ 70 و PR: 70 BUN: 18 mg/dl Cr: 0.9 mg/dl Na: 125 mmol/l K: 4.2 meq/l Plasma Osmolality: 290 m osmol/kg</p> <p>کدام تشخیص برای وی بیشتر مطرح است؟</p>
الف	سندرم ترشح نابجای آنتی دیورتیک (SIADH)
ب	هیپوتیروئیدیسم
ج	هایپرلیپیدمی
د	کمبود آلدوسترون

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۱۶	تمام عوامل زیر از علل شیفت پتاسیم به خارج سلول هستند بجز؟
الف	اسیدوز متابولیک
ب	بتابلاکر
ج	هایپر گلیسمی
د	آلفابلاکر

داخلی	
۱۷	خانم ۴۰ ساله به علت درد اپی گاستر و تست هلیکوباکتر پیلوری مثبت تحت درمان با پنتوپرازول، سایمتیدین و آموکسی سیلین و سوکرالفیت قرار گرفته است. کدامیک از داروهای زیر میتواند باعث افزایش کراتینین بیمار از طریق کاهش ترشح آن از توبول کلیه شود؟
الف	آموکسی سیلین
ب	پنتوپرازول
ج	سایمتیدین
د	سوکرال فیت

داخلی	
۱۸	کدامیک از عوارض میکروواسکولار دیابت محسوب می شود؟
الف	گزگز و مورمور شدن اندام تحتانی
ب	هماچوری
ج	کاهش خونرسانی به پاها
د	گلوکوم

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۱۹	فرد مبتلا به دیابت نوع I از ۱۰ سال قبل، از دو هفته قبل تزریق انسولین را متوقف کرده است. احتمال بروز کدام عارضه کمتر است؟
الف	کمای هیپراسمولار
ب	DKA
ج	شیلومیکرونی
د	دهیدره شدن

داخلی	
۲۰	خانم ۲۸ ساله به دلیل نازایی ارجاع شده است. در معاینه تیروئید قوام Firm سایز ۳۰ گرم لمس می شود. گلاکتوره ندارد. در آزمایشات : TSH > 100 IU/l (0.4-4) T4: 1 µg/dl (4.5-12) Prolactin: 60 ng/ml (10-25) دارد. اقدام بعدی چیست؟
الف	MRI هیپوفیز
ب	سونوگرافی تیروئید
ج	درمان با لووتیروکسین
د	درمان با کابریولین

داخلی	
۲۱	بالاترین سطح پرولاکتین با مصرف کدام دارو دیده می شود؟
الف	فلوکستین
ب	ریسپریدون
ج	وراپامیل
د	متیل دوپا

داخلي	
<p>آقای ۴۰ ساله به علت سنگ های کلیوی مکرر ارزیابی شده است. در آزمایشات:</p> <p>Ca: 13 mg/dl (8.5-10.5) P: 2 mg/dl (2.5-4.5) Alb: 4 g/l Urea: 20 mg/dl Cr: 0.8 mg/dl iPTH: 55 (5-55 pg/ml)</p> <p>کدام تشخیص مطرح است؟</p>	۲۲
الف	هیپرکلسمی ناشی از بدخیمی
ب	مسمومیت با ویتامین D
ج	هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
د	هیپرکلسمی هیپوکلسیوریک فامیلیال

داخلي	
<p>خانم ۴۸ ساله ای با دیابت اخیر، هیپرتانسیون و افزایش وزن مراجعه کرده است. در معاینه چاقی شکمی و استریاهای ارغوانی شکم مشهود است. در آزمایشات میزان کورتیزول آزاد ادرار ۲۴ ساعته (UFC) در دو نوبت، ۳ برابر نرمال است و میزان ACTH بسیار پایین می باشد. اقدام بعدی کدام است؟</p>	۲۳
الف	ام آر آی هیپوفیز
ب	انجام سی تی اسکن آدرنال
ج	انجام تست دگزامتازون با دوز بالا
د	انجام سی تی اسکن قفسه سینه

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
بیمار خانم ۲۵ ساله با سابقه فامیلی بیماری تیروئید جهت بررسی مراجعه کرده است. به جز سردرد خفیف شکایت خاصی ندارد. در معاینه بزرگی مختصر تیروئید دارد. آزمایشات به شرح زیر است: T4: 7.8 µg/dl (5-11) TSH: 9.8 (0.4-4)	۲۴
اقدام تشخیصی بعدی کدام است؟	
الف	اندازه گیری T3
ب	سونوگرافی تیروئید
ج	اندازه گیری TPO Ab
د	MRI هیپوفیز

داخلی	
در درمان بیماران (Constipation dominant) IBS-C ملین Choice کدام است؟	۲۵
الف	Osmatic
ب	Pro kinetic
ج	Bulk agent
د	تفاوتی ندارد

داخلی	
پایه اصلی تشخیصی در سندرم روده تحریک پذیر کدام است؟	۲۶
الف	درد راجعه شکمی
ب	تغییر در فرم اجابت مزاج
ج	بهبود درد یا دفع گاز یا مدفوع
د	احساس ناراحتی راجعه در شکم

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۲۷	در بیمار با درد شکم و زردی از یک هفته قبل در آزمایشات: Bili D: 2.3 ، Bili T: 4.5 ، ALP: 1260 ، ALT: 110 ، AST: 87 اولین اقدام تشخیصی کدام است؟
الف	MRCP
ب	ERCP
ج	سونوگرافی شکم
د	کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

داخلی	
۲۸	آقای ۵۵ ساله با کاهش وزن و تورم شکم و آسیت مراجعه کرده است. جواب پاراسنتز مایع آسیت به قرار زیر است: Alb: 2.8 g/dl Protein Total: 4.5 g/dl ارزیابی همزمان پلاسما: Alb: 3.5 g/dl اقدام تشخیصی بعدی کدام است؟
الف	HBS Ag HCV Ab
ب	لاپاراسکوپي تشخیصی
ج	سونوگرافی داپلر پورت
د	آزمایش ادرار از نظر پروتئینوری

داخلی	
۲۹	تمام موارد زیر جزء عوارض داروهای PPI می باشد <u>بجز</u> :
الف	Common acquired pneumonia
ب	افزایش عفونت با کستریدیوم دیفیسیل
ج	افزایش hip fracture
د	کاهش جذب مواد غذایی

داخلی	
۳۰	در درمان IBS، اثرات مفید کدام دارو، حتی پس از قطع آن باقی می ماند؟
الف	ریفاکسیمین
ب	مترونیدازول
ج	تتراسیکلین
د	هیچکدام

داخلی	
۳۱	بیمار آقای ۵۰ ساله غیرسیگاری از یک هفته قبل دچار سرفه پروداکتیو و تنگی نفس فعالیتی مرحله ۲ شده است و از روز گذشته دفع خلط خونی در دو نوبت و در هر نوبت به میزان تقریبی ۳۰ سی سی را ذکر می کند تمام اقدامات زیر را در مرحله اول جهت بیمار درخواست می کنیم بجز :
الف	برونکوسکوپی
ب	آنالیز ادرار و کراتینین خون
ج	گرافی قفسه سینه
د	CBC

داخلی	
۳۲	آقای ۴۶ ساله سیگاری با سابقه آمفیژم ریوی با تنگی نفس ناگهانی مراجعه کرده است و شدیداً مضطرب و تاکیکارد می باشد در معاینه آمفیژم زیرجلدی قابل لمس است با توجه به محتمل ترین تشخیص تمام موارد زیر قابل انتظار است بجز :
الف	Decreased breath sounds
ب	Increased tactile fremitus
ج	Pleural friction rub
د	Hyperresonance percussion sound

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۳۳	آقای ۵۵ ساله با سابقه MI (آنترپور) هم اکنون با $O_2\text{ SAT}:89\%$ مراجعه کرده است ، در VBG انجام شده $PCO_2:39$ دارد . کدام درمان تنفسی زیر در اولویت است ؟
الف	BIPAP
ب	CPAP
ج	O2 NASAL
د	O2 WITH RESERVAL MASK

داخلی	
۳۰	آقای ۴۵ ساله با تورم شدید MTP اول راست مراجعه کرده است شرح حال حملات مکرر را در یکسال اخیر می دهد . در معاینه برجستگی هایی به صورت توده در لاله ی گوش چپ و آرنج ها دارد . در بررسی ها $Uric\ acid:11.8\ mg/100$ دارد کدام گزینه در مورد طول مدت تجویز کلشی سین صحیح می باشد ؟
الف	تا شش ماه
ب	تا سه ماه بدون حمله باشد .
ج	تا زمان وجود توفوس
د	تا زمانی که اسید اوریک به زیر ۷ برسد.

داخلی	
۳۵	بیماری به علت ضعف و بی حالی به اورژانس آورده شده است سابقه تروما ندارد طی بررسی $Na:118\text{mmol/l}$ و $K:3.5\text{mEq/l}$ دارد سایر آزمایشات نرمال است از هفته گذشته برای بیمار دیورتیک شروع شده است به نظر شما کدامیک از داروهای زیر شانس هایپوناترمی داشته است ؟
الف	فورزماید
ب	هیدروکلروتیازید
ج	اسپرونولاکتون
د	تریامترن H

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
۳۶	بیمار آقای ۶۰ ساله با سابقه کنسر معده و شکایت تنگی نفس ناگهانی و تپش قلب مراجعه کرده است. در معاینه $BP=80/60$ و $HR=130$ و سمع ریه پاک می باشد با توجه به محتمل ترین تشخیص، تمام گزینه های زیر صحیح است <u>بجز</u> :
الف	سی تی آنژیوگرافی ریه بعنوان روش انتخابی تشخیصی
ب	عدم استفاده از دی دایمر در این بیمار
ج	انتظار تغییرات نوار قلب با الگوی فشار بر بطن راست
د	رد شدن بیماری با عکس قفسه سینه نرمال

داخلی	
۳۷	بیمار آقای ۳۰ ساله با شکایت درد پلور تیک قفسه سینه با انتشار به شانه ها به اورژانس مراجعه کرده است. وی سابقه گاستروانتریت را در هفته گذشته ذکر می کند. در نوار قلب صعود منتشر قطعه ST در اکثریت لیدها دیده می شود در اکوکاردیوگرافی افیوژن متوسط بدون تامپوناد مشهود است. بیمار تب ندارد و فشارخون بیمار نرمال می باشد با توجه به محتمل ترین تشخیص اقدام درمانی مناسب کدام است ؟
الف	ترخیص از اورژانس با آسپرین دوز بالا و کلشی سین
ب	ترخیص از اورژانس با کورتیکواستروئید و کلشی سین
ج	بستری و انجام پریکاردیوسنتز
د	بستری و درمان با آسپرین دوز بالا و کلشی سین

داخلی	
۳۸	بر اساس الگوریتم احیای پیشرفته قلبی ریوی بعد از شوک دوم در بیمار با ریتم های قابل شوک (VT بدون نبض / VF) از کدام دارو استفاده می گردد ؟
الف	آمیودارون
ب	ایپی نفرین
ج	آتروپین
د	ایبوتیلاید

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلي	
کدامیک از انواع پرفشاری خون ارتباط قویتری با خطر مرگ ۵ ساله قلبی عروقی دارد؟	۳۹
Day time HTN	الف
(average) 24 hours HTN	ب
Night time HTN	ج
Clinic HTN	د

داخلي	
تمام موارد زیر جزء کنتراندیکاسیون های مطلق تجویز فیبریولیتیک در درمان STEMI می باشند <u>بجز</u> :	۴۰
دایسکشن آئورت	الف
خونریزی قاعدگی	ب
سکته مغزی هموراژیک	ج
فشارخون شدید و غیرقابل کنترل با درمان های اورژانسی	د

داخلي	
تمام گزینه های زیر در جلوگیری از پیشرفت نارسائی بطن چپ با کسر جهشی کاهش یافته مؤثر هستند <u>بجز</u> :	۴۱
کاپتوپریل	الف
بیزوپرولول	ب
اسپیرونولاکتون	ج
فورزماید	د

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلي	
۴۲	مرد ۷۰ ساله با سابقه نقرس با درد شدید اندام تحتانی مراجعه کرده است. در معاینه قرمزی، گرمی و تورم مچ پا دارد. در آزمایشات بیمار: Cr: 2.3 mg/dl ESR: 60 می باشد. جهت کنترل حمله نقرس بیمار کدام درمان مناسب تر است؟
الف	آلپورینول 100 mg هر ۱۲ ساعت
ب	کلشی سین 1 mg هر ۸ ساعت
ج	پردنیزولون 10 mg هر ۸ ساعت
د	ایندومتاسین 50 mg هر ۸ ساعت

داخلي	
۴۳	در کدامیک از انواع بورسیت‌های احتمال یافتن علت عفونی کمتر است؟
الف	رتروکالکانتال
ب	اوله کرانون
ج	ساب دلتوئید
د	پره پاتلا

داخلي	
۴۴	خانم ۶۳ ساله به علت درد ناحیه گردن و شانه دو طرف و همینطور لگن از دو ماه پیش مراجعه کرده است. دردها با تشدید صبحگاهی همراه بوده است. مکرراً بیمار را از خواب بیدار می کند. در رادیوگرافی انجام شده، تغییرات اسپوندیلوزیس مشهود است. بررسی های عفونی و بدخیمی انجام شده است که منفی بوده است. در آزمایشات انجام شده تست های تیروئید، سدیمان، CRP در حد نرمال است. بهترین اقدام کدام است؟
الف	شروع درمان با پردنیزولون خوراکی با دوز 20 mg روزانه
ب	تجویز کلسیم ویتامین D ناپروکسن 500 mg دو بار در روز
ج	بیوپسی دو طرفه شریان تمپورال در محل حداکثر ضایعه ممکن
د	تکرار مجدد تست های تیروئید، ESR و CRP

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داخلی	
تمام موارد زیر از ریسک فاکتورهای زمینه ساز بیماری آرتريت روماتوئید می باشند <u>بجز</u> :	۴۵
بیماری پریدونتیت	الف
مواد غذایی حاوی ال - تریپتوفان	ب
میکروبیوم روده	ج
عفونت ویرال با EBV	د

داخلی	
همه موارد زیر از شواهد علل جدی کمردرد می باشد <u>بجز</u> ؟	۴۶
کاهش وزن	الف
ضعف نورولوژی پیشرونده	ب
بی اختیاری ادرار و مدفوع	ج
بی حسی جلوی ران	د

جراحی	
کدامیک از موارد زیر تعریف ماسیو ترانسفیوژن خون است ؟	۴۷
تزریق ۸ واحد خون در ۲۴ ساعت	الف
تزریق ۴ واحد در عرض یکساعت	ب
تزریق ۵۰ درصد حجم خون بیمار در عرض ۶ ساعت	ج
تزریق بالای ۵۰ درصد حجم خون بیمار در ۲۴ ساعت	د

جراحی	
کدامیک از علائم زیر در شوک گرید ۳ وجود ندارد ؟	۴۸
تعداد نبض ۱۳۰ در دقیقه	الف
تعداد تنفس ۴۲ در دقیقه	ب
کانفیوزن	ج
حجم ادرار ۷ سی سی در ساعت	د

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
نمای رادیولوژیک bird beak sign در کدامیک از بیماری های مری وجود دارد ؟		۴۹
الف	آشالازی	
ب	کانسر مری	
ج	دیورتیکول زنکر	
د	اسپاسم مری	

جراحی		
خانم جوانی حین غذا خوردن دچار بلع استخوان مرغ می شود و با شکایت درد گلو و سینه به اورژانس مراجعه کرده است برای تشخیص، تمام رادیوگرافی های زیر درخواست می شود <u>بجز</u> :		۵۰
الف	گرافی قفسه سینه	
ب	گرافی لترال گردن	
ج	گرافی رخ گردن	
د	گرافی با بلع باریم	

جراحی		
بیماری با شکایت درد قسمت فوقانی شکم و زردی به شما مراجعه کرده است. در آزمایشات همراه، آلکالین فسفاتاز بالا دارد اولین اقدام تشخیصی کدامست ؟		۵۱
الف	سونوگرافی شکم	
ب	سی تی اسکن شکم	
ج	MRCP	
د	آندوسکوپی معده	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
۵۲	خانم ۵۰ ساله با تورم و قرمزی پستان سمت چپ که در لمس دردناک است به شما مراجعه می کند در سونوگرافی، آبسه ۲ در ۳ سانتی متر گزارش می شود. کدام اقدام زیر در این بیمار ارجح است؟	
الف	تخلیه آبسه به روش باز	
ب	تخلیه آبسه زیر گاید سونوگرافی	
ج	درمان آنتی بیوتیک	
د	تخلیه آبسه و بیوپسی	

جراحی		
۵۳	آقای ۴۰ ساله موتورسوار بدنبال تصادف به اورژانس آورده شده است. به دلیل تنگی نفس و شکستگی دنده ی دوم، لوله سینه در سمت چپ قفسه سینه تعبیه شده است که در بدو تعبیه ۸۰۰ سی سی خون تخلیه شده است. پس از انتقال به بخش نیز ۵۰۰ سی سی خون در عرض ۳ ساعت از لوله سینه خارج شده است. تمام اقدامات زیر جهت بیمار انجام می شود بجز:	
الف	تزریق خون	
ب	بلوک بین دنده ای	
ج	توراکتومی	
د	سی تی اسکن قفسه صدی	

جراحی		
۵۴	کودک ۴ ساله با وزن ۲۰ کیلو به دلیل درد شکم بستری شده است بیمار را NPO کرده ایم. کدامیک از گزینه زیر در مورد مایع درمانی صحیح است؟	
الف	سرم $\frac{2}{3}$ ، ۱۵۰۰ سی سی در ۲۴ ساعت + ۱۵ سی سی KCL	
ب	سرم ۵% D/W در $\frac{1}{2}$ N/S ۷۵۰ سی سی هر ۱۲ ساعت	
ج	سرم ۵% D/W در N/S ۱۵۰۰ سی سی + ۱۰ سی سی KCL/Lit	
د	سرم N/S ۷۵۰ سی سی + ۷,۵ سی سی KCL هر ۱۲ ساعت	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
۵۵	خانم ۲۹ ساله ای با شکایت توده در پستان چپ مراجعه کرده است در سونوگرافی کیست کمپلکس گزارش شده است. تحت آسپیراسیون کیست قرار می گیرد و در سونوگرافی مجدد توده ای وجود ندارد اقدام مناسب بعدی کدام است؟	
الف	ماموگرافی	
ب	بیوپسی از توده	
ج	سونوگرافی ۳ ماه بعد	
د	ام آر آی پستان	

جراحی		
۵۶	خانم ۳۵ ساله معلم با شکایت تغییر رنگ قهوه ای و سفت شدن پوست قسمت داخلی و تحتانی ساق پای راست از ۲ سال قبل، که در طی دو ماه گذشته دچار زخم بدون درد با ترشح زیاد در قسمت میانی تغییرات پوستی شده است، سابقه هیچ بیماری خاصی را ذکر نمی کند. کدامیک از بررسی های زیر در تشخیص بیماری ارجح است؟	
الف	بیوپسی زخم	
ب	سونوگرافی داپلر وریدی پا	
ج	بررسی بیماری های اتوایمیون	
د	کشت زخم	

جراحی		
۵۷	آقای ۲۱ ساله ای بدنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ران سمت چپ شده است. در معاینه هماتوم ران دارد علائم حیاتی پایدار است و هماتوم پیشرفت نکرده است. در سونوگرافی داپلر اندام تحتانی ABI مساوی با 0.70 است. اقدام بعدی کدام است؟	
الف	اکسپلور زخم	
ب	تکرار سونوگرافی ۳ ساعت بعد	
ج	سی تی آنژیوگرافی هردو اندام تحتانی	
د	آنژیوگرافی هر دو اندام تحتانی	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
۵۸	آقای ۴۵ ساله به دلیل سوختگی درجه ۲ در اندام تحتانی و قدام قفسه سینه به اورژانس آورده میشود. اقدامات احیاء انجام شده بیمار درد شدیدی دارد برای کنترل درد، کدام یک از روش های زیر ارجح است ؟	
الف	کتورولاک وریدی	
ب	فنتانیل وریدی	
ج	بی حسی اپیدورال	
د	مورفین عضلانی	

جراحی		
۵۹	در ترومای مغزی کدامیک از ضایعات تروماتیک جمجمه و مغز نیاز به دخالت سریعتر جراحی دارد ؟	
الف	هماتوم اپیدورال	
ب	هماتوم ساب دورال	
ج	هماتوم اینتراپارانشیمال	
د	شکستگی باز جمجمه	

جراحی		
۶۰	بیمار آقای ۴۳ ساله با درد کمر از چندین ماه قبل مراجعه کرده است . اخیراً درد بیمار تشدید یافته است . درد انتشار به اندام تحتانی دارد و دچار بی حسی در مدیال پا و اولین انگشت شده است. کدام تشخیص زیر مطرح است ؟	
الف	بیرون زدگی دیسک L4 - L5	
ب	بیرون زدگی دیسک L5 - S1	
ج	تنگی کانال نخاع کمری	
د	اسپوندیلولیزیس (spondylolysis)	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی	
آقای ۷۴ ساله سیگاری با تشخیص آدرنوکارسینوم مری در ۳۵ سانتی متری از دندان پیشین در آندوسکوپی به شما مراجعه کرده است. برای تشخیص عمق نفوذ تومور در مری کدامیک از روش های زیر را پیشنهاد می کنید؟	۶۱
EUS (اندوسونوگرافی)	الف
PET Scan	ب
CT Scan قفسه سینه	ج
MRI قفسه سینه با کنتراست	د

جراحی	
آقای ۳۵ ساله با سابقه هیپرکلسمی تحت درمان، با شکایت استفراغ خونی مکرر به شما مراجعه کرده است که در آندوسکوپی زخم های متعدد در معده و دئودنوم دارد. کدامیک از آزمایش های زیر در تشخیص بیماری کمک بیشتری می کند؟	۶۲
اندازه گیری PH معده	الف
اندازه گیری PH قسمت اول دئودنوم	ب
گلوکاگون سرم	ج
گاسترین سرم	د

جراحی	
در تمام بیماران زیر ترمیم زخم دچار اختلال هست <u>بجز</u> :	۶۳
خانم ۴۰ ساله دیابتیک با $Hb A_{1C} = 6$	الف
آقای ۵۰ ساله با وزن 45 kg با کانسر معده	ب
خانم ۶۰ ساله تحت درمان هیپرتانسیون	ج
آقای ۴۵ ساله با مصرف روزانه یک پاکت سیگار	د

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
درس سونوگرافی تیروئید آقای جوانی ندول یک سانتی متری گزارش شده است و در آزمایشات TSH پایین دارد. اقدام مناسب بعدی چیست؟		۶۴
الف	بیوپسی از ندول	
ب	سونوگرافی سه ماه بعد	
ج	جراحی لوبکتومی	
د	اسکن رادیونوکلئید	

جراحی		
آقای ۴۵ ساله با سابقه ۱۲ سال کولیت اولسرو به شما مراجعه می کند. در مورد غربالگری کانسر چه توصیه ای به بیمار می کنید؟		۶۵
الف	کولونوسکوپی و بیوپسی سالیانه	
ب	بررسی تست خون مخفی سالیانه	
ج	رکتوسیگموئیدوسکوپی هر دو سال یکبار و بیوپسی	
د	باریم انما و تست خون مخفی هر ۲ سال یکبار	

جراحی		
بیماری با تشخیص کانسر پستان تحت درمان پارشیل ماستکتومی (BCT) قرار گرفته است در فالوآپ بیمار همه موارد زیر لازم است <u>بجز</u> :		۶۶
الف	ماموگرافی ۶ ماه بعد از اتمام رادیوتراپی	
ب	معاینه فیزیکی هر ۶-۳ ماه برای سه سال	
ج	ماموگرافی سالیانه	
د	ام آر آی سالیانه	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی	
آقای ۴۰ ساله الکلی با سابقه دردهای شکمی از ۲ سال پیش به شما مراجعه می کند. در سی تی اسکن شکم توده کیستیک در قسمت میانی پانکراس به ابعاد ۶ × ۵ سانتی متر مشاهده می شود. کدامیک از اقدامات زیر جهت بیمار انجام می شود؟	۶۷
الف	ERCP و تعبیه استنت
ب	جراحی تخلیه کیست به داخل معده
ج	درناژ زیر گاید سونوگرافی
د	درمان با اوکتروتاید

جراحی	
در زخم های زیر با دیفکت پوستی حتماً بایستی از گرافت پوست با ضخامت کامل استفاده کرد <u>بجز</u> :	۶۸
الف	صورت
ب	سر
ج	ساعد
د	انگشت

جراحی	
بیمار با تشخیص ITP مزمن تحت اسپلنکتومی قرار گرفته است. در آزمایشات بعد از عمل جراحی، کدام یک از تغییرات زیر دیده نمی شود؟	۶۹
الف	افزایش دائم پلاکت ها
ب	ظهور اجسام Howell Jolly در خون محیطی
ج	کاهش IgM و Opsonin
د	ظهور RBC های هسته دار در خون محیطی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی		
۷۰	آقای ۷۰ ساله با ضایعه در ناحیه سر به شما مراجعه می کند، بیمار سابقه درمان کچلی با اشعه را دارد. بیوپسی از ضایعه BCC گزارش می شود. درمان ارجح در این بیمار چیست ؟	
الف	برداشتن کامل ضایعه با مارژین آزاد	
ب	برداشتن کامل ضایعه با مارژین ۳ میلی متر	
ج	برداشتن کامل ضایعه با مارژین ۶ میلی متر	
د	برداشتن کامل ضایعه و غدد لنفاوی گردن	

کودکان		
۷۱	غربالگری اوتیسم برای همه کودکان از چه سنی توصیه می شود؟	
الف	۱۲ تا ۱۸ ماه	
ب	۱۸ تا ۲۴ ماه	
ج	۲۴ تا ۳۶ ماه	
د	۳۶ تا ۴۸ ماه	

کودکان		
۷۲	کودکی ۱۴ ماهه با علائم استفراغ، اسهال، عدم رشد مناسب، بی حالی، تحریک پذیری شدید و تشنج مراجعه کرده است. هموگلوبین وی ۶ گرم بر دسی لیتر است. بررسی خون محیطی، کم خونی هیپوکرومیک میکروسیتیک را نشان می دهد. از بدو تولد با شیر بز تغذیه شده است . محتمل ترین علت وضعیت او کمبود کدام ویتامین است ؟	
الف	تیامین (B ₁)	
ب	ریبوفلاوین (B ₂)	
ج	نیاسین (B ₃)	
د	پیریدوکسین (B ₆)	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۷۳	در نوزاد متولد شده از مادر مبتلا به هیپاتیت B که واکسن و ایمونوگلوبولین بعد از تولد دریافت کرده است چک HBS (Ab&Ag) در چه سنی توصیه می شود ؟
الف	۳ تا ۶ ماهگی
ب	۱ تا ۳ ماهگی
ج	۹ تا ۱۸ ماهگی
د	۶ تا ۸ ماهگی

کودکان	
۷۴	شیرخوار پسر ۸ ماهه ای را با تب خفیف و کوریزا از ۲ روز پیش به اورژانس آورده اند. از امروز سرفه بارکینگ (Barking cough) و استریدور به علائم اضافه شده است. با توجه به محتملترین تشخیص کدامیک از اقدامات تشخیصی زیر نیاز است ؟
الف	گرافی گردن
ب	گرافی قفسه سینه
ج	اقدامی نیاز ندارد
د	آزمایشات CBC,ESR,CRP

کودکان	
۷۵	کودک ۵ ماهه با وزن 6kg ، در حالت تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه به اورژانس آورده شده است. اقدامات اولیه (خواباندن کودک به پهلو چپ ، ارزیابی علائم حیاتی و برقراری راه هوایی مناسب و سرکولیشن کافی برای بیمار) ظرف دو دقیقه صورت گرفت اما تشنج کنترل نشد و میدازولام وریدی به میزان ۱ میلی گرم آهسته تزریق شد ، اما کودک همچنان تشنج می کند. کدامیک از داروهای ضد تشنج زیر در کنترل تشنج مناسب تر است ؟
الف	والپرات سدیم
ب	فنوباریتال
ج	ویتامین B6
د	فنی توئین

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۷۶	کودک ۷ ساله ای ، بعلت از دست دادن قدرت راه رفتن به اورژانس آورده شده است. در معاینه کاملاً هوشیار و سطح حسی در حد مید توراسیک دارد ، قادر به حرکت دادن پا نیست ، بابنسکی دو طرف مثبت است و بی اختیاری ادرار دارد. محتمل ترین تشخیص چیست؟
الف	پولیو میلیت
ب	میلیت عرضی
ج	میوزیت ویرال
د	سندرم گلین باره

کودکان	
۷۷	پسر ۴ ساله با علائم رینوره، احتقان و خارش بینی مراجعه نموده است. در معاینه مخاط بینی رنگ پریده، ترشحات شفاف و آبکی دارد. خط عرضی بینی رؤیت شد با توجه به محتمل ترین تشخیص، مؤثرترین درمان کدامیک از موارد زیر است؟
الف	مومتازون اینترا نازال
ب	پردنیزولون خوراکی
ج	ایپراتروپیوم بروماید موضعی
د	آنتی هیستامین اینترانازال

کودکان	
۷۸	کدامیک از موارد زیر در مورد سیستم کمپلمان صحیح است؟
الف	نقایص اجزای ابتدایی کمپلمان با مننژیت باکتریال همراهی دارد
ب	نقایص اجزای انتهایی کمپلمان بیشتر با SLE مرتبط است
ج	CH50 غیرنرمال نشان دهنده کمبود اجزای ابتدایی کمپلمان است
د	کمبود C1 inhibitor با گلومرونفریت همراهی دارد

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۷۹	کودک ۲/۵ ساله با علائم بی قراری - بی خوابی و کاهش اشتها به درمانگاه آورده شده است. در معاینه رنگ پریده می باشد. معیارهای رشدی پایین است و اختلال تکامل عصبی و روانی دارد. در آزمایشات، پروتئینوری دارد در آزمایش لام خون محیطی pmn های ۶-۷ لوب دارد. $Hb: 8 \text{ g/dl}, MCV : 102$ محتملترین تشخیص کدام است؟
الف	کمبود ویتامین B12
ب	کمبود مس
ج	مسمومیت با آلومینیوم
د	نارسایی مزمن کلیوی

کودکان	
۸۰	کدامیک از ترانسلوکاسیونهای کروموزومی زیر در بیمار مبتلا به ALL، با پیش آگهی خوب همراه است؟
الف	T(12,21)
ب	T(9,22)
ج	T(1,19)
د	T (4, 11)

کودکان	
۸۱	کودک ۴ ساله ای با سابقه آسم و مصرف اسپری سالبوتامول در حال حاضر به علت تنگی نفس، سرفه و افت O_2sat را به اورژانس می آورند. با توجه به محتملترین تشخیص کدام یک از اقدامات درمانی زیر در حال حاضر برای بیمار مناسب است؟
الف	اومالیزوماب
ب	تئوفیلین
ج	سالمترو
د	کورتیکواستروئید

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۸۲	شیرخوار ۲ ساله ای با وزن ۱۲ کیلوگرم را با شکایت استفراغ و اسهال آبکی از روز قبل به اورژانس آورده اند. کودک عطش به آب دارد و بی قرار می باشد. استفراغ بیمار از صبح مراجعه بهبود پیدا کرده است. کدام اقدام درمانی زیر مناسب است؟
الف	بستری و تجویز نرمال سالین ۳۶۰ سی سی طی نیم ساعت
ب	ORS خوراکی ۹۰۰ سی سی طی چهار ساعت در اورژانس
ج	ترخیص بیمار و دادن ۱۰۰ سی سی ORS به ازای هر بار اسهال
د	دادن سرم $\frac{2}{3}$ به میزان ۱۲۰۰ سی سی طی ۶ ساعت

کودکان	
۸۳	دانشجوی پزشکی در روز اول بستری کودکی با تشخیص مننژیت باکتریال، ساکشن ترشحات دهانی بیمار را انجام داده است. اقدام مناسب در مورد این دانشجو کدام است؟
الف	بستری دانشجو و شروع درمان تزریقی
ب	شروع پروبیلاکسی با کپسول ریفامپین
ج	ارسال کشت حلق و تصمیم بر اساس نتیجه آن
د	نیاز به انجام اقدام خاصی نمی باشد

کودکان	
۸۴	کودک ۴ ساله ای با تب و لنفادنوپاتی دو طرف گردنی و استریدور خفیف از هفته گذشته مراجعه کرده است. در معاینه اسپلنومگالی دارد. بیمار ۴ روز قبل یک دوز پنی سیلین ۶.۳.۳ دریافت کرده است اما بهبودی نداشته است. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدامیک از درمان های زیر مناسب تر است؟
الف	آزیترومایسین
ب	سفتریاکسون
ج	درمان حمایتی
د	کورتیکواستروئید

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۸۵	شیرخوار پسر ۱،۵ ماهه ای، به علت استفراغ های جهنده غیر صفراوی بعد از شیر خوردن به اورژانس آورده شده است در معاینه مخاطات خشک است. در گرافی شکم بعمل آمده، معده متسع می باشد و هوای داخل روده کاهش یافته است. کدام یافته در این بیمار معمول نمی باشد؟
الف	افزایش BUN
ب	هیپوکالمی
ج	هیپر بیلیروبینمی کونژوگه
د	آلکالوز متابولیک شدید

کودکان	
۸۶	شیر خوار ۴ ماهه ای را با شکایت بی قراری موقع شیر خوردن، کاهش سرعت وزن گیری و استفراغ بصورت خروج آرام شیر از دهان، از یک ماه قبل به درمانگاه آورده اند. تغذیه با شیر مادر است و معاینات طبیعی است. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدامیک از اقدامات درمانی زیر مناسب است؟
الف	فاموتیدین
ب	شیر خشک آنتی رگورژیتیشن
ج	اقدامی لازم ندارد
د	دامپیریدون

کودکان	
۸۷	کدامیک از موارد زیر جزو علل هماچوری با منشاء گلومرولار می باشد؟
الف	تومور ویلمز
ب	بیماری سیکل سل
ج	IgA نفروپاتی
د	هایپر کلسیوری

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان		
۸۸	کودک ۳ ساله با سابقه اسهال و استفراغ از دو روز پیش به اورژانس آورده شده است. مادر بیمار محلول ORS به میزان یک ساشه در یک لیوان آب به کودک خورانده است. در حال حاضر کودک بی قرار و تب دار بوده، ولع فراوان به آب دارد. کدامیک از اختلالات زیر برای بیمار محتمل تر است؟	
الف	هایپرکالمی	
ب	هایپرناترمی	
ج	هایپرکلسمی	
د	هایپوگلیسمی	

کودکان		
۸۹	شیر خوار ۷ ماهه ای با شکایت تب و سرفه، تنگی نفس و کاهش اشتها از ۲ روز قبل آورده شده است. بیمار سابقه اسهال حجیم، بدبو، چرب و عدم وزن گیری مناسب داشته است بهترین تست تشخیصی بیمار کدام است؟	
الف	چک الاستاز مدفوع	
ب	انجام تست عرق	
ج	ایمونو راکتیو تریپسینوژن	
د	سی تی اسکن قفسه سینه	

کودکان		
۹۰	نوزاد ترمی بدنبال سزارین اورژانسی با هیپوتونی بدنیا آمده است. پس از اقدامات اولیه احیاء، ضربان قلب بالای ۱۰۰ می باشد و آپنه ندارد. ولی سیانوز پایدار دارد اقدام مناسب بعدی کدام است؟	
الف	تهویه با فشار مثبت	
ب	اصلاح گام های تهویه ای	
ج	در نظر گرفتن اینتوباسیون	
د	در نظر گرفتن CPAP	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۹۱	نوزادی سه روزه با سن ۲۸ هفته جنینی با وزن یک کیلو گرم در بخش نوزادان بستری می باشد. نوزاد در معاینه زرد می باشد. در چه سطحی از بیلی روبین سرمی در این نوزاد کرنیکتروس شروع می شود؟
الف	10 mg /dl
ب	11mg/dl
ج	12mg/dl
د	13mg/dl

کودکان	
۹۲	کدامیک از گزینه های زیر با وضعیت کودکی با تشخیص Pierre-Robin همراه با Micrognathia که منجر به انسداد راه هوایی شده است، متناسب تر است؟
الف	syndrome
ب	association
ج	sequence
د	disease

کودکان	
۹۳	پسر ۶ ساله به علت کوتاهی قد به درمانگاه اطفال ارجاع گردیده است. منحنی رشدی ۲ سال اخیر بین صدک ۳ و ۱۰ به طور موازی پیش رفته است. معاینه سیستمیک وی نکته غیر طبیعی ندارد و سن استخوانی معادل ۴.۵ سال می باشد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟
الف	کمبود هورمون رشد
ب	کوتاه قدی سرشتی
ج	کوتاه قدی فامیلیال
د	هیپوتیروئیدی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کودکان	
۹۴	پسر ۳ ساله بعلت تشنج به اورژانس آورده شده است در بررسی، قند خون پایین دارد. به گفته والدین بیمار از شب قبل بی حالی و تب داشته و میل به غذا خوردن نداشته است. سابقه هیچ بیماری خاصی نمی دهد. تمام معاینات نرمال می باشد. در بررسی آزمایشگاهی فقط کتونوری دارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟
الف	هیپرانسولینسم
ب	ارگانیک اسیدی
ج	هیپوگلیسمی کتوتیک
د	مسمومیت دارویی

زنان	
۹۵	خانم ۹ هفته باردار با لکه بینی مراجعه کرده است در سونوگرافی جنین نرمال دارای ضربان قلب و هماتوم یک سانتی خلف جفت گزارش شده است. در معاینه سرویکس بسته می باشد. اقدام درمانی مناسب کدام است؟
الف	درمان با سولفات منیزیم
ب	درمان انتظاری
ج	سرکلاژ دهانه رحم
د	کورتاژ اورژانسی

زنان	
۹۶	خانم ۳۲ ساله با حاملگی ۸ هفته به علت درد شکم و لکه بینی مراجعه کرده است. در سونوگرافی انجام شده ساک داخل رحمی ندارد. کیست هموراژیک یا EP ۲ سانتی متر در آدنکس راست رؤیت شد. در تشخیص ایشان کدام گزینه قطعی تر است؟
الف	لاپاراسکوپی
ب	سونوگرافی واژینال با داپلر
ج	انجام کلدوسنتز
د	اندازه گیری پروژسترون

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
در کدام عارضه جنینی احتمال Post term شدن مادر وجود دارد ؟	۹۷
الف	هایپوپلازی آدرنال
ب	هیدروسفالی
ج	ماکروزومی
د	سندرم دیس مچوریتی

زنان	
خانم ۳۲ ساله با سابقه ۳ بار سزارین با سن حاملگی ۳۵ هفته و انسزیون کلاسیک در بارداری قبلی با درد زایمان و خونریزی واژینال مراجعه کرده است. علائم حیاتی $BP = \frac{80}{35}$ و $PR = 120$ و قلب جنین سمع نمی شود. محتمل ترین تشخیص کدام است ؟	۹۸
الف	پارگی رحم
ب	جفت سرراهی
ج	واژوپرویا
د	اختلال انعقادی

زنان	
خانم ۴۲ ساله مورد کانسر SCC سرویکس در معاینه پارامتر سمت چپ درگیر می باشد و توده ۳ سانتی متری در سرویکس دارد. اقدام مناسب کدام است ؟	۹۹
الف	کموترابی
ب	هیسترکتومی ساده
ج	هیسترکتومی رادیکال
د	کمورادپاسیون

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
خانم ۳۴ ساله به علت خونریزی واژینال و افزایش ضخامت اندومتر تحت بیوپسی اندومتر قرار گرفته است که پاتولوژی آن غیر تشخیصی بوده است. اقدام مناسب کدام است؟	۱۰۰
الف	تکرار بیوپسی اندومتر
ب	هیستروسکوپی و نمونه گیری اندومتر
ج	مصرف پروژسترون
د	گذاشتن IUD میرنا

زنان	
خانم باردار ۲۱ ساله G1 با شکایت درد زایمانی و پارگی کیسه آب با دیلاتاسیون ۴ سانتی متر در اتاق زایمان بستری می باشد. بیمار تحت بی حسی اپیدورال قرار گرفته است. کدام مورد اختلال توقف (arrest disorder) را در این بیمار نشان می دهد؟	۱۰۱
الف	مرحله ی نهفته طولانی تر از ۱۴ ساعت
ب	دیلاتاسیون سرویکس کمتر از ۱ سانتی متر در ساعت در مرحله فعال
ج	عدم نزول جنین در مرحله دوم زایمان بعد از یکساعت از Pushing
د	در مرحله فعال زایمان هیچگونه دیلاتاسیونی طی ۳ ساعت رخ ندهد

زنان	
خانم حامله ۲۸ هفته در معاینه ارتفاع رحم ۳۴ سانتی متر است. همه تشخیص های زیر محتمل است <u>بجز</u> :	۱۰۲
الف	صحیح نبودن سن حاملگی
ب	فیبروم رحمی
ج	مرگ داخل رحمی
د	پلی هیدرامنیوس

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
در خانم ۳۸ ساله پاپ اسمیر LSIL بوده است که تحت کولپوسکوپی قرار گرفته و کولپوسکوپی رضایت بخش نمی باشد. اقدام بعدی چیست؟	۱۰۳
هیسترکتومی	الف
تست HPV	ب
کولپوسکوپی ۲ ماه بعد	ج
کورتاژ اندوسرویکس	د

زنان	
کدام یک از موارد زیر ریسک فاکتور مهمتری برای هیپرپلازی اندومتر می باشد؟	۱۰۴
مصرف استروژن در یائسگی	الف
مصرف تاموکسیفن	ب
چاق بودن بیمار	ج
یائسگی دیررس	د

زنان	
سالپنژکتومی خطر ابتلا به کدام کانسر را کاهش می دهد؟	۱۰۵
کانسر اندومتر	الف
کانسر تخمدان	ب
کانسر سرویکس	ج
کانسر پستان	د

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
۱۰۶	خانم ۳۵ ساله با شکایت ترشحات پنیری و خارش مراجعه کرده است. طی یکسال گذشته ۵ نوبت با همین تظاهرات نزد پزشک مراجعه کرده و درمان شده است. در مورد این بیمار کدام اقدام صحیح است؟
الف	درمان با ایمیدازول موضعی به مدت ۳ روز
ب	درمان با فلوکونازول 150Mg هفتگی به مدت ۶ ماه
ج	درمان با کلوتریمازول موضعی به مدت ۳ روز
د	درمان شریک جنسی با فلوکونازول

زنان	
۱۰۷	خانم ۳۵ ساله با سابقه سقط از ۴ ماه قبل دچار خونریزی واژینال بوده و $\beta\text{HCG}=25$ می باشد. در سونوگرافی توده 2cm در رحم هیپرواسکولار گزارش شده. تشخیص احتمالی کدام است؟
الف	کوریوکارسینوما
ب	مول مهاجم
ج	تومور اپیتلیوئید محل جفت
د	مول کامل

زنان	
۱۰۸	خانم باردار ۳۵ هفته با فشار خون $\frac{170}{120}$ و سردرد شدید در سونوگرافی جنین نرمال با AFI کافی گزارش شده است. اقدام درمانی مناسب کدام است؟
الف	ختم بارداری فوری
ب	ختم بارداری در ۳۷ هفته
ج	تجویر بتامتازون و فالوآپ
د	تجویر سولفات منیزیم و فالوآپ

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
۱۰۹	در نتیجه پاپ اسمیر خانم ۳۲ ساله واژینوز باکتریال گزارش شده است. وی شکایتی از ترشحات بدبو یا تحریک وولو ندارد. اقدام مناسب چیست؟
الف	بررسی PH واژینال
ب	ارزیابی Wet mount
ج	درمان با مترونیدازول
د	اطمینان بخشی به بیمار

زنان	
۱۱۰	در همه موارد زیر پیشگیری از ابتلای نوزاد به عفونت GBS حین زایمان باید انجام شود <u>بجز</u> :
الف	باکتریوری مادر باردار در بارداری قبلی
ب	تولد نوزاد مبتلا به GBS در بارداری قبلی
ج	زایمان زودرس در سن ۳۵ هفته
د	پارگی پرده آمنیون طولانی تر از ۱۸ ساعت

زنان	
۱۱۱	خانم باردار ۳۰ هفته با گروه خونی B منفی و تست کومبس غیر مستقیم مثبت مراجعه کرده است. همسرشان گروه خونی B مثبت دارد. در سونوگرافی جنین هیدروپس است. تحت کوردوسنتز قرار گرفته و هماتوکریت ۲۵٪ می باشد. چه اقدامی انجام می دهید؟
الف	تزریق خون به جنین
ب	ختم حاملگی
ج	سونوگرافی داپلر MCA
د	تزریق روگام

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زنان	
۱۱۲	در بارداری دوقلویی باکوتاهی سرویکس کدام یک از موارد زیر را توصیه می کنید؟
الف	Cervical cerclage
ب	Progesterone
ج	Work modifications
د	Pessary

زنان	
۱۱۳	خانم ۳۵ ساله با ناباروری ثانویه ۴ ساله تحت هیستروسالپینگوگرافی (HSG) قرار گرفته است. کدام گزینه HSG غیر نرمال را نشان می دهد؟
الف	$\frac{2}{3}$ پروگزیمال لوله فالوپ نازک می باشد
ب	$\frac{1}{3}$ دیستال لوله فالوپ متسع می باشد
ج	رنگ داخل کلدوساک ریخته شده است
د	فرو رفتگی در حفره اندومتر مشهود است

مغز و اعصاب	
۱۱۴	خانم ۳۰ ساله ای با اختلال اسفنکتری و ضعف اندام تحتانی از ۴ روز قبل مراجعه کرده است ، بیمار هم چنین از پارستزی اندام تحتانی و درد لگن نیز شاکی می باشد. کدامیک از علائم زیر به ضرر تشخیص گلیلن باره می باشد؟
الف	درد لگن
ب	پارستزی اندام تحتانی
ج	اختلال اسفنکتری زودرس
د	ضعف اندام تحتانی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مغز و اعصاب	
۱۱۵	کدامیک از موارد زیر از علائم هشدار دهنده سردرد <u>نمی</u> باشد؟
الف	سردرد که تحت حاد و پیشرونده است
ب	سردرد که به درمان های طبی پاسخ ندهد
ج	سردرد که شدت آن در عصر بیشتر از صبح است
د	سردرد که به تازگی بعد از ۴۰ سالگی شروع شده است

مغز و اعصاب	
۱۱۶	در کدام بیمار زیر ریسک بروز سکته مغزی بعد از ایسکمی گذرا (TIA) براساس ABCD2 بیشتر است؟
الف	آقای ۷۰ ساله با سابقه دیابت با همی پارزی از ۲ ساعت قبل
ب	خانم ۲۰ ساله با اختلال تکلم و همی پارزی از ۳۰ دقیقه قبل
ج	آقای ۶۵ ساله با فشار خون ۱۲/۸ و همی پارزی از ۲ ساعت قبل
د	خانم ۴۰ ساله با مونوپارزی اندام فوقانی راست از ۱۰ دقیقه قبل

مغز و اعصاب	
۱۱۷	در معاینه یک بیمار که با شروع ناگهان اختلال تکلم به اورژانس آورده شده است متوجه علائم زیر می شوید بیمار روان صحبت می کند درک مطلب نرمال است اما تکرار مختل است این علائم مربوط به کدامیک از انواع آفازی می باشد؟
الف	بروکا
ب	گلوبال
ج	ورنیکه
د	ارتباطی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مغز و اعصاب		
۱۱۸	خانم ۳۰ ساله ای از ۲ ماه پیش دچار پارزی نیمه چپ بدن شده است در MRI انجام شده ضایعاتی در نیمکره راست بیمار مشاهده می شود کدامیک از موارد تصویر برداری مغز در افتراق تومور گلیال از پلاک مالتیپل اسکلروز کمک کننده می باشد؟	
الف	طیف سنجی با تشدید مغناطیسی (MRS)	
ب	MRI عملکردی (F.MRI)	
ج	آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی (MRA)	
د	توپوگرافی کامپیوتری با انتشار فوتون مغزی (Spect)	

مغز و اعصاب		
۱۱۹	انجام نوار مغزی (EEG) در کدامیک کاربرد ندارد؟	
الف	بیماری کروتز فلد جاکوب (CJD)	
ب	بیماری آنسفالیت اسکلروز دهنده سراسری تحت حاد (SSPE)	
ج	بیماری آنسفالیت هرپسی	
د	سندرم MAN IN THE BARREL	

مغز و اعصاب		
۱۲۰	نوجوان ۱۵ ساله ای با سابقه طولانی مدت و سندرم های سوء جذب که از یکسال قبل دچار عدم تعادل پیشرونده شده است در معاینات آتاکسی واضح دارد که همراه با حرکات مشابه میوکلونوس می باشد و در دیستال اندام های تحتانی حس سطحی به نفع نوروپاتی کاهش یافته است کدام یک تشخیص قطعی بیماری را بدنبال دارد؟	
الف	تصویر برداری مغز	
ب	آزمایشات بالنی	
ج	نوار مغز	
د	آندوسکوپی دستگاه گوارش	

مغز و اعصاب		
۱۲۱	آقای ۶۵ ساله به علت افت هوشیاری به اورژانس آورده شده است در معاینات خواب آلوده می باشد دست های بیمار وقتی در حالت اکستانسیون کامل قرار گرفته و دچار لرزش های متناوب می شوند و رفلکس های وتیری (DTR) افزایش یافته است در حین بستری دچار تشنج می شود کدام یک از اقدامات زیر جهت تشخیص کمک کننده نمی باشد؟	
الف	نوار مغز	
ب	بررسی بیماری متابولیک	
ج	تصویر برداری از مغز	
د	پونکسیون لومبار	

عفونی		
۱۲۲	خانم ۲۵ ساله با تشخیص مننژیت بروسلا بستری شده است. کدام رژیم آنتی بیوتیکی زیر را انتخاب می کنید؟	
الف	ریفامپین + تتراسایکلین + جنتامایسین	
ب	ریفامپین + کوتریموکسازول + داکسی سایکلین	
ج	ریفامپین + سفتریاکسون + داکسی سایکلین	
د	ریفامپین + کوتریموکسازول + جنتامایسین	

عفونی		
۱۲۳	خانم جوانی باردار می باشد. کودک ۱۰ ساله او دچار آبله مرغان شده است. مادر سابقه آبله مرغان نداشته است. واکسن هم قبلا نزده است. با توجه به تماس طولانی مادر با کودک، اقدام مناسب جهت مادر کدام است؟	
الف	آسیکلوویر وریدی	
ب	تزریق VZIG	
ج	تجویز واکسن آبله مرغان	
د	درمان در صورت بروز علائم	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عفونی	
۱۲۴	کودک ۶ ساله ای جهت واکسیناسیون آنفولانزا برای بار اول مراجعه نموده است. دوز مناسب کدام گزینه است؟
الف	یک دوز واکسن کافی است
ب	دو دوز واکسن به فاصله یک ماه
ج	دو دوز واکسن به فاصله سه ماه
د	دو دوز واکسن به فاصله دو ماه

عفونی	
۱۲۵	کارگر هندی ساکن در ایران با علائم تب و لرز مراجعه نموده است. در لام خون محیطی گامتوسیت موزی شکل مشاهده شده است. مناسب ترین درمان کدام است؟
الف	کلیندامایسین
ب	پروگوانیل
ج	آرتسونات
د	کلروکین

عفونی	
۱۲۶	پسر ۲۰ ساله سرباز با سردرد و تهوع و استفراغ و ضایعات پتشی روی بدن مراجعه نموده است. با شک به مننژیت مننگوکوکی درمان تجربی مناسب کدام است؟
الف	سفتریاکسون
ب	سفتازیدیم
ج	وانکومایسین
د	مروپنم

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عفونی	
۱۲۷	مرد ۳۵ ساله با سرفه و خلط مراجعه کرده است. در گرافی در لوب تحتانی ریه راست کدورت دارد. علائم بالینی CBC و BUN و Cr و SPO2 نرمال است. کدام گزینه را برای درمان انتخاب می کنید؟
الف	آموکسی سیلین کلارولونات + آزیترومایسین
ب	وانکومایسین + کلاریترومایسین
ج	لووفلوکساسین + کلیندامایسین
د	سیپروفلوکساسین + سفیکسیم

عفونی	
۱۲۸	شایعترین تظاهر بالینی عفونت گونوکوکی منتشر کدام است؟
الف	سوزش ادرار و ترشح از پیشابراه
ب	خارش در تمام بدن و کهیر
ج	کاهش وزن و سردرد
د	تب و لرز ، بتورات جلدی و علائم مفصلی

عفونی	
۱۲۹	در مورد زن ۴۱ ساله که در اورژانس تحت بررسی است و سابقه بیماری قبلی ندارد ، کدام نشانه برای تشخیص سپسیس استفاده نمیشود؟
الف	تب
ب	تاکی پنه
ج	تاکی کاردی
د	افت فشارخون

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عفونی	
۱۳۰	در مورد درمان دارویی زونا کدام مورد صحیح است؟
الف	در درگیری صورت، درمان آسیکلوویر به صورت وریدی آغاز میشود
ب	جهت کاهش التهاب در دو روز اول استروئید و در روزهای بعد درمان ضد ویروسی داده میشود
ج	در درمان درد این بیماری میتوان از پیرگابالین یا آمی تریپتیلین استفاده نمود
د	در دریافت کننده پیوند کبد درمان زونا با آسیکلوویر خوراکی و موضعی صورت میگیرد

رادیولوژی	
۱۳۱	مدالیتی تصویر برداری اصلی در بررسی آسیب تروماتیک مجرای ادراری (urethra) کدام مورد می باشد؟
الف	CT-cystogram
ب	MRI
ج	IVP
د	RUG

رادیولوژی	
۱۳۲	کدام گزینه زیر جهت افتراق پنوموتوراکس از بولا کمک کننده است؟
الف	عدم رویت vascular marking
ب	دیدن thin white line
ج	دانسیته ضایعه
د	تحدب پلور به موازات قفسه سینه

رادیولوژی	
۱۳۳	کدام گزینه در مورد سودوتومور فیشرال نادرست است؟
الف	تقریبا همیشه در بیماران دچار نارسایی قلبی مشاهده می شود.
ب	ماهیت ترنسودا دارند
ج	با تغییر پوزیشن بیمار جابجا می شوند
د	نام دیگر آنها "تومورهای ناپدیدشونده" است.

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رادیولوژی		
کدام گزینه جزء تومورهای شایع مדיاستن قدامی قرار نمی گیرد؟		۱۳۴
الف	لنفوم هوچکین	
ب	تومورهای نوروژنیک	
ج	تیموما	
د	تراتوما	

رادیولوژی		
کدام یک از موارد زیر کنتراندیکاسیون انجام MRI می باشد؟		۱۳۵
الف	سنگ کیسه صفرا	
ب	پرولاپس میترال	
ج	پروتز حلزون گوش	
د	آنوریسم آئورت	

رادیولوژی		
جهت بررسی نوموپریتوئن در بیمار بستری در ICU کدام نمای رادیولوژی شکم مناسب است؟		۱۳۶
الف	Antero - posterior upright	
ب	Left lateral decubitus	
ج	lateral upright view	
د	Abdominal supine view	

آسیب شناسی		
کدامیک از موارد زیر مربوط به کولیت میکروسکوپی نمی باشد؟		۱۳۷
الف	اسهال آبکی و مزمن	
ب	نمای رادیولوژی طبیعی	
ج	امکان همراهی با بیماری سلیاک	
د	کاهش وزن	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آسیب شناسی	
۱۳۸	در بررسی مغز استخوان بیمار مبتلا به هپاتواسپلنومگالی سلول های با سائز ۱۰۰ میکرومتر با نمای سیتوپلاسمی شبیه دستمال کاغذی چروکیده و فاقد واکوئل مشاهده می شود. تشخیص کدام است؟
الف	بیماری گوشه
ب	بیماری نیمین پیک نوع A
ج	بیماری تای ساکس
د	بیماری فون ژیرکه

آسیب شناسی	
۱۳۹	در بررسی یک لوب تیروئید مربوط به خانم ۲۰ ساله یک توده کپسولدار حاوی فولیکولهای کوچک و استرومای ظریف فیبروواسکولار مشاهده می شود ولی تهاجم به کپسول و عروق اطراف توده مشاهده نمی شود. یافته های فوق با کدام حالت تیروئید مطابقت دارد؟
الف	Thyroid Adenoma
ب	Follicular Carcinoma
ج	Hyperplastic Nodule
د	Medullary Carcinoma

آسیب شناسی	
۱۴۰	یک خانم ۲۵ ساله بدنبال هر بار عفونت تنفسی دچار ادرار خونی می شود. در بیوپسی کلیه، اتساع و پرسلولی فضاهای مزانژیال گلومرولها دیده می شود. یافته های فوق با کدام بیماری گلومرولار کلیه مطابقت دارد؟
الف	Membranous Nephropathy
ب	Minimal Change Disease
ج	Membranoproliferative Glomerulonephritis
د	IgA nephropathy

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آسیب شناسی	
۱۴۱	در مورد انفارکتوس کدام عبارت زیر نادرست است؟
الف	نحوه خونرسانی مهمترین عامل تعیین احتمال انفارکتوس است
ب	انسداد ورید در ارگانی که یک ورید تخلیه کننده دارد انفارکتوس سفید ایجاد می کند
ج	انفارکتوس کلیه سفید می باشد
د	انفارکتوس ریه قرمز است

آسیب شناسی	
۱۴۲	مرد ۶۰ ساله ای با درد و تغییر شکل استخوان های ران و لگن طی چند سال اخیر مراجعه کرده است. او اخیراً دچار شکستگی استخوان فمور شده است. در آزمایش ها، آکالین فسفاتاز سرمی به طور قابل توجهی افزایش یافته اما سطح کلسیم و فسفر طبیعی است. در بررسی میکروسکوپی، نمای موزاییکی استخوان دیده می شود. کدامیک از گزینه های زیر با پاتوژنز بیماری تطابق بیشتری دارد؟
الف	افزایش فعالیت استئوبلاست ها در مراحل اولیه بیماری
ب	کاهش فعالیت استئوکلاست ها در اثر جهش ژنتیکی
ج	افزایش فعالیت استئوکلاست ها به دنبال عفونت و بیروسی
د	کاهش تولید ماتریکس کلاژنی توسط استئوسیت ها

آسیب شناسی	
۱۴۳	زن ۵۵ ساله ای با سابقه طولانی بیماری کلیوی و تحت دیالیز، به دلیل شکستگی خودبه خودی استخوان رادیوس مراجعه کرده است. رادیولوژی نواحی کیستیک در متافیز استخوان رادیوس نشان می دهد. در آزمایش ها، کلسیم سرم کاهش یافته، فسفر افزایش یافته، و سطح PTH بسیار بالا گزارش شده است. در معاینه هیستوپاتولوژیک، سلول های استئوکلاست با حاشیه برجسته و فضای استخوانی در حال تخریب مشاهده شده اند. این یافته ها به احتمال زیاد نشان دهنده کدامیک از تشخیص های زیر است؟
الف	پوکی استخوان ناشی از یائسگی
ب	استئومالاسی به دلیل کمبود ویتامین D
ج	بیماری پاژه در مراحل پیشرفته
د	استئودیستروفی ناشی از هیپرپاراتیروئیدی ثانویه

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آسیب شناسی	
۱۴۴	خانم ۲۱ ساله ای با ضایعات قهوه ای رنگ متعدد در نواحی پشت و اندام ها مراجعه کرده است. در برش میکروسکوپی از ضایعات فوق افزایش ملانوسیت ها در لایه بازال اپیدرم همراه با هیپرکروم شدن هسته سلول ها و تغییرات اتیپیک و میتوز مشاهده گردید. در قسمت بالایی درم مقدار کمی فیبروز همراه با ارتشاح سلول های التهابی لنفوسیتی مشاهده شد. یافته های فوق با کدام نوع نووس مطابقت دارد؟
الف	بلو
ب	جانکشنال
ج	دیسپلاستیک
د	اینترادرمال

آسیب شناسی	
۱۴۵	اقای ۶۰ ساله ای با توده ای در بیضه راست مراجعه کرده است. در برش میکروسکوپی دستجات سلولهای تومورال چند وجهی مشاهده گردید که دارای سایز کوچک و متوسط و بزرگ بودند. در اطراف این دستجات سلولی، سلولهای التهابی لنفوسیتی مشاهده نگردید. افزایش تومور مارکرهای سرمی نیز گزارش نگردید. تشخیص چیست؟
الف	کوربوکارسینوم
ب	کارسینوم امبریونال
ج	تومور کیسه زرده
د	سمینوم اسپرماتوسیتیک

روان پزشکی	
۱۴۶	بر اساس مطالعه ی با جهانی بیماریها در سال ۱۹۹۰ اولین علت سالهای سپری شده با ناتوانی کدام گزینه است؟
الف	بیماریهای قلبی - عروقی
ب	افسردگی اساسی
ج	اسکیزوفرنیا
د	بیماریهای انسدادی مزمن ریه

روان پزشکی	
۱۴۷	خانم جوانی به درمانگاه روانپزشکی مراجعه کرده است. حین مصاحبه از خلق افسرده، کاهش تمرکز، کاهش خواب و کاهش اشتها شاکی است، بیمار ذکر می کند از زندگی خسته شده است و قصد خودکشی با قرص های مادرش را دارد. در سابقه بیمار یک نوبت بستری در بخش روانپزشکی وجود دارد. علایم حین بستری شامل پرخاشگری شدید، کاهش نیاز به خواب، پر حرفی و افزایش انرژی بوده است. تشخیص بیمار کدام است؟
الف	(MDD) اختلال افسردگی اساسی
ب	(BMD Type I) اختلال دوقطبی نوع یک
ج	(BMD Type II) اختلال دوقطبی نوع دو
د	(Cyclothymia) سیکلوتایمی

روان پزشکی	
۱۴۸	جوان ۲۶ ساله ای را با علائم پرخاشگری شدید، لفظی و فیزیکی، هذیان بزرگ منشی و توهم شنیداری، هیپرتانسیون و میدریازیس به اورژانس آورده اند. پس از بستری در اورژانس و اقدامات درمانی علائم بیمار بهبود می یابد ولی طی روزهای بعد، از پر خوابی، پراشتهائی، احساس خستگی و کندی روانی حرکتی شکایت دارد. جهت درمان نگهدارنده کدام گزینه توصیه می گردد؟
الف	بوپروپیون
ب	پاروکستین
ج	الانزپین
د	نورتریپتیلین

روان پزشکی	
۱۴۹	آقای ۲۳ ساله ای از چندین سال قبل، از سوار شدن هواپیما اجتناب می ورزد. ایشان ذکر می کنند که هنگام ورود به هواپیما به دلیل ترس و نگرانی شدید از خرابی و سقوط هواپیما دچار تپش قلب زیاد، سنگینی قفسه سینه، تعریق، احساس گیجی و منگی می گردد. کدام اختلال مطرح می باشد؟
الف	آگورافوبیا
ب	پانیک
ج	فوبیای خاص
د	وسواس جبری

روان پزشکی		
۱۵۰	در مرد جوان مبتلا به اسکیزوفرنیا با شکایت از impotence (ناتوانی جنسی) کدامیک از آنتی سابتوتیک های زیر مناسب تر می باشد؟	
الف	آری پیرازل	
ب	رسپریدون	
ج	هالوپریدل	
د	فلوفنازین	

روان پزشکی		
۱۵۱	آقای ۶۷ ساله ای بستری در بخش داخلی طی چند روز اخیر دچار نوسان در سطح هوشیاری گردیده است . به طوریکه حین عصر و شب تغییرات شناختی بیشتری مانند اختلال حافظه و جهت یابی نیز اضافه می گردد . وی دچار بی قراری قابل توجهی شده و گهگاهی تصاویری را می بیند که واقعیت ندارند. محتمل ترین تشخیص چیست ؟	
الف	اسکیزوفرنیا	
ب	اختلال خلقی دوقطبی نوع ۱ همراه علائم سایکوتیک	
ج	دلیریوم	
د	دمانس حاد	

روان پزشکی		
۱۵۲	خانم جوانی به دنبال از دست دادن اعضای خانواده در یک تصادف دچار هذیان ، توهم و گفتار آشفته گردیده است و پس از سه هفته به طور کامل بهبود می یابد . کدام تشخیص مطرح است ؟	
الف	Schizophreniform disorder	
ب	Schizoaffective disorder	
ج	Brief psychotic disorder	
د	Delusional disorder	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پوست	
۱۵۳	کودک ۳ ساله با ضایعات پاپولوپوسچولار ژنرالیزه و درگیری کف دست و پا و صورت از یکماه پیش به کلینیک ارجاع شده است. ضایعات شدیداً خارش دار هستند. ضایعات مشابه در پدر و مادر کودک نیز دیده می شود. بهترین درمان در این کودک کدام است؟
الف	لوسیون لیندان
ب	سولفور ده درصد
ج	کرم بتامتازون و شربت هیدروکسی زین
د	ایورمکتین خوراکی

پوست	
۱۵۴	آقای جوانی با یک پلاک زخمی که از ۲ ماه قبل بر روی صورت به دنبال مسافرت به اطراف اصفهان ایجاد شده ، مراجعه نموده است. در اسمیر از ضایعه، ارگانیزم عامل بیماری درون هیستوسیت ها دیده شد. بهترین درمان کدام است؟
الف	آسیکلوویر
ب	استروئید سیستمیک
ج	ترکیبات آنتی موان
د	سفالکسین

پوست	
۱۵۵	کدام مورد در آلوپسی آره آتا با پروگنوز بهتری همراه است؟
الف	شروع بیماری در کودکی
ب	همراهی با آتوپی
ج	درگیری ناخن
د	آلوپسی ناحیه صورت و ریش

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پوست	
۱۵۶	تمام گزینه ها در مورد بیماری ویتیلیگو صحیح است بجز؟
الف	درمعاینه با لامپ وود به نحو مشخصی سفیدی و بازتابنده نور ظاهر می شود
ب	بهبود ضایعات با فعال شدن و مهاجرت سلول های ذخیره ی ملانوسیتی در فولیکول مو اتفاق می افتد.
ج	NB-UVB انتخاب اول در ویتیلیگو ژنرالیزه است .
د	NB-UVB در کودکان و زنان باردار و شیرده قابل استفاده نیست.

پوست	
۱۵۷	خانم جوانی با آکنه صورت تحت درمان با ایزوترتینوئین خوراکی می باشد . چه مدت بعد از قطع درمان حاملگی <u>منعی ندارد</u> ؟
الف	یک ماه
ب	سه ماه
ج	یک سال
د	شش ماه

پوست	
۱۵۸	بیمار خانم ۵۲ ساله ای ضایعات کهیری و تاولهای سفت در نواحی مختلف پوست بدن دارد. در بیوپسی، تاول زیر اپیدرم به همراه ارتشاح ائوزینوفیل و در آزمایش ایمنوفلورسانس مستقیم، رسوب C3 و IgG در ناحیه غشاء پایه گزارش شده است. در مورد این بیماری کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف	درگیری مخاطی در بیش از ۹۰ درصد بیماران وجود دارد.
ب	خط اول درمان، آنتی بیوتیک به همراه آنتی هیستامین می باشد.
ج	خارش در اکثر بیماران وجود دارد.
د	وجود آنتی بادی در گردش ضد BP180 با پروگنوز بهتری همراه است.

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پوست	
در تشخیص درماتیت آتوپیک کدام یک جز معیار <u>مینور</u> محسوب میشود؟	۱۵۹
الف	خارش
ب	خشکی
ج	شرح حال قوی در سایر اعضای خانواده
د	شکل و انتشار ضایعات

جراحی استخوان و مفاصل	
در افتراق لنگش نوروژنیک از لنگش عروقی تمامی موارد زیر به نفع لنگش نوروژنیک می باشد <u>بجز</u> ؟	۱۶۰
الف	طی کردن فاصله ی ثابت و شروع لنگش
ب	کاهش درد بدنبال خم شدن به سمت جلو
ج	افزایش درد هنگام پایین رفتن از سرپایینی
د	عدم بهبود درد با ایستادن به تنهایی

جراحی استخوان و مفاصل	
پسر ۱۴ ساله فوتبالیست با شکایت صدای زانو هنگام فعالیت روزمره به شما مراجعه کرده است. در رادیوگرافی انجام شده پهن شدگی بخش لترال فضای مفصلی زانوی چپ مشهود است. مناسب ترین مدالیته تشخیص بیمار چه می باشد؟	۱۶۱
الف	سی تی اسکن زانو با بازسازی سه بعدی
ب	MRI زانو
ج	انجام رادیوگرافی استرس زانو
د	اسکن استخوان

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی استخوان و مفاصل	
۱۶۲	کدام یک از انواع شکستگی زیر جزء شکستگی های ناپایدار حلقه لگن محسوب می شود؟
الف	Straddle fracture
ب	ASIS avulsion fracture with 2cm displacement
ج	Left isolated iliac wing fracture
د	Right inferior and superior ramus fracture

جراحی استخوان و مفاصل	
۱۶۳	در مقایسه شکستگی اینترتروکانتریک با شکستگی گردن فمور تمام موارد زیر صحیح می باشد بجز؟
الف	احتمال Non-union کمتر در شکستگی اینترتروکانتریک
ب	احتمال نکروز واسکولار بیشتر در شکستگی گردن فمور
ج	چرخش ران به خارج بیشتر در شکستگی اینترتروکانتریک
د	پروگنوز بدتر پس از جراحی در شکستگی گردن فمور

جراحی استخوان و مفاصل	
۱۶۴	پسر ۲۲ ساله بسکتبالیست با شکایت دررفتگی مکرر شانه راست به کلینیک مراجعه کرده است. اولین نوبت دررفتگی شانه در سن ۱۸ سالگی هنگام انجام ورزش بوده که جهت جاناندازی به اورژانس مراجعه کرده است. مناسب ترین اقدام درمانی کدام گزینه می باشد؟
الف	بی حرکتی شانه به مدت ۳ هفته
ب	تزریق داخل مفصل شانه
ج	فیزیوتراپی شانه
د	عمل جراحی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی استخوان و مفاصل		
تمامی موارد زیر با دیسپلازی تکاملی مفصل ران (DDH) همراهی دارند <u>بجز</u> ؟	۱۶۵	
Club foot	الف	
Torticollis	ب	
Metatarsus adductus	ج	
Calcaneo- valgus	د	

جراحی استخوان و مفاصل		
در آسیب عصبی Posterior interosseous nerve عملکرد کدام عضله از افتادگی کامل مچ دست جلوگیری می کند ؟	۱۶۶	
عضلات بازکننده ی اولنار مچ دست Extensor carpi ulnaris	الف	
عضله بازکننده رادیال بلند Extensor carpi radialis longus	ب	
عضله بازکننده مشترک انگشتان Extensor digitorum communis	ج	
عضله بازکننده شست دست Extensor pollicis longus	د	

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی		
آقای ۴۰ ساله ای به دلیل نعوظ طول کشیده آلت تناسلی بدون تحریک جنسی به مدت ۶ ساعت به شما مراجعه کرده است. بیمار درد آلت تناسلی ندارد. در سونوگرافی داپلر انجام شده از عروق آلت وی جریان خون در عروق گزارش شده است. در شرح حال وی سابقه تروما به پرینه ذکر میشود. اولین اقدام درمانی برای این بیمار چیست؟	۱۶۷	
کمپرس یخ بر روی آلت تناسلی	الف	
شستشوی اجسام غاری	ب	
تزریق فنیل افرین داخل اجسام غاری	ج	
شانست دیستال	د	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی		
دقیق ترین و کاملترین بررسی تصویر برداری سیستم ادراری چیست؟		۱۶۸
الف	سونوگرافی	
ب	سی تی یوروگرافی	
ج	ام آر آی	
د	اسکن هسته ای	

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی		
علامت سر مار کبری در پایلوگرافی داخل وریدی (IVP) نشانه کلاسیک کدام ناهنجاری مادرزادی سیستم ادراری میباشد؟		۱۶۹
الف	مگایورتر	
ب	یورتروسل	
ج	انسداد محل اتصال حالب به لگنچه (UPJO)	
د	حالب اکتوپیک	

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی		
کدام سنگ سیستم ادراری حتی در سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق نیز ممکن است مشاهده نشود؟		۱۷۰
الف	سنگهای سیستمینی	
ب	سنگ ماتریکسی	
ج	سنگهای آمونیوم اورات	
د	سنگهای ایندیناویری	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی	
۱۷۱	کدام گزینه کنتراندیکاسیون مطلق استفاده از ب.ث.ژ داخل مثانه ای در بیمار مبتلا به سرطان مثانه می باشد؟
الف	بی اختیاری کامل ادرار
ب	سن بالا
ج	عفونت ادراری
د	بیماری کبدی

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی	
۱۷۲	آقای ۲۵ ساله بدنبال تصادف دچار شکستگی لگن و قطع مجرای ادراری شده است. در بررسی های انجام شده متوجه قطع شدگی کامل مجرای ادراری در مجرای خلفی میشویم اما آسیب به دیگر ارگانها وارد نشده است. درمان مناسب برای این فرد کدام گزینه میباشد؟
الف	درمان اولیه به روش جراحی باز
ب	درمان تاخیری به روش های آندوسکوپیک
ج	درمان اولیه به روش های آندوسکوپیک
د	درمان تاخیری به روش جراحی باز

چشم پزشکی	
۱۷۳	نوزاد ۴ روزه که حاصل زایمان طبیعی بوده است، بدلیل تورم پلک ها و ترشحات چرکی فراوان از هر دو چشم ارجاع شده است. در معاینه ترشحات چرکی سبز رنگ همراه با تورم شدید ملتحمه و بدون درگیری قرنیه دیده می شود. علاوه بر توصیه به شستشوی مکرر چشم ها با نرمال سالین کدام اقدام ضرورت بیشتری دارد؟
الف	تجویز قطره چشمی سولفاستامید ۱۰٪
ب	تزریق یک دوز سفتریاکسون عضلانی
ج	بستری نوزاد و تزریق وریدی سفتریاکسون هر ۱۲ ساعت تا ۳ روز
د	تجویز اریتروماکسین خوراکی

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چشم پزشکی		
طول قدامی خلفی چشم نرمال ۲۴ میلی متر است اگر چشمان یک فردی دارای طول قدامی خلفی ۲۶ میلی متر باشد عیب انکسار بیمار با کدام عینک اصلاح می شود؟		۱۷۴
الف	محدب ۳ دیوپتر	
ب	مقعر ۳ دیوپتر	
ج	محدب ۶ دیوپتر	
د	مقعر ۶ دیوپتر	

چشم پزشکی		
ترشحات کدامیک از غدد سیستم اشکی از تبخیر اشک جلوگیری می کند؟		۱۷۵
الف	غدد کروز	
ب	غده اشکی اصلی	
ج	غدد میومین	
د	سلول های گابلت	

چشم پزشکی		
جوان ۱۸ ساله ای با کاهش دید دو چشم مراجعه می کند در معاینه بیمار مبتلا به میوپی آستیگماتیسم نامنظم دو چشم می باشد در رتینوسکوپی Red reflex نامنظم است در عمق استروما خطوط Vogt's دیده می شود و دید بیمار با عینک اصلاح کامل نمی شود برای متوقف کردن پیشرفت بیماری کدام اقدام درمانی ارجح است؟		۱۷۶
الف	Cross linking	
ب	تجویز لنز سخت	
ج	کارگزاری حلقه داخل استروما	
د	پیوند لایه ای قرنیه	

چشم پزشکی		
۱۷۷	والدین کودک ۱ ساله ای فرزند خود را به دلیل انحراف چشم ها به داخل نزد شما آورده اند در معاینات اولیه حرکات چشمی نرمال بوده و مختصری از اسکلرای نزال توسط چین اپی کانتال پوشیده شده است . در معاینه با چراغ قوه زمانی که کودک به نور نگاه می کند ، رفلکس های نوری قرنیه در دو چشم یکسان و در مرکز می باشند کدام اقدام صحیح می باشد ؟	
الف	درخواست مشاوره نورولوژی اطفال	
ب	ارجاع جهت جراحی استرایسیم	
ج	اطمینان دادن به والدین و صبر کردن	
د	تجویز پریزم و درمان تنبلی چشم	

چشم پزشکی		
۱۷۸	در بیمار مبتلا به دژنرسانس وابسته به سن ماکولا، انجام کدام تست به صورت دوره ای توسط فرد می تواند پیدایش عروق جدید را نشان دهد ؟	
الف	Ishihara	
ب	Amsler grid	
ج	Goldman perimetry	
د	Orbcan	

گوش و حلق و بینی		
۱۷۹	کدام ضایعه دهانی زیر با Epstein-Barr virus ارتباط بیشتری دارد؟	
الف	Oral Hairy Leukoplaki	
ب	Hairy Tongue	
ج	Leukoplakia	
د	Lichen Planus	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گوش و حلق و بینی		
در بیمار مبتلا به افت شنوایی ناگهانی کدام درمان مناسب تر است؟		۱۸۰
الف	آنتی کوآگولان	
ب	استروئید	
ج	آنتی ویرال	
د	وازدیلاتور	

گوش و حلق و بینی		
کدام جمله زیر در ارتباط با شکستگی های بینی صحیح است؟		۱۸۱
الف	بعد از شکستگی مندیبل شایعترین علت شکستگی صورت است.	
ب	جا اندازی بسته ممکن است نیاز به ترمیم تاخیری را کاهش دهد.	
ج	در موارد شکستگی بسته نیاز به جراحی باز نمی باشد.	
د	هدف از درمان صرفا رفع مشکلات زیبا شناختی است .	

گوش و حلق و بینی		
شایعترین علت افت شنوایی با منشا ژنتیک از کدام الگوی توارث تبعیت می کند؟		۱۸۲
الف	اتوزوم غالب	
ب	وابسته به X غالب	
ج	وابسته به X مغلوب	
د	اتوزوم مغلوب	

گوش و حلق و بینی		
طی درمان کروپ، عارضه ریباند به دنبال کدام یک از موارد زیر ایجاد می گردد؟		۱۸۳
الف	ایپی نفرین راسمیک	
ب	استروئید استنشاقی	
ج	استروئید تزریقی	
د	اکسیژن با ماسک	

گوش و حلق و بینی	
کدام مورد زیر اندیکاسیون جراحی برای درمان لارنگومالاسی می باشد؟	۱۸۴
الف	سرفه های مکرر
ب	حملات سیانوز
ج	تنگی نفس موقع تغذیه
د	تداوم علائم برای بیش از یک ماه

آمار و اپیدمیولوژی																																																
مادری دختر خود را جهت پایش رشد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ به مرکز بهداشتی درمانی آورده است، تاریخ تولد کودک ۱۳۹۷/۰۸/۰۸، قد او ۱۱۵ سانتی متر و وزن او ۲۳ کیلوگرم می باشد با توجه به جدول صدک BMI وضعیت رشد کودک چگونه است؟	۱۸۵																																															
BMI-for-age GIRLS																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Year/m onth</th> <th colspan="5">Percentile(BMI in Kg/m²)</th> </tr> <tr> <th>5th</th> <th>50th</th> <th>75th</th> <th>85th</th> <th>95th</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5:3</td> <td>13.1</td> <td>15.2</td> <td>16.3</td> <td>16.9</td> <td>18.1</td> </tr> <tr> <td>5:4</td> <td>13.1</td> <td>15.2</td> <td>16.3</td> <td>17</td> <td>18.2</td> </tr> <tr> <td>5:9</td> <td>13.1</td> <td>15.3</td> <td>16.4</td> <td>17</td> <td>18.3</td> </tr> <tr> <td>6:3</td> <td>13.1</td> <td>15.3</td> <td>16.4</td> <td>17.1</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>6:4</td> <td>13.1</td> <td>15.3</td> <td>16.5</td> <td>17.2</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>6:9</td> <td>13.1</td> <td>15.4</td> <td>16.6</td> <td>17.3</td> <td>18.7</td> </tr> </tbody> </table>		Year/m onth	Percentile(BMI in Kg/m ²)					5th	50th	75th	85th	95th	5:3	13.1	15.2	16.3	16.9	18.1	5:4	13.1	15.2	16.3	17	18.2	5:9	13.1	15.3	16.4	17	18.3	6:3	13.1	15.3	16.4	17.1	18.5	6:4	13.1	15.3	16.5	17.2	18.5	6:9	13.1	15.4	16.6	17.3	18.7
Year/m onth	Percentile(BMI in Kg/m ²)																																															
	5th	50th	75th	85th	95th																																											
5:3	13.1	15.2	16.3	16.9	18.1																																											
5:4	13.1	15.2	16.3	17	18.2																																											
5:9	13.1	15.3	16.4	17	18.3																																											
6:3	13.1	15.3	16.4	17.1	18.5																																											
6:4	13.1	15.3	16.5	17.2	18.5																																											
6:9	13.1	15.4	16.6	17.3	18.7																																											
الف	لاغر است																																															
ب	طبیعی است																																															
ج	اضافه وزن دارد																																															
د	چاق است																																															

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آمار و اپیدمیولوژی		
۱۸۶	خانم ۴۰ ساله‌ای جهت غربالگری کانسر برست به پزشک مراجعه می‌کند، سابقه سرطان پستان در ۳۵ سالگی در خواهر بیمار وجود دارد و در بررسی ژنتیکی، این خانم BRCA1+ بوده است، بهترین توصیه برای غربالگری کانسر برست در این بیمار کدام است؟	
	الف	MRI
	ب	ماموگرافی
	ج	سونوگرافی
	د	ماموگرافی و MRI

آمار و اپیدمیولوژی		
۱۸۷	اعمال سختگیرانه قوانین رانندگی در حوادث جاده‌ای کدام سطح پیشگیری در حوادث جاده‌ای محسوب می‌شود؟	
	الف	ابتدایی
	ب	اولیه
	ج	ثانویه
	د	ثالثیه

آمار و اپیدمیولوژی		
۱۸۸	سه هفته بعد از جاری شدن سیل در یک منطقه روستایی، تعدادی از ساکنین روستا دچار علائم بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ و زردی شده و ۵ زن باردار بر اثر ابتلا فوت کردند احتمال ابتلا به کدام بیماری در آن‌ها بیشتر است؟	
	الف	هپاتیت A
	ب	هپاتیت B
	ج	هپاتیت D
	د	هپاتیت E

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آمار و اپیدمیولوژی	
۱۸۹	سطح هورمون TSH در نمونه‌ای از ۴ کودک عبارت است از: 2.8, 1.5, 3.2, 2.5 انحراف استاندارد مقادیر TSH تقریباً چقدر است؟
الف	0.5
ب	0.7
ج	1.29
د	1.3

آمار و اپیدمیولوژی	
۱۹۰	برای انجام آزمون مقایسه میانگین فشارخون افراد در دو گروه مداخله دارویی با فرض نرمال بودن اندازه‌های فشارخون چه آزمونی مناسب می‌باشد؟
الف	آزمون T مستقل
ب	آزمون رتبه علامت ویلکاکسون
ج	آزمون T وابسته (زوج شده)
د	تحلیل واریانس

فارماکولوژی	
۱۹۱	کدام داروی زیر با ایجاد هایپوکالمی باعث افزایش سمیت دیگوکسین می‌شود؟
الف	اپرنول
ب	اینداپامید
ج	کینیدین
د	آمیودارون

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فارماکولوژی		
بیماری در نتیجه مصرف یک دیورتیک دچار اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک شده است، این بیمار کدام داروی زیر را مصرف می کند؟	۱۹۲	
الف	استازولامید	
ب	مانیتول	
ج	فورزماید	
د	آمیوراید	

فارماکولوژی		
کدام یک از داروهای زیر عمدتاً از طریق کاهش تولید و ترشح VLDL از کبد اثر کاهنده چربی خون را ایفا می کند؟	۱۹۳	
الف	لومیتاپاید	
ب	ایولوکومب	
ج	ارلیستات	
د	میپومرسن	

فارماکولوژی		
یک پسر ۳ ساله با نارسایی رشد و اختلال متابولیک یک موتاسیون غیرفعال کننده در ژنی که GHR را کد میکند، مراجعه میکند. کدام دارو را برای بهبود رشد و عملکرد متابولیک توصیه می کنید؟	۱۹۴	
الف	اکترئوتاید	
ب	بروموکریپتین	
ج	مکاسرمین	
د	سوماتروپین	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فارماکولوژی		
۱۹۵	در مرد ۷۸ ساله ای ترومبوز ورید عمقی تشخیص داده می شود. بیماری تاریخچه ترومبوسیتوپنی ایجاد شده توسط هپارین داد. کدام یک از داروهای زیر مناسب ترین داروی تزریقی برای این بیمار می باشد؟	
الف	وارفارین	
ب	آبسیکسیماب	
ج	کلوپیدوگرل	
د	آرگاتروبان	

فارماکولوژی		
۱۹۶	اگر به بیماری که تحت درمان با فلوکستین است داروی فنلزین داده شود کدام یک از مشکلات زیر محتمل است؟	
الف	کاهش در سطح پلاسمایی فلوکستین	
ب	آنتاگونیسم اثر ضد افسردگی فلوکستین	
ج	بیقراری، سفتی عضلانی، هاپیترمی، تشنج	
د	کاهش متابولیسم فلوکستین	

فارماکولوژی		
۱۹۷	کدامیک از داروهای زیر از طریق مهار آنزیم نورآمینیداز در درمان آنفلوانزای فصلی موثر می باشد؟	
الف	زانامیویر	
ب	آمانتادین	
ج	آسیکلوویر	
د	اینداناویر	

آزمون میان دوره پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اخلاق پزشکی		
ارزش های اخلاقی در حیطه پیشرفت های وسیع علمی و فناوری ...		۱۹۸
الف	از ارکان Morality است.	
ب	از ارکان Ethics است.	
ج	از ارکان Medical Ethics است.	
د	از ارکان Bioethics است.	

اخلاق پزشکی		
به گونه ای عمل کن که دستورالعمل تو بتواند تا سرحد قانون کلی اعتبار یابد " این عبارت از کیست ؟		۱۹۹
الف	کانت	
ب	بنتام	
ج	ارسطو	
د	استوارت	

اخلاق پزشکی		
کدام وظایف از احترام به اتونومی بیمار ناشی می شود؟		۲۰۰
الف	جبران خسارت	
ب	رعایت انصاف	
ج	رازداری	
د	وفای به عهد	

کلید اولیه آزمون پیش کارورزی - بدون سوالات دروس شناور - آذرماه ۱۴۰۳

۳	۱۵۱	۳	۱۰۱	۱	۵۱	۲	۱
۳	۱۵۲	۳	۱۰۲	۴	۵۲	۱	۲
۲	۱۵۳	۴	۱۰۳	۳	۵۳	۱	۳
۳	۱۵۴	۱	۱۰۴	۳	۵۴	۳	۴
۴	۱۵۵	۲	۱۰۵	۳	۵۵	۳	۵
۴	۱۵۶	۲	۱۰۶	۲	۵۶	۴	۶
۱	۱۵۷	۳	۱۰۷	۳	۵۷	۴	۷
۳	۱۵۸	۱	۱۰۸	۲	۵۸	۱	۸
۲	۱۵۹	۴	۱۰۹	۱	۵۹	۴	۹
۱	۱۶۰	۱	۱۱۰	۱	۶۰	۱	۱۰
۲	۱۶۱	۱	۱۱۱	۱	۶۱	۲	۱۱
۱	۱۶۲	۳	۱۱۲	۴	۶۲	۱	۱۲
۴	۱۶۳	۴	۱۱۳	۳	۶۳	۲	۱۳
۴	۱۶۴	۳	۱۱۴	۴	۶۴	۳	۱۴
۱	۱۶۵	۳	۱۱۵	۱	۶۵	۳	۱۵
۲	۱۶۶	۱	۱۱۶	۴	۶۶	۴	۱۶
۱	۱۶۷	۴	۱۱۷	۲	۶۷	۳	۱۷
۲	۱۶۸	۱	۱۱۸	۳	۶۸	۱	۱۸
۲	۱۶۹	۴	۱۱۹	۱	۶۹	۱	۱۹
۴	۱۷۰	۴	۱۲۰	۳	۷۰	۳	۲۰
۱	۱۷۱	۴	۱۲۱	۲	۷۱	۲	۲۱
۴	۱۷۲	۳	۱۲۲	۴	۷۲	۳	۲۲
۲	۱۷۳	۲	۱۲۳	۳	۷۳	۲	۲۳
۴	۱۷۴	۲	۱۲۴	۳	۷۴	۳	۲۴
۳	۱۷۵	۳	۱۲۵	۲	۷۵	۳	۲۵
۱	۱۷۶	۱	۱۲۶	۲	۷۶	۱	۲۶
۳	۱۷۷	۱	۱۲۷	۱	۷۷	۳	۲۷
۲	۱۷۸	۴	۱۲۸	۳	۷۸	۲	۲۸
۱	۱۷۹	۱	۱۲۹	۱	۷۹	۴	۲۹
۲	۱۸۰	۳	۱۳۰	۱	۸۰	۱	۳۰
۲	۱۸۱	۴	۱۳۱	۴	۸۱	۱	۳۱
۴	۱۸۲	۴	۱۳۲	۲	۸۲	۲	۳۲
۱	۱۸۳	۳	۱۳۳	۲	۸۳	۳	۳۳
۲	۱۸۴	۲	۱۳۴	۳	۸۴	۳	۳۴
۳	۱۸۵	۳	۱۳۵	۳	۸۵	۲	۳۵
۴	۱۸۶	۲	۱۳۶	۱	۸۶	۴	۳۶
۲	۱۸۷	۴	۱۳۷	۳	۸۷	۱	۳۷
۴	۱۸۸	۱	۱۳۸	۲	۸۸	۲	۳۸
۲	۱۸۹	۱	۱۳۹	۲	۸۹	۳	۳۹
۱	۱۹۰	۴	۱۴۰	۴	۹۰	۲	۴۰
۲	۱۹۱	۲	۱۴۱	۱	۹۱	۴	۴۱
۴	۱۹۲	۳	۱۴۲	۳	۹۲	۳	۴۲
۱	۱۹۳	۴	۱۴۳	۲	۹۳	۳	۴۳
۳	۱۹۴	۳	۱۴۴	۳	۹۴	۱	۴۴
۴	۱۹۵	۴	۱۴۵	۲	۹۵	۲	۴۵
۳	۱۹۶	۲	۱۴۶	۱	۹۶	۴	۴۶
۱	۱۹۷	۲	۱۴۷	۱	۹۷	۲	۴۷
۴	۱۹۸	۱	۱۴۸	۱	۹۸	۲	۴۸
۱	۱۹۹	۳	۱۴۹	۴	۹۹	۱	۴۹
۳	۲۰۰	۱	۱۵۰	۲	۱۰۰	۴	۵۰