

پاسخ تشریحی

آزمون سراسری سال ۱۴۰۳

(تیر ماه ۱۴۰۳)

گروه آزمایشی علوم ریاضی

(خارج کشور)

ریاضیات

۱- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۱ (درس ۱، فصل ۱)

نکته: به طور کلی در هر معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ اگر جمع ریشه‌ها S و ضرب ریشه‌ها P باشد، این روابط برقرار است.

$$S = -\frac{b}{a}, \quad P = \frac{c}{a}$$

راه حل اول:

می‌دانیم قدرنسبت دنباله هندسی برابر تقسیم دو جمله متوالی است. پس اگر دنباله مورد نظر را a_n با قدرنسبت r بنامیم، داریم:

$$r = \frac{a_5}{a_4} = \frac{a_7}{a_6} \Rightarrow \frac{2-x}{x-1} = \frac{x}{x+1} \Rightarrow 2x+2-x^2-x = x^2-x \Rightarrow 2x^2-2x-2=0 \Rightarrow x^2-x-1=0.$$

از حل معادله فوق دو مقدار برای x به دست می‌آید. حاصل جمع و ضرب این دو مقدار برابر $S = x_1 + x_2 = 1$ و $P = x_1 x_2 = -1$ است. از طرفی، قدرنسبت دنباله برابر است با:

$$r = \frac{a_7}{a_6} = \frac{x}{x+1}$$

از آنجا که x در معادله $x^2 - x - 1 = 0$ صدق می‌کند، پس $x^2 = x + 1$ و داریم:

$$r = \frac{x}{x+1} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$$

بنابراین حاصل جمع مقادیر ممکن برای قدرنسبت دنباله برابر است با:

$$r_1 + r_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{S}{P} = \frac{1}{-1} = -1$$

راه حل دوم:

می‌دانیم قدرنسبت دنباله هندسی برابر تقسیم دو جمله متوالی است. پس اگر دنباله مورد نظر را a_n با قدرنسبت r بنامیم، داریم:

$$r = \frac{a_5}{a_4} = \frac{a_7}{a_6} \Rightarrow \frac{2-x}{x-1} = \frac{x}{x+1} \Rightarrow 2x+2-x^2-x = x^2-x \Rightarrow 2x^2-2x-2=0 \Rightarrow x^2-x-1=0.$$

از حل معادله فوق دو مقدار برای x به دست می‌آید. حاصل جمع و ضرب این دو مقدار برابر $S = x_1 + x_2 = 1$ و $P = x_1 x_2 = -1$ است. از طرفی، قدرنسبت دنباله برابر است با:

$$r = \frac{a_7}{a_6} = \frac{x}{x+1}$$

پس برای مقادیر قدرنسبت یعنی $r = \frac{x}{x+1}$ خواهیم داشت:

$$r_1 = \frac{x_1}{x_1+1}, \quad r_2 = \frac{x_2}{x_2+1}$$

بنابراین حاصل جمع مقادیر ممکن برای قدرنسبت دنباله برابر است با:

$$r_1 + r_2 = \frac{x_1}{x_1+1} + \frac{x_2}{x_2+1} = \frac{x_1 x_2 + x_1 + x_2 x_1 + x_2}{x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1} = \frac{2P + S}{P + S + 1} = \frac{-2 + 1}{-1 + 1 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

۲- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * آمار و احتمال (درس ۱، فصل ۱)

نکته: ترکیب عطفی، فصلی و شرطی دو گزاره به صورت زیر است:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
د	د	د	د	د
د	ن	ن	د	ن
ن	د	ن	د	د
ن	ن	ن	ن	د

راه حل اول:

جدول ارزش گزاره داده شده را تشکیل می دهیم:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow r$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q \vee r$	$[(p \wedge q) \Rightarrow r] \Rightarrow (\sim p \vee \sim q \vee r)$
د	د	د	د	د	ن	ن	د	د
د	د	ن	د	ن	ن	ن	ن	د
د	ن	د	ن	د	ن	د	د	د
د	ن	ن	ن	د	ن	د	د	د
ن	د	د	ن	د	د	ن	د	د
ن	د	ن	ن	د	د	ن	د	د
ن	ن	د	ن	د	د	د	د	د
ن	ن	ن	ن	د	د	د	د	د

همان طور که می بینید، گزاره $[(p \wedge q) \Rightarrow r] \Rightarrow (\sim p \vee \sim q \vee r)$ همواره درست است.

راه حل دوم:

نکته: برای دو گزاره p و q همواره داریم: $p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ نکته: برای دو گزاره p و q داریم:

$$\begin{cases} \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q \\ \sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \end{cases} \therefore \text{قوانین دمورگان}$$

$$p \vee \sim p \equiv T \text{ نکته}$$


با توجه به نکات، گزاره داده شده را ساده می کنیم.

$$\begin{aligned} [(p \wedge q) \Rightarrow r] \Rightarrow (\sim p \vee \sim q \vee r) &\equiv \sim[(p \wedge q) \vee r] \vee (\sim p \vee \sim q \vee r) \\ &\equiv [(p \wedge q) \wedge \sim r] \vee [\sim p \vee \sim q \vee r] \equiv [p \wedge q \wedge \sim r] \vee [\sim p \wedge q \wedge \sim r] \\ s \vee \sim s &\equiv T \end{aligned}$$

با فرض $p \wedge q \wedge \sim r \equiv s$ داریم:

۳- پاسخ: گزینه ۱ ▲ مشخصات سؤال: ساده * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۱)

نکته: تابع f را در یک مجموعه، اکیداً صعودی می گوئیم، اگر برای هر دو مقدار a و b در این مجموعه که $a < b$ ، آن گاه $f(a) < f(b)$ در فاصله ای که یک تابع اکیداً صعودی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، همواره روبه بالا خواهیم رفت.می دانیم اگر $a > 0$ سهمی $y = ax^2 + bx + c$ در بازه $\left[\frac{-b}{2a}, +\infty\right)$ اکیداً صعودی و اگر $a < 0$ این سهمی در بازه $\left(-\infty, \frac{-b}{2a}\right]$ اکیداً نزولیاست و این بازه بزرگ ترین بازه با این خاصیت است؛ زیرا $\frac{-b}{2a}$ طول رأس سهمی است؛ بنابراین در سهمی $y = ax^2 + 7x - 1$ که در بازه $(-\infty, \frac{-b}{2a}]$ اکیداً صعودی است، a مقداری مثبت است و داریم:



$$\frac{-b}{2a} = -\frac{7}{2} \Rightarrow 2a = 10 \Rightarrow a = 5$$

بنابراین عرض رأس سهمی $y = 5x^2 + 7x - 1$ برابر است با:

$$y_S = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-(49 - 4 \times 5 \times (-1))}{4 \times 5} = \frac{-69}{20} = \frac{-345}{100} = -3.45$$

۴- پاسخ: گزینه ۲ ▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۱)

نکته (قضیه تقسیم برای چندجمله ای ها): اگر $f(x)$ و $p(x)$ چندجمله ای باشند و درجه $p(x)$ از صفر بزرگ تر باشد، آن گاه چندجمله ای های منحصربه فرد $q(x)$ و $r(x)$ وجود دارند به طوری که:

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x)$$

که در آن $r(x) = 0$ یا درجه $r(x)$ از درجه $p(x)$ کمتر است.برای یافتن باقی مانده تقسیم یک عبارت بر $x^2 - x + 1$ کافی است مقسوم علیه را مساوی صفر قرار دهیم، یعنی $x^2 - x + 1 = 0$ توجه کنید از هر نتیجه ای که این تساوی می دهد نیز می توان استفاده کرد.

$$\begin{cases} x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = x - 1 \Rightarrow x^3 = x^2 - x \\ x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - x = -1 \end{cases} \Rightarrow x^3 = -1$$

بنابراین برای یافتن باقی مانده تقسیم عبارت $x^{17} - 5 - x^2 - x + 1$ بر جای x^2 ، منفی یک قرار می دهیم:

$$x^{17} - 5 = (x^2)^8 x^1 - 5 \Rightarrow r(x) \equiv (-1)^8 x^1 - 5 \Rightarrow r(x) \equiv -x^2 - 5 \xrightarrow{x^2=x-1} r(x) \equiv -(x-1) - 5 \\ \Rightarrow r(x) = -x - 4$$

حاصل ضرب ضرایب این باقی مانده برابر است با:

$$(-1)(-4) = 4$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۱ (درس ۲، فصل ۱)

۵- پاسخ: گزینه ۳

راه حل اول:

برای آنکه هر دو ریشه معادله $-x^2 + 5x + m = 0$ کوچک تر از $\frac{9}{4}$ باشند، می توانیم از تغییر متغیر $x - \frac{9}{4} = t$ استفاده کنیم. در این صورت باید هر دو ریشه t منفی باشند:

$$\left. \begin{array}{l} -x^2 + 5x + m = 0 \\ x - \frac{9}{4} = t \Rightarrow x = \frac{9}{4} + t \end{array} \right\} \Rightarrow -\left(t + \frac{9}{4}\right)^2 + 5\left(t + \frac{9}{4}\right) + m = 0 \Rightarrow -t^2 - 9t - \frac{81}{4} + 5t + \frac{45}{4} + m = 0 \Rightarrow t^2 + 4t - \left(m + \frac{9}{4}\right) = 0$$

برای آنکه این معادله دو ریشه منفی داشته باشد، باید شرطهای زیر برقرار باشند:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \Rightarrow 4^2 + 4\left(m + \frac{9}{4}\right) > 0 \Rightarrow 16 + 4m + 9 > 0 \Rightarrow m > -\frac{25}{4} \\ S < 0 \Rightarrow -4 < 0 \quad \checkmark \\ P > 0 \Rightarrow -\left(m + \frac{9}{4}\right) > 0 \Rightarrow m + \frac{9}{4} < 0 \Rightarrow m < -\frac{9}{4} \end{array} \right.$$

با اشتراک محدوده های به دست آمده $-\frac{25}{4} < m < -\frac{9}{4}$ به دست می آید که شامل ۴ عدد صحیح $\{-6, -5, -4, -3\}$ است.

راه حل دوم:

با توجه به روش کلی حل معادله درجه دوم، جوابهای معادله به صورت $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ خواهد بود؛ بنابراین کافی است این جوابها از $\frac{9}{4}$ کوچک تر باشد:

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4(-1)(m)}}{-2} < \frac{9}{4} \Rightarrow \pm \sqrt{25 + 4m} < 4 \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{25 + 4m} < 4 \Rightarrow 0 < 25 + 4m < 16 \Rightarrow -25 < 4m < -9 \Rightarrow \frac{-25}{4} < m < \frac{-9}{4} \\ -\sqrt{25 + 4m} < 4 \end{array} \right. \text{همواره درست است.}$$

در نتیجه جواب مسئله به صورت $-\frac{25}{4} < m < -\frac{9}{4}$ خواهد بود که شامل ۴ عدد صحیح $\{-6, -5, -4, -3\}$ می باشد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۱ (درس ۵، فصل ۱)

۶- پاسخ: گزینه ۲

راه حل اول:

معادله خط ℓ گذرنده از دو نقطه $(0, -6)$ و $(-\frac{3}{4}, 0)$ به صورت زیر است:

$$y = \left(\frac{-6 - 0}{0 - (-\frac{3}{4})} \right) x - 6 \Rightarrow y = -8x - 6$$


مختصات رأس A از مربع به صورت $A(a, a)$ است. (زیرا به دلیل مربع بودن شکل سؤال، A باید روی نیمساز ناحیه سوم باشد).

نقطه A روی خط ℓ است، پس:

$$a = -8a - 6 \Rightarrow 9a = -6 \Rightarrow a = -\frac{2}{3}$$


بنابراین طول قطر OA برابر فاصله نقطه $O(0, 0)$ از نقطه $A(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ است:

$$OA = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3} \sqrt{2} = \frac{4}{3\sqrt{2}}$$



راه حل دوم:

می توان به صورت هندسی به مسأله نگاه کرد. با استفاده از قضیه تالس خواهیم داشت:



$$\left. \begin{aligned} \frac{\frac{3}{4}-x}{x} &= \frac{a}{b} \\ \frac{x}{6-x} &= \frac{a}{b} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\frac{3}{4}-x}{x} = \frac{x}{6-x} \Rightarrow (6-x)\left(\frac{3}{4}-x\right) = x^2$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{27}{4}x + \frac{9}{2} = x^2 \Rightarrow \frac{27}{4}x = \frac{9}{2} \Rightarrow x = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{27}{4}} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

طول قطر مربع $\sqrt{2}$ برابر ضلع است، پس طول قطر برابر است با:

$$\sqrt{2}x = \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4}{3\sqrt{2}}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۱ (درس ۵، فصل ۱)

۷- پاسخ: گزینه ۳

نکته: اگر خطوط d_1 و d_2 به ترتیب با شیب‌های m_1 و m_2 بر هم عمود باشند، آن‌گاه $m_1 m_2 = -1$ و برعکس.

فرض کنید رأس A و C از مستطیل $ABCD$ روی خط $x = 2y - 4$ هستند، پس مختصات آن‌ها به صورت $(2k - 4, k)$ است. با توجه به دو نقطه $B(1, 4)$ و $D(-1, 0)$ و اینکه می‌دانیم در مستطیل $ABCD$ دو ضلع AB و AD بر یکدیگر و دو ضلع BC و CD بر یکدیگر عمود هستند، پس:

$$m_{AB} \times m_{AD} = -1 \Rightarrow \frac{k-4}{2k-4-1} \times \frac{k-0}{2k-4-(-1)} = -1 \Rightarrow \frac{k(k-4)}{(2k-5)(2k-3)} = -1 \Rightarrow -4k^2 + 16k - 15 = k^2 - 4k$$

$$\Rightarrow 5k^2 - 20k + 15 = 0 \Rightarrow k^2 - 4k + 3 = 0 \Rightarrow k = 3, 1$$

پس مختصات دو نقطه A و C به صورت $A(2 \times 1 - 4, 1)$ و $C(2 \times 3 - 4, 3)$ است.پس در مستطیل $ABCD$ با مختصات رئوس $A(-2, 1)$ ، $B(1, 4)$ ، $C(2, 3)$ و $D(-1, 0)$ ، طول اضلاع برابر است با:

$$AB = \sqrt{(-2-1)^2 + (1-4)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$AD = \sqrt{(-2+1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$$

پس طول مستطیل برابر $3\sqrt{2}$ است.

▲ مشخصات سؤال: دشوار * ریاضی ۱ (درس ۲، فصل ۵)

۸- پاسخ: گزینه ۲

با توجه به اینکه $a^2 \geq 0$ ، پس $1 + a^2 \geq 1$ ، یعنی:

$$f(1+a^2) = 7-3(1+a^2) = 4-3a^2$$

(توجه کنید اگر $a = 0$ باشد، آن‌گاه $f(1+a^2)$ تعریف نشده است.)ضمناً برای پیدا کردن محدوده $\left| \frac{-a^2}{1+a^2} \right|$ ، داریم:

$$a^2 > 0 \Rightarrow \frac{1}{a^2} > 0 \Rightarrow 1 + \frac{1}{a^2} > 1 \Rightarrow \frac{a^2+1}{a^2} > 1 \Rightarrow 0 < \frac{a^2}{1+a^2} < 1 \Rightarrow -1 < \frac{-a^2}{1+a^2} < 0 \Rightarrow 0 < \left| \frac{-a^2}{1+a^2} \right| < 1$$

بنابراین:

$$f\left(\frac{-a^2}{1+a^2}\right) = -2\left(\frac{-a^2}{1+a^2}\right) = \frac{2a^2}{1+a^2}$$

اکنون به حل معادله $f(1+a^2) = f\left(\frac{-a^2}{1+a^2}\right)$ می‌پردازیم:

$$4-3a^2 = \frac{2a^2}{1+a^2} \Rightarrow 4+4a^2-3a^2-3a^4 = 2a^2 \Rightarrow 3a^4+a^2-4 = 0 \Rightarrow (a^2-1)(3a^2+4) = 0 \xrightarrow{a^2 \geq 0} a^2 = 1$$

$$\Rightarrow a = \pm 1$$

اختلاف این دو مقدار به دست آمده برابر $2 - (-1) = 3$ است.

۹- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۱)

نکته: تابع f را در یک مجموعه، اکیداً صعودی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار a و b در این مجموعه که $a < b$ ، آن‌گاه $f(a) < f(b)$. در فاصله‌ای که یک تابع اکیداً صعودی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، همواره روبه بالا خواهیم رفت.

تابع f اکیداً صعودی است. (زیرا تابع $y = 1 + \sqrt{1+x}$ اکیداً صعودی است.) می‌دانیم تابع اکیداً صعودی وارون خود را فقط می‌تواند روی خط $y = x$ قطع کند. پس برای یافتن محل تقاطع تابع f با f^{-1} ، می‌توانیم معادله $f(x) = x$ را حل کنیم:

$$f(x) = x \Rightarrow \sqrt{1+\sqrt{1+x}} = x \xrightarrow{x \geq 0} 1 + \sqrt{1+x} = x^2 \Rightarrow \sqrt{1+x} = x^2 - 1 \xrightarrow{x \geq 1} 1+x = ((x-1)(x+1))^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+1=0 \Rightarrow x=-1 \xrightarrow{x \geq 0} \text{ غ ق ق} \\ 1=(x-1)^2(x+1) \Rightarrow (x^2-2x+1)(x+1)=1 \Rightarrow x^3-x^2-x=0 \end{cases}$$


$$\Rightarrow x(x^2-x-1)=0 \Rightarrow x=0 \text{ غ ق ق}, x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, x=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \text{ غ ق ق}$$

توجه کنید با توجه به اینکه $x \geq 0$ و $x^2-1 \geq 0$ ، پس دامنه معادله به صورت $x \geq 1$ است؛ بنابراین سه جواب $x=0$ و -1 و $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

غیرقابل قبول هستند و تنها جواب $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ قابل قبول است.

پس تابع f و f^{-1} نیز یکدیگر را فقط در یک نقطه $A(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ قطع می‌کنند.

نمودار تقریبی دو تابع f و f^{-1} به صورت زیر است:



▲ مشخصات سؤال: ساده * حسابان ۱ (درس ۳، فصل ۳)

۱۰- پاسخ: گزینه ۱

$$\text{نکته: } y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

نکته: قانون توان لگاریتم:

ابتدا دامنه معادله را تعیین می‌کنیم:

$$1-x > 0 \Rightarrow x < 1$$

$$x^2 - 2x + 1 > 0 \Rightarrow (x-1)^2 > 0 \Rightarrow x \neq 1$$

بنابراین دامنه معادله به صورت $(-\infty, 1)$ است. اکنون به حل معادله می‌پردازیم:

$$\log(x^2 - 2x + 1) + 3 \log(1-x) = 5 \Rightarrow \log(x-1)^2 + 3 \log(1-x) = 5 \Rightarrow 2 \log|x-1| + 3 \log(1-x) = 5$$

$$\xrightarrow{x < 1} 2 \log(1-x) + 3 \log(1-x) = 5 \Rightarrow 5 \log(1-x) = 5 \Rightarrow \log(1-x) = 1 \Rightarrow 1-x = 10 \Rightarrow x = -9$$

جواب به دست آمده قابل قبول است. مقدار خواسته شده برابر است با:


$$\log_3(-x) = \log_3 9 = \log_3 3^2 = 2 \log_3 3 = 2 \times 1 = 2$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۲)

۱۱- پاسخ: گزینه ۲

نکته: مثلث قائم‌الزاویه‌ای که یکی از زوایای حاده آن α باشد را در نظر بگیرد. نسبت مثلثاتی کتانژانت زاویه α به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{ضلع مجاور} : \cot \alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}}$$




در مثلث روبه‌رو طول ضلع AB را x می‌نامیم؛ بنابراین در مثلث قائم‌الزاویه ABC، داریم:

$$\tan \hat{B}_1 = \frac{AC}{AB} \Rightarrow \tan 2\alpha = \frac{2}{x}$$

همچنین در مثلث قائم‌الزاویه ABD، داریم:

$$\tan \hat{D} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{x}{3}$$



با توجه به فرمول $\tan 2\alpha$ ، داریم:

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{2 \times \frac{x}{3}}{1 - (\frac{x}{3})^2} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{\frac{2x}{3}}{\frac{9-x^2}{9}} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{6x}{9-x^2} \Rightarrow 18 - 2x^2 = 6x^2 \Rightarrow 8x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$\cot \alpha = \cot \hat{D} = \frac{AD}{AB} = \frac{3}{x} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2$$


بنابراین مقدار خواسته شده برابر است با:

▲ مشخصات سؤال: ساده * ریاضی ۱ (درس ۳، فصل ۲)

۱۲- پاسخ: گزینه ۴

نکته: مثلث قائم الزاویه‌ای که یکی از زوایای حاده آن α باشد را در نظر بگیرید. نسبت مثلثاتی کتانژانت زاویه α به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\cot \alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{ضلع مقابل}}$$



راه حل اول:

$$\frac{3 \cos x - \sin x}{\sin x} = \frac{3 \cot x - 1}{\cot x + 1} = \frac{3 \times \frac{4}{5} - 1}{\frac{4}{5} + 1} = \frac{11}{5} = 2 \frac{1}{5}$$


از آنجا که مقدار $\cot x$ مشخص است، برای پیدا کردن کسر مورد نظر کافی است صورت و مخرج کسر را بر $\sin x$ تقسیم کنیم:

راه حل دوم:

با توجه به اینکه $\cot x = 4$ ، یعنی $\cos x = 4 \sin x$ ، پس:

$$\frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \frac{3 \times 4 \sin x - \sin x}{4 \sin x + \sin x} = \frac{11 \sin x}{5 \sin x} = 2 \frac{1}{5}$$

راه حل سوم:

زاویه $\hat{x}$ را در یک مثلث فرض می‌کنیم: (با توجه به اینکه $\cot \hat{x} = 4$ ، ضلع روبه‌رو را ۱ و ضلع مجاور را ۴ در نظر می‌گیریم، پس وتر نیز $\sqrt{17}$ می‌شود.)

$$\sin x = \frac{1}{\sqrt{17}}, \cos x = \frac{4}{\sqrt{17}} \Rightarrow \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \frac{3 \times \frac{4}{\sqrt{17}} - \frac{1}{\sqrt{17}}}{\frac{4}{\sqrt{17}} + \frac{1}{\sqrt{17}}} = \frac{12-1}{4+1} = \frac{11}{5} = 2 \frac{1}{5}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۱ (درس ۴، فصل ۴)

۱۳- پاسخ: گزینه ۳

$$\tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0)$$

نکته:

نکته (نسبت‌های مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا):

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

راه حل اول:

ابتدا مقدار $\cos(B-C)$ را پیدا می‌کنیم:

$$1 + \tan^2(B-C) = \frac{1}{\cos^2(B-C)} \Rightarrow 1 + (\sqrt{3})^2 = \frac{1}{\cos^2(B-C)} \Rightarrow \cos^2(B-C) = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos(B-C) = \pm \frac{1}{2}$$

B و C زوایای مثلث هستند، پس $B-C$ زاویه‌ای در ربع اول یا چهارم است و $\cos(B-C)$ مثبت است، پس $\cos(B-C) = \frac{1}{2}$

اکنون عبارت مورد نظر را ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cos(B+C) + 1}{4 \sin B \cos C} &= \frac{2(\cos(B+C) + \frac{1}{2})}{4 \sin B \cos C} = \frac{\cos(B+C) + \cos(B-C)}{2 \sin B \cos C} \\ &= \frac{\cos B \cos C - \sin B \sin C + \cos B \cos C + \sin B \sin C}{2 \sin B \cos C} = \frac{2 \cos B \cos C}{2 \sin B \cos C} = \frac{\cos B}{\sin B} = \cot B \end{aligned}$$

راه حل دوم:

استفاده از حالت خاص: با توجه به اینکه $\cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ و B و C را زوایایی فرض کنیم که $\hat{B} - \hat{C} = 60^\circ$ باشد، مثلاً $\hat{C} = 30^\circ$ و $\hat{B} = 90^\circ$ ؛ بنابراین برای محاسبه عبارت مورد نظر، داریم:

$$\frac{2 \cos(90^\circ + 30^\circ) + 1}{4 \sin 90^\circ \cos 30^\circ} = \frac{2 \times (-\frac{1}{2}) + 1}{4 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0 = \cot 90^\circ = \cot B$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۲)

۱۴- پاسخ: گزینه ۲

نکته: جواب‌های کلی معادله $\cos x = \cos \alpha$ به صورت $x = 2k\pi \pm \alpha$ می‌باشند که $k \in \mathbb{Z}$. ابتدا معادله را در حالت کلی حل می‌کنیم:

$$\cos(x - \frac{\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{6} - x) \Rightarrow \cos(x - \frac{\pi}{3}) = \cos(\pi - (\frac{\pi}{6} - x)) \Rightarrow \cos(x - \frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{5\pi}{6} + x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = 2k\pi + \frac{5\pi}{6} + x \\ x - \frac{\pi}{3} = 2k\pi - (\frac{5\pi}{6} + x) \end{cases} \text{ غ ق ق}$$

$$\Rightarrow 2x = 2k\pi - \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{3} \Rightarrow 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{4}$$

بنابراین جواب کلی معادله $x = k\pi - \frac{\pi}{4}$ بوده که جواب‌های $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$ در بازه $(0, 2\pi)$ قرار دارند و مجموع آن‌ها برابر است با:

$$\frac{3\pi}{4} + \frac{7\pi}{4} = \frac{10\pi}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۱ (درس ۴، فصل ۵)

۱۵- پاسخ: گزینه ۴

نکته: برای رفع ابهام حالت $\frac{a + \sqrt{bx+c}}{x}$ رادیکالی، ابتدا مزدوج رادیکال را در آن ضرب می‌کنیم، سپس با تبدیل به چندجمله‌ای، آن را تجزیه می‌کنیم.

وقتی $x \rightarrow 0$ حد مخرج کسر $\frac{a + \sqrt{bx+c}}{x}$ برابر صفر است. پس برای آنکه حاصل حد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + \sqrt{bx+c}}{x}$ متناهی باشد، باید حد صورت کسر نیز برابر صفر باشد:

$$\lim_{x \rightarrow 0} a + \sqrt{bx+c} = 0 \Rightarrow a + \sqrt{c} = 0 \Rightarrow \underbrace{a = -\sqrt{c}}_{\text{پس } a \text{ عددی منفی است}} \Rightarrow c = a^2$$

اکنون به محاسبه حد می‌پردازیم: ($c = a^2$ را جای گذاری می‌کنیم).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + \sqrt{bx+c}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + \sqrt{bx+a^2}}{x} \times \frac{a - \sqrt{bx+a^2}}{a - \sqrt{bx+a^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 - (bx+a^2)}{x(a - \sqrt{bx+a^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-b}{a - \sqrt{bx+a^2}} = \frac{-b}{a - \sqrt{a^2}} \\ &= \frac{-b}{a - |a|} = \frac{-b}{2a} \end{aligned}$$

حاصل حد برابر $\frac{1}{4}$ است، پس:

$$\frac{-b}{2a} = \frac{1}{4} \Rightarrow -4b = 2a \Rightarrow a = -2b \Rightarrow b = \frac{-a}{2}$$

$$\frac{ab}{c} = \frac{a \times (-\frac{a}{2})}{a^2} = -\frac{1}{2}$$

بنابراین مقدار خواسته شده برابر است با:

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۲ (درس ۱، فصل ۳)

۱۶- پاسخ: گزینه ۱

برای آنکه تابع f یک مجانب قائم داشته باشد، سه حالت زیر قابل تصور است:

حالت اول: معادله مخرج درجه اول بوده و فقط یک ریشه داشته باشد: (ریشه مضاعف)

$$a = 0 \Rightarrow -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ تنها مجانب قائم}$$

حالت دوم: معادله مخرج درجه دوم بوده ولی فقط یک ریشه مضاعف داشته باشد:

$$\Delta = 0 \Rightarrow (a-2)^2 - 4 \times 4 \times a = 0 \Rightarrow a^2 - 4a + 4 - 16a = 0 \Rightarrow a^2 - 20a + 4 = 0$$

معادله فوق دو جواب دارد که به‌ازای هر کدام از آن‌ها تابع فقط یک مجانب قائم دارد.

حالت سوم: معادلهٔ مخرج، درجه دوم بوده و دو ریشه داشته باشد، ولی یکی از ریشه‌های آن، ریشهٔ صورت کسر نیز باشد. در این حالت فقط ریشهٔ غیرمشتک مخرج و صورت، مجانب قائم است. صورت کسر دو ریشه دارد و به‌ازای هر کدام از آن‌ها یک مقدار قابل قبول برای a به‌دست می‌آید:

$$2x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (2x - 3)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -2, \frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} x = -2 \Rightarrow 4a - 2(a - 2) + 4 = 0 \Rightarrow 2a = -8 \Rightarrow a = -4 \\ x = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}(a - 2) + 4 = 0 \Rightarrow \frac{15}{4}a = -1 \Rightarrow a = -\frac{4}{15} \end{cases}$$

بنابراین برای a ، ۵ مقدار مختلف وجود دارد که به‌ازای هر کدام از آن‌ها تابع فقط یک مجانب قائم دارد.

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۱ (درس ۵، فصل ۵)

۱۷- پاسخ: گزینهٔ ۲

نکته (پیوستگی در نقطه):

تابع f در نقطهٔ $x = a$ پیوسته است، هرگاه $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

این تابع دو ضابطه‌ای باید در نقاط تغییر ضابطه پیوسته باشد. این نقاط از حل معادلهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$|x - 2| = c \Rightarrow x - 2 = \pm c \Rightarrow x = 2 \pm c$$

پس تابع f باید در این دو نقطه پیوسته باشد:

$$f(x) = \begin{cases} |x - 2| & 2 - c \leq x \leq 2 + c \\ a(x - 2)^2 + b(x - 2) & x > 2 + c \text{ یا } x < 2 - c \end{cases}$$

ابتدا پیوستگی در نقطهٔ $x = 2 + c$ را بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow (2+c)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (2+c)^-} f(x) \Rightarrow |2+c-2| = a(c)^2 + b(c)$$

$$\Rightarrow |c| = ac^2 + bc \xrightarrow{c \geq 0} c = c(ac + b) \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ ac + b = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ ac = -b + 1 \end{cases} \quad (1)$$

اکنون پیوستگی در نقطهٔ $x = 2 - c$ را بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow (2-c)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (2-c)^-} f(x) \Rightarrow |2-c-2| = a(-c)^2 + b(-c)$$

$$\Rightarrow |-c| = ac^2 - bc \xrightarrow{c \geq 0} -c = c(ac - b) \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ ac - b = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ ac = b + 1 \end{cases} \quad (2)$$

با توجه به معادلات (۱) و (۲)، پس:

$$\begin{cases} ac = -b + 1 \\ ac = b + 1 \end{cases} \Rightarrow -b + 1 = b + 1 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow ac = 1$$

اگر $c = 0$ ، آن‌گاه $[ac] = 0$ و اگر $ac = 1$ ، آن‌گاه $[ac] = 1$ پس برای $[ac]$ دو مقدار صفر و یک وجود دارد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۴)

۱۸- پاسخ: گزینهٔ ۳

نکته: توابع $f(x) = \sin x$ و $g(x) = \cos x$ مشتق پذیر هستند و داریم:

$$f'(x) = \cos x \quad \text{و} \quad g'(x) = -\sin x$$

مقدار خواسته شده یعنی $3g'(\frac{\Delta\pi}{3}) - f'(\frac{\Delta\pi}{3})$ برابر مشتق تابع $3g - f$ در $x = \frac{\Delta\pi}{3}$ است، پس ابتدا تابع $3g - f$ را ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (3g - f)(x) &= 3 \times \frac{3}{3 + \sin x} - \frac{27 - \sin^3 x}{9 - \sin^2 x} = \frac{9}{3 + \sin x} - \frac{(3 - \sin x)(9 + 3 \sin x + \sin^2 x)}{(3 - \sin x)(3 + \sin x)} = \frac{9 - 9 - 3 \sin x - \sin^3 x}{3 + \sin x} \\ &= \frac{-\sin x(3 + \sin x)}{3 + \sin x} = -\sin x \end{aligned}$$

مشتق تابع $y = -\sin x$ برابر $y' = -\cos x$ است. مقدار مشتق به‌ازای $x = \frac{\Delta\pi}{3}$ برابر است با:

$$(3g - f)'(\frac{\Delta\pi}{3}) = -\cos(\frac{\Delta\pi}{3}) = -\cos(2\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cos(-\frac{\pi}{3}) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

۱۹- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * حسابان ۲ (درس ۲، فصل ۴)

نکته: f در a پیوسته باشد و مشتق راست و مشتق چپ در $x = a$:

الف) هر دو موجود (متناهی) ولی نابرابر باشند (نقطه گوشه‌ای).

ب) یکی متناهی و دیگری نامتناهی باشد (نقطه گوشه‌ای).

ابتدا مشتق تابع را محاسبه می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} b & x < a \\ b + (x-a)^m & x \geq a \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ m(x-a)^{m-1} & x \geq a \end{cases}$$

تابع f فقط می‌تواند در $x = a$ نقطه گوشه‌ای داشته باشد، پس باید مشتق چپ و راست تابع f در $x = a$ نابرابر باشد:

$$f'_-(a) = 0 \Rightarrow f'_+(a) \neq 0$$

اگر $m > 1$ ، مشتق راست تابع f در $x = a$ برابر صفر است و تابع نقطه گوشه‌ای ندارد.اگر $m = 1$ ، آن‌گاه، $f'_+(a) = m$ و تابع f در $x = a$ نقطه گوشه‌ای دارد.اگر $m = 0$ ، آن‌گاه $f'_+(a) = 0$ ، پس تابع f نقطه گوشه‌ای ندارد.بنابراین فقط به‌ازای $m = 1$ تابع نقطه گوشه‌ای دارد.

۲۰- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * حسابان ۲ (درس ۱، فصل ۵)

نکته (تعریف): اگر f یک تابع و $I \subseteq D_f$ یک همسایگی از نقطه c (بازه باز شامل نقطه c) باشد کهالف) به‌ازای هر x متعلق به I داشته باشیم $f(x) \leq f(c)$ ، در این صورت $f(c)$ را یک ماکزیمم نسبی تابع f می‌نامیم.ب) به‌ازای هر x متعلق به I داشته باشیم $f(x) \geq f(c)$ ، در این صورت $f(c)$ را یک مینیمم نسبی تابع f می‌نامیم.نکته (تعریف): فرض کنیم $c \in D_f$. نقطه به طول c را یک نقطه بحرانی برای تابع f می‌نامیم، هرگاه $f'(c)$ برابر صفر باشد و یا $f'(c)$ موجود نباشد.

راه‌حل اول:

ابتدا دامنه تابع f را محاسبه می‌کنیم:

$$x|x| - x \geq 0 \Rightarrow x(|x| - 1) \geq 0$$

x	-1	0	+1
x	-	-	+
$ x - 1$	+	0	-
$x(x - 1)$	-	0	+

$$D_f = [-1, 0] \cup [1, +\infty)$$

تابع در نقاط مرزی دامنه یعنی $x = -1, 0, 1$ مشتق‌ناپذیر است، پس $x = -1, 0, 1$ طول نقاط بحرانی تابع f است.

از آنجا که تابع در همسایگی این سه نقطه تعریف نشده است، پس این سه نقطه اکسترمم نسبی محسوب نمی‌شود.

برای یافتن سایر نقاط بحرانی و اکسترمم نسبی، مشتق تابع را محاسبه می‌کنیم:

$$f(x) = \sqrt{x|x| - x} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x^2 - x} & -1 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x^2 - x} & x \geq 1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{-2x-1}{2\sqrt{-x^2-x}} & -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x}} & x \geq 1 \end{cases}$$

باید ریشه‌های f' را مشخص کنیم:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} & -1 \leq x \leq 0 \\ x = \frac{1}{2} & x \geq 1 \end{cases}$$

 $x = -\frac{1}{2}$ تنها ریشه مشتق است.

جدول تعیین علامت مشتق به‌صورت روبه‌رو است:

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1
f'		+	-	+
f		↗	↘	↗



max نسبی

با توجه به جدول فوق، $x = -\frac{1}{2}$ طول نقطه ماکزیمم نسبی تابع f است یعنی $m = 1$ و تابع، مینیمم نسبی ندارد، پس $n = 0$ همچنین تابع ۴

$$\frac{km+n}{k-n} = \frac{4 \times 1 + 0}{4 - 0} = \frac{4}{4} = 1$$

نقطه بحرانی دارد، یعنی $k = 4$ پس مقدار خواسته شده برابر است با:

راه حل دوم:

سعی می‌کنیم شمای کلی نمودار را رسم کنیم. ابتدا نمودار تابع $y = x(|x| - 1)$ را رسم می‌کنیم:

با توجه به شکل فوق، پس از اعمال رادیکال $(f(x) = \sqrt{x(|x| - 1)})$ نمودار به صورت حدودی به دست می‌آید، پس مطابق شکل، ۴ نقطه بحرانی $(k = 4)$ ، صفر مینیم نسبتی $(n = 0)$ یک ماکزیم نسبتی $(m = 1)$ داریم، پس مقدار خواسته شده برابر است با:


$$\frac{km + n}{k - n} = \frac{4 \times 1 + 0}{4 - 0} = \frac{4}{4} = 1$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * ریاضی ۱ (درس ۲، فصل ۶)

۲۱- پاسخ: گزینه ۱

نکته: اگر چند شیء متمایز داشته باشیم، به هر حالت چیدن آن‌ها کنار هم، یک جایگشت از آن اشیاء می‌گوییم. تعداد جایگشت‌های n شیء برابر $n!$ است.

حالاتی که در آن‌ها بازیکنان بیشتری بعد از کاپیتان وارد زمین می‌شوند به صورت زیر است:



$$360 = 3 \times 5! = 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 360$$


▲ مشخصات سؤال: دشوار * آمار و احتمال (درس ۳، فصل ۲)

۲۲- پاسخ: گزینه ۲

نکته: فرض کنید $B_1, B_2, \dots, B_n$ پیشامدهایی با احتمال ناصفر باشند که فضای نمونه را افزای می‌کنند. در این صورت، برای هر پیشامد دلخواه A داریم:

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)$$

نمودار درختی زیر را در نظر بگیرید:



طبق قانون احتمال کل داریم:

$$P = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$P = 3 \times \frac{1}{36} + 3 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

۲۳- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: دشوار * آمار و احتمال (درس ۳، فصل ۳)

نکته (میانگین یا متوسط داده‌ها): میانگین یا متوسط n داده $x_1, x_2, \dots, x_n$ را با نماد $\bar{x}$ نشان می‌دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

نکته (انحراف معیار داده‌ها): اگر n داده از جامعه به صورت $x_1, x_2, \dots, x_n$ داشته باشیم، انحراف معیار آن‌ها را با نماد σ نشان می‌دهیم، که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

که در آن $x_i - \bar{x}$ را انحراف داده i ام از میانگین داده‌ها می‌گویند.

نکته (واریانس داده‌ها): توان دوم انحراف معیار داده‌ها را واریانس داده‌ها گویند و آن را با نماد σ^2 نشان می‌دهیم.

دسته اول با ۴ داده را به صورت داده‌های b, c, d, e و دسته دوم با ۵ داده را به صورت داده‌های a, b, c, d, e در نظر می‌گیریم. میانگین هر دو دسته را $\bar{x}$ در نظر گرفته و داریم:

$$b, c, d, e \Rightarrow \bar{x} = \frac{b+c+d+e}{4} \Rightarrow b+c+d+e = 4\bar{x} \quad (1)$$

$$a, b, c, d, e \Rightarrow \bar{x} = \frac{a+b+c+d+e}{5} \Rightarrow a+b+c+d+e = 5\bar{x} \xrightarrow{(1)} a+4\bar{x} = 5\bar{x} \Rightarrow a = \bar{x}$$

واریانس دسته اول را σ_1^2 و واریانس دسته دوم را σ_2^2 در نظر گرفته و داریم:

$$\sigma_1^2 = \frac{(b-a)^2 + (c-a)^2 + (d-a)^2 + (e-a)^2}{4}$$

$$\sigma_2^2 = \frac{(a-a)^2 + (b-a)^2 + (c-a)^2 + (d-a)^2 + (e-a)^2}{5} = \frac{(b-a)^2 + (c-a)^2 + (d-a)^2 + (e-a)^2}{5}$$

فرض می‌کنیم $A = (b-a)^2 + (c-a)^2 + (d-a)^2 + (e-a)^2$ و طبق فرض سؤال داریم:

$$\sigma_1^2 = 1 + \sigma_2^2 \Rightarrow \frac{A}{4} = 1 + \frac{A}{5} \Rightarrow \frac{A}{4} - \frac{A}{5} = 1 \Rightarrow \frac{A}{20} = 1 \Rightarrow A = 20$$

بنابراین انحراف معیار دسته اول برابر است با:

$$\sigma_1 = \frac{A}{4} = \frac{20}{4} = 5 \Rightarrow \sigma_1 = \sqrt{5}$$

۲۴- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: دشوار * آمار و احتمال (درس ۳، فصل ۲)

نکته: برای هر دو پیشامد دلخواه A و B داریم: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

نکته: برای هر دو پیشامد دلخواه A و B داریم $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$.

نکته: در صورتی که B پیشامدی باشد که $P(B) > 0$ ، برای هر پیشامد A ، «احتمال A به شرط رخ دادن B » (که آن را « P ی A به شرط B » نیز می‌خوانیم) به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

راه حل اول:

احتمال آنکه بازیکن A پنهانی اول را گل کند، با $P(A_1)$ و احتمال آنکه پنهانی دوم را گل کند، با $P(A_2)$ نشان می‌دهیم. طبق مفروضات سؤال داریم:

$$P(A_1) = \frac{80}{100} = 0.8, \quad P(A_2|A_1) = \frac{60}{100} = 0.6, \quad P(A_2|A_1') = \frac{50}{100} = 0.5$$

با استفاده از نکات، داریم:

$$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} = 0.6 \Rightarrow \frac{P(A_2 \cap A_1)}{0.8} = 0.6 \Rightarrow P(A_2 \cap A_1) = 0.48$$

$$P(A_2|A_1') = \frac{P(A_2 \cap A_1')}{P(A_1')} = 0.5 \Rightarrow \frac{P(A_2 - A_1)}{1 - P(A_1)} = 0.5 \Rightarrow \frac{P(A_2) - P(A_2 \cap A_1)}{1 - 0.8} = 0.5$$


$$\Rightarrow P(A_2) - P(A_2 \cap A_1) = 0.1 \Rightarrow P(A_2) - 0.48 = 0.1 \Rightarrow P(A_2) = 0.58$$

احتمال آنکه حداقل یک پنهانی گل شود، همان $P(A_1 \cup A_2)$ است، پس:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = 0.8 + 0.58 - 0.48 = 0.9$$

راه حل دوم:

این سؤال را می توان به روش نمودار درختی نیز حل کرد:





احتمال آنکه حداقل یک پناالتی گل شود به صورت زیر است:

$$0.8 \times 0.6 + 0.8 \times 0.4 + 0.2 \times 0.5 = 0.48 + 0.32 + 0.1 = 0.9$$


▲ مشخصات سؤال: ساده * هندسه ۱ (درس ۲، فصل ۱)

۲۵- پاسخ: گزینه ۳


گزینه ها را بررسی می کنیم:



گزینه ۱: مثال نقض دارد. یعنی ممکن است دو مثلث مساحت برابر داشته باشند ولی همنهشت نباشند، مانند مثلث های روبه رو:


 $AH > BC$

مثلث های ABC و $A'B'C'$ همنهشت نیستند.
گزینه ۲: مثال نقض دارد. در مثلث زیر، ارتفاع وارد بر ضلع BC از خود ضلع BC بزرگ تر است.



$$AB = AC \Rightarrow \hat{B} = \hat{C}$$

گزینه ۳: مثال نقض ندارد و حکم کلی است.

گزینه ۴: مثال نقض دارد. در مثلث ABC زیر زاویه $\hat{A}$ از ۴ برابر زاویه B بزرگ تر است.



$$\hat{A} > 4\hat{B} \Rightarrow 100^\circ > 4 \times 20^\circ$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * هندسه ۱ (درس ۳، فصل ۲)


۲۶- پاسخ: گزینه ۴

نکته: هرگاه دو زاویه از مثلثی، با دو زاویه از مثلث دیگر هم اندازه باشند، دو مثلث متشابه اند.

$$(\hat{B} = \hat{B}', \hat{C} = \hat{C}') \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$



با توجه به شکل مقابل، مثلث‌های AEF و ECD متشابه هستند؛ زیرا:



$$\left. \begin{aligned} \hat{E}_1 + \hat{E}_2 &= 90^\circ \\ \hat{E}_2 + \hat{C}_1 &= 90^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{E}_1 + \hat{E}_2 = \hat{E}_2 + \hat{C}_1 \Rightarrow \hat{E}_1 = \hat{C}_1$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{E}_1 &= \hat{C}_1 \\ \hat{A} &= \hat{D} = 90^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \triangle AEF \sim \triangle ECD$$

$$\Rightarrow \frac{EF}{EC} = \frac{AF}{ED} = \frac{AE}{CD}$$

فرض می‌کنیم، ضلع مربع برابر a و AE = x باشد، پس ED = a - x داریم:

$$\frac{EF}{EC} = \frac{AE}{CD} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{a} \Rightarrow a = 2x \Rightarrow x = \frac{1}{2}a$$

$$ED = a - x = a - \frac{1}{2}a = \frac{1}{2}a$$


در مثلث EDC طبق رابطه فیثاغورس، داریم:

$$ED^2 + DC^2 = EC^2 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + a^2 = 2^2 \Rightarrow \frac{5}{4}a^2 = 4 \Rightarrow a^2 = \frac{16}{5} \Rightarrow S_{ABCD} = a^2 = \frac{16}{5} = 3\frac{1}{5}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * هندسه ۱ (درس ۲، فصل ۳)

۲۷- پاسخ: گزینه ۱

نکته: سه میانه هر مثلث در یک نقطه درون آن مثلث هم‌رس‌اند، به طوری که فاصله این نقطه تا وسط هر ضلع برابر $\frac{1}{3}$ اندازه میانه نظیر این ضلع است و فاصله‌اش تا هر رأس، $\frac{2}{3}$ اندازه میانه نظیر آن رأس است.



$$AG = 2GM = \frac{2}{3}AM$$

$$GM = \frac{1}{2}AG = \frac{1}{3}AM$$

مشابه روابط فوق برای میانه‌های دیگر نیز برقرار است.

طبق نکته فوق، نقطه G محل هم‌رسی میانه‌های مثلث ABC است و داریم:

$$AG = 2GE \quad (1)$$

در مثلث GBC، GE میانه وارد بر ضلع BC و چون BD = DG، نیز میانه وارد بر ضلع BG است، پس در مثلث GBC نقطه P، محل هم‌رسی میانه‌های مثلث است و داریم:

$$GP = \frac{2}{3}GE \quad (2)$$


$$\frac{AG}{GP} = \frac{2GE}{\frac{2}{3}GE} = 3$$

حال با استفاده از روابط (۱) و (۲) داریم:

▲ مشخصات سؤال: دشوار * هندسه ۱ (درس ۲، فصل ۲)

۲۸- پاسخ: گزینه ۴

نکته (تعمیم قضیه تالس): اگر خطی دو ضلع مثلثی را در دو نقطه قطع کند و با ضلع سوم آن موازی باشد، مثلثی پدید می‌آید که اندازه ضلع‌های آن با اندازه ضلع‌های مثلث اصلی متناسب‌اند؛ مثلاً در شکل روبه‌رو داریم:



$$DE \parallel BC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

با توجه به اینکه مثلث‌های ABC و BEF هم‌نهشت هستند، داریم:

$$FB = BC = 1, EF = AB = 2$$

فرض می‌کنیم BH = x، پس:

$$FH = FB - BH = 1 - x$$

طبق تالس در مثلث‌های ABC و BEF داریم:


$$\triangle ABC : DH \parallel BC \Rightarrow \frac{AH}{AB} = \frac{DH}{BC} \Rightarrow \frac{2-x}{2} = \frac{DH}{1} \Rightarrow DH = \frac{2-x}{2} \quad (1)$$

$$\triangle BEF : DH \parallel EF \Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{DH}{EF} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{DH}{2} \Rightarrow DH = 2x \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow 2x = \frac{2-x}{2} \Rightarrow 4x = 2-x \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

$$(2) : DH = 2x = 2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$



بنابراین اندازه DH برابر است با:



۲۹- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: ساده * هندسه ۲ (درس ۲، فصل ۱)

نکته: یک خط و یک دایره بر هم مماس‌اند. اگر و تنها اگر این خط در نقطهٔ تماس با دایره بر شعاع آن نقطه عمود باشد.




طبق شکل مقابل، در نقطهٔ A مماس‌های مرسوم بر دو دایره برهم عمودند و طبق نکتهٔ فوق، این خط‌های مماس از مرکز دایره‌ها گذشته و مثلث $OO'A$ قائم‌الزاویه است و داریم:

$$OO'^2 = OA^2 + O'A^2 \Rightarrow OO'^2 = 15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289 \\ \Rightarrow OO' = \sqrt{289} = 17$$


۳۰- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * هندسه ۲ (درس ۳، فصل ۳)

نکته: در هر مثلث، نیمساز هر زاویهٔ داخلی، ضلع روبه‌رو به آن زاویه را به نسبت اندازه‌های ضلع‌های آن زاویه تقسیم می‌کند.



$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$



نکته: در هر مثلث، مربع اندازهٔ هر نیمساز داخلی برابر است با حاصل‌ضرب اندازهٔ دو ضلع زاویه، منهای حاصل‌ضرب اندازهٔ دو قطعه‌ای که نیمساز روی ضلع مقابل ایجاد می‌کند.

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$$

فرض می‌کنیم $BM = CM = x$ ، با استفاده از نکات فوق، ابتدا در مثلث AMC داریم:

$$MP \text{ نیمساز} \Rightarrow \frac{AP}{PC} = \frac{AM}{MC} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} = \frac{AM}{x} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{AM}{x} \\ \Rightarrow x = 3AM \Rightarrow AM = \frac{1}{3}x$$

$$MP^2 = AM \cdot MC - AP \cdot PC$$

$$\Rightarrow (\sqrt{33})^2 = \frac{1}{3}x \cdot x - \sqrt{5} \times 3\sqrt{5} \Rightarrow 33 = \frac{1}{3}x^2 - 15$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3}x^2 = 48 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = 12 \Rightarrow AM = \frac{1}{3} \times 12 = 4$$

$$BC = 2x = 2 \times 12 = 24$$

PQ و BC موازی هستند؛ زیرا:

$$\left. \begin{array}{l} \triangle AMC: MP \text{ نیمساز} \Rightarrow \frac{AP}{PC} = \frac{AM}{MC} \\ \triangle AMB: MQ \text{ نیمساز} \Rightarrow \frac{AQ}{QB} = \frac{AM}{MB} \end{array} \right\} \xrightarrow{MB=MC} \frac{AP}{PC} = \frac{AQ}{QB} \xrightarrow{\text{عکس تالس}} PQ \parallel BC$$

$$\Rightarrow \frac{AP}{AC} = \frac{PQ}{BC} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \frac{PQ}{24} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{PQ}{24} \Rightarrow PQ = 6$$

MP و MQ برهم عمودند؛ زیرا:

$$\hat{M}_1 + \hat{M}_2 + \hat{M}_3 + \hat{M}_4 = 180^\circ \xrightarrow{\hat{M}_1 = \hat{M}_2, \hat{M}_3 = \hat{M}_4} 2(\hat{M}_2 + \hat{M}_3) = 180^\circ \Rightarrow \hat{PMQ} = 90^\circ$$

$$\triangle PMQ: MQ^2 + MP^2 = PQ^2 \Rightarrow MQ^2 + 33 = 36 \Rightarrow MQ^2 = 3 \Rightarrow MQ = \sqrt{3}$$


۳۱- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * هندسه ۲ (درس ۲، فصل ۲)

نکته: یکی از کاربردهای بازتاب، حل مسائلی است که به مسائل هم‌پیرامونی یا هم‌محیطی معروف است. در این گونه مسائل، هدف این است که بدون این که محیط یک چندضلعی تغییر کند، مساحت آن چندضلعی را تغییر دهیم.

بازتاب B را نسبت به AC یافته و B' می‌نامیم. همچنین بازتاب D را نسبت به EC یافته و D' می‌نامیم.

میزان افزایش مساحت برابر است با:



$$S = 2S_{ABC} + 2S_{EDC}$$

$$\Rightarrow S = 2 \times \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin 135^\circ + 2 \times \frac{1}{2} DE \cdot DC \cdot \sin 120^\circ$$

$$\Rightarrow S = AB \cdot BC \cdot \sin 45^\circ + DE \cdot DC \cdot \sin 60^\circ$$

$$\Rightarrow S = 4 \times 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 24 + 9 = 33$$

۳۲- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * هندسه ۳ (درس ۲، فصل ۱)

نکته: اگر $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، در این صورت وارون ماتریس A یعنی A^{-1} از تساوی زیر به دست می‌آید:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

طبق نکته، ابتدا وارون ماتریس B را می‌یابیم.

$$B = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{(-2)(-1) - (-3)(-1)} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{2-3} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{حال طرفین رابطه } 2I - 2A^{-1}B = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -12 & -11 \end{bmatrix} \text{ را از سمت راست در } B^{-1} \text{ ضرب می‌کنیم.}$$

$$(2I - 2A^{-1}B) \cdot B^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -12 & -11 \end{bmatrix} \cdot B^{-1}$$

$$\Rightarrow 2IB^{-1} - 2A^{-1} \underbrace{B \cdot B^{-1}}_I = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -12 & -11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2B^{-1} - 2A^{-1} = \begin{bmatrix} 7-5 & -21+10 \\ -12+11 & 36-22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -11 \\ -1 & 14 \end{bmatrix}$$

کوچک‌ترین درایه ماتریس فوق، برابر ۱۱- است.

۳۳- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده * هندسه ۳ (درس ۱، فصل ۱)

حاصل ضرب درایه‌های ماتریس A برابر ۱- است.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{حاصل ضرب درایه‌ها} = -1$$

حال A^2 را محاسبه می‌کنیم.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 \text{ حاصل ضرب درایه‌های } = -1$$

بنابراین خواسته سؤال برابر است با:

$$\frac{-1}{-1} = 1$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * هندسه ۳ (درس ۳، فصل ۲)

۳۴- پاسخ: گزینه ۲

نکته: معادله سهمی افقی یا قائم با رأس $S(h, k)$ به صورت زیر است.

معادله سهمی	کانون	خط هادی	محور سهمی	دهانه سهمی
$(y-k)^2 = 4a(x-h)$	$(a+h, k)$	$x = -a+h$	خط $y = k$	روبه راست
$(y-k)^2 = -4a(x-h)$	$(-a+h, k)$	$x = a+h$	خط $y = k$	روبه چپ
$(x-h)^2 = 4a(y-k)$	$(h, a+k)$	$y = -a+k$	خط $x = h$	روبه بالا
$(x-h)^2 = -4a(y-k)$	$(h, -a+k)$	$y = a+k$	خط $x = h$	روبه پایین

معادله سهمی $y^2 - 2y + 4x = a$ را به صورت متعارف می نویسیم.

$$y^2 - 2y = -4x + a \xrightarrow{+1} y^2 - 2y + 1 = -4x + a + 1 \Rightarrow (y-1)^2 = -4\left(x - \frac{a+1}{4}\right) \Rightarrow \text{رأس سهمی } S\left(\frac{a+1}{4}, 1\right)$$

سهمی افقی و روبه چپ است، اگر فاصله کانونی سهمی را با a' نشان دهیم، داریم:

$$4a' = 4 \Rightarrow a' = 1$$


معادله خط هادی سهمی به صورت زیر است:

$$x = \frac{a+1}{4} + 1 = 3 \Rightarrow \frac{a+1}{4} = 2 \Rightarrow a+1=8 \Rightarrow a=7$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * هندسه ۳ (درس ۲، فصل ۳)


۳۵- پاسخ: گزینه ۳

نکته: مساحت مثلث ساخته شده بر روی دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ از رابطه زیر به دست می آید.



$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

نکته: اگر وسط های سه ضلع هر مثلث را به هم متصل کنیم، چهار مثلث هم نهشت و در نتیجه با مساحت های برابر پدید می آید.




$$\triangle AMN \cong \triangle BMP \cong \triangle PCN \cong \triangle MNP$$

$$S_{\triangle AMN} = S_{\triangle BMP} = S_{\triangle PCN} = S_{\triangle MNP} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABC}$$

وسط اضلاع مثلث را نقاط A، B و C نامیده و طبق نکات فوق، داریم:

$$S_{ABC} = \frac{1}{4} \times 16 = 4$$



$$\vec{BA} = A - B = (a, 4, 1) - (a, b, 3)$$

$$\Rightarrow \vec{BA} = (0, 4-b, -2)$$

$$\vec{BC} = C - B = (a, 9, b) - (a, b, 3)$$

$$\Rightarrow \vec{BC} = (0, 9-b, b-3)$$

حاصل ضرب خارجی بردارهای $\vec{BA}$ و $\vec{BC}$ را محاسبه می کنیم.

$$\vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4-b & -2 \\ 0 & 9-b & b-3 \end{vmatrix} = \vec{i}((4-b)(b-3) - (-2)(9-b))$$

$$\Rightarrow \vec{BA} \times \vec{BC} = (4b - 12 - b^2 + 3b + 18 - 2b)\vec{i} = (\delta b - b^2 + 6)\vec{i}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{BA} \times \vec{BC}| = \frac{1}{2} |\delta b - b^2 + 6| = 4 \Rightarrow |b^2 - \delta b - 6| = 8$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b^2 - \delta b - 6 = 8 \Rightarrow b^2 - \delta b - 14 = 0 \xrightarrow{\Delta > 0} S = 5 \\ b^2 - \delta b - 6 = -8 \Rightarrow b^2 - \delta b + 2 = 0 \xrightarrow{\Delta > 0} S = 5 \end{cases}$$

بنابراین، مجموع مقادیر ممکن برای b برابر است با:

$$5 + 5 = 10$$

۳۶- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار * ریاضیات گسسته (درس‌های ۲ و ۳، فصل ۱)

نکته (قضیه تقسیم): اگر a عددی صحیح و b عددی طبیعی باشد در این صورت، اعدادی صحیح و منحصر به فرد مانند q و r یافت می‌شوند به قسمی که $a = bq + r$ و $0 \leq r < b$.
نکته: می‌توان به دو طرف یا یک طرف یک رابطه هم‌نهشتی هر مضربی از پیمانه را اضافه یا از آن کم کرد.

$$a \equiv b \Rightarrow \begin{cases} a + mt \equiv b + mk \\ a - mt \equiv b - mk \end{cases}$$

نکته: اگر بخواهیم دو طرف یک رابطه هم‌نهشتی را بر عددی تقسیم کنیم، باید پیمانه آن هم‌نهشتی را بر ب.م.م آن عدد و پیمانه تقسیم کنیم.

$$ac \equiv bc, (c, m) = d \Rightarrow a \equiv \frac{m}{d} b$$

a مضرب ۶ است، پس $a = 6k$. از طرفی باقی‌مانده تقسیم a بر ۱۷ برابر ۱۱ است، بنابراین داریم:

$$a \equiv 11 \Rightarrow 6k \equiv 11 \Rightarrow 6k \equiv 11 - 17 = -6 \Rightarrow 6k \equiv -6 \xrightarrow{+6} k \equiv -1 \Rightarrow k \equiv -1 + 17 = 16 \Rightarrow k \equiv 16 \Rightarrow k = 17q + 16$$

حال در رابطه $a = 6k$ داریم:

$$a = 6(17q + 16) \Rightarrow \frac{a}{3} = 2(17q + 16) = 2 \times 17q + 32 \Rightarrow \frac{a}{3} = 2 \times 17q + 17 + 15 = 17(2q + 1) + 15$$

$$\Rightarrow \frac{a}{3} = 17q' + 15 \Rightarrow 15 \text{ باقی‌مانده}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * آمار و احتمال (درس ۲، فصل ۱)

۳۷- پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{\text{Min} + \text{Max}}{2} = 3k \Rightarrow \text{Min} + \text{max} = 6k$$

میانگین کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عضو زیرمجموعه بر ۳ بخش پذیر است، پس:

بنابراین مجموع کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عضو زیرمجموعه باید مضرب ۶ باشد.

حالات زیر را در نظر می‌گیریم. توجه کنید که پس از مشخص کردن کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عضو زیرمجموعه، اعضای بین آن‌ها هر کدام دو

حالت دارند. یا در زیرمجموعه حضور دارند یا حضور ندارند، پس داریم: $A = \{13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23\}$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 13, 14, 16, 17 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2 \times 2 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 14, 16 & & \\ \Rightarrow & & \text{حالت ۱} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 14, 16, 17, 19, 20, 22 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 16, 17, 19, 20 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2 \times 2 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 17, 19 & & \\ \Rightarrow & & \text{حالت ۱} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 19, 20, 22, 23 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 2 \times 2 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \min & & \max \\ 20, 22 & & \\ \Rightarrow & & \text{حالت ۱} \end{array}$$

$$95 = 4 + 64 + 1 + 16 + 4 + 1 + 4 + 1 = \text{کل حالات}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * ریاضیات گسسته (درس ۳، فصل ۱)

۳۸- پاسخ: گزینه ۲

نکته: می‌توان به دو طرف یا یک طرف یک رابطه هم‌نهشتی هر مضربی از پیمانه را اضافه یا از آن کم کرد.

$$a \equiv b \Rightarrow \begin{cases} a + mt \equiv b + mk \\ a - mt \equiv b - mk \end{cases}$$

نکته: اگر بخواهیم دو طرف یک رابطه هم‌نهشتی را بر عددی تقسیم کنیم، باید پیمانه آن هم‌نهشتی را بر ب.م.م آن عدد و پیمانه تقسیم کنیم.

$$ac \equiv bc, (c, m) = d \Rightarrow a \equiv \frac{m}{d} b$$

نکته: شرط لازم و کافی برای آنکه معادله سیاله $ax + by = c$ دارای جواب باشد، آن است که: $(a, b) | c$

طبق نکته فوق، داریم:

$$51x + 85y = 7a - 1 \Rightarrow (51, 85) | 7a - 1$$

$$51 = 3 \times 17, 85 = 5 \times 17 \Rightarrow (51, 85) = 17$$

بنابراین:

$$17 \mid 7a-1 \Rightarrow 7a-1 \equiv 0 \Rightarrow 7a \equiv 1 \Rightarrow 7a \equiv 1+2 \times 17 \Rightarrow 7a \equiv 35 \xrightarrow[(7,17)=1]{+7} a \equiv 5 \Rightarrow a = 17q + 5$$

$$q = 2 \Rightarrow a = 17 \times 2 + 5 = 34 + 5 = 39$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * ریاضیات گسسته (درس ۲، فصل ۳)

۳۹- پاسخ: گزینه ۴

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$$

بدترین حالت زمانی است که تمام اعداد مشخص شده انتخاب شوند که تعداد آن‌ها برابر ۱۳ است. با انتخاب یک عدد دیگر، قطعاً حداقل ۳ عدد متوالی خواهیم داشت، پس حداقل اعضا برابر $13 + 1 = 14$ است.

▲ مشخصات سؤال: دشوار * ریاضیات گسسته (درس ۱، فصل ۲)

۴۰- پاسخ: گزینه ۴

نکته: اگر G یک گراف با n رأس و u یک رأس آن باشد و $d_G(u)$ و $d_{\bar{G}}(u)$ به ترتیب درجه رأس u در گراف‌های G و $\bar{G}$ باشند، داریم:

$$d_G(u) + d_{\bar{G}}(u) = n - 1$$

نکته: اگر G یک گراف با n رأسی باشد، مقدار $q(G) + q(\bar{G})$ برابر است با:

$$q(G) + q(\bar{G}) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

نکته: اگر گراف G از مرتبه p یک رأس با ماکزیمم درجه $\Delta = p - 1$ داشته باشد، آن‌گاه گراف G قطعاً همبند است: زیرا یک رأس به تمام رئوس دیگر متصل است.

نکته: همبندی و ناهمبندی یک گراف: گراف G را همبند می‌نامیم هرگاه بین هر دو رأس آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشد، در غیر این صورت آن را ناهمبند می‌نامیم.

فرض می‌کنیم تعداد رئوس گراف G برابر P باشد. با توجه به اینکه رأسی با درجه مینیمم در G ، رأسی با درجه ماکزیمم در $\bar{G}$ و بالعکس است، داریم:

$$\Delta(G) + \delta(\bar{G}) = P - 1 \Rightarrow \delta(\bar{G}) = P - 1 - \Delta(G)$$

$$\delta(G) + \Delta(\bar{G}) = P - 1 \Rightarrow \Delta(\bar{G}) = P - 1 - \delta(G)$$

با جای‌گذاری روابط فوق، در فرض $\Delta(\bar{G}) - \delta(\bar{G}) = 2$ داریم:

$$P - 1 - \delta(G) - P + 1 + \Delta(G) = 2 \Rightarrow \Delta(G) - \delta(G) = 2$$

از فرض دیگر سؤال یعنی $\Delta(G) + \delta(G) = 12$ استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} \Delta(G) + \delta(G) = 12 \\ \Delta(G) - \delta(G) = 2 \end{cases} \Rightarrow 2\Delta(G) = 14 \Rightarrow \Delta(G) = 7 \Rightarrow \delta(G) = 5$$


چون $\Delta(G) = 7$ ، پس گراف G حداقل باید ۸ رأس داشته باشد ولی در این حالت چون ماکزیمم درجه برابر $P - 1 = 8 - 1 = 7$ است، پس در گراف مکمل یعنی $\bar{G}$ رأس منفرد خواهیم داشت و $\bar{G}$ ناهمبند است. چون $\bar{G}$ همبند است. پس حداقل رئوس گراف G برابر ۹ است و داریم:

$$P = 9$$

$$\delta(\bar{G}) = P - 1 - \Delta(G) = 9 - 1 - 7 = 1$$

$$\Delta(\bar{G}) - \delta(\bar{G}) = 2 \Rightarrow \Delta(\bar{G}) - 1 = 2 \Rightarrow \Delta(\bar{G}) = 3$$

گراف $\bar{G}$ با شرایط فوق و کمترین یال به صورت زیر است:



$$q_{\min}(\bar{G}) = 8$$

فیزیک

▲ مشخصات سؤال: ساده * فیزیک ۱ (فصل ۵)

۴۱- پاسخ: گزینه ۱

طبق متن کتاب درسی گزینه ۱ درست است.


▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۲ (فصل ۳)

۴۲- پاسخ: گزینه ۲

طبق قاعده دست راست در سیم حامل جریان، چون جریان بالای سیم درون سو و در قسمت پایین آن برون سو است، جریان به سمت چپ ($\leftarrow$) است.

قاعده دست راست را برای الکترون می‌نویسیم (فقط حواستون باشه بار الکترون منفی است و جهت نیرو در نهایت باید


برعکس بشه)



۴۳- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۶)

معادله واپاشی را می نویسیم:



پس هسته دختر ۸ (۷-۱۵) نوترون دارد.

۴۴- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۲ (فصل ۴)

طبق متن کتاب درسی هنگام عبور جریان الکتریکی پایا (ثابت) از القاگر آرمانی، انرژی به آن وارد یا از آن خارج نمی شود.

۴۵- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۱ (فصل ۳)

طبق قضیه کار- انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{mg} + W_f = K_f - K_i \Rightarrow \frac{mgh}{W} + W_f = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 \Rightarrow 8 \times 22 - 16 = \frac{1}{2} \left(\frac{0}{8} \right) v_f^2$$

$$\Rightarrow v_f^2 = \frac{16 \times 2}{0/8} = 400 \Rightarrow v_f = 20 \frac{m}{s}$$

۴۶- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۱ (فصل ۲)

ابتدا چگالی مخلوط را محاسبه می کنیم:

$$\rho = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} \Rightarrow \rho = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{400 + 600} = \frac{400 + 720}{1000} = \frac{1120}{1000} = 1/12 \frac{g}{cm^3}$$

$$P_g = P - P_o = \rho gh = 1/12 \times 10^3 \times 10 \times 0/5 = 5600 \text{ Pa} = 5/6 \text{ kPa}$$

حال فشار پیمانه‌ای ناشی از مایع را محاسبه می کنیم:

۴۷- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۱)

ابتدا زمان کل حرکت را محاسبه می کنیم:

$$\Delta y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 80 = \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t = 4 \text{ s}$$

پس ۰/۶ s قبل از رسیدن یعنی زمان $t' = 3/4 \text{ s}$ ، مکان گلوله در این لحظه را حساب کرده و از ۸۰ متر کم می کنیم:

$$\Delta y = \frac{1}{2}g(t')^2 \Rightarrow 80 = \frac{1}{2}(10)(3/4)^2 = 57/8 \text{ m}$$


$$80 - 57/8 = 22/2 \text{ m}$$

۴۸- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۳ (فصل ۱)

برای محاسبه سرعت متوسط دو متحرک ابتدا نمودار سرعت- زمان را رسم کرده پس نسبت جابه جایی آن‌ها در ۸ s اول حرکت را مقایسه می کنیم:

متحرک A:



$$v = at + v_0$$


$$\Rightarrow v_{4s} = 2/5 \times 4 + 0 = 10 \frac{m}{s}$$

$$v_{8s} = 2/5 \times 8 + 0 = 18 \frac{m}{s}$$

$$\Delta x_A = S_1 + S_2 = \left(\frac{4 \times 10}{2} \right) + \left(\frac{10 + 18}{2} \times 4 \right)$$

$$\Rightarrow \Delta x_A = 20 + 56 = 76 \text{ m}$$

متحرک B:



$$v = at + v_0$$

$$\Rightarrow v_{4s} = 2 \times 4 + 0 = 8 \frac{m}{s}$$

$$v_{8s} = 2/5 \times 8 + 8 = 18 \frac{m}{s}$$

$$\Delta x_B = S_1 + S_2 = \left(\frac{8 \times 4}{2} \right) + \left(\frac{8 + 18}{2} \times 4 \right)$$

$$\Rightarrow \Delta x_B = 16 + 52 = 68 \text{ m}$$

حال خواسته سؤال را محاسبه می کنیم:

$$\frac{v_{av,B}}{v_{av,A}} = \frac{\Delta x_B}{\Delta x_A} = \frac{68}{76} = \frac{17}{19}$$

۴۹- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۳ (فصل ۱)

ابتدا مکان و سرعت اتومبیل A را در $t = 3\text{ s}$ محاسبه می‌کنیم:

$$v_A = at + v_0 = 2 \times 3 + 0 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad x_A = \frac{1}{2}(2)(9) + 0 = 9\text{ m}$$

لحظه $t = 3\text{ s}$ را به عنوان مبدأ زمان در نظر می‌گیریم و معادله مکان- زمان دو اتومبیل را می‌نویسیم:

$$x_A = \frac{1}{2}(2)t^2 + 6t + 9 = t^2 + 6t + 9$$

$$x_B = v_B t = 16t$$

چون $t = 3\text{ s}$ را مبدأ حرکت در نظر گرفتیم پس بازه مورد نظر سؤال $t = 4\text{ s}$ تا $t = 6\text{ s}$ است. حال در هر لحظه مکان دو اتومبیل را به دست می‌آوریم:

$$t = 4\text{ s}: \begin{cases} x_A = 16 + 24 + 9 = 49\text{ m} \\ x_B = 16 \times 4 = 64\text{ m} \end{cases} \Rightarrow \Delta x = 15\text{ m}$$

$$t = 5\text{ s}: \begin{cases} x_A = 25 + 30 + 9 = 64\text{ m} \\ x_B = 16 \times 5 = 80\text{ m} \end{cases} \Rightarrow \Delta x = 16\text{ m}$$

$$t = 6\text{ s}: \begin{cases} x_A = 36 + 36 + 9 = 81\text{ m} \\ x_B = 16 \times 6 = 96 \end{cases} \Rightarrow \Delta x = 15\text{ m}$$

پس فاصله دو اتومبیل ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش پیدا کرده است.


▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۳ (فصل ۱)

۵۰- پاسخ: گزینه ۱

باید نشان دهیم مکان هر متحرک در هر لحظه چگونه

تغییر می‌کند تا با کمک مکان‌های آن‌ها دور یا نزدیک

شدن دو متحرک را تشخیص دهیم:

هر دو متحرک در $t = 0$ در $x = 0$ قرار دارند.با توجه به اینکه شتاب متحرک A در بازه زمانی $(0, 50\text{ s})$ ثابت است، پس $t' = 40\text{ s}$ است.در $t' = 40\text{ s}$ مکان دو متحرک را محاسبه می‌کنیم:

$$x_B = vt + x_0 = 20 \times 40 + 0 = 800\text{ m}$$

$$x_A = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)(40)^2 + 0 = 400\text{ m}$$

در $t = 50\text{ s}$ داریم:

$$x_B = 20 \times 50 = 1000\text{ m}$$

$$x_A = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)(50)^2 = 625\text{ m}$$

در $t = 60\text{ s}$:

$$x_B = 20 \times 60 = 1200\text{ m}, \quad x_A = v_A t + x'_0 = 25 \times 10 + 625 = 875\text{ m}$$

در $t = 70\text{ s}$:

$$x_B = 20 \times 70 = 1400\text{ m}, \quad x_A = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)(10)^2 + 250 + 875 = 1100\text{ m}$$

در $t = 80\text{ s}$:

$$x_B = 20 \times 80 = 1600\text{ m}, \quad x_A = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)(10)^2 + 200 + 1100 = 1275\text{ m}$$

و در آخر در $t = 90\text{ s}$:


$$x_B = 20 \times 90 = 1800\text{ m}, \quad x_A = v_A t + x''_0 = 15 \times 10 + 1275 = 1425\text{ m}$$

مشخص است در هر بازه زمانی ۱۰ ثانیه‌ای متحرک B، ۲۰۰ متر جابه‌جا می‌شود ولی جابه‌جایی متحرک A بیشتر یا کمتر از این مقدار است، پس این دو متحرک هرگز به هم نمی‌رسند.

۵۱- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۲)

ابتدا نیروهای وارد بر جسم را رسم می کنیم:

چون نیروی $F_p > mg$ است، پس جسم رو به بالا حرکت می کند. پس داریم:

$$F_1 = F_N \Rightarrow F_N = 40 \text{ N}$$

$$f_k = \mu_k F_N = 0.4 \times 40 = 16 \text{ N}$$

$$R = \sqrt{F_N^2 + f_k^2} = \sqrt{40^2 + 16^2}$$

$$= \sqrt{16^2 (5^2 + 2^2)} = 16\sqrt{29} \text{ N}$$

۵۲- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۳ (فصل ۲)

حداقل نیرو برابر است با $f_{s, \max}$ ، پس:

$$f_{s, \max} = \mu_s F_N = \mu_s mg = 0.5 \times 5 \times 10 = 25 \text{ N}$$

برای اینکه جسم متوقف نشود و چون حداکثر نیرو مدنظر است پس باید مجموعه با سرعت ثابت حرکت کند، پس:

$$F - f_k = ma = 0 \Rightarrow F = f_k \Rightarrow F = \mu_k (m + m')g \Rightarrow 25 = 0.4(5 + m')10 \Rightarrow m' = 1/25 \text{ kg}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۲)

۵۳- پاسخ: گزینه ۲

طبق رابطه $F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ داریم:

$$F_{av} = ma = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow 0.2a = \frac{v-1}{10-0} \Rightarrow a = 3 \frac{m}{s^2}$$

چون نمودار یک خط راست با شیب ثابت است، پس شتاب لحظه ای با شتاب متوسط برابر است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۲)

۵۴- پاسخ: گزینه ۴

ابتدا سرعت را به $\frac{m}{s}$ تبدیل می کنیم:

$$v = 36 \frac{km}{h} \div 3.6 = 10 \frac{m}{s}$$

نیروی مرکزگرای خودرو در پیچ جاده را نیروی اصطکاک تأمین می کند، پس:


$$f_{s, \max} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow \mu_s mg = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow \mu_s = \frac{v^2}{gr} \Rightarrow \mu_s = \frac{10^2}{10 \times 25} = 0.4$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۳)

۵۵- پاسخ: گزینه ۳

طبق شکل مقابل می دانیم نوسانگر فاصله زمانی نقطه تعادل تا $\frac{A}{2}$ را در $\frac{T}{12}$ طی می کند.

$$\frac{T}{12} = \frac{1}{60} \Rightarrow T = 0.2 \text{ s}$$



حال که دوره تناوب را داریم به راحتی تعداد نوسان در ۶۰s را محاسبه می کنیم:

$$n = \frac{\Delta t}{T} = \frac{60}{0.2} = 300$$

۵۶- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۳)

این سؤال عیناً از پرسش کتاب درسی مطرح شده است. سه شکل را بررسی می کنیم:

در شکل ۱: تندی صوت بیشتر از تندی چشمه است.

در شکل ۲: تندی چشمه از تندی صوت بیشتر است.

در شکل ۳: تندی صوت بزرگ تر از تندی چشمه است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۳)

۵۷- پاسخ: گزینه ۴


می دانیم دوره حرکت نوسانگر جرم- فنر از رابطه $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ محاسبه می شود. پس از رابطه نسبتی داریم:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \Rightarrow \frac{0.6T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{m_1 - 320}{m_1}} \Rightarrow \frac{36}{100} = \frac{m_1 - 320}{m_1} \Rightarrow 36m_1 = 100m_1 - 32000 \Rightarrow m_1 = 500 \text{ g}$$

۵۸- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۴)

چون محیط دوم ضریب شکست کمتری دارد، سرعت بیشتر می شود و پرتو از خط عمود دور می شود.



$$\frac{v}{v'} = \frac{n'}{n} = \frac{1/25}{1/5} = \frac{5}{6} \Rightarrow v' = \frac{6}{5}v$$

۵۹- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۴)

طبق رابطه $f = \frac{v}{\lambda L}$ ، بسامد صوت اصلی با سرعت رابطه مستقیم دارد. همچنین رابطه سرعت با نیروی کشش تار هم طبق رابطه $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$$f = \frac{1}{\lambda L} \sqrt{\frac{F}{\mu}} \xrightarrow{\text{رابطه مقایسه‌ای بسامد}} \frac{f_1}{f_2} = \sqrt{\frac{F_1}{F_2}} \Rightarrow \frac{f_1}{1/2f_1} = \sqrt{\frac{50}{F_2}} \Rightarrow \frac{100}{144} = \frac{50}{F_2} \Rightarrow F_2 = 72 \text{ N}$$

در نهایت خواسته سؤال:

$$\Delta F = F_2 - F_1 = 72 - 50 = 22 \text{ N}$$

۶۰- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: ساده * فیزیک ۳ (فصل ۵)

۶۱- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۵)

$$K_{\max} = hf - hf_0 = 5hf_0 - hf_0 = 4hf_0 = 4W_0 = 4 \times 1/75 = 7 \text{ eV} = 7 \times 1/6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1/12 \times 10^{-18} \text{ J}$$

۶۲- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۳ (فصل ۶)

بررسی عبارت‌های نادرست:

طبق متن کتاب درسی در پرتوایی طبیعی تعداد نوکلئون‌ها همواره ثابت و برابر است. («الف» و «ب» نادرست) فقط مورد «پ» درست است.

۶۳- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۲ (فصل ۱)

در هر دو حالت E_t را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{حالت اول: } E_1 = \frac{kq_1}{r_1^2} = \frac{k(10)}{(20)^2} = \frac{k}{40}, \quad E_2 = \frac{k(20)}{(40)^2} = \frac{k}{80}$$

$$E_t = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{\left(\frac{k}{40}\right)^2 + \left(\frac{k}{80}\right)^2} = \frac{k}{40} \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{k}{40} \sqrt{\frac{5}{4}}$$

$$\text{حالت دوم: } E'_1 = \frac{k}{40}, \quad E_2 = \frac{k(20)}{(20)^2} = \frac{k}{20}$$

$$E'_t = \sqrt{\left(\frac{k}{40}\right)^2 + \left(\frac{k}{20}\right)^2} = \frac{k}{20} \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{k}{20} \sqrt{\frac{5}{4}}$$


$$\frac{E'_t}{E_t} = \frac{\frac{k}{20} \sqrt{\frac{5}{4}}}{\frac{k}{40} \sqrt{\frac{5}{4}}} = 2$$

۶۴- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۲ (فصل ۱)

ابتدا میدان‌های ناشی از هر بار را در نقطه M رسم می‌کنیم:

چون مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است، اندازه فاصله‌ها به راحتی مطابق شکل روبه‌رو قابل محاسبه است.



$$E = \frac{k|q|}{r^2}$$

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{(3\sqrt{2} \times 10^{-2})^2} = 2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}, \quad E_2 = E_1 = 2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_3 = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{(3\sqrt{2} \times 10^{-2})^2} = 2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$\text{در راستای محور x: } E_1 + E_2 = E_x \Rightarrow E_x = 4 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}, \quad E_y = 2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_t = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{(4 \times 10^5)^2 + (2 \times 10^5)^2} = 10^5 \sqrt{16 + 4} = 2 \times 10^5 \sqrt{5} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

۶۵- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۲ (فصل ۱)

طبق صورت سؤال $\Delta V = 2 \times 10^3 \text{ V}$ ، $\Delta U = 8 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{h}$ ، پس:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \Rightarrow \Delta V = \frac{\Delta U}{ne} \Rightarrow n = \frac{\Delta U}{e \Delta V} = \frac{8 \times 10^3 \times 3600}{1.6 \times 10^{-19} \times 2000} = 9 \times 10^{22}$$

۶۶- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۲ (فصل ۲)

$$500 \text{ mA} = 0.5 \text{ A}$$

$$P_1 = VI_1 \Rightarrow P_1 = 8 \times 0.5 = 4 \text{ W}$$

$$R_1 = \frac{V}{I_1} \Rightarrow R_1 = \frac{8}{0.5} = 16 \Omega$$

$$P_2 = P_1 + 0.6 P_1 = 1.6 P_1 = 1.6 \times 4 = 6.4 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R_2} \Rightarrow 6.4 = \frac{64}{R_2} \Rightarrow R_2 = 10 \Omega$$

$$R_2 - R_1 = -6 \Rightarrow 6 \Omega \text{ کاهش}$$

۶۷- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۲ (فصل ۲)

در حالت اول دو مقاومت ۶ و ۱۲ اهمی مطابق شکل موازی اند و مقاومت معادل آن‌ها ۴ Ω است و این مقاومت با دیگر مقاومت ۶ اهمی متوالی است که مقاومت کل مقدار ۱۰ Ω را پیدا می‌کند. پس داریم:

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq} + r} = \frac{24}{10 + r} \quad \text{رابطه (۱)}$$

در حالت دوم در شاخه سوم مقاومت ۱۳ اهمی اضافه شده که با مقاومت ۶ اهمی پایین موازی است و مقاومت معادل آن‌ها ۲ Ω است پس مقاومت کل $R_{eq} = 4 + 2 = 6 \Omega$ پس داریم:

$$I_2 = \frac{24}{6 + r} \xrightarrow{\text{رابطه (۱)}} \frac{24}{6 + r} = \frac{24}{10 + r} + 1$$

با جایگذاری گزینه‌ها $r = 2$ پاسخ درست می‌باشد.

۶۸- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۲ (فصل ۲)

پس از وصل کلید، دو مقاومت موازی اتصال کوتاه کرده و از مدار خارج می‌شوند و مقاومت معادل کاهش می‌یابد؛ پس حتماً جریان افزایش می‌یابد. از طرفی داریم:

$$V_1 = IR, \quad V_2 = \mathcal{E} - Ir$$

همان‌طور که واضح است با افزایش جریان V_2 کاهش و V_1 افزایش می‌یابد.

۶۹- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: ساده * فیزیک ۲ (فصل ۳)

در شکل حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده اما همچنان جهت‌گیری‌ها چندان هم‌سو نیست که این حالت بیانگر قرار گرفتن یک ماده فرومغناطیسی در معرض یک میدان مغناطیسی خارجی ضعیف است.


۷۰- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۲ (فصل ۴)

بازه $(0, t_1)$: شیب نمودار $\left(\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}\right)$ منفی است، پس طبق رابطه $\mathcal{E}_{av} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ مقدار $\mathcal{E}_{av}$ مثبت و ثابت است پس با توجه به $I_{av} = \frac{\mathcal{E}_{av}}{R}$ جریان هم مقداری ثابت و مثبت دارد (رد گزینه‌های ۱ و ۲)

در بازه $(t_1, \frac{3}{2}t_1)$: شیب نمودار صفر $\leftarrow \mathcal{E}_{av} = 0 \leftarrow I_{av} = 0$

در بازه $(\frac{3}{2}t_1, 2t_1)$: شیب نمودار منفی $\leftarrow \mathcal{E}_{av} > 0, I_{av} > 0$ اما باید توجه کرد که طبق نمودار سؤال، شیب این قسمت اندازه بیشتری دارد؛ پس مقدار $\mathcal{E}_{av}$ و I_{av} در این بازه بیشتر از بازه اول است.



۷۱- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۱ (فصل ۱)

$$\left. \begin{aligned} R_A &= 2R_B \\ R_B &= 2r_B \\ m_A &= 3m_B \\ h_A &= 3h_B \end{aligned} \right\} \text{طبق داده‌های مسئله:}$$


از رابطه نسبتی چگالی کمک می‌گیریم:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{\pi(R_B^3 - r_B^3)h_B}{\pi R_A^3 h_A} \Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{3m_B}{m_B} \times \frac{(R_B^3 - r_B^3)h_B}{4R_B^3 \times (3h_B)} = 3 \times \frac{3}{4 \times 3} = \frac{3}{4}$$

۷۲- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۱ (فصل ۲)

با بازکردن شیر رابط، سطح آزاد دو مایع جابه‌جا می‌شوند تا به حالت تعادل برسند؛ یعنی شکل مقابل:




$$\begin{aligned} P_A &= P_B \Rightarrow \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 \\ \Rightarrow \rho_1 h_1 &= \rho_2 h_2 \Rightarrow 1.3 \times h = 1.0 \times 15 \\ \Rightarrow h &= 11.5 \text{ cm} \\ \Rightarrow \Delta h &= 15 - 11.5 = 3.5 \text{ cm} \end{aligned}$$

۷۳- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۱ (فصل ۳)

می‌دانیم بیشینه انرژی جنبشی وزنه در نقطه‌ای است که از حالت تعادل عبور می‌کند، چون مقاومت هوا ناچیز است، طبق پایستگی انرژی داریم:



$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 \\ \Rightarrow \cancel{K_1} + U_1 &= K_2 + \cancel{U_2} \\ \Rightarrow mgh &= K_2 \Rightarrow 0.2 \times 10 \times 1 = K_2 \\ \Rightarrow K_2 &= 2 \text{ J} \end{aligned}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار * فیزیک ۱ (فصل ۵)

۷۴- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{P_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2}{n_2 T_2}$$

چون حجم ثابت است پس:

(سؤال به ما فشار پیمانه‌ای را داده اما در معادله حالت باید فشار مطلق را قرار دهیم، پس $P_{\text{مطلق}} = P_{\text{پیمانه‌ای}} + P_0$)

$$\frac{4}{n_1(320)} = \frac{3}{n_2(300)} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = 0.8 \xrightarrow[\text{ثابت: } M]{n = \frac{m}{M}} \frac{m_2}{m_1} = 0.8$$

پس ۲۰٪ خارج شده است.

۷۵- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * فیزیک ۱ (فصل ۵)

می‌دانیم در فرایند بی‌دررو گرما مبادله نمی‌شود، پس:

$$Q_2 = 0, \Delta U_2 = W_2$$

در فرایند هم‌دما، انرژی درونی صفر است، پس:

$$\Delta U_1 = 0 \Rightarrow Q_1 = -W_1$$

در فرایندها حجم کاهش یافته است، پس داریم:

$$W_1 > 0 \Rightarrow Q_1 < 0$$


شیمی

۷۶- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۱ (فصل ۱)

اولاً دقت کنیم که عنصر A می‌تواند هر عنصری از عدد اتمی ۲۰ (Ca) تا ۳۰ (Zn) را شامل شود، به غیر از دو عنصر ۲۴Cr و ۲۹Cu که آرایش الکترونی لایه ظرفیت آن‌ها به $4s^1$ پایان می‌یابد.

(۱) درست



$${}_2\text{Ca} = 20 - 11 = 9, {}_3\text{Zn} = 30 - 11 = 19$$

(۲) نادرست؛ چون عنصر A نمی‌تواند Cr یا Cu باشد، پس می‌توان آن را به ۸ عنصر دسته d در دوره ۴ نسبت داد.

(۳) نادرست؛ همگی این عناصر فلز هستند و امکان تشکیل ترکیب مولکولی ندارند.

(۴) نادرست؛ در میان این ۹ فلز فقط فلز کلسیم می‌تواند یون پایدار «۲+» تشکیل دهد، که این یون به آرایش $[18\text{Ar}]$ می‌رسد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۱ (فصل ۱)

۷۷- پاسخ: گزینه ۳

(۱) درست؛ سه فلز و یک شبه فلز: Na, Mg, Al, Si

(۲) درست؛ آرایش الکترون لایه ظرفیت عناصر واسطه به جز Cr و Cu به $4s^2$ پایان می‌یابد.

(۳) نادرست؛ پانزدهمین عنصر دسته d، همان پنجمین عنصر دسته d در دوره ۵ است. پس عدد اتمی آن برابر است با:

$$36 + 2 + 5 = 43$$


سیزدهمین عنصر دسته p همان اولین عنصر دسته p در دوره ۴ است. پس عدد اتمی آن برابر است با:

$$18 + 2 + 10 + 1 = 31$$

$$43 - 31 = 12$$

دومین فلز قلیایی: ${}_{11}\text{Na}$

(۴) درست؛



$$M \text{ و } A : 32 - 21 = 11$$

شعله ${}_{11}\text{Na}$ زرد است. دقت کنیم که Ge شبه فلز است و یون پایدار ندارد. در صورت سؤال هم نگفته یون پایدار M^{2+} ، پس ایرادی وارد نیست.

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۱ (فصل ۱) و شیمی ۳ (فصل ۳)

۷۸- پاسخ: گزینه ۴

(الف) نادرست؛ He آرایش هشت تایی ندارد.

(ب) نادرست؛ در جدول تناوبی جرم اتمی میانگین عناصر گزارش می‌شود. (نه عدد جرمی!)

(پ) درست؛ عناصر ${}_{29}\text{Cu}$ تا ${}_{36}\text{Kr}$ ، دارای زیرلایه $3d^1$ هستند.

(ت) درست؛ چون یون‌های پایدار هم‌الکترون هستند، اما مقدار بار که با افزایش عدد اتمی کاهش می‌یابد بر شعاع یونی اولویت دارد.

$$\frac{|q|}{r} : N^{3-} > O^{2-} > F^{-}$$

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۱ (فصل ۲)

۷۹- پاسخ: گزینه ۴

(۱) نادرست؛ نقطه جوش هلیوم -269°C است و در دمای -185°C همچنان گاز است.

(۲) نادرست؛ با افزایش دما از -200 به ترتیب ابتدا N_2 ، سپس Ar و O_2 جدا می‌شوند.

(۳) نادرست؛

°C : نقطه ذوب یخ

°C : -78 نقطه تصعید یخ خشک



(۴) درست؛

گاز	N_2	Ar	O_2
نقطه جوش	-196	-186	-183

۸۰- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۱ (فصل ۱)

ابتدا دو واکنش را موازنه می‌کنیم:





دقت کنیم که در هر دو واکنش نسبت ضریب مولی سوخت (متان و متانول) به CO_2 ۱ به ۱ است، پس میزان CO_2 برابر نشان‌دهندهٔ برابری مقدار مول CH_4 و CH_3OH است.

$$\frac{x \text{ mol CH}_3\text{OH} \times \frac{32 \text{ g CH}_3\text{OH}}{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}}{x \text{ mol CH}_4 \times \frac{16 \text{ g CH}_4}{1 \text{ mol CH}_4}} = 2$$

۸۱- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۲ (فصل ۱)

برای سهولت ابتدا همه ترکیب‌ها را شماره‌گذاری و نام‌گذاری می‌کنیم. ترکیب‌های هم‌نام یکسان خواهند بود.



پس ترکیب‌های «پ» و «ت» یکسان هستند.

حالا مجموع شماره شاخه‌های فرعی:

الف) $3 + 4 + 2 = 9$ ب) $3 + 4 + 3 = 10$ «ب» و «ت»: $4 + 3 + 5 = 12$

پس کمترین مجموع اعداد مربوط به ترکیب «الف» است.

۸۲- پاسخ: گزینه ۲ ▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۱ (فصل ۳)

الف) نادرست؛ هر دو حلال، کاربرد صنعتی دارند.

(ب) نادرست؛ H_2O و NH_3 دارای پیوند هیدروژنی هستند.



(پ) درست

ت) درست؛ چون انحلال پذیری گاز NO از O_2 بیشتر است. بر طبق قانون هنری تابعیت انحلال پذیری آن نیز نسبت به تغییرات فشار و دما شیب بیشتری در نمودار نشان می دهد.

۸۳- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۱ (فصل ۳)

ابتدا واکنش را موازنه می‌کنیم. می‌توان واکنش را با وارسی و یا با تغییر عدد اکسایش موازنه کرد.



$$\frac{.73 \text{ L} \times \frac{.1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mol S}}{2 \text{ mol NaOH}} \times \frac{32 \text{ g S}}{1 \text{ mol S}} = .116 \text{ g S}$$

حالا یک استوکومتری ساده:

۸۴- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * شیمی ۱ (فصل ۳)

ابتدا جرم SO_4^{2-} در هر دو ماده را به دست می آوریم:

$$100 \text{ g محلول} \times \frac{1380 \text{ g Na}^+}{106 \text{ g محلول}} \times \frac{1 \text{ mol Na}^+}{23 \text{ g Na}^+} \times \frac{1 \text{ mol SO}_4^{2-}}{2 \text{ mol Na}^+} \times \frac{96 \text{ g SO}_4^{2-}}{1 \text{ mol SO}_4^{2-}} = 288 \times 10^{-3} \text{ g SO}_4^{2-}$$

$$40 \times 10^{-3} \text{ g Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \times \frac{1 \text{ mol Fe}_2(\text{SO}_4)_3}{400 \text{ g Fe}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{3 \text{ mol SO}_4^{2-}}{1 \text{ mol Fe}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{96 \text{ g SO}_4^{2-}}{1 \text{ mol SO}_4^{2-}} = 288 \times 10^{-3} \text{ g SO}_4^{2-}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{288 \times 10^{-3} + 288 \times 10^{-3}}{100} \times 10^6 = 2880 + 2880 = 3168$$

۸۵- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۱ (فصل ۳)

(۱) درست؛ جاذبه یون های نمک با حلال آب جاذبه یون دو قطبی است که با تغییر دما قدرت آن تغییر می کند، اما نوع آن تغییر نمی کند.
 (۲) نادرست؛ بسته به اینکه انحلال ΔH ، + یا - باشد، با تغییر دما ممکن است انحلال پذیری افزایش یا کاهش داشته باشد. ضمناً نمی دانیم محلول اولیه سیر شده یا سیر نشده بوده است.
 (۳) نادرست؛ تشکیل بلور نشان دهنده کاهش انحلال پذیری با افزایش دما و گرماده بودن فرایند است.
 (۴) نادرست؛ برخی نمک ها رفتار غیر خطی دارند.

۸۶- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۲ (فصل ۱)

 C_8H_{18} آلکان است و در شرایط عادی با برم مایع واکنش نمی دهد.

$$\text{C}_7\text{H}_{14} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_7\text{H}_{14}\text{Br}_2$$

$$1/6 \text{ g Br}_2 \times \frac{1 \text{ mol Br}_2}{160 \text{ g Br}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}_7\text{H}_{14}}{1 \text{ mol Br}_2} = 10^{-3} \text{ mol C}_7\text{H}_{14}$$

$$\text{C}_7\text{H}_{14} : 7 \times 12 + 14 \times 1 = 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$? \text{ g C}_7\text{H}_{14} : 98 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 0/01 \text{ mol} = 0/98 \text{ g}$$

$$\text{C}_8\text{H}_{18} \text{ در مخلوط} : 1/208 - 0/98 = 0/228 \text{ g C}_8\text{H}_{18}$$

$$? \text{ mol C}_8\text{H}_{18} : 0/228 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{114 \text{ g}} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$$

$$\text{نسبت خواسته شده} : \frac{10^{-3} \text{ mol C}_7\text{H}_{14}}{2 \times 10^{-3} \text{ mol C}_8\text{H}_{18}} = 5$$

۸۷- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۲ (فصل ۱)

ابتدا واکنش را موازنه می کنیم:

دقت شود که در شرایط STP، H_2O دیگر گاز نیست، پس:

$$4 \text{ mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9 = (12 + 6 + 1) \text{ mol گاز}$$

$$\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9 = 3 \times 12 + 5 \times 1 + 3 \times 14 + 9 \times 16 = 227 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$


$$363/2 \text{ g ماده} \times \frac{x}{100} \times \frac{1 \text{ mol ماده}}{227 \text{ g ماده}} \times \frac{19 \text{ mol گاز}}{4 \text{ mol ماده}} \times \frac{22/4 \text{ L}}{1 \text{ mol گاز}} = 127/68 \text{ L} \Rightarrow x = 75$$

درصد خلوص

۸۸- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۲ (فصل ۱)

ابتدا ساختار ماده را رسم می کنیم.



بر اساس تقارن سه نوع کربن (جایگاه متفاوت H) داریم، پس سه ایزومر کلر دار خواهیم داشت.

۸۹- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار * شیمی ۲ (فصل ۱)

A: نافلز است ولی گاز نجیب نیست.

الف) نادرست؛ A می تواند H_2 ، N_2 ، O_2 و F_2 باشد، که در دوره اول شبه فلز نداریم؛ در دوره دوم فقط B شبه فلز است؛ در دوره سوم نیز فقط Si شبه فلز است.

(ب) درست؛ تنها گروهی که دو نافلز گازی دارای فعالیت شیمیایی دارد، گروه ۱۷ (Cl_2 ، F_2) است. در این گروه $\text{Br}_2(\text{l})$ و $\text{I}_2(\text{s})$ است.


(پ) نادرست؛ عدد اتمی A از عدد اتمی Ge یعنی عدد ۳۲ کمتر است. پس A در یکی از دوره های ۱، ۲ یا ۳ است و نمی تواند با Zn (دوره ۴) و نقره (دوره ۵) هم دوره باشد.

(ت) درست؛ بنا به صورت عبارت، A باید یک هالوژن گازی باشد و D نافلزی قوی تر از آن، پس A باید Cl و D F است.(متأسفانه طراح محترم از H_2 غافل شده است که خصلت نافلزی $\text{H} > \text{He}$ است و کمترین عدد اتمی را دارد.)

۹۰- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار * شیمی ۲ (فصل ۲)

(الف) نادرست؛ ابتدا فرمول دو ترکیب را به دست می آوریم:




(a)

 C_9H_8 : آلکان هم کربن

$$20 - 6 \times 2 = 8$$

a: C_9H_8O

$$\text{تعداد پیوند} : \frac{9 \times 4 + 8 \times 1 + 2}{2} = 23$$

پیوند $23 - 18 = 5$: اختلاف پیوندهاالکترون اشتراکی $5 \times 2 = 10$ 

(b)

 C_7H_6 : آلکان هم کربن

$$16 - 5 \times 2 = 6$$

b: C_7H_6O


$$\text{تعداد پیوند} : \frac{7 \times 4 + 6 \times 1 + 2}{2} = 18$$

(ب) نادرست؛ فرمول دو ترکیب را از هم کم می کنیم.


اتین (C_2H_2) اولین آلکین است:(پ) درست؛ چون تعداد هیدروژن ها در مولکول a بیشتر است، پس با جایگزین کردن اتم های H با گروه های متیل ($-CH_3$)، افزایش جرم مولی بیشتر نیز خواهد بود.

(ت) درست؛ در هر دو ترکیب اتم های H فقط به اتم های C متصل هستند، پس تعداد اتم های H همان تعداد پیوندهای C-H است.

$$(C-H)_a - (C-H)_b = 8 - 6 = 2$$



۷ کربن با عدد اکسایش -۱



۵ کربن با عدد اکسایش -۱

در شکل های روبه رو کربن های با عدد اکسایش -۱ (گروه های CH) مشخص شده اند.

$$7 - 5 = 2 : \text{اختلاف مورد نظر}$$

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۲ (فصل ۳)

۹۱- پاسخ: گزینه ۱

نام	فرمول شیمیایی	اختلاف شمار اتم ها و نوع عناصر
سیانواتن	$CH_2 = CH - C \equiv N$	$7 - 3 = 4 \quad \checkmark$
وینیل کلرید	$CH_2 = CH - Cl$	$6 - 3 = 3 \quad \times$
تترا فلئورواتن	C_2F_4	$6 - 2 = 4 \quad \checkmark$
فرمیک اسید	$HCOOH$	$5 - 3 = 2 \quad \times$
استون	$CH_3 - C(=O) - CH_3$	$10 - 3 = 7 \quad \times$
پروپین	C_3H_4	$7 - 2 = 5 \quad \times$

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۲ (فصل ۲)

۹۲- پاسخ: گزینه ۳


(۱) نادرست؛ دو واکنش عکس یکدیگر هستند و ΔH آن ها قرینه هم است.

(۲) نادرست؛ میعان تبدیل گاز به مایع و انجماد تبدیل مایع به جامد است.

$$\Delta H_{\text{انجماد}} < \Delta H_{\text{میعان}} < 0$$

دقت کنیم که در مواد، اختلاف انرژی (g) و (l) بیشتر از (l) و (s) است.

(۳) درست؛ به شکل زیر دقت کنید.




(۴) نادرست؛ در فرایند چگالش که تبدیل گاز به جامد است، اختلاف سطح انرژی

بیشتر از فرایند میعان است که تبدیل گاز به مایع است.

۹۳- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۲ (فصل ۲)


ابتدا واکنش سوختن هیدروژن در حالت گازی را می‌نویسیم:



$$\Delta H = \Delta H = 2\Delta H_{(\text{H}-\text{H})} + \Delta N_{(\text{O}=\text{O})} - 4\Delta H_{(\text{O}-\text{H})} \Rightarrow -484 = 2\Delta H_{(\text{H}-\text{H})} + 496 - 4 \times 460$$

$$\Delta H_{(\text{H}-\text{H})} = \frac{-484 - 496 + 4 \times 460}{2} = 430 \text{ kJ}$$

حالا واکنش دوم:



$$\Delta H = \Delta H_{(\text{H}-\text{H})} - 2\Delta H_{(\text{H}-\text{Cl})} = 430 - 2 \times 430 = -430 \text{ kJ}$$

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۲ (فصل ۲)

۹۴- پاسخ: گزینه ۲

در واحد زمان قدرمطلق تغییر جرم A، ۳ برابر D است اما جرم مولی آن نیز سه برابر D است، پس تغییر مول دو ماده در واحد زمان با هم برابر است و ضریب مولی برابر دارند.

پس گزینه ۱ نادرست و گزینه ۲ درست است.

(۳) سرعت واکنش برابر با سرعت مولی ماده با ضریب ۱ است و ما نمی‌دانیم ضریب A و D چند است.

(۴) چون اطلاعات سؤال در مورد سرعت است و نه تغییر جرم (مول) آن‌ها، نمی‌توان تشخیص داد که A یا D واکنش‌دهنده یا فرآورده باشند.

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۳ (فصل ۱)

۹۵- پاسخ: گزینه ۱

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) مخلوط آب، صابون و روغن یک کلوئید است. پس ناهمگن و پایدار است.

(۳) صابون و آمونیوم نیترات (NH_4NO_3) هر دو ترکیب یونی هستند و در آب انحلال یونی دارند.

(۴) صابون از واکنش چربی با یکی از سه باز NaOH ، KOH و NH_3 به‌دست می‌آید. نمک حاصل از چربی با هیدروکسید فلزهای قلیایی (مثلاً Ca و Mg) رسوب ایجاد می‌کند.

▲ مشخصات سؤال: دشوار * شیمی ۳ (فصل ۱)

۹۶- پاسخ: گزینه ۲


ابتدا مقدار مول اولیه ۲ محلول را به‌دست می‌آوریم:

$$\text{HBr محلول: } 0.1 \text{ L} \times \frac{2 \text{ mol HBr}}{1 \text{ L}} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol HBr}$$

$$\text{NaOH محلول: } 0.1 \text{ L} \times \frac{4 \text{ mol}}{40 \text{ g}} = 4 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$0.2 \text{ L} \times \frac{4 \times 10^{-2} \text{ mol NaOH}}{1 \text{ L}} = 8 \times 10^{-3} \text{ mol NaOH}$$

حالا جدول تغییرات مولی:



پس در محلول پایانی ۰/۰۱۲ مول HBr داریم:

$$M_{\text{HBr}} = \frac{12 \times 10^{-3} \text{ mol}}{(0.1 + 0.2 + 0.2) \text{ L}} = 24 \times 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow [\text{H}^+] = M\alpha = 24 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 3 - \log 24 = 3 - \log 3 - 3 \log 2 = 3 - 0.5 - 0.9 = 1.6$$

۹۷- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۲)

(۱) نادرست؛ کاتیون به سمت کاتد می‌رود، e هم در مدار بیرونی از آند به کاتد می‌رود. پس هم‌جهت هستند. (متأسفانه طراح محترم توجه نداشته است که جهت حرکت الکترون‌ها با جهت جریان متفاوت است.)

(۲) نادرست



$$0.56 \text{ g Fe} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{56 \text{ g Fe}} \times \frac{2 \text{ mole}}{1 \text{ mol Fe}} \times \frac{9.6 \times 10^{23} e}{1 \text{ mole}} = 1.92 \times 10^{23} e$$

(۳) درست؛ Pt کاتد است، پس آنیون‌های محلول کاتدی به سمت آند می‌روند.

(۴) نادرست؛ چون پتانسیل کاهش Mn از آهن کمتر است، پس در این سلول گالوانی Mn آند و Fe کاتد است، ضمناً Fe^{2+} اکسند و Mn کاهنده است. پس مقدار emf:

$$\text{emf} = E^{\circ}_{\text{کاتد}} - E^{\circ}_{\text{آند}} = -0.44 - (-1.18) = +0.74 \text{ V}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۱)

۹۸- پاسخ: گزینه ۱

$$[\text{H}^{+}] = M\alpha \Rightarrow \begin{cases} 10^{-2} = 10^{-1/2} X \\ 10^{-3} = 10^{-0.7} Y \end{cases} \Rightarrow 10 = 10^{-0.6} \times \frac{X}{Y} \Rightarrow \frac{X}{Y} = 10^{0.6} = 10^{1+2\log 2} = 10 \times 10^{\log 4} = 40$$

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۳ (فصل ۳)

۹۹- پاسخ: گزینه ۴

(۱) درست؛ اساساً در کتاب درسی طرح سلول سوختی برای ضرورت نیاز به عدد اکسایش است.

(۲) درست



فلزات با قدرت کاهندگی بالا، کاتیون‌هایی با قدرت اکسندگی پایین دارند، پس در فرایند برقکافت محلول آبی نمک آن‌ها، در کاتد به جای کاهش کاتیون، آب دچار کاهش می‌شود. در نتیجه برای استخراج این فلزها در فرایند برقکافت از نمک مذاب استفاده می‌شود.

(۳) درست؛ نقطه ذوب NaCl برابر 801°C و نقطه ذوب مخلوط NaCl و CaCl_2 برابر 587°C است، پس اختلاف آن‌ها برابر 214°C (به تقریب 215°C) است.

(۴) نادرست؛ در سلول سوختی آند و کاتد دارای کاتالیزگر هستند. خود آن‌ها کاتالیزگر نیستند.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۲)

۱۰۰- پاسخ: گزینه ۱

ابتدا چهار نیم‌واکنش را برحسب پتانسیل از زیاد به کم مرتب می‌نویسیم. هرچه E° کمتر باشد، کاهنده قوی‌تری و هرچه E° بیشتر باشد، اکسند قوی‌تر است. واکنش بین کاهنده با E° کمتر و اکسند با E° بیشتر انجام می‌شود.

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۳ (فصل ۳)

۱۰۱- پاسخ: گزینه ۲

در بین ترکیب‌های یونی موجود در گزینه‌ها، بیشترین آنتالپی فروپاشی را Al_2O_3 دارد. کمترین هم مربوط به NaCl ، KCl و LiF است. ترکیب‌های با بار $1+$ و $1-$ اختلاف چندانی ندارند، پس می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین اختلاف متعلق به Al_2O_3 و LiF در گزینه‌ها است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۳)

۱۰۲- پاسخ: گزینه ۴

براساس شکل (a)، می‌توان فهمید که ترکیبی است که دارای یک جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی بوده و یک ترکیب قطبی است. (مانند NH_3)

براساس شکل (b)، می‌توان فهمید که ترکیبی مسطح، متقارن و ناقطبی است. (مانند SO_3)

در هیچ‌کدام از شکل‌ها نمی‌توان راجع به بار جزئی اتم مرکزی و جانی اظهار نظر کرد.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) درست؛ با توجه به کلمه می‌تواند، هر حالت امکان‌پذیر است. مثلاً PCl_3 برای (a) و SO_3 برای (b).(ب) نادرست؛ PF_3 برای (a) قابل قبول است اما FeCl_3 مولکول نیست، بلکه ترکیب یونی است.(پ) درست؛ SO_3 قطبی است، چون اتم S یک جفت الکترون ناپیوندی دارد و براین بردارهای گشتاور دوقطبی در آن صفر نمی‌شود.(ت) نادرست؛ اتم F در NF_3 بار جزئی $-\delta$ و اتم N در NO_2 بار جزئی $+\delta$ دارد.قدرت نافلزی: $\text{F} > \text{O} > \text{N}$

۱۰۳- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۴)

۱۰ کیلومتر در صورت سؤال هیچ ارزشی ندارد، چون سؤال مقایسه‌ای است.

آلاینده	درصد کاهش جرم	مقدار مول با استفاده از کاتالیزگر
CO	$\frac{5/99 - 0/61}{5/99} \times 100 \approx 90\%$	$\frac{0/61}{28} \approx 0/021$
C ₈ H ₁₈	$\frac{1/67 - 0/07}{1/67} \times 100 \approx 96\%$	$\frac{0/07}{114} \approx 0/0006$
NO	$\frac{1/04 - 0/04}{1/04} \times 100 \approx 96\%$	$\frac{0/04}{30} \approx 0/001$

۱۰۴- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: ساده * شیمی ۳ (فصل ۴)

(۱) نادرست؛ سنتز شیمیایی فرایندی است که در آن مواد شیمیایی ساده‌تر به مواد پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند.

سایر گزینه‌ها درست هستند.

۱۰۵- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط * شیمی ۳ (فصل ۴)

(۱) نادرست؛ با افزایش فشار (کاهش حجم) در واکنش (I) تعادل به سمت مول گازی کمتر یعنی در جهت برگشت و تولید واکنش‌دهنده پیش می‌رود.

(۲) نادرست؛ در واکنش (II) با افزایش حجم (کاهش فشار)، تعادل به سمت مول گاز بیشتر یعنی جهت برگشت جابه‌جا می‌شود و شمار مول فراورده‌ها کاهش می‌یابد. اما افزایش CH₄ باعث جابه‌جایی تعادل در جهت مصرف آن و تولید فراورده است.

(۳) نادرست؛ تغییر فشار باعث تغییر K نمی‌شود، ضمناً در واکنش (II) که گرماده است، K و T رابطه عکس دارند، پس با افزایش دما، مقدار ثابت تعادل کم می‌شود.

(۴) درست؛ چون در واکنش (I) تعداد مول گاز فراورده‌ها بیشتر است و در واکنش (II) تعداد مول واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است. با تغییر حجم یکسان ظرف تعادل‌ها در جهت متفاوتی جابه‌جا می‌شوند.

