









سوالات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴				
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.			
۱	<p>در جمله‌های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید.</p> <p>الف) در نیم دور حرکت ماه به دور زمین، مسافت طی شده (بزرگتر از - برابر با) اندازه جابه‌جایی است.</p> <p>ب) شیب خطی که نمودار سرعت - زمان را در دو لحظه قطع می‌کند، برابر (شتاب - سرعت) متوسط است.</p> <p>پ) در حرکت تندشونده روی خط راست، بردارهای سرعت و شتاب (در جهت - خلاف جهت) یکدیگرند.</p>			
۲	<p>شکل روبه‌رو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند.</p>  <p>الف) سرعت متحرک در لحظه t_3 چقدر است؟</p> <p>ب) یک لحظه را مشخص کنید که بردار مکان متحرک تغییر جهت می‌دهد.</p> <p>پ) در بازه زمانی صفر تا t_1، بردار شتاب متحرک در جهت محور x است یا خلاف آن؟</p>			
۳	<p>نمودار سرعت - زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل روبه‌رو است.</p>  <p>الف) تندی متوسط متحرک در کل زمان حرکت چند متر بر ثانیه است؟</p> <p>ب) اگر متحرک در لحظه $t = 5s$ در 20 متری مبدأ محور باشد، معادله مکان - زمان متحرک را در بازه زمانی $5s$ تا $10s$ بنویسید.</p>			
۴	<p>گلوله‌ای را در شرایط خلأ از ارتفاع $31/25$ متری سطح زمین رها می‌کنیم.</p> <p>الف) گلوله پس از چند ثانیه به زمین می‌رسد؟ ($g = 10 m/s^2$)</p> <p>ب) نمودار سرعت - زمان آن را به‌طور کیفی رسم کنید.</p>			
۵	<p>درستی و نادرستی جمله‌های زیر را با واژه "درست" یا "نادرست" مشخص کنید و در پاسخ برگ بنویسید.</p> <p>الف) به تمایل اجسام برای حفظ وضعیت حرکت خود، وقتی نیروی خالص وارد بر آنها صفر است، لختی می‌گویند.</p> <p>ب) هر چه تندی جسم در یک شاره بیشتر باشد، نیروی مقاومت شاره بیشتر خواهد شد.</p> <p>پ) با پاره شدن کابل آسانسور و سقوط آزاد آن، شتاب آسانسور بیشتر از g می‌شود.</p> <p>ت) نیروی عمودی سطح و نیروی وزن وارد بر جسم، کنش و واکنش یکدیگر هستند.</p>			
۶	<p>مطابق شکل روبه‌رو جسمی به جرم $4kg$ توسط فنری با سرعت ثابت روی سطح افقی کشیده می‌شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح $3/10$ و ثابت فنر $10 N/cm$ باشد، طول فنر چند سانتی‌متر افزایش می‌یابد؟ ($g = 10 m/s^2$)</p> 			
۷	<p>الف) نقش کیسه هوا در کم شدن آسیب‌ها در تصادف‌ها را بیان کنید.</p> <p>ب) اگر انرژی جنبشی جسمی 9 برابر شود، بزرگی تکانه جسم چند برابر می‌شود؟</p>			

سوالیات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴														
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:														
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴																		
ردیف	سوالیات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.																	
	صفحه ۱ از ۳																	
۸	<p>ماهواری در فاصله 1600 km از سطح زمین با تندی 6 km/s به دور زمین می چرخد.</p> <p>(الف) دوره گردش ماهواره چند ثانیه است؟ $(\pi = 3, R_e = 6400\text{ km})$</p> <p>(ب) نیروی مرکزگرای وارد بر ماهواره، چه نیرویی است؟</p>																	
۰/۷۵ ۰/۲۵																		
۹	<p>(الف) نوسان های یک ساعت آونگ دار در یک مکان مشخص، با کاهش دما، تندتر می شود یا کندتر؟</p> <p>(ب) برای اینکه انتقال به آبی در پدیده دوپلر رخ دهد، ناظر باید به چشمه نور نزدیک شود یا از آن دور شود؟</p> <p>(پ) اگر طول طنابی را نصف کنیم، با ثابت ماندن نیروی کشش طناب، تندی انتشار موج عرضی چگونه تغییر می کند؟</p> <p>(ت) مسافتی که موج در مدت $\frac{T}{4}$ طی می کند، چند برابر طول موج است؟</p> <p>(ث) پرتوهای ایکس، امواج طولی هستند یا عرضی؟</p>																	
۱/۲۵																		
۱۰	<p>شکل روبهرو نمودار مکان - زمان نوسانگر جرم - فنری را نشان می دهد. اگر جرم وزنه 200 g و اندازه شتاب نوسانگر در لحظه t' برابر 4 m/s^2 باشد، انرژی پتانسیل نوسانگر در نقاط بازگشتی چند ژول است؟ (از نیروهای اتلافی چشم پوشی شود)</p>																	
۱/۲۵																		
۰/۱۵ ۰/۷۵																		
۱۱	<p>(الف) در شکل روبهرو شدت صوت حاصل از چشمه، برابر 10^{-4} W/m^2 است. اگر مساحت سطح 3 m^2 باشد، آهنگ متوسط انتقال انرژی از این سطح چند وات است؟</p> <p>(ب) عقرب ماسه ای، امواج طولی و عرضی حاصل از حرکت طعمه اش را به ترتیب با تندی های 120 m/s و 40 m/s دریافت می کند. اگر اختلاف زمانی رسیدن این امواج به نزدیک ترین پای عقرب برابر 5 ms باشد، فاصله طعمه تا عقرب چند متر است؟</p>																	
۰/۱۵ ۰/۷۵																		
۱۲	<p>هر یک از موارد ستون اول به یک مورد از ستون دوم مرتبط است. آن ها را مشخص کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (دو مورد در ستون دوم اضافی است)</p>																	
۱	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ستون اول</th> <th>ستون دوم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها</td> <td>(۱) پراش</td> </tr> <tr> <td>(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج</td> <td>(۲) پاشندگی</td> </tr> <tr> <td>(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها</td> <td>(۳) بازتاب پخشنده</td> </tr> <tr> <td>(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف</td> <td>(۴) بازتاب منظم</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(۵) تداخل</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(۶) مکان یابی پژواکی</td> </tr> </tbody> </table>				ستون اول	ستون دوم	(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها	(۱) پراش	(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج	(۲) پاشندگی	(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها	(۳) بازتاب پخشنده	(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف	(۴) بازتاب منظم		(۵) تداخل		(۶) مکان یابی پژواکی
ستون اول	ستون دوم																	
(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها	(۱) پراش																	
(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج	(۲) پاشندگی																	
(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها	(۳) بازتاب پخشنده																	
(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف	(۴) بازتاب منظم																	
	(۵) تداخل																	
	(۶) مکان یابی پژواکی																	
	صفحه ۲ از ۳																	

سوالیات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴				
ردیف	سوالیات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.			
۱۳	الف) آزمایشی را شرح دهید که به کمک آن بتوان ضریب شکست یک تیغه متوازی السطوح شفاف را اندازه گیری کرد. (وسایل آزمایش: تیغه متوازی السطوح - لیزر مدادی - نقاله - کاغذ) ب) اگر آزمایش یانگ را به جای نور تکفام سبز با نور تکفام قرمز انجام دهیم، پهنای هر نوار روشن چه تغییری می کند؟ چرا؟	۰/۷۵	۰/۵	
۱۴	شکل روبه رو نقش موج ایستاده ای را در یک تار نشان می دهد. اگر تندی موج عرضی در این تار 240 m/s باشد، بسامد این موج چند هرتز است؟		۱	
۱۵	با استفاده از عبارتهای داخل جعبه، جمله های زیر را کامل کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (دو مورد اضافی است) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">پیوسته - رادرفورد - شبه پایدار - خطی - تامسون - جذبی</div> الف) طیف حاصل از اتم های برانگیخته گازهای رقیق و کم فشار، به صورت است. ب) طبق مدل اتمی الکترون ها در نقاط مختلف اتم پراکنده هستند. پ) در ترازهای الکترون ها مدت زمان طولانی تری نسبت به حالت برانگیخته معمولی باقی می ماند. ت) خط های تاریک در طیف خورشید، معرف طول موج های توسط اتم های گازهای جو خورشید است.	۱		
۱۶	نوری با بسامد $1/5 \times 10^{15} \text{ Hz}$ به سطح فلزی می تابد. اگر بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون های گسیل شده 0.8 eV باشد، بسامد آستانه فلز چند هرتز است؟ $(h = 4 \times 10^{-15} \text{ eV.s})$	۱		
۱۷	شکل روبه رو تعدادی از ترازهای انرژی اتم هیدروژن را نشان می دهد. با محاسبه نشان دهید کدام گذار بین دو تراز می تواند به گسیل فوتونی با طول موج $102/5 \text{ nm}$ منجر شود؟ $(hc = 1240 \text{ eV.nm})$	۰/۷۵		
۱۸	بخش اصلی مدار یک آشکار ساز دود، مطابق شکل روبه رو است. معادله واپاشی ذره گسیل شده توسط ماده پرتوزا را بنویسید.	۰/۵		
۱۹	الف) یک ماده جذب کننده نوترون در میله های کنترل را بنویسید. ب) به فرایند افزایش غلظت ایزوتوپ اورانیوم ^{235}U در یک نمونه، چه می گویند؟ پ) چرا از دیدگاه نیروی هسته ای تفاوتی بین نوترون و پروتون وجود ندارد؟ ت) انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون های یک هسته چه نام دارد؟	۱		
۲۰	پس از گذشت ۲۰ روز، تعداد هسته های پرتوزای یک نمونه، به $1/33$ تعداد موجود در آغاز کاهش یافته است. نیمه عمر ماده چند روز است؟	۱		
۲۰	جمع بارم			موفق باشید
				صفحه ۳ از ۳

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴	رشته: ریاضی فیزیک	پایه: دوازدهم	راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)
ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴	
نمره	راهنمای نمره‌گذاری		ردیف

۰/۷۵	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۱ و ۱۶	(پ) در جهت	(ب) شتاب	(الف) بزرگتر از	۱	
۰/۷۵	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۰ و ۸ و ۱۲	(پ) خلاف جهت	(ب) t_1 یا t_2	(الف) صفر	۲	
۱/۵		$L = S = \frac{3 \times 30}{2} + \left \frac{(5+7) \times (-20)}{2} \right = 165 \text{ m}$		(الف) (۰/۵)	۳	
	$s_{av} = \frac{L}{\Delta t}$ (۰/۲۵)	$s_{av} = \frac{165}{10} = 16.5 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)				
	$x = vt + x_0$ (۰/۲۵)	$x = -20t + 20$ (۰/۲۵)		(ب) (۰/۲۵)		
۰/۷۵		(ب)	$\Delta y = -\frac{1}{2}gt^2$ (۰/۲۵)	(الف) (۰/۲۵)	۴	
	ص ۲۴	(۰/۲۵)	$-31/25 = -\frac{1}{2} \times 10 t^2$			
			$t = 2/5 \text{ s}$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)		
۱	هر مورد (۰/۲۵) ص ۳ و ۳۶ و ۳۹ و ۳۷	(ت) نادرست	(پ) نادرست	(ب) درست	(الف) درست	۵
۱/۲۵		$F_N = F_T + mg = 10 + 40 = 50 \text{ N}$ (۰/۲۵)	$f_k = 0.3 \times 50 = 15 \text{ N}$ (۰/۲۵)		۶	
	$f_k = \mu_k F_N$ (۰/۲۵)	$F_T = f_k$ (۰/۲۵)	$kx = 15 \rightarrow x = \frac{15}{10} = 1.5 \text{ cm}$ (۰/۲۵)			
	ص ۴۲، ۴۲، ۳۸					
۰/۷۵	(الف) طبق رابطه $F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ (۰/۲۵) کیسه هوا مدت زمان حرکت کندشونده تا توقف را افزایش می‌دهد و باعث کاهش مقدار نیرو (۰/۲۵) و در نتیجه کاهش آسیب‌ها می‌شود.				۷	
	(ب) ۳ برابر (۰/۲۵) (نیاز به نوشتن فرمول و محاسبات نیست)					
	ص ۵۹					
۱		$r = R_e + h = 6400 + 1600 = 8000 \text{ km}$ (۰/۲۵)	$T = \frac{2 \times 3 \times 8 \times 10^3}{6} = 8 \times 10^3 \text{ s}$ (۰/۲۵)	(الف) (۰/۲۵)	۸	
	$T = \frac{2\pi r}{v}$ (۰/۲۵)			(ب) نیروی گرانشی (۰/۲۵)		
	ص ۵۵					
۱/۲۵	هر مورد (۰/۲۵) ص ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۶، ۸۳، ۸۵، ۸۶	(پ) ثابت می‌ماند	(ب) نزدیک شود	(الف) تندتر	۹	
			(ث) عرضی	(ت) $\frac{1}{4}$		
۱/۲۵	$a = -\omega^2 x $ (۰/۲۵)	$\omega = \omega^2 \times 0.1$ (۰/۲۵)	$\omega^2 = 400$ (۰/۲۵)	(الف) (۰/۲۵)	۱۰	
	$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$ (۰/۲۵)	$E = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 400 \times 16 \times 10^{-4} = 64 \times 10^{-3} \text{ J}$ (۰/۲۵)	$U_{\max} = E = 64 \times 10^{-3} \text{ J}$ (۰/۲۵)	(الف) (۰/۲۵)		
				(ب) (۰/۲۵)		
					صفحه ۱ از ۲	

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴	رشته: ریاضی فیزیک	پایه: دوازدهم	راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)
ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴	
نمره	راهنمای نمره‌گذاری		ردیف

۱/۲۵	$I = \frac{P_{av}}{A}$ (۰/۲۵)	$P_{av} = 3 \times 10^{-4} W$ (۰/۲۵)	الف) (۱۱)
	$\Delta x = \left(\frac{v_L v_T}{v_L - v_T} \right) \Delta t$ (۰/۲۵)	$\Delta x = \left(\frac{120 \times 40}{120 - 40} \right) \times 5 \times 10^{-3}$ (۰/۲۵)	ب) $\Delta x = 0.3 m$ (۰/۲۵)
۱	هر مورد (۰/۲۵) ص ۹۴ و ۱۰۲ و ۹۲ و ۱۰۰	ب) پراش (۱) ت) پاشندگی (۲)	الف) بازتاب پخشنده (۳) پ) مکان یابی پژواکی (۶)
۱/۲۵	الف) تیغه متوازی‌السطوح را روی کاغذ بر سطح افقی قرار می‌دهیم و نور لیزر مدادی را به صورت مایل به آن می‌تابانیم و مسیر عبور نور از تیغه را روی کاغذ رسم می‌کنیم (۰/۲۵) و با استفاده از نقاله، زاویه تابش و زاویه شکست را اندازه‌گیری می‌کنیم (۰/۲۵) و به کمک رابطه $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ و دانستن $n_1 = 1$ ، ضریب شکست تیغه را محاسبه می‌کنیم. (۰/۲۵)		
	ب) افزایش می‌یابد (۰/۲۵)، چون پهنای نوارها با طول موج متناسب است. (۰/۲۵) ص ۹۹ و ۱۱۳		
۱	$L = 4 \times 0.2 = 0.8 m$ (۰/۲۵)	$f = \frac{4 \times 240}{2 \times 0.8}$ (۰/۲۵)	الف) $f = 600 Hz$ (۰/۲۵)
	$f = \frac{nv}{2L}$ (۰/۲۵) ص ۱۰۶ و ۱۰۷	ت) جذبی	ب) تامسون
۱	$K_{max} = hf - W_0$ (۰/۲۵)	$0.8 = 4 \times 10^{-15} \times 1/5 \times 10^{15} - W_0$	$W_0 = 5/2 eV$ (۰/۲۵)
	$f_0 = \frac{W_0}{h}$ (۰/۲۵) ص ۱۱۸ و ۱۱۹	$f_0 = \frac{5/2}{4 \times 10^{-15}} = 1/3 \times 10^{15} Hz$	(۰/۲۵)
۰/۷۵	$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ (۰/۲۵)	$\Delta E = \frac{1240}{10.2/5} = 12/0.9 eV$ (۰/۲۵)	الف) (۱۷)
	پس گذار از تراز با انرژی $1/51 eV$ به تراز با انرژی $13/6 eV$ انجام می‌شود. (از $n=3$ به $n=1$) (۰/۲۵) ص ۱۲۸		
۰/۵	${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + {}^4_2 He$ یا ${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + \alpha$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) ص ۱۴۳		
۱	ب) غنی‌سازی ت) انرژی بستگی هسته‌ای	الف) یکی از موارد: کادمیم، بور، نقره، ایندیم پ) زیرا نیروی هسته‌ای مستقل از بار است.	الف) (۱۹)
	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۵۱ و ۱۵۰ و ۱۴۰ و ۱۴۱		
۱	$N = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵)	$\frac{1}{32} N_0 = \frac{N_0}{2^n}$ $n=5$ (۰/۲۵)	الف) (۲۰)
	$n = \frac{t}{T}$ (۰/۲۵) ص ۱۴۷	$5 = \frac{20}{T} \rightarrow T = 4$ روز (۰/۲۵)	
۲۰	جمع بارم	موفق باشید	
		صفحه ۲ از ۲	

همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد درخور اهمیت جهت نمره‌گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است،

خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، فقط در مسائل به راه‌حل‌های درست دیگر نمره مناسب دهید.

با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار