




ساعات شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس ریاضی ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		
نمره	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)		



۰/۷۵	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) اگر f تابعی وارون پذیر باشد، دامنه تابع $y = (f \circ f^{-1})(x)$ با دامنه تابع $y = f(x)$ برابر است. ب) دوره تناوب تابع $y = 3 \sin(\frac{\pi}{4}x) + 1$ برابر ۴ است. پ) اگر تابع f در بازه $[a, b]$ پیوسته باشد، آنگاه همواره اکسترمم نسبی دارد.	۱
۰/۷۵	جاهای خالی را با عبارت یا عدد مناسب کامل کنید. الف) در تابع $f(x) = x^2 - 4x + 1$ با دامنه $[-3, 1]$، مقدار $f^{-1}(1)$ برابر است. ب) باقی مانده تقسیم چند جمله ای $P(x) = 2x^3 + x^2 + 1$ بر $x + 1$ برابر است. پ) در تابع $y = x + 2$، طول نقطه گوشه ای برابر است.	۲
۱/۵	اگر $f(x) = 2x - 5$ و $g(x) = x^2 - 2$ باشد، آنگاه معادله $(f \circ g)(x) = f(x)$ را حل کنید.	۳
۱	نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = \frac{1}{4}f(2x) + 1$ را رسم کنید. 	۴
۱/۲۵	نمودار تابع $y = a \cos(bx) + 2$ در یک دوره تناوب به صورت روبه رو رسم شده است. الف) مقدار a را بیابید. ب) مینیمم تابع را به دست آورید. 	۵
۱/۵	جواب های کلی معادله $\sin x \cdot \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ را به دست آورید.	۶
صفحه ۱ از ۳		

ساعات شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس ریاضی ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		
نمره	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)		

۱/۷۵	الف) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2 - \sqrt{x-1}}{x-5}$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{\sin^2 x}$ پ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{(2x-1)^3}$	۷	حاصل حدهای زیر را به دست آورید.
۱		۸	تابع f به صورت زیر رسم شده است. اگر $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = \frac{3}{4}$ باشد، آنگاه مختصات نقطه A را به دست آورید.
۱	با استفاده از تعریف مشتق، مشتق راست تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 3x + 1 & x < 1 \end{cases}$ را در $x=1$ به دست آورید.	۹	
۱/۵	الف) $y = (x^3 + 1)\sqrt{3x+2}$ ب) $y = \frac{x^2 + 1}{(3x+1)^5}$	۱۰	مشتق بگیرید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.)
۱/۲۵	یک توده باکتری پس از t ساعت، دارای جرم $m(t) = t + \sqrt{t}$ گرم است. الف) آهنگ متوسط رشد جرم این توده باکتری را در بازه زمانی $0 \leq t \leq 4$ بیابید. ب) آهنگ رشد جرم توده باکتری در چه لحظه ای برابر $\frac{5}{4}$ است؟	۱۱	
صفحه ۲ از ۳			

باسمه تعالی

ساعات شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس ریاضی ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)		
نمره			

۱/۵	 نمودار تابع $y = x^3 - 3x^2 + k$ به صورت زیر، رسم شده است. الف) طول نقاط اکسترمم نسبی تابع را بیابید. ب) مقدار k را به دست آورید.	۱۲
۱/۲۵	غلظت یک داروی شیمیایی در خون، t ساعت بعد از تزریق در ماهیچه از رابطه $C(t) = \frac{3t}{t^3 + 54}$ به دست می آید. چند ساعت پس از تزریق این دارو، غلظت آن در خون، بیشترین مقدار ممکن است؟	۱۳
۱/۲۵	 اگر فاصله کانون F، از دورترین رأس قطر بزرگ آن، ۸ واحد باشد، محیط مثلث $\Delta MFF'$ را به دست آورید.	۱۴
۱/۲۵	معادله دایره ای را بنویسید که مرکز آن نقطه $O(۰, ۳)$ بوده و بر خط $۳x - ۴y - ۳ = ۰$ مماس باشد.	۱۵
۱/۵	اگر احتمال انتقال نوعی بیماری خاص به نوزاد پسر ۰/۰۸ و به نوزاد دختر ۰/۰۳ باشد و خانواده ای قصد بچه دار شدن داشته باشند، با چه احتمالی نوزاد آنها به بیماری مذکور مبتلا خواهد شد؟	۱۶
۲۰	موفق و پیروز باشید	جمع نمره
صفحه ۳ از ۳		