

۷۶- عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب هم‌دوره خود می‌رسد.
 (۱) Y (۲) D (۳) M (۴) Z
 (۲) Li (۳) Li (۴) Z

۷۷- کدام موارد درباره «جدول تناوبی عناصر» درست است؟
 الف - تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز گروه ۱۶ و قوی‌ترین فلز دوره دوم، برابر ۶ است.
 ب - تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز جامد دوره سوم و نخستین عنصر واسطه دوره چهارم، برابر ۵ است.

ج - شمار عنصرهای میان نخستین شبه‌فلز گروه ۱۴ و دومین نافلز دوره سوم، برابر عدد اتمی یک گاز نجیب جدول است.
 د - مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیت نافلز مایع دوره چهارم، برابر با عدد اتمی یکی از عنصرهای گروه ۱۵ است.

(۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

۷۸- اتم عنصر A، دارای ۱۲ الکترون در زیرلایه p است. اگر بیرونی‌ترین زیرلایه آن، ns^2 باشد، کدام مورد درباره این عنصر، نادرست است؟

(۱) محلول نمک‌های آن با عددهای اکسایش مختلف، می‌تواند رنگی باشد.

(۲) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند با شمار الکترون‌های $l=2$ ، برابر باشد.

(۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش آن با کلر، می‌تواند XCl_3 یا XCl_4 باشد.

(۴) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند دو برابر شمار الکترون‌های $l=2$ ، باشد.

۷۹- کدام مورد درست است؟ ($Na=23$, $Al=27$, $Ar=40$, $Ca=40$: $g.mol^{-1}$)

(۱) با توجه به جایگاه عناصر در جدول، جرم یک مول Zn^{2+} ، می‌تواند با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول Cu^+ باشد.

(۲) جرم یک مول اتم روبیدیم، با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول از یون پایدار آن است.

(۳) شمار اتم‌ها در یک مول سدیم، ۵۷۵ برابر شمار اتم‌ها در یک مول کلسیم است.

(۴) جرم ۱٫۵ مول گاز آرگون، بیشتر از جرم $10^{24} \times 0.8 \times 10^{-24}$ اتم آلومینیم است.


۸۰- اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین، برابر $24^\circ C$ باشد، در چه ارتفاعی با یکای کیلومتر، دمای هوا

نسبت به سطح زمین، ۸۰ درصد کاهش می‌یابد؟ (دمای هوا به ازای هر کیلومتر ارتفاع، $6^\circ C$ کاهش می‌یابد).

(۱) ۱٫۶ (۲) ۶٫۴ (۳) ۴٫۸ (۴) ۳٫۲

۸۱- اگر ۰٫۳ مول از ترکیبی با فرمول شیمیایی $C_4H_nO_2$ با ۴۸ گرم گاز اکسیژن (مطابق معادله زیر) واکنش کامل


دهد، این ترکیب چند اتم هیدروژن دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود، $O=16 g.mol^{-1}$)



$$\frac{0.3}{1} = \frac{48}{22.4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} \Rightarrow n=8$$

محل انجام محاسبات

(O = 16, S = 32, Cu = 64 : g.mol⁻¹)



(۱) ضریب استوکیومتری فراورده گازی با ضریب استوکیومتری اسید، برابر است.
(۲) به ازای مصرف ۰٫۷۵ مول نمک، ۱۲۰ گرم نمک دارای سولفات، تشکیل می شود.

۳) در این واکنش، تغییر عدد اکسایش مس، برابر با تغییر عدد اکسایش هیدروژن است.

۴۰) اگر $0,32$ مول فراورده غیر گازی تشکیل شود، $4,6$ گرم واکنش دهنده جامد مصرف شده است.

۸۳- درباره ویژگی‌های مولکول‌های آمونیاک، کلروفرم، دی‌متیل‌اتر و هگزان، کدام موارد زیر درست است؟

الف - گستاور دوقطبی تنہا یک مولکول، برابر صفر است. $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$ C_2H_6 C_2H_4

ب - در دمای اتاق، حالت فیزیکی تنها دو ماده، مایع است.

ج - اتم‌های جانبی در مولکول‌های آمونیاک و کلروفرم، بار جزئی منفی دارند.

د - در یک مولکول، قوی ترین نیروی جاذبه بین مولکولی، به وجود هیدروژن در ساختار آن وابسته است.

(۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

۸۴- اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیرشده از یک نمک، برابر ۲۰ باشد، در ۲۰۰ گرم آب مقطر، چند گرم از

این نمک حل می شود و انحلال پذیری آن در این دما، چند گرم در ۱۰۰ گرم آب است؟ $\frac{g}{100g\text{ آب}} = \frac{x}{200g\text{ آب}}$

(۱) ۵۰ و ۲۵ (۲) ۴۰ و ۲۰ (۳) ۴۰ و ۲۵ (۴) ۵۰ و ۲۰

۸۵- مخلوطی از دو ماده A و D در یک لوله آزمایش، به شدت همزده و سپس همزدن آنها متوقف می‌شود. A و D از

یکدیگر جدا شده و دو لایه مجزا تشکیل می‌دهند. اگر D در انتهای لوله و A ، روی آن جای داشته باشد، کدام مورد

درست است؟

(۱) A می‌تواند یک محلول و D، حلال خالص آن باشد.


۲) A و D می‌توانند دو حالت فیزیکی متفاوت داشته باشند.

۳) A و D می‌توانند دو محلول آبی با حل‌شونده‌های متفاوت باشند.

(۴) اگر جرم A و D، برابر باشد، حجم A به یقین، کمتر از حجم D است.


۸۶- اگر ۸۰۰ میلی لیتر محلول کلسیم کلرید، در واکنش کامل با ۱۲۰۰ میلی لیتر محلول Na_3PO_4 ، ۰/۷۲ مول سدیم کلرید

تشکیل دهد، مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول آغازی کلسیم کلرید، کدام است؟



$$\frac{\text{Ar. m. LXM}}{r} = \frac{1,35 \text{ (f)} \cdot 0,47 \text{ NaCl}}{4} \quad 0,27 \text{ (r)} \quad 0,54 \text{ (r)} \quad 2,70 \text{ (1)}$$

محل انجام محاسبات



۸۷- فرمول مولکولی یک ترکیب آلی غیرحلقوی، مشابه فرمول مولکولی «هگزن» است. کدام مورد درباره ویژگی

ساختاری این ترکیب، به یقین درست است؟ C_6H_{12} سیکلوهگزان نیست

(۱) شمار پیوندهای دوگانه در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر یک است.

(۲) شمار شاخه‌های فرعی در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر صفر است.

(۳) شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در زنجیره کربنی، نصف شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول آن است. $\frac{1}{3}$

(۴) شمار پیوندهای کربن - هیدروژن در زنجیره کربنی، دو برابر شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در مولکول آن است. $\frac{3}{3}$ برابر

۸۸- اگر درصد خلوص نوعی چربی و زغال سنگ، به ترتیب، برابر ۸۰ و ۵۰ در نظر گرفته شود، جرم زغال سنگ، چند

برابر جرم چربی باشد تا گرمای تولیدشده از سوختن چربی، دو برابر گرمای تولیدشده از سوختن زغال سنگ شود؟

(ارزش سوختی چربی و زغال سنگ، به ترتیب برابر ۳۹ و ۳۰ کیلوژول بر گرم است و ناخالصی‌ها، گرما آزاد نمی‌کنند.)

(۱) ۰٫۵۲

(۲) ۰٫۲۶

(۳) ۲٫۰۸

(۴) ۱٫۰۴

۸۹- با توجه به ویژگی‌های عنصرهای «نقره، مس، پتاسیم و روی» کدام مقایسه درباره آنها درست است؟

(۱) کمترین تمایل برای تبدیل شدن به کاتیون: Cu (۲) آسان‌ترین نگهداری در شرایط یکسان: Zn

(۳) شوارترین استخراج: K (۴) پایدارترین ترکیب‌ها: Ag

واکنش پذیری

واکنش پذیری

واکنش پذیری

۹۰- در یک ظرف دو لیتری، ۳۲ گرم مخلوط متان و پروپین با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش می‌دهند تا فراورده(های)

سیرشده تشکیل شود. اگر افزایش جرم مخلوط هیدروکربن‌ها، حداکثر برابر ۷٫۵ درصد جرم آغازی آنها باشد،

غلظت مولی آغازی گاز متان در ظرف واکنش، کدام بوده است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$) $C_3H_4 + H_2 \rightarrow C_3H_6$

(۱) ۰٫۵۰ (۲) ۰٫۲۵ (۳) ۰٫۱۰ (۴) ۰٫۰۵

۹۱- نسبت جرم اتم‌های کربن به جرم اتم‌های هیدروژن، در کدام دو گروه از ترکیب‌های آلی، با افزایش شمار اتم‌های

کربن ثابت می‌ماند؟

(۱) آمین‌ها و آمیدها

(۲) سیکلوآلکان‌ها و آمیدها

(۳) آلکن‌ها و آمین‌ها

(۴) آلکن‌ها و سیکلوآلکان‌ها

۹۲- گرمای آزادشده از چگالش ۳ مول کربن دی‌اکسید با گرمای حاصل از واکنش چند گرم اتین با مقدار کافی گاز

هیدروژن، برابر است؟ (میانگین آنتالپی پیوند $C \equiv C$ ، $C-C$ و $C-H$ ، به ترتیب برابر ۸۴۰، ۳۵۰ و ۴۱۵ و

آنتالپی پیوند $H-H$ ، برابر ۴۳۵ کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود. ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

$C_2H_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$ $H-C \equiv C-H + 2H-H \rightarrow H-C-C-H$

$CO_2(g) \rightarrow CO_2(s) + 25 kJ$ $(2 \times 415 + 840) + (2 \times 435) - (2 \times 415) + 350 \Rightarrow -300$

(۱) ۱۳٫۰۰

(۲) ۳٫۲۵


(۳) ۶٫۵۰

(۴) ۹٫۷۵

$$\frac{x}{250} = \frac{75}{200} \Rightarrow x = 93.75$$

محل انجام محاسبات

۹۳- گازهای A_2 و D_2 ، به ترتیب با غلظت مولی 0.2 و 0.6 وارد ظرف 2 لیتری در بسته می‌شود. اگر واکنش: $A_2(g) + D_2(g) \rightarrow 2AD(g)$ در مدت 10 دقیقه کامل شود، کدام نمودار (غلظت - زمان) برای 4 دقیقه آغازی این واکنش، می‌تواند درست باشد و پس از 4 دقیقه، با توجه به نمودار، چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت؟ (واکنش در بازه زمانی گفته شده، یک طرفه در نظر گرفته و معادله آن، موازنه شود).



۹۴- درباره نمودار «مول - زمان» برای اجزای شرکت کننده در واکنش‌های شیمیایی گازی، کدام مورد همواره درست است؟
 (۱) اگر برای ماده A ، شیب نمودار در گستره زمانی t_1 تا t_2 ($t_2 > t_1$)، برابر صفر باشد، واکنش به تعادل رسیده است و مقدار مول A ، ثابت باقی می‌ماند.
 (۲) اگر سرعت واکنش، برابر با $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ برای ماده A باشد، A فراورده واکنش است و ضریب استوکیومتری آن در معادله واکنش، برابر یک است.


(۳) اگر برای ماده A ، شیب نمودار در گستره زمانی t_1 تا t_2 ، بزرگ‌تر از شیب نمودار در گستره زمانی t_2 تا t_3 باشد، A فراورده واکنش است و $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ برای آن، عددی مثبت است.
 (۴) اگر شیب نمودار برای ماده A ، 2 برابر شیب نمودار برای ماده D باشد، A و D فراورده واکنش‌اند و نسبت ضرایب استوکیومتری آنها در معادله واکنش، برابر 2 است.

۹۵- اگر زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن در اتم‌های دو عنصر X و Y ، به ترتیب $3d$ (با a الکترون) و $4p$ (با b الکترون) و تفاوت a و b ، برابر 7 باشد، کمترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر X و Y ، کدام است؟
 (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۳


محل انجام محاسبات

$$\begin{aligned}
 a &\rightarrow 3d^a \\
 b &\rightarrow 4p^b \\
 |a - b| &= 7 \\
 3d^3 &\rightarrow 3d^3 \quad (28) \\
 4p^1 &\rightarrow 4p^1 \quad (21) \\
 &\rightarrow 7
 \end{aligned}$$

- ۹۶- نمودار داده شده، تجزیه ۴ مول گاز N_2O_5 را در یک ظرف ۲ لیتری نشان می دهد. اگر سرعت متوسط تشکیل گاز NO_2 در گستره زمانی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه، برابر $5.4 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ باشد، کدام مورد درست است؟ (واکنش، یک طرفه در نظر گرفته شود.)
- $$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$$



- (۱) n_1 و n_2 به ترتیب می تواند ۲٫۲ و ۰٫۴ باشد.
 (۲) اگر $n_1 - n_2 = ۱٫۲$ ، سرعت واکنش در گستره زمانی ۱۰ تا ۲۰ ثانیه، برابر $6 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$ است.
 (۳) اگر $n_2 = ۱$ ، مجموع غلظت فراورده ها در ثانیه ۲۰، برابر $۷٫۵ \text{ mol.L}^{-1}$ خواهد بود.
 (۴) پس از کامل شدن واکنش، شمار مول های گازی درون ظرف، ۱٫۵ برابر شمار مول ها در آغاز واکنش است.



- ۹۷- کدام مورد درباره ساختار مولکول داده شده، نادرست است؟ ($H=۱$, $O=۱۶ \text{ g.mol}^{-1}$)
 (۱) دارای یک گروه عاملی کربونیل و یک گروه متیل است.

- (۲) تفاوت شمار پیوندهای $C-H$ ، با شمار پیوندهای $C-C$ ، برابر (۳) است.
 (۳) مجموع جرم اتم های اکسیژن، ۳٫۲ برابر جرم اتم های هیدروژن در ترکیب است.
 (۴) شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها، ۲ برابر شمار اتم های کربنی است که عدد اکسایش صفر دارند.

- ۹۸- در هر زنجیر از یک نمونه پلی سیانواتن، میانگین شمار پیوندهای سه گانه، ۲ برابر میانگین شمار پیوندهای دو گانه در هر زنجیر از یک نمونه پلی استیرن است. اگر میانگین شمار مونومر های سیانواتن در هر زنجیر از پلیمر آن، برابر ۱۸۰۰۰ باشد، میانگین جرم مولی پلی استیرن، برابر چند گرم است؟ ($H=۱$, $C=۱۲ \text{ g.mol}^{-1}$)

$18000 \div 2 = 9000$
 $9000 \times 104 = 936000$ (۱)
 $936000 \div 105 = 8914$ (۲)
 $8914 \times 105 = 936000$ (۳)
 $936000 \div 105 = 8914$ (۴)

- ۹۹- اگر در دمای اتاق، pH محلولی که از وارد شدن ۴۰ گرم از باز DOH (با درصد یونش یک) در ۲ لیتر آب مقطر تشکیل می شود، برابر ۱۰٫۳ باشد، چند درصد از آن در آب حل شده است و شمار مول های یون هیدرونیوم در ۵۰۰ میلی لیتر

از این محلول کدام است؟ (از تغییر حجم آب بر اثر انحلال باز صرف نظر شود، $DOH = 200 \text{ g.mol}^{-1}$)

$\frac{40}{200} = 0.2 \text{ mol} \rightarrow \frac{0.2}{2} = 0.1 \text{ M}$
 2.5×10^{-11} ، ۱۰ (۲)
 5×10^{-11} ، ۱۰ (۴)
 2.5×10^{-11} ، ۲۰ (۱)
 5×10^{-11} ، ۲۰ (۳)

$pH = 10.3 \rightarrow pOH = 3.7$
 $[OH^-] = 2 \times 10^{-4}$
 $\alpha = \frac{2 \times 10^{-4}}{0.1} \rightarrow 0.2\%$
 محل انجام محاسبات
 $2 \times 10^{-11} = \frac{mol}{-1.8} = 2.5 \times 10^{-11}$

۱۰۰- با در نظر گرفتن دمای ثابت، کدام مورد درست است؟ ($HCl = ۳۶,۵$, $HI = ۱۲۸$: g.mol⁻¹)

(۱) اگر درجه یونش دو اسید HX و HA ، برابر باشد، با توجه به غلظت تعادلی آنها در محلول، همواره می توان قدرت اسیدی آنها را مقایسه کرد. K_a




(۲) اگر در دو محلول جداگانه، مول های حل شده لیتیم اکسید، نصف مول های حل شده گاز هیدروژن کلرید در آب مقطر باشد، شمار یون های دو محلول با یکدیگر برابر است.

(۳) اگر شمار مول های حل شده باز قوی YOH ، در یک لیتر آب، با شمار مول های حل شده باز ضعیف XOH ، در دو لیتر آب برابر باشد، pH دو محلول، برابر است.

(۴) اگر جرم های برابر از دو گاز هیدروژن کلرید و هیدروژن یدید، به صورت جداگانه در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل شوند، pH محلول HI ، کوچکتر است. HI اسیدی تر و قوی تر است.

۱۰۱- اگر از واکنش ۰,۰۶ مول صابون جامد دارای زنجیر هیدروکربنی سیر شده، با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، ۱۷,۷ گرم رسوب تشکیل شود، شمار اتم های کربن در مولکول صابون کدام است و چند مول یون به حالت محلول

باقی می ماند؟ (معادله واکنش موازنه شود، $H = ۱$, $C = ۱۲$, $O = ۱۶$, $Mg = ۲۴$: g.mol⁻¹)



$$\begin{array}{l} 0.06, 18 \quad (۴) \quad 0.12, 17 \quad (۳) \quad 0.12, 18 \quad (۲) \quad 0.06, 17 \quad (۱) \\ 24 + 4R + 2R + 12 \quad 0.12 RCOONa = 0.12 NaCl \end{array}$$

۱۰۲- کدام مورد درست است؟

(۱) انحلال پذیر بودن غسل و گریس در آب، به وجود گروه هیدروکسیل در ساختار آنها وابسته است. محلول و محلول کننده

(۲) مخلوط آب و روغن و صابون همانند مخلوط آوره و آب، همگن است و هر دو نور را پخش می کنند.

(۳) نسبت شمار آنیون به کاتیون در پاک کننده های صابونی، با همین نسبت در پاک کننده های غیر صابونی، برابر است. $SO_3^- Na^+$

(۴) هنگام شستن لباس با پاک کننده های غیر صابونی در آب سخت، لکه های سفید رنگ ناشی از وجود یون های کلسیم $CO_3^{2-} Na^+$

و منیزیم روی سطح آنها تشکیل می شود. پاک کننده ی صابونی رسوب می کند نه غیر صابونی

۱۰۳- اگر تغییر جرم آند، در سلول گالوانی استاندارد «منیزیم - نقره»، نصف تغییر جرم کاتد در سلول گالوانی استاندارد

«منگنز - کروم» باشد و ۳/۲۴ گرم به جرم کاتد در سلول «منیزیم - نقره» اضافه شود، به تقریب چند الکترون در

سلول «منگنز - کروم» مبادله شده است؟ (بازه های زمانی انجام واکنش ها، متفاوت در نظر گرفته شود.)

$$(Mg = ۲۴, Cr = ۵۲, Mn = ۵۵, Ag = ۱۰۸ : g.mol^{-1}) \quad 2.5 \times 10^{22} \quad (۱)$$

$$E^\circ(Ag^+/Ag) = +0.80 V, \quad E^\circ(Cr^{3+}/Cr) = -0.74 V \quad 1.5 \times 10^{23} \quad (۲)$$





$$E^\circ(Mn^{2+}/Mn) = -1.18 V, \quad E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2.37 V \quad 5.0 \times 10^{22} \quad (۳)$$

$$2.0 \times 10^{23} \quad (۴)$$

۱۰۴- با توجه به اطلاعات زیر، که رفتار چهار فلز A, X, D و Z را در آزمایش‌های مختلف نشان می‌دهد، کدام مورد دربارهٔ مقایسهٔ قدرت کاهندگی آنها در مقایسه با Cu درست است؟

- قدرت اکسندگی X^{2+} از قدرت اکسندگی Z^{2+} بیشتر است. $\leftarrow$ مطلب نه از Z
 - تنها سه فلز Z, D و X با محلول $CuCl_2(aq)$ واکنش می‌دهند. $\leftarrow$ مطلب نه از Cu

- با قرار دادن تیغه‌ای از فلز D در محلول‌های جداگانهٔ دارای یون‌های Z^{2+} ، A^{2+} و X^{2+} ، فقط فلزهای A و X رسوب می‌کنند.



۱۰۵- در کدام ترکیب، عدد اکسایش ۵ اتم کربن یکسان، و مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن دیگر، برابر +۱ است؟

(۱) بنزالدهید (۲) بنزوئیک‌اسید (۳) ۲-هپتانون (۴) اتیل بوتانوات

۱۰۶- واژهٔ شبکهٔ بلوری برای توصیف آرایش و منظم از در حالت جامد به کار می‌رود.

(۱) دو بُعدی - اتم‌ها و یون‌ها (۲) سه بُعدی یا دو بُعدی - اتم‌ها و یون‌ها

(۳) سه بُعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها (۴) سه بُعدی یا دو بُعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها




۱۰۷- در کدام دو گونه، ساختار لوویس، متفاوت، اما علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟

(۱) SO_2 ، H_2S (۲) NO_3^- ، PF_3 (۳) CH_4 ، SO_4^{2-} (۴) SCO ، CS_2

۱۰۸- یک مول CF_4 و یک مول CO_2 ، مطابق شکل و پس از باز شدن شیر (I)، تعادل گازی زیر را تشکیل می‌دهند. اگر

شیر (II) باز شود، در تعادل نهایی، مجموع شمار مول‌های CO_2 و CF_4 ، چند برابر شمار مول‌های COF_2 خواهد

بود؟ (حجم هر یک از ظرف‌ها، برابر یک لیتر و دما ثابت است.)



هم‌تأثیرند در مول‌ها برابر

$$\begin{aligned} (1) & \quad 0,5 \\ (2) & \quad 2 \\ (3) & \quad 4 \\ (4) & \quad 8 \end{aligned}$$


$$\frac{(0,2+2x)^2}{(1-x)^2} = 2,5 \times 10^{-1}$$

$$x = 0,12$$

$$\frac{0,188 + 0,188}{0,144} = 8$$

محل انجام محاسبات

۱۰۹- نمودار «انرژی - پیشرفت واکنش» برای حذف آلاینده گاز NO در مبدل کاتالیستی بنزینی کدام است و این واکنش، در چه دماهایی بهتر انجام می‌شود؟



۱۱۰- تعادل گازی: $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$, $\Delta H < 0$ ، در یک ظرف ۲ لیتری و با وجود یک مول از هر یک از مواد

شرکت کننده برقرار است. کدام مورد درباره این تعادل درست است؟

- (۱) انتقال تعادل به ظرف ۵ لیتری، غلظت هر یک از مواد شرکت کننده، ۰٫۴ برابر می‌شود. $K = 0.4$
- (۲) اگر با کاهش دما، ۲۰ درصد به مول‌های فراورده اضافه شود، مقدار K، ۰٫۸ برابر می‌شود. K رابطه دما کاهش
- (۳) با انتقال تعادل به ظرف یک لیتری، غلظت فراورده، نصف و تعادل در جهت رفت، جابه‌جا می‌شود. کاهش
- (۴) با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا شده و سطح انرژی واکنش دهنده‌ها، افزایش می‌یابد.