

سوالات آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی
سری ۱۳ آزمون تئوری ۸ آبان ماه

تعداد سوالات ۶۰

مدت زمان پاسخگویی ۶۰ دقیقه

تاریخ آزمون: پنج شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح

ارتو

(۱) پسر ۹ ساله‌ای با کراس‌بایت قدامی در وضعیت **centric occlusion (CO)** مراجعه کرده است. در حالت **centric relation (CR)**، کراس‌بایت از بین می‌رود و اورجت + ۲ میلی‌متر است. رابطه مولر و کاتین کلاس یک و انسیزورهای بالا کمی رتروکلاین، انسیزورهای پایین کمی پروکلاین و فاصله‌دار هستند. کدام گزینه بهترین طرح درمان است؟

- الف- عدم درمان و پیگیری تا پایان رویش دندانهای دائمی
- ب- درمان به‌عنوان کلاس III اسکلتی (True Class III) و استفاده از هدگیر معکوس
- ج- درمان به‌عنوان Pseudo-Class III با پلایت متحرک ماگزینا همراه فینگر اسپرینگ برای جلوآوردن انسیزور بالا
- د- درمان با دستگاه ثابت برای ریتراکشن دندان‌های پایین

(۲) در رادیوگرافی بایت‌وینگ یک کودک ۸ ساله، رویش نابجای مولر اول دانی فک بالا مشاهده شد. در بررسی‌ها:

- جذب ریشه دیستال دندان شیری E حدود ۱.۲ میلی‌متر است.
- در بازبینی ۶ ماه بعد، موقعیت عمودی مولر بهتر نشده و تماس همچنان باقی‌ست.
- تاج مولر دائم در دهان دیده نمی‌شود.
- دندان E محکم است و بدون درد و التهاب لثه‌ای.
- بهترین گزینه درمانی بعدی کدام است؟
- الف- مشاهده و پیگیری بیشتر تا زمان رویش کامل مولر دائم
- ب- بستن سیم برنجی (brass wire ligature) یا استفاده از فنر clip separator برای حرکت دیستال مولر دائم
- ج- اپلاینس ثابت شامل باند روی دندان E و فنر لحیمی یا باند-کانتی‌لیور با الاستومریک تراکشن
- د- کشیدن دندان E و گذاشتن distal shoe برای هدایت رویش مولر

(۳) پسر ۷ ساله‌ای دندان مولردوم شیری فک پایین سمت چپ (E) را سه ماه پیش از دست داده است.

در معاینه و رادیوگرافی:

فضای قوسی دندانی در ناحیه از دست‌رفته کامل و کافی است.

مولر اول دانی (۶) رویده و در اکلوزن قرار دارد.

دندان پره مولر دارد حضور دارد و یک سوم ریشه تشکیل شده است

دندان‌های قدامی دائمی رویده‌اند و رشد مختصری از قوس در حال انجام است.

کدام گزینه بهترین انتخاب درمانی در حال حاضر است؟

- الف- قرار دادن فضا نگهدار Band and loop
- ب- قرار دادن lingual arch
- ج- قرار دادن Distal shoe
- د- عدم درمان و فقط پیگیری تا رویش پرمولر دوم

۴) در معاینه‌ی دهان کودک مطابق تصویر زیر، دندان‌های سانترال انسیزور و مولار اولای دایمی در حال رویش هستند. در ارزیابی بالینی ثنایای شیری لق نیستند. کدام گزینه بهترین تفسیر از سن دندانی بیمار و اقدام درمانی مناسب است؟



- الف- سن دندانی ۷ سال؛ خارج کردن دندان سانترال شیری و قرار دادن اپلاینس ارتودنسی متحرک همراه با فنر جهت لبیالی کردن ثنایای دایمی
- ب- سن دندانی ۶ سال؛ خارج کردن سانترال و لترال شیری برای تسهیل رویش طبیعی و قرار دادن اپلاینس ارتودنسی متحرک همراه با فنر جهت لبیالی کردن ثنایای دایمی
- ج- سن دندانی ۵ سال؛ خارج کردن دندان سانترال شیری بدون نیاز به اپلاینس ارتودنسی
- د- سن دندانی ۶ سال؛ خارج کردن دندان سانترال شیری بدون نیاز به اپلاینس ارتودنسی

۵) دختر ۸ ساله‌ای با تنگی فک بالا مراجعه کرده است. در رادیوگرافی اکلوزال، درز میانی کام هنوز باز و قابل تشخیص است. کدام گزینه مناسب‌ترین انتخاب درمانی برای این بیمار است؟

- الف- پلاک متحرک دارای Jack screw با فعال سازی روزانه
- ب- پالاتال اکسپندر ثابت باند شونده با فعال سازی روزانه
- ج- لینگویال ارک با طرح W-Arch
- د- تاخیر درمان تا پس از بلوغ جهت انجام rapid skeletal expansion

۶) اوج رشد قدی (Growth Spurt) در دختران معمولاً چه زمانی رخ می‌دهد؟

- الف- حدود ۱ سال قبل از شروع قاعدگی
- ب- دقیقاً همزمان با شروع قاعدگی
- ج- دو سال بعد از قاعدگی
- د- دو سال قبل از شروع قاعدگی

آسیب

۷) در بررسی میکروسکوپی ضایعه سفید رنگی که از لثه بیمار برداشته شده است، علائم دیسپلازی از لایه بازال تا حد لایه‌های سطحی اپیتلیوم و لایه گرانولر دیده شده است. برای توصیف درجه دیسپلازی از کدام اصطلاح استفاده می‌کنید؟

الف	دیسپلازی خفیف
ب	دیسپلازی متوسط
ج	دیسپلازی شدید
د	کارسینوم درجا

۸) خانمی میانسال با شکایت از سوزش دهان که از چند ماه پیش شروع شده مراجعه کرده است. در معاینه بالینی نواحی از اروژن ها و زخم های سطحی وسیع در گونه و کام نرم مشاهده می شود. بیمار سابقه ای از هیچ گونه بیماری سیستمیک شناخته شده ندارد. در بررسی میکروسکوپی از نواحی اطراف زخم ها آکانتولیز و شکاف داخل اپیتلیالی مشخص است. تشخیص چیست؟

الف	اریتم مولتی فرم
ب	پمفیگوس ولگاریس
ج	پمفیگوئید غشایی مخاطی
د	لیکن پلان

۹) خانمی میانسال با شکایت از یک درد مبهم و مداوم در ناحیه کام مراجعه کرده است. در معاینه، یک توده با سطح زخمی مشاهده می شود و در بررسی سیتی اسکن، تخریب کام سخت به همراه گسترش تومور به داخل حفره بینی دیده می شود. در بررسی میکروسکوپی ضایعه، جزایری از سلولهای بازالوئید و مکعبی با هسته های هیپرکروم دیده می شود که با الگوی غربالی (کریبریفرم) ارایش یافته اند. تشخیص چیست؟

الف	موکوپیدرموئید کارسینوما
ب	پلنومورفیک ادنوما
ج	ادنویید سیستمیک کارسینوما
د	تومور وارتن

۱۰) بیمار آقای ۵۰ ساله دارای یک ناحیه پیگمانته وسیع در کام که در نمای هیستوپاتولوژی پرولیفراسیون سلول های آتیپیک با نواحی از نکروز در بافت همبند مشاهده میشود. تشخیص چیست؟

الف	ملانوما بدخیم
ب	بازال سل کارسینوما
ج	خال ملانوسیتیک
د	همانژیوم کاورنوس

۱۱) بیمار آقای ۱۹ ساله با تورم فک پایین و نمای رادیوگرافی رادیولوسنت مراجعه کرده است. در نمای میکروسکوپی در زمینه ای مشابه دنبال پاپیلای دندان حضور فولیکول هایی کوچک دارای رتیکولوم ستاره ای دیده میشود. نام این تومور چیست؟

الف	آملوبلاستیک فیبروما
ب	ادنتوآملابلاستوما
ج	ادونتوزنیک میگزوما
د	پیندبورگ

اندو

۱۲) در تصویر روبرو، علت ایجاد ضایعه پری آپیکال در دندان پرمولر دوم ماگزایلا چیست؟

الف-کانال درمان نشده

ب-شکستگی عمودی ریشه

ج-آمادهسازی کوتاهتر از طول کارکرد

د-عدم آمادهسازی مناسب کانال


۱۳) روش ایزولاسیون مقابل چه نام دارد؟

الف-Split Dam

ب-Posterior Tooth Clamp Method

ج-Two-Step Method

د-Full-Dam Technique



۱۴) خانم ۴۵ ساله ای است که دندانپزشک در رادیوگرافی جهت چک آپ دندان های ایشان مطابقه با تصویر زیر، متوجه رادیو اپسیتی در انتهای ریشه دندان می شود. دندان ۵ سال پیش تحت درمان ریشه قرار گرفته است و ترمیم مناسبی دارد. بیمار تاریخچه ناراحتی در این دندان ندارد، تشخیص و طرح درمان مناسب برای ایشان چیست؟

الف) Periapical cemental dysplasia - درمان مجدد ریشه

ب) Condensing Osteitis - عدم نیاز به درمان

ج) Periapical cemental dysplasia - عدم نیاز به درمان

د) Condensing Osteitis - درمان مجدد ریشه

۱۵) کدام گزینه در ارتباط با شکستگی‌های افقی ریشه صحیح است؟

- الف: در صورت عدم پاسخ دندان به EPT در این نوع شکستگی، درمان ریشه باید آغاز شود
 ب: در جابجایی‌های مختصر قطعه کرونال دندان، ترمیم با بافت همبند رخ خواهد داد
 ج: در موارد ترمیم با بافت همبند، لامینا دورای ساکت معمولاً دست نخورده است
 د: کلسیفیکاسیون متامورفوز همواره در قطعه کرونال رخ می‌دهد و بخش اپیکال سالم باقی می‌ماند.



۱۶) بیمار مرد ۴۵ ساله با درد مبهم و تورم خفیف در ناحیه دندان مولر اول مندیبل مراجعه کرده است. بیمار سابقه درمان ریشه روی این دندان ۸ سال قبل دارد. اخیراً متوجه ترشح چرکی از لثه مجاور شده است. دندان حساسیت به پرکاشن دارد.

پروبینگ در سطح دیستوباکال ۹ میلی‌متر (pocket عمیق و موضعی) و پاسخ به تست‌های پالپی منفی است. رادیوگرافی، در تصویر زیر مشاهده می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟



- با درگیری ثانویه اندودنتیک
 با درگیری ثانویه پریودنتال
 پیشرفته تنها
 ارتباط با پریو

- الف) ضایعه اولیه پریودنتال
 ب) ضایعه اولیه اندودنتیک
 ج) بیماری پریودنتال
 د) شکست درمان ریشه بدون

شکایت اصلی از تغییر رنگ دندان سانترال و



۱۷) بیمار آقای ۲۲ ساله با تورم در ناحیه بافت نرم باکال مراجعه نموده اند. در تاریخچه سابقه ی درمان ریشه در یک ماه گذشته گزارش می‌شود. در هنگام پروپ عمق پروبینگ ۷ mm مشاهده شد. با توجه به تصاویر تشخیص شما چیست؟

- الف) VRF
 ب) پرفوریشن باکال
 ج) کلسیفیکاسیون متامورفوز
 د) درمان ریشه با طول کارکرد کوتاه

بیماری ها

۱۸) آقای ۳۵ ساله مبتلا به ایدز جهت مشکلات دندانی مراجعه کرده است. در معاینه پلاک سفید غیر پاک شونده‌ی دو طرفه به صورت چین های کراتوتیک در لترال بوردر زبان مشاهده می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟



الف- Oral hairy leukoplakia

ب- proliferative verrucous leukoplakia


ج- Hairy tongue

د- leukoplakia

۱۹) خانم ۲۰ ساله با شکایت از ضایعه ای در سطح و نترال زبان باسیر ۳ ماهه مراجعه نموده است. در معاینه، ضایعه پولیپوئید با پایه باریک و قطر تقریبی ۳ میلیمتر، مشاهده شد. اولین تشخیص احتمالی چیست؟

ب) وروکولگاریس
د) اسکواموس پاپیلوما

الف) وروکوس کارسینوما
ج) فیبروم تحریکی



۲۰) خانم ۳۰ ساله ای با تورم مواج و بدون درد در کف دهان مراجعه نموده است. باتوجه به نمای ضایعه محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- الف) آدنوئید سیستیک کارسینوما
 ب) رانولا
 ج) پلنومورفیک آدنوما
 د) سیالادنیت باکتریال



۲۱) شایع ترین علت بروز ضایعات منتشر در مخاط دهان از دوران کودکی مطابق اسلاید کدام است؟

- الف) کم کاری قشر آدرنال
 ب) پیگمانتاسیون فیزیولوژیک
 ج) نقص ویتامین B12
 د) سندرم پوتز جگروز



۲۲) بیمار خانم ۵۳ ساله با شکایت از زخم های دهانی متعدد از ۵ ماه قبل، مراجعه نمودند. در معاینه بالینی زخم های map-like در مخاط باکال هردو سمت و زبان و نمای desquamative gingivitis در لثه قدام ماگزایلا و مندیبل مشهود است. کدام گزینه به عنوان تست تشخیصی ارجحیت دارد؟

- الف) تست پاترژي
- ب) تست نیکولسکی
- ج) تست لوپوس باند
- د) تست دیاسکوپی



۲۳) بیمار خانم ۶۵ ساله با شکایت از زخم با سابقه ۶ ماهه در زبان مراجعه کردند. در معاینه بالینی induration اطراف زخم مشهود است و هیچ عامل تروماتیکی یافت نمی شود. اولین اقدام لازم کدام است؟



- الف) نمونه برداری انسیزنال
 ب) تجویز دهانشویه نیستاتین
 ج) تجویز پماد تریادنت
 د) پرسش از ضایعات پوستی

پروتز

۲۴ کدام مورد از اندیکاسیون های پروتز متحرک می باشد؟

- الف) فضا‌های بی‌دندانی شامل سه دندان قدامی
 ب) بی‌دندانی خلفی بیش از یک دندان
 ج) از دست رفتن کانین و دو دندان مجاور
 د) فضای بی‌دندانی ۴ دندان انسیزور مندیبل

۲۵ در صورتی که بیمار دندان های پرمولر اول و دوم و مولر اول ماگزیلا را از دست داده باشد و اکلوژن مقابل پروتز پارسیل متحرک باشد کدام طرح درمان را پیشنهاد می کنید؟

- الف) پروتز پارسیل متحرک
 ب) ایمپلنت
 ج) بریج با پایه دندان کانین و مولر دوم
 د) تمام موارد

۲۶ نسبت تاج به ریشه ی اپتیمم برای پایه ی پروتز ثابت چقدر است؟

- الف) ۱ به ۱
 ب) ۱ به ۲
 ج) ۱ به ۳
 د) ۲ به ۳

۲۷ اگر طول ناحیه بی‌دندانی دو برابر شود میزان deflection بریج چه تغییری می کند؟

- الف) نصف میشود
 ب) دوبرابر میشود
 ج) سه برابر می شود
 د) ۸ برابر می شود

۲۸ کدام خط تراش زیر باعث ایجاد استرس بیشتری می شوند؟

- الف) Chamfer
 ب) Deep Chamfer
 ج) Classic Shoulder
 د) Radial shoulder

پریو

۲۹) لثه چسبنده فاصله بین تا موکوزنژیال جانکشن است؟


- الف) مارجین لثه
- ب) عمق سالکوس
- ج) عمق وستیبول
- د) CEJ

۳۰) ترومای حاصل از مسواک زدن می توان عامل اصلی بروز کدام یک از نشانه های زیر باشد؟

- الف) Pockets در سطوح باکال
- ب) Loss of Attachment در سطوح باکال
- ج) Loss of Attachment در سطوح پروگزیمال
- د) Pockets در سطوح پروگزیمال

۳۱) نمای کرست استخوان در ناحیه خلفی فک پایین طبیعی است چون است؟

- الف) لامینا دورا تقویت شده
- ب) در امتداد ناحیه قدامی
- ج) نزدیک تراز CEJ
- د) در امتداد PDL



۳۲) کشیدن دندان hopeless در کدام فاز درمانی انجام میشود؟

- الف) فاز درمانهای غیرجراحی
- ب) فاز درمانهای جراحی
- ج) فاز درمانهای نگهدارنده
- د) در همه فازهای درمانی بسته به شرایط

۳۳) در کدام دسته از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن، شاخص خونریزی متعاقب پروبینگ کارایی چندانی در ارزیابی میزان التهاب لثه ندارد؟


- الف) سیگاری
- ب) دیابتیک
- ج) مشکل قلبی عروقی
- د) زنان پس از دوران منوپوز

ترمیمی

۳۴) در یک تهیه حفره محافظه کارانه کلاس ۲، کدام تراش مربوط به آمالگام و کدام کامپوزیت است؟

- الف: A آمالگام - B کامپوزیت

- ب: A کامپوزیت - B آمالگام
ج: هر دو آمالگام
د: هر دو کامپوزیت



۳۵) در تهیه حفره کلاس چهار با وسعت مشاهده شده در تصویر ، گیر اضافی از چه طریقی لازم است فراهم شود؟



- الف: روند نمودن زوایای داخلی
ب: ایجاد groove در دیواره جینجیوال
ج: متقارب نمودن دیواره ها به سمت اکلوزال
د: صاف و مسطح نمودن کف پالپال


۳۶) یک دندان مولر اول پایین پس از تراش به یک سوم سرویکالی رسیده است. اگر لازم باشد پین داخل عاجی قرار دهیم؛ صرفنظر از شکل حفره، کدام انتخاب کدام محل جهت تعبیه پین خطر کمتری خواهد داشت؟

- الف ۱
ب ۲
ج ۳
د ۴




۳۷) ترمیم دندان وایتال زیر با عمق زیاد و نزدیک به پالپ، از محل مورد اشاره شکسته است. در صورتی که پوسیدگی خاصی وجود نداشته باشد، چه اقدامی مناسب تر است؟

- الف: تراش باکس و اندکی گسترش مزیالی؛ اصلاح تهیه حفره در زوایا؛ ترمیم مجدد
 ب: تراش کل ترمیم؛ اصلاح تهیه حفره در زوایا؛ ترمیم مجدد
 ج: تراش باکس و اندکی گسترش مزیالی؛ اصلاح تهیه حفره در زوایا؛ کاسپ ریداکشن در دیستو باکال، ترمیم مجدد
 د: تراش کل ترمیم؛ اصلاح تهیه حفره در زوایا؛ کاسپ ریداکشن در دیستو باکال، ترمیم مجدد



۳۸) در صورتی که در یک حفره آمالگام عمیق، نیاز به گذاشتن لاینر و بیس باشد، کدامیک از حالتها درست است؟

- A الف
 B ب
 C ج
 د هر سه حالت اشتباه هستند



جراحی

۳۹) هنگام استفاده از الواتور جهت کشیدن دندان بافت نرم بیمار سوراخ شده است. اقدام درمانی لازم کدام است؟

- الف) تمیز کردن ناحیه، بخیه زدن
- ب) تمیز کردن ناحیه، هموستاز، بخیه زدن
- ج) تمیز کردن ناحیه، هموستاز، ترمیم به صورت اولیه
- د) تمیز کردن ناحیه، هموستاز، ترمیم به صورت ثانویه

۴۰) برای کشیدن کدام یک از دندان های زیر حرکت چرخشی استفاده می شود؟

- الف) پره مولر اول ماگزیلا
- ب) مولر اول مندیبل
- ج) پره مولر دوم مندیبل
- د) مولر اول ماگزیلا

۴۱) بیمار آقای ۲۰ ساله جهت کار دندانپزشکی مراجعه نموده است، بعد از تزریق بی حسی دچار گزگز نوک انگشتان، رنگ پریدگی و تنفس های متعدد کوتاه (تاکی پنه) می شود. اقدام درمانی مناسب کدام است؟

- الف) اکسیژن تجویز شود
- ب) بیمار سوپاین شود.
- ج) اپی نفرین تزریق شود.
- د) تنفس در کیسه هوا انجام شود.

۴۲) در کشیدن دندان بعد از رادیوترابی کدام عبارت صحیح است؟

- الف) کشیدن ساده دندان و یا به صورت جراحی نتایج مشابهی دارد.
- ب) نیازی به تجویز آنتی بیوتیک نیست.
- ج) کشیدن دندان قبل و بعد از رادیوترابی نتایج مشابهی دارد.
- د) درمان HBO فقط بعد از کشیدن توصیه می شود.

۴۳) بیمار پسر ۱۵ ساله به دلیل ترومای ورزشی دچار شکستگی یک سوم انتهایی ریشه دندان کانین راست فک بالا شده است، بهترین مدت زمان اسپلینت تراپی کدام است؟

- الف) ۲-۴ ماه
- ب) ۷-۱۰ روز
- ج) ۲-۳ هفته
- د) ۳-۴ هفته

۴۴) جهت کشیدن دندان مولر دوم مندیبل سمت چپ کدام تزریق در اولویت است؟

- الف) تزریق اینترآوسئوس
- ب) بلاک اینفریور آلوئولار و لانگ باکال
- ج) تزریق اینتراسپتال
- د) تزریق بلاک اینسزبو

رادیو

۴۵) در رادیوگرافی پانورامیک یک آقای ۳۰ ساله رادیولوسنسی با حدود مشخص و scallop و دارای sclerotic border در ناحیه اینتر رادیکولار دندان های قدامی مندیبل مشهود است. دندان ها وایتال بوده و بیمار فاقد علائم کلینیکی است. محتمل ترین تشخیص

- ا) simple bone cyst
- ب) lateral periodontal cyst
- ج) KOT
- د) Ameloblastoma

۴۶) در رادیوگرافی پری اپیکال، ضایعه ای رادیوپاک با حدود نامشخص و همراه با تحلیل ریشه دندان ها مشهود است. کدامیک از گزینه های زیر محتمل ترین تشخیص میباشد

- ا) فیروز دیسپلازی
- ب) سمنتو اسیوس دیسپلازی
- ج) استیوسارکوم
- د) استیوما

۴۷) بیمار خاتم ۲۵ ساله با شکایت از محدودیت در باز کردن دهان مراجعه نموده است. کدامیک از اقدامات زیر دارای ارزش تشخیصی بیشتری میباشد


- ا) معاینه کلینیکی و گرفتن تاریخچه
- ب) بررسی دیسک توسط MRI
- ج) بررسی استخوان کندیل توسط CBCT
- د) بررسی میزان التهاب دیسک توسط سینتی گرافی

۴۸) در رادیوگرافی زیر نشانگر موید کدامیک از موارد زیر میباشد؟

- ا) استیوما
- ب) کلسیفیکاسیون عروق کاروتید
- ج) کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهایوبید
- د) هیچکدام



۴۹) در رادیوگرافی پانورامیک زیر کدام اقدام درمانی در اولویت قرار می‌گیرد



- ا) جراحی ضایعه
- ب) بیوپسی اولیه
- ج) فالوآپ رادیوگرافی
- د) عدم نیاز به اقدام درمانی

سلامت

۵۰) این تصویرنیم فک پایین یک پسر ۱۰ ساله است. با فرض اینکه تمام دندان های فک بالای او سالم باشد DMFT وی کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) ۴
- ب) صفر
- ج) ۶
- د) ۲



۵۱) نسبت وابستگی را در جمعیت زیر محاسبه کنید.

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| جمعیت ۰ تا ۴ سال: ۱۰۰ نفر | جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال: ۱۲۰۰ نفر | جمعیت ۶۵ سال به بالا: ۲۰ نفر |
| الف) ۱,۲ | ب) ۰,۲ | ج) ۰,۱ |
| | | د) ۱۰ |

۵۲) کدامیک از موارد زیر شاخص پوسیدگی است و در چه حدی پوسیدگی را شناسایی میکند؟

- الف) ICDAS, D1
- ب) OHIP, D3
- ج) MCDAS, D3
- د) CDAS, D2

۵۳) خطر از دست دادن دندان در افرادی که روکش دریافت کرده اند ۰/۰۸ و خطر بروز از دست دادن دندان در گروهی که در معرض روکش نبوده اند ۰/۷۱ است. خطر نسبی از دست دادن دندان برای افرادی که روکش دریافت کرده اند چقدر است؟

- الف) ۱۱ درصد ب) ۸/۸ درصد ج) ۸۸ درصد د) ۱۱۰ درصد

۵۴) کدامیک از موارد زیر از روشهای مبتنی بر جامعه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان نیست؟

- الف) فلوریداسیون آب ب) فلوریداسیون شیر ج) فلوریداسیون نمک د) خمیر دندان حاوی فلوراید

کودکان

۵۵) بیماری ۴ ساله با نمای دندان زیر به شما مراجعه می‌کند. با توجه به ارزیابی ریسک پوسیدگی بیمار، با چه فاصله زمانی فلورایدتراپی را توصیه می‌کنید؟

الف) ۳ ماه

ب) ۶ ماه

ج) به میزان همکاری کودک بستگی دارد.

د) به رژیم غذایی کودک بستگی دارد.



۵۶) والدین کودک سه ساله با نگرانی نسبت به تاثیر کشیدن دندانهای قدامی شیری بر ظاهر و تکلم فرزندشان مراجعه نموده‌اند. در این شرایط علت اصلی استفاده از اپالینس چیست؟

الف) تکلم

ب) زیبایی

ج) تثبیت موقعیت دندانها

د) تکه کردن غذا



۵۷) در رادیوگرافی از دندان‌های قدام یک کودک ۶ ساله، تصویر زیر مشاهده می‌شود. کدامیک از مواد زیر احتمال بیشتری دارد در درمان پالپکتومی این دندان‌ها به‌کار رفته باشد؟

الف) ZOE

ب) Vitapex

ج) Calcium Hydroxide

د) KRI



۵۸) یک روز بعد از درمان دندانپزشکی، کودک با نمای زیر مراجعه می‌کند. برای مدیریت این شرایط چه دارویی توصیه می‌شود؟

الف) شربت آموکسی سیلین بسته به وزن

ب) دهانشویه کلرهگزیدین

ج) پماد نیستاتین

د) دهانشویه سالین گرم




۵۹) تراش ایده‌آل حفره CI II آمالگام کدام است؟

الف) A

ب) B

ج) C

د) A, B



۶۰) بیمار ۵ ساله به علت ضربه وارد شده در اثر افتادن از دوچرخه دچار ترومای دندان‌های شده است. با توجه به نمای مشاهده شده و در صورت لقی دندان‌های A و B سمت چپ، طرح درمان مناسب کدام است؟

الف) کشیدن دندان A, B

ب) اسپلینت دندان A, B در صورت عدم تداخل با اکلوزن



ج) فالوآپ بیمار به علت احتمال اصلاح خودبخودی دندان

د) درمان پالپ دندان A, B و توصیه به کنترل رژیم غذایی

پاسخنامه سوالات

ج	۳۱	ج	۱
د	۳۲	ب	۲
الف	۳۳	الف	۳
ب	۳۴	د	۴
ب	۳۵	ج	۵
ج	۳۶	الف	۶
ج	۳۷	ج	۷
ب	۳۸	ب	۸
د	۳۹	ج	۹
ج	۴۰	الف	۱۰
د	۴۱	الف	۱۱
الف	۴۲	الف	۱۲
الف	۴۳	الف	۱۳
ب	۴۴	ب	۱۴
الف	۴۵	ج	۱۵
ج	۴۶	ب	۱۶
الف	۴۷	ب	۱۷
ج	۴۸	الف	۱۸
د	۴۹	د	۱۹
ب	۵۰	ب	۲۰
ج	۵۱	ب	۲۱
د	۵۲	ب	۲۲
الف	۵۳	الف	۲۳
د	۵۴	ج	۲۴
الف	۵۵	ج	۲۵
ب	۵۶	د	۲۶
الف	۵۷	د	۲۷
د	۵۸	ج	۲۸
الف	۵۹	ب	۲۹
الف	۶۰	ب	۳۰