

کد کنترل

122

A



122A

پارسا رحیمی
@chwithParsa
ایران * ایما * بله *

بسیار زیاده

آگهی دایمی جوبی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی باید دنبال قله بود.
(رهبر شهید)

دفترچه شماره ۲

صبح جمعه

گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی

آزمون اختصاصی سراسری و پذیرش دانشجو - معلم

سال ۱۴۰۵

(ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی)

مدت زمان پاسخ‌گویی: ۷۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۵


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت زمان پاسخ‌گویی
۱	فیزیک	۳۵	۴۱	۷۵	۴۵ دقیقه
۲	شیمی	۳۰	۷۶	۱۰۵	۳۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.
این آزمون، نمره منفی دارد.



حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز است و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۷۶- اگر شمار الکترون‌های دارای $n=4$ در اتم عنصری، برابر با شمار الکترون‌های دارای $n=2$ ، $l=1$ در آرایش الکترونی آن باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است؟




۷۷- اگر آرایش الکترونی اتم‌های X، Y و Z، به ترتیب به $4s^2$ ، $4s^1$ و $3p^5$ ختم شده باشد، کدام مورد درباره آنها، نادرست است؟

- (۱) حداکثر تفاوت عدد اتمی X و Y، برابر ۱۱ است.
 (۲) تفاوت عدد اتمی Y و Z، نمی‌تواند مضربی از ۲ باشد.
 (۳) شمار الکترون‌های دارای $n+l=4$ در اتم عنصر Z، برابر ۵ است.
 (۴) دو عنصر که آرایش الکترونی Y را دارند از قاعده آفیا پیروی نمی‌کنند.

۷۸- اگر مجموع شمار ذره‌های زیراتمی باردار در یون پایدار X^{n-} (عنصر X متعلق به دوره سوم جدول تناوبی)، ۷ برابر شمار الکترون‌های اتم عنصر Z از دوره دوم جدول باشد، تفاوت شماره گروه دو عنصر کدام است؟




۷۹- در ساختار لوویس آنیون کدام ترکیب، نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم‌ها، بزرگ‌تر است؟



۸۰- ویژگی یا کاربرد کدام گاز، نادرست بیان شده است؟

- (۱) هلیوم: جوشکاری (همانند آرگون)
 (۲) کربن مونوکسید: دارای چگالی کمتر از هوا
 (۳) نیتروژن: نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی
 (۴) اوزون: گندزدایی میوه و سبزیجات در مصارف خانگی

۸۱- شمار مول‌های اکسیژن تشکیل شده از تجزیه کامل ۰/۲ مول $KClO_3$ ، مطابق با معادله واکنش داده شده، با شمار مول‌های کربن دی‌اکسید تشکیل شده از سوختن کامل ۰/۱۵ مول از کدام ماده زیر برابر است؟ (معادله واکنش موازنه شود.)



محل انجام محاسبات

نکته: بهین ماده هنگام حل شدن برین تبدیل می‌شود یا ساختار مولکولی خود را در حفظ می‌کنی!!


صفحه ۱۱

122A

شیمی - گروه علوم ریاضی و فنی سال ۱۴۰۵


- ۸۲- کدام ماده در آب حل شده و در فرایند انحلال آن، ساختار ماده بدون تغییر باقی می‌ماند؟ انحلال برین
(۱) پتاسیم استات (۲) گلوکز (۳) دکان (۴) گاز هیدروژن فلوئورید
- ۸۳- انحلال پذیری لیتیم سولفات در دمای 40°C و 70°C ، به ترتیب، برابر ۳۰ و ۲۵ گرم نمک در ۱۰۰ گرم آب است. اگر دمای ۶۵۰ گرم محلول از 40°C تا 70°C افزایش یابد، حداقل چند گرم آب مقطر لازم است تا همه رسوب تشکیل شده را حل کند؟
(۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) ۵۰ (۴) ۱۵۰
- ۸۴- کدام مورد درباره ویژگی‌های انحلال سدیم کلرید در آب درست است؟
(۱) ساختار شبکه بلور در هم می‌ریزد و همه یون‌های نمک با لایه‌ای از مولکول‌های آب، پوشیده می‌شوند.
(۲) جاذبه ایجاد شده در این انحلال، از نوع هیدروژنی و با قدرت پیوند یونی در نمک، برابر است.
(۳) بلورهای مکعبی سدیم کلرید با یون‌های H^+ و OH^- ، جاذبه برقرار می‌کنند.
(۴) از انحلال آن، برخلاف انحلال HI(g) در آب، یون تشکیل می‌شود.
- ۸۵- اگر از سوختن کامل ۰/۱ مول هیدروکربن غیرحلقوی C_nH_n ، $16/8$ گرم بخار آب تشکیل شود، برای سیرشدن یک مول از آن، چند گرم گاز هیدروژن لازم است؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1}$)
(۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۲
- ۸۶- با توجه به مقایسه واکنش پذیری چهار عنصر آغازی دوره دوم جدول تناوبی که به شکل نامرتب و با حروف انگلیسی نشان داده شده، کدام مورد درست است؟
(۱) همه عناصر، دارای یون پایدار تک‌اتمی هستند.
(۲) شعاع اتمی D، بزرگ‌تر از شعاع اتمی X و Y است.
(۳) همه زیرلایه‌های الکترونی در اتم D، برخلاف زیرلایه‌های الکترونی در اتم X، پر است.
(۴) شمار الکترون‌های دارای $l=0$ ، در اتم Y، برابر با شمار الکترون‌های دارای $l=1$ ، در اتم Z است.

واکنش پذیری



نکته: روند تناوبی ← جت یاد آوری ← شعاع اتمی ↓ خلت نامرتب ↑


محل انجام محاسبات




پاسخ ۸۵ :





$$\frac{n}{2} = 6 \Rightarrow n = 12$$




۸۷- با توجه به معادله واکنش داده شده، اگر ۶٫۷۲ لیتر گاز هیدروژن سولفید (در شرایط STP)، با مقدار کافی محلول نیتریک اسید واکنش داده و در مجموع، ۰٫۴۵ مول ترکیب مولکولی تشکیل دهد، بازده درصدی واکنش کدام است؟ (معادله واکنش موازنه شود.)



۸۸- اگر در ساختار آلکانی غیر حلقوی، نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به شمار اتم‌های کربن، برابر ۲٫۴ باشد، در ساختار چند ایزومر از آن، ۳ اتم کربن با عدد اکسایش -۳ وجود دارد؟




۹۰- با توجه به واکنش‌های گازی زیر، که به صورت جداگانه، در دو ظرف دربسته و با تزریق گازهای A و D، انجام می‌شود، اگر هر دو واکنش، در مدت زمان X دقیقه پایان یابد و سرعت متوسط مصرف A، برابر با سرعت متوسط مصرف D باشد، کدام مورد درست است؟



محل انجام محاسبات

۹۱- با توجه به معادله واکنش و شکل داده شده، کدام مورد، نادرست است؟
 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$, $\Delta H = -184 \text{ kJ}$

(۱) واکنش گرماده و هر ذره در شکل، معادل ۰/۲۵ مول ماده است.
 (۲) مجموع انرژی گرمایی H_2 و Cl_2 ، با انرژی گرمایی HCl ، تفاوت چندانی ندارد.



(۳) گرمای آزاد شده به طور عمده مربوط به تفاوت انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فراورده است.

(۴) اگر آنتالپی پیوند هر مول از فراورده، برابر با ۴۳۱ kJ باشد، مجموع

آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها، برابر با ۶۷۸ kJ است. $\Delta H = -184 \text{ kJ}$

۹۲- با توجه به واکنش: $SF_6(g) + 2H_2O(l) \rightarrow SO_2(g) + 4HF(g)$, $\Delta H = -820 \text{ kJ}$ ، که در ظرف ۴ لیتری انجام می شود، اگر گرمای آزاد شده از واکنش در مدت ۲۰ ثانیه، برابر با ۲۰۵ کیلوژول باشد، سرعت متوسط تشکیل

HF در این مدت، برابر چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟

$$R = \frac{V_f \text{ mol}}{V_r \text{ min}} = \frac{0.75 \text{ (۳)}}{0.60 \text{ (۴)}} = 1.25 \text{ (۱)}$$




۹۳- اگر در ساختار مولکول X، هر اتم کربن با سه اتم دیگر پیوند اشتراکی داشته باشد، کدام مورد، نمی تواند ترکیب X باشد؟
 (۱) سیانواتن (۲) فرمیک اسید (۳) وینیل کلرید (۴) نفتالن

۹۴- با توجه به ساختار مولکول های داده شده، کدام مورد، نادرست است؟ ($H=1, C=12, N=14, O=16 \text{ g.mol}^{-1}$)
 (۱) در سوختن کامل هر مول از b، ۱۱ مول گاز اکسیژن مصرف و در مجموع، ۱۴ مول فراورده تشکیل می شود.


(۲) هر دو مولکول آروماتیک اند و مجموع شمار اتم ها در a، ۱/۲ برابر مجموع شمار اتم ها در b است.

(۳) شمار اتم های کربن دارای عدد اکسایش منفی در a، برابر با ۸ است.

(۴) تفاوت جرم مولی دو ترکیب، برابر با ۲۴ است.



محل انجام محاسبات



یازدهم فصل ۲
گزینه ۳

۹۵- کدام مورد درباره «پاک کننده های خورنده»، درست است؟
(۱) برخلاف پاک کننده های صابونی با ذره ها برهم کنش دارند.
(۲) همانند پاک کننده های غیرصابونی از نظر شیمیایی فعالند.
(۳) همانند سود سوزآور و جوهر نمک، می توانند به ترتیب، pH بزرگ تر و کوچک تر از ۷ داشته باشند.
(۴) یک نوع از آن، مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم است که با تولید گاز اکسیژن، قدرت پاک کنندگی را افزایش می دهد.

یازدهم فصل ۳
گزینه ۴

۹۶- اگر pH محلول اسید ضعیف HA ($K_a = 2 \times 10^{-5}$)، با pH محلول ۰٫۰۰۲ مولار هیدروکلریک اسید برابر باشد، به ترتیب، درصد یونش آن به تقریب کدام و برای تهیه ۲۰۰ میلی لیتر از محلول HA، به تقریب چند گرم اسید لازم است؟ ($HA = 50 \text{ g.mol}^{-1}$)
(۱) ۱ و ۱ (۲) ۲ و ۲ (۳) ۳ و ۱ (۴) ۴ و ۱
استاندارد

یازدهم فصل ۳
گزینه ۴

۹۷- کدام مورد (با در نظر گرفتن دمای اتاق) درست است؟
(۱) رنگ کاغذ pH در محلولی که نسبت $[H^+]$ به $[OH^-]$ در آن، برابر 10^{-3} باشد، قرمز است.
(۲) اگر رسانایی الکتریکی دو محلول HA و HX برابر باشد، غلظت آغازی مولکول های دو اسید به یقین برابر است.
(۳) گستره تغییر pH در محلول های آبی، بین ۱ و ۱۴ است و هر چه pH محلولی کوچک تر باشد، $[H^+]$ در آن بیشتر است.
(۴) اگر تفاوت pH محلول های اسید HA و باز DOH (هر دو قوی)، برابر با ۱۴ باشد، غلظت مولی هر یک از محلول ها، برابر با یک است.

۹۸- اگر قدرت اکسندگی A^{2+} ، بیشتر از X^{2+} و قدرت کاهندگی A کمتر از Y باشد، کدام مورد یقین درست است؟
(۱) $E^\circ(X^{2+}/X) > 0$ و هر سه فلزند و $E^\circ(A^{2+}/A) > 0$ را نمی توان در ظرفی از جنس X، نگهداری کرد و $E^\circ(Y^{2+}/Y) > 0$ است.
(۲) قدرت اکسندگی X^{2+} ، بیشتر از قدرت اکسندگی Y^{2+} و $E^\circ(Y^{2+}/Y) > 0$ است.
(۳) در سلول گالوانی تشکیل شده از Y و A، جهت حرکت الکترون از A به سمت Y است.
(۴) واکنش: $X(s) + Y^{2+}(aq) \rightarrow X^{2+}(aq) + Y(s)$ ، به طور طبیعی انجام می شود.

گزینه ۱

نکته: قدرت الکترونی را با پتانسیل کاهش استاندارد سنجیم.

محل انجام محاسبات

پایخ سوال ۹۶:

$$[H^+] = 10^{-3} = \sqrt{K_a \times C} \Rightarrow 10^{-3} = \sqrt{2 \times 10^{-5} \times C} \Rightarrow C = 5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

برای تهیه ۲۰۰ میلی لیتر از محلول HA، به تقریب ۱۰ گرم اسید لازم است.

آبکاری کاتد → لاکتی → انزای جرم

صفحه ۱۵

122A

شیمی - گروه علوم ریاضی و فنی سال ۱۴۰۵

۹۹- کدام مورد در مقایسه ویژگی های «فرایند آبکاری فلز با نقره» و «سلول گالوانی هیدروژن - مس» مشابه است؟

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > 0$$

(۲) اکسایش آنیون ها در آند
(۴) اکسایش فلز در آند

نکته مهم: آند = الساتر
کاتد = لاکتی
سلول

دوازدهم فصل ۱

گزینه ۱

۱۰۰- با توجه به معادله واکنش: $3\text{X}^{n+}(\text{aq}) + \text{bCr}(\text{s}) \rightarrow \text{bCr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{X}(\text{s})$ اگر به ازای مصرف ۰٫۰۴ مول فلز کروم، ۰٫۱۲ مول الکترون مبادله شود، پس از موازنه معادله واکنش، نسبت n به b، کدام خواهد شد؟

(۱) ۰٫۵ (۲) ۱ (۳) ۱٫۵ (۴) ۲

۱۰۱- در کدام مورد، علامت بار جزئی اتم مرکزی دو مولکول گفته شده مخالف یکدیگر و گشتاور دوقطبی آنها، بزرگ تر از صفر است؟

(۱) SCl_2 (۲) H_2S (۳) NF_3 (۴) H_2O (۵) OBr_2

۱۰۲- با توجه به جدول که مقدار آنتالپی فروپاشی شبکه را برای چند ترکیب یونی به صورت پارامتری نشان می دهد، کدام مورد درست است؟

ترکیب یونی	CaO	LiF	BaO	KBr
آنتالپی فروپاشی ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	a	b	c	d

گزینه ۱ آنتالپی شبکه → بارین ↑، شعاع یون ↓

$$(1) (a-d) > (c-b) \quad (2) (d+b) > (c+a) \quad (3) \left(\frac{b}{c} > \frac{a}{d}\right) \quad (4) \left(\frac{d}{b} > \frac{a}{c}\right)$$

۱۰۳- با توجه به تعادل گازی: $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ $\Delta H < 0$ ، که در یک ظرف ۲ لیتری برقرار است، کدام مورد درست است؟ ($N=14, O=16; \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

(۱) با کاهش دما، رنگ مخلوط تیره تر می شود و تغییر جرم فراورده، کمتر از مجموع تغییر جرم واکنش دهنده ها خواهد بود.
(۲) با انتقال تعادل به ظرف یک لیتری، شمار مول های گازی درون ظرف افزایش یافته و K تعادل ثابت می ماند.
(۳) با تزریق یک مول NO_2 به ظرف، نسبت تغییر جرم NO به تغییر جرم O_2 ، برابر ۱٫۸۷۵ خواهد بود.
(۴) با انتقال تعادل به ظرف ۵ لیتری، غلظت NO و O_2 ، افزایش و غلظت NO_2 ، کاهش می یابد.

نکته: ثابت
K ثابت

محل انجام محاسبات

نکته سوال ۱۰۱: فقط قطبی بودن کافی نیست؛
هشده دشاردن مولکولی تعیین شده ندارد قطبی

آلده دوست داستی کانالی جوبی بسنی

صفحه ۱۶

122A

شیمی - گروه علوم ریاضی و فنی سال ۱۴۰۵

بازدهم ضل ۲

۱۰۴- با توجه به معادله نوشتاری واکنش‌های داده شده، کدام مورد درست است؟

ایلی انذرات

I) $A + B \rightarrow$ اتانولیک اسید + اتانولII) افشانه بی‌حس کننده موضعی $X +$ گاز اتنIII) $Y \rightarrow$ محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات + گاز اتن(۱) شمار جفت‌الکترون‌های ناپیوندی روی اتم‌ها در Y ، برابر با شمار همین جفت‌الکترون‌ها در مولکول فراورده واکنش (II) است.(۲) تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول‌های A و Y ، دو برابر شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول X است.(۳) جمع جبری عدد اکسایش اتم‌های کربن در مولکول A ، ۴ برابر همین جمع جبری در مولکول Y است.(۴) Y همانند A و برخلاف X می‌تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.۱۰۵- در دمای معین، تعادل گازی: $2NO \rightleftharpoons N_2 + O_2$ ، با ۰/۱ مول از هر واکنش‌دهنده و ۰/۲ مول فراورده، در یک ظرف ۵ لیتری برقرار است. اگر با تزریق مقداری گاز NO به ظرف واکنش، ۵۰ درصد به غلظت آن اضافه شود، پس از برقراری تعادل جدید، غلظت مولی گاز N_2 ، کدام خواهد بود؟

اولیه	۰/۲	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۲۵
جدید	$0.2 + x$	$0.35 - 2x$	$0.25 + x$	0.25

محل انجام محاسبات

$$K = \frac{0.4 \times 0.4}{0.2 \times 0.2} = 4$$

پاسخ سوال ۱۰۵

$$\Rightarrow 4 = \frac{[(0.4) - (x)][(0.4) - (x)]}{[(0.1) + (x)][(0.1) + (x)]} \Rightarrow 2 = \frac{0.4 - x}{0.1 + x}$$

$$\frac{0.25 + 0.25}{5} = 0.25 \text{ mol/l}$$

به حسته نباشید و خدا قوت خیل
خیلی

بالاخره پس از سختی‌های اصلی پرونه کنکور ۱۴۰۵ بسته شد

با آرزوی بهترین‌ها پارسا رحی