www.konkur.in

۱- **شایع‌ترین عصب درگیر در عفونت هرپس زوستر عودکننده در ناحیه صورت، کدام است؟**

الف) افتالمیک ب) ماگزیلاری ج) کوردا تمپانی د) گلوسوفارنژیال

۲- **ژنژیویت هرپتیک ثانویه در بیماران Immunocompetent شبیه کدام ضایعه است؟**

الف) Desquamative Gingivitis

ب) Necrotizing Ulcerative Gingivitis

ج) Plasma Cell Gingivitis

د) Nonspecific Gingivitis

۳- **کدام‌یک از راهکارهای درمانی، برای مدیریت درد ناشی از عفونت اولیه HSV، توصیه شده است؟**

الف) مسکن حاوی کدئین

ب) لیدوکائین موضعی ۲٪

ج) پردنیزولون خوراکی

د) پماد تاکرولیموس

۴- **کدام تکنیک آزمایشگاهی جهت تشخیص عفونت هرپس عودکننده از ریزش بدون علامت ویروس، کارایی دارد؟**

الف) کشت بزاق

ب) اسمیر تزانک

ج) سنجش ایمونوگلوبولین G

د) واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

۵- **ضایعات عصبی کدام بیماری شبیه مالتیپل اسکلروزیس است؟**

الف) استیونس جانسون

ب) آرتریت تمپرال

ج) بهجت

د) پمفیگوس

۶- **بیمار ۵۵ ساله با سابقه شش ماهه زخم‌های فرسایشی در لثه مراجعه کرده است. همچنین از سوزش و قرمزی چشم شکایت دارد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟**

الف) پمفیگوس ولگاریس

ب) لیکن پلان

ج) پمفیگوئید غشای مخاطی

د) اپیدرمولیزیس بولوزای اکتسابی

۷- **ضایعات اریتم مولتی‌فرم، که اغلب توسط عفونت قبلی HSV ایجاد می‌شود، به چه صورت در دهان ظاهر می‌گردد؟**

الف) زخم‌های متعدد و به هم پیوسته

ب) زخم منفرد با حاشیه صاف

ج) لکه‌های سفید شبیه کاندیدیازیس

د) اروژن‌های خطی

۸- **به‌طور انحصاری لیکن پلان در کدام ناحیه، به‌صورت نمای کاشی مانند (Tiles) دیده می‌شود؟**

الف) کام سخت ب) لثه چسبنده ج) دورسال زبان د) کف دهان

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۹- تمام موارد شامل عوامل عمومی (General Predisposing Factors) مستعد کننده بروز کاندیدیازیس دهانی است، به‌جز:

الف) استروئیدهای استنشاقی
ب) آنتی بیوتیک‌های سیستمیک
ج) شیمی درمانی
د) دیابت

۱۰- کاربرد کدام تست برای شناسایی نحوه توزیع مخمرهای کاندیدا آلبیکانس در روی مخاط دهان مفید است؟

الف) Smear
ب) Impression Culture
ج) Culture Salivary
د) Imprint Culture

۱۱- بیوپسی در تشخیص کدام نوع از کاندیدیازیس دهانی کارایی دارد؟

الف) هیپرپلاستیک مزمن
ب) آتروفیک حاد
ج) اریتماتوز
د) انگولر کلایتیس

۱۲- خانمی ۷۲ ساله با ضایعات متعدد سفید وروکوئید در روی لثه به کلینیک مراجعه کرده است. نمونه‌برداری اولیه دیسپلازی خفیف را نشان داده است. بر اساس ویژگی‌های PVL ،کدام اقدام بالینی منطقی‌تر است؟

الف) برداشتن کل ضایعه در یک جلسه
ب) پیگیری منظم ضایعه با فواصل ۶ ماه
ج) جراحی با چاقوی سرد
د) درمان عفونت ویروسی

۱۳- همه موارد ممکن است درنمای بالینی لکوپلاکیای نان هموژن دیده شود، به‌جز:

الف) رتیکولر ب) وروکوز ج) پاپیلری د) ندولر

۱۴- Frictional Keratosis در ناحیه گونه با کدام ضایعه، در تشخیص افتراقی قرار می‌گیرد؟

الف) Homogeneous Leukoplakia
ب) Lichenoid Reactions
ج) Leukoedema
د) White Sponge Nevus

۱۵- ملانومای دهانی در کدام ناحیه با بدترین پروگنوز همراه است؟

الف) لب ب) لثه ج) مخاط باکال د) کام

۱۶- در بیمارانی که قرص Bismuth Subsalicylate را می‌جوند، پیگمانتاسیون دهانی به کدام صورت است؟

الف) منتشر خاکستری در گونه
ب) موضعی قهوه‌ای در لثه
ج) منتشر سیاه در زبان
د) موضعی سیاه در کام

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۱۷- آقای ۳۲ ساله با لکه‌های متعدد قهوه‌ای رنگ روی مخاط لب پایین و پوست اطراف دهان مراجعه کرده است. وی سابقه جراحی‌های مکرر به دلیل پولیپ‌های گوارشی ذکر می‌کند. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) سندرم آلبرایت
ب) سندرم پوتز- جگرز
ج) بیماری آدیسون
د) نوروفیبروماتوز نوع ۱

۱۸- احتمال بروز واکنش‌های لیکنوئید در مصرف سیستمیک کدام فلز وجود دارد؟

الف) طلا ب) نقره ج) آرسنیک د) بیسموت

۱۹- بیمار تحت شیمی‌درمانی سرکوب‌کننده مغز استخوان که مهار کننده‌های تیمیدین کیناز دریافت می‌کند، مبتلا به عفونت کدام ویروس نمی‌شود؟

الف) پاپیلوما ویروس ب) کوکساکی ج) هرپس سیمپلکس د) پارامیکسو ویروس

۲۰- آقایی ۵۵ ساله به لحاظ موکوزیت و درد دهان ناشی از شیمی درمانی قادر به مسواک زدن به‌صورت منظم نمی‌باشد کدام دهان‌شویه به عنوان مکمل کنترل پلاک توصیه می‌شود؟

الف) پراکسید هیدروژن ۳٪
ب) کلرهگزیدین گلوکونات ۰۱۲٪
ج) لیسترین با طعم نعناع
د) بنزیدآمین هیدروکلراید

۲۱- در بیماری که استخوان فک پایین، نمایان، نکروزه و بدون علامت است، بروز کدام مورد موجب تغییر طبقه‌بندی استئونکروز فک از مرحله ۱ به ۲ می‌شود؟

الف) ترشح چرکی همراه با درد
ب) سابقه مصرف بیس فسفونات
ج) گسترش اندازه استخوان نمایان
د) لقی منتشر دندان‌ها

۲۲- خانمی تحت شیمی‌درمانی، دچار ترومبوسیتوپنی شدید (پلاکت کمتر از ۲۰۰۰۰) و موکوزیت دهانی گسترده شده است. بیمار نیاز به کشیدن دندان مولر اول به دلیل آبسه حاد دارد.کدام گزینه صحیح است؟

الف) تجویز آنتی‌بیوتیک سیستمیک
ب) مشاوره با پزشک معالج جهت درمان بیمار
ج) کشیدن دندان با بی‌حسی موضعی
د) درمان موکوزیت و تجویز مسکن

۲۳- بیماری مبتلا به سرطان سر و گردن، برای کاهش آسیب وارده به غدد بزاقی در حین پرتودرمانی، به کلینیک ارجاع داده شده است. کدام روش بیشترین کمک را می‌کند؟

الف) Brachytherapy
ب) Conventional Radiotherapy
ج) Intensity-Modulated Radiotherapy
د) Adjuvant Chemotherapy

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۲۴- بیماری دو روز بعد از انجام درمان ریشه دندان مولر اول فک بالا، با زخمی دردناک به ابعاد یک در یک سانتی‌متر در ناحیه کام مراجعه نموده است.محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) Necrotizing Sialometaplasia
ب) Cheilitis Glandularis
ج) Adenoid Cystic Carcinoma
د) Acute Allergic Sialadenitis

۲۵- پسری ۶ ساله با سردرد، تب، خستگی، درد عضلانی و تورم دو طرفه پاروتید به‌صورت حاد مراجعه کرده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) Lymphoma
ب) Heerfordt's Syndrome
ج) Epidemic Parotitis
د) CMV Infection

۲۶- کدام تکنیک تشخیصی جهت شناسایی Calcified Phleboliths مناسب است؟

الف) Scintigraphy
ب) Sialography
ج) Computed Tomography
د) Ultrasonography

۲۷- اندازه‌گیری سطوح کلسیم و آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین در تشخیص کدام بیماری غده بزاقی مناسب است؟

الف) Bulimia Nervosa
ب) Sjögren Syndrome
ج) Anorexia Nervosa
د) Sarcoidosis

۲۸- در بیماری نوجوان، سیلادنیت حاد، به صورت تورم منتشر و دردناک غدد پاروتید همراه با خشکی دهان بروز کرده است. بیمار دچار کولیت نیز شده است. علائم نشان دهنده بروز کدام مورد می‌باشد؟

الف) Sjögren Syndrome
ب) Allergic Sialadenitis
ج) CMV Infection
د) Lymphoma

۲۹- بر اساس معیارهای تشخیصی، برای تشخیص "میالژی"، کدام یافته ضروری است؟

الف) وجود درد ارجاعی به خارج از ناحیه عضله در لمس
ب) گزارش درد آشنا (Familiar pain) در عضله تمپورال یا ماسِتر با لمس
ج) وجود محدودیت شدید در بازکردن دهان با Hard end-feel
د) وجود صداهای مفصلی مانند کِرپیتوس هنگام حرکت فک

۳۰- عضله اصلی جلو آورنده و باز کننده فک پایین کدام است؟

الف) تمپورال ب) تریگوئید خارجی ج) ماستر د) بوکسیناتور

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۳۱- در بیمار دچار تورم و حساسیت در ناحیه TMJ که با سفتی صبحگاهی توام است، محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) Rheumatoid Arthritis
ب) Septic Arthritis
ج) Reiter's Syndrome
د) Psoriatic Arthritis

۳۲- کدام مورد شایع‌ترین عامل اتیولوژی و پاتوژنز نورالژی تریژمینال کلاسیک می‌باشد؟

الف) تومورهای زاویه مخچه
ب) پلاک‌های دمیلینه کننده در بیماری اماس
ج) فشار عروقی بر روی ریشه عصب تریژمینال
د) ضربه مستقیم به عصب در طی اعمال جراحی

۳۳- مؤثرترین و قابل اعتمادترین گزینه درمانی در بیمار مبتلا به سندرم سوزش دهان کدام است؟

الف) کپسایسین موضعی
ب) کلونازپام موضعی
ج) آلفا لیپوئیک اسید
د) آمی‌تریپتیلین

۳۴- در آقایی ۶۶ ساله با شدت درد متوسط تا شدید در مسیر عصب زوج پنجم، که کمتر از ۶ ماه پس از جراحی دنـدان عقل ایجاد شده، مراجعه کرده است. وی دچار هیپرآلژزی، آلودینیا نیز می‌باشد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) Post-Traumatic Trigeminal Neuropathy
ب) Persistent Idiopathic Facial Pain
ج) Central Post Stroke Pain
د) Neck-Tongue Syndrome

۳۵- استنشاق اکسیژن در رفع حمله کدام سردرد موثر می‌باشد؟

الف) Hemicrania Continua
ب) Tension-Type
ج) Cluster Headache
د) Migraine Common

۳۶- در کدام نورالژی امکان برادی‌کاردی، افت فشار خون و ایست قلبی وجود دارد؟

الف) Geniculate
ب) Glossopharyngeal
ج) Occipital
د) Trigeminal

۳۷- شایع‌ترین علامت قبل از بروز سر دردهای ناشی از تومورهای خلفـی حفـره مغـزی (Posterior Cranial Fossa) کدام است؟

الف) استفراغ ب) گرفتگی بینی ج) وزوز گوش د) ریزش اشک

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۳۸- بیماری جهت فالواپ دندان لترال بالا متعاقب اندو رتروگرید و اپیکوسکتومی مراجعه کرده است. درکلیشه پری آپیکال همه موارد ممکن است مشاهده شود، به‌جز:

الف) Fibrous scar

ب) Spoke like radiopaque

ج) Internally radiating

د) Halo pattern

۳۹- بهترین کلیشه استاندارد جهت بررسی تیپینگ دندان مولر اول فک پایین درگیر کیست باکال بایفورکیشن، کدام است؟

الف) پری آپیکال موازی

ب) کراس سکشنال ماندیبل

ج) بایت وینگ مولر

د) تصویر پانورامیک

۴۰- در رادیوگرافی پانورامیک، کدام ویژگی به تشخیص کیست دنتی‌جروس کمک می‌کند؟

الف) اپی‌سنتر ضایعه در ناحیه اپکس ریشه دندان

ب) اتصال حاشیه کیست به سمنتو انامل جانکشن دندان نهفته

ج) وجود سپتوم‌های منحنی داخل ضایعه

د) گسترش ضایعه به خارج از کورتکس استخوان

۴۱- کدام‌یک از کیست‌ها تمایل به رشد در طول استخوان فک با گسترش کم (Tunneling) دارد؟

الف) کیست دنتی‌جروس

ب) کیست رادیکولار

ج) کیست ادنتوژنیک کراتوسیست

د) کیست ساده استخوانی

۴۲- ضایعات سنترال ژانت سل به‌صورت اولیه شامل کدام سلول همراه با تغییرات عروقی می‌باشند؟

الف) اوستئوسیت ب) فیبروبلاست ج) استئوکلاست د) کندروسیت

۴۳- شایع‌ترین جایگاه متاستاز به استخوان فک، کدام ناحیه است؟

الف) خلف ماندیبل ب) قدام کام ج) سرکندیل د) سینوس ماگزیلا

۴۴- شایع‌ترین یافته بالینی در سنترال جاینت سل استخوان فک کدام است؟

الف) تورم ب) درد ج) حساسیت به لمس د) فیستول

۴۵- در کلیشه رادیوگرافی این تومور تشکیل فلبولیت‌ها، ایجاد نمای Target Like را می‌نمایند. کدام تومور مطرح می‌باشد؟

الف) استئوبلاستوما

ب) سنترال ژانت سل گرانولوما

ج) سنترال همانژیوما

د) سنترال ادونتوژنیک فایبروما

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۴۶- آقای ۳۵ساله شش ماه پس از تعبیه ایمپلنت دندان کانین فک پایین با شکایت از بروز ضایعه بدون درد در سطح باکال دندان مزبور مراجعه کرده است. ضایعه دارای سطح صاف، به ابعاد ۱/۵ در ۲ سانتی‌متر،حالت Sessile و ته رنگ آبی- ارغوانی دارد. در رادیوگرافی پری آپیکال رزورپشن فنجانی استخوان دیده می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) PGCG

ب) Pyogenic Granuloma

ج) Epulis Granulomaosa

د) Ossifying Fibroma

۴۷- کدام مورد در کلینیک با پاپیلوما اشتباه می‌شود؟

الف) رتروکاسپید پاپیلا

ب) دنچر پاپیلوماتوز

ج) فرنال تگ

د) جاینت سل فیبروما

۴۸- وجود یک ندول بدون درد، زرد رنگ و بدون زخم در ناحیه دورسال زبان یک خانم، کدام تشخیص را مطرح می‌نماید؟

الف) Viral Papilloma

ب) Granular Cell Tumor

ج) Palisaded Encapsulated Neuroma

د) Desmoplastic Fibroma

۴۹- کدام تومور احتمالا از سلول‌های لیگامان پریودونتال منشا می‌گیرد؟

الف) Ossifying Fibroma

ب) Pindborg Tumor

ج) Adenomatoid Tumor

د) Central Fibroma

۵۰- کدام یافته دهانی در سندرم MEN 2B مشاهده می‌شود؟

الف) پوستچول‌های متعدد در گونه

ب) نوروم‌های مخاطی در دهان

ج) اگزوستوزهای متعدد در فکین

د) هایپرپلازی شدید لثه

۵۱- ضایعات Fine Wart Like بر روی گونه و پیشانی مبتلایان به کدام بیماری دیده می‌شود؟

الف) Cowden Syndrome

ب) Tuberous Sclerosis

ج) Heck's Disease

د) Sturge Weber Syndrome

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۵۲- نوزاد ۸ روزه با دندان متولد شده است. مادر وی از زخم تروماتیک پستان حین شیردهی شکایت دارد. دندان درمعاینه لق است و لبه تاج آن، تیز می‌باشد.کدام اقدام صحیح است؟

الف) تزریق ویتامین K و جراحی دنتال پاپیلا
ب) ریلیف وتراش تیزی دندان و حفظ آن
ج) توصیه به تهیه اسپلینت شیردهی
د) تهیه رادیوگرافی وفالوآپ نوزاد

۵۳- ارتباط بین تارودنتیسم با همه موارد مطرح شده است، به‌جز:

الف) شکاف لب ب) هیپودنشیا ج) شکاف کام د) میکرودونشیا

۵۴- بر اساس Modified Duke Criteria برای تشخیص اندوکاردیت عفونی، کدام مورد Major Criteria محسوب می‌شود؟

الف) تب بالاتر از ۱۰۰/۴ فارنهایت
ب) پنومونی ایمونولوژیک
ج) کشت خون مثبت در دو مرحله جدا از هم
د) پدیده‌های عروقی مانند آمبولی

۵۵- خانمی دچار پرفشاری خون که Captopril استفاده می‌کند، دچار سوزش دهان و تغییرات چشایی شده است. محتمل‌ترین علت بروز این علایم چیست؟

الف) بیماری زمینه‌ای ب) کاهش جریان بزاق ج) جنسیت بیمار د) عارضه جانبی دارو

۵۶- آقایی ۶۰ ساله با سابقه آنژین صدری پایدار (Stable Angina) و سابقه سکته قلبی (MI) در ۶ ماه پیش، برای کشیدن دندان مراجعه کرده است. روزانه ۸۱ میلی‌گرم آسپرین استفاده می‌کند. وی بدون تنگی نفس یا درد قفسه سینه، از پله‌ها بالا می‌رود. کدام توصیه در مورد مدیریت این بیمار صحیح است؟

الف) تعویق درمان انتخابی توجه به سابقه سکته قلبی بیمار
ب) درمان سرپایی و رعایت اقدامات کاهش استرس
ج) کشیدن دندان حداقل ۷ روز پس از قطع آسپرین
د) دریافت آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تزریقی

۵۷- در بیمار مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی که روزانه وارفارین مصرف می‌کند و نیاز به کشیدن دندان سانترال فک بالا دارد. تمام موارد رعایت می‌شود، به‌جز:

الف) کاربرد ترانگزامیک اسید
ب) INR بین ۲ تا ۳
ج) قطع وارفارین
د) تجویز دهانشویه آمینوکاپروئیک اسید

۵۸- بیمار ۷۰ ساله با سابقه تعویض دریچه آئورت که با سابقه حساسیت به پنی‌سیلین، نیاز به کشیدن دندان دارد. با توجه به دستورالعمل AHA ۲۰۲۱، کدام رژیم پروفیلاکسی جایگزین مناسب محسوب می‌شود؟

الف) آزیترومایسین ۵۰۰ میلی‌گرم خوراکی
ب) کلیندامایسین ۶۰۰ میلی‌گرم خوراکی
ج) سفالکسین ۵۰۰ میلی‌گرم خوراکی
د) سفازولین ۱ گرم به‌صورت تزریق وریدی

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۵۹- تمام موارد از خصوصیات درگیری دهان به بیماری سل می‌باشد، به‌جز:

الف) وجود درد در ضایعه دهانی
ب) ابتلا بیشتر در ناحیه پشت زبان
ج) بروز استئومیلیت در استخوان‌های فک
د) بروز زخم کم عمق و منظم در مخاط دهان

۶۰- خانم ۶۵ ساله مبتلا به COPD شدید، نیاز به کنترل اضطراب قبل از درمان دندان‌پزشکی دارد. مناسب‌ترین روش کدام است؟

الف) استفاده نیتروس‌اکساید
ب) تجویز باربیتورات
ج) تجویز دوز کم دیازپام خوراکی
د) آرام‌بخشی نارکوتیک

۶۱- کدام توصیه جهت مدیریت آسم در حین درمان دندان‌پزشکی صحیح می‌باشد؟

الف) تجویز آسپرین برای رفع آلرژی
ب) انجام درمان در حالت سمی سوپاین
ج) تجویز باربیتورات جهت کنترل اضطراب
د) پرهیز از تجویز دیازپام خوراکی

۶۲- انقباضات سریع و چشمک زن عضلات صورت که ثانویه به ضایعات مالتیپل اسکلروزیس ایجاد می‌شود، چه نام دارد؟

الف) Myokymia ب) Fasciculations ج) Blepharospasm د) Fibrillations

۶۳- بروز همه عوارض در فرد مبتلا به تشنج تونیک کلونیک جنرالیزه شایع است، به‌جز:

الف) اسکار لب ب) پارگی زبان ج) دندان شکسته د) هماتوم کف دهان

۶۴- در بیمار مشکوک به هپاتیت D کدام تست اسکرین درخواست می‌شود؟

الف) HBS-Ag ب) Anti-HDV ج) IgM Anti-HBC د) HBe-Ag

۶۵- تغییرات بدرنگی پوست در بیمار مشکوک به کبد چرب غیرالکلی، بیشتر درکدام نواحی دیده می‌شود؟

الف) سینه ب) گردن ج) ساق پا د) ناحیه ژنیتال

۶۶- در فرد مبتلا به بیماری کبدی تجویزکدام داروی دندان‌پزشکی امن می‌باشد؟

الف) آمپی سیلین ب) ایبوبروفن ج) باربیتورات د) آسیکلووییر

۶۷- التهاب همزمان و عفونت مزمن با H. pylori در آنتروم معده که اسید ترشح نمی‌کند، موجب افزایش کدام‌یک می‌شود؟

الف) گاسترین ب) سکرتین ج) پپسین د) پپسینوژن

۶۸- در بیماری التهابی روده، ضایعات پیواستوماتیت وژتانس، کدام ناحیه را کمتر درگیر می‌نماید؟

الف) مخاط لب ب) لثه ج) کام د) زبان

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۶۹- قبل از تجویز دیازپام تزریقی در بیمار مبتلا به End Stage Renal Disease، کدام معیار آزمایشگاهی اندازه‌گیری می‌شود؟

الف) کراتین سرم ب) شمارش پلاکت ج) غلظت هموگلوبین د) نیتروژن اوره خون

۷۰- در نارسایی مزمن کلیه، از تجویز نارکوتیک‌ها به لحاظ بروز کدام عارضه باید اجتناب نمود؟

الف) دپرسیون تنفسی
ب) لتارژی
ج) پاراستزی انتهاها
د) نوروپاتی

۷۱- کدام دارو نیاز به تجویز دوز Supplement متعاقب همودیالیز دارد؟

الف) آموکسی‌سیلین
ب) اریترومایسین
ج) کلیندامایسین
د) مترونیدازول

۷۲- کدام بیماری می‌تواند موجب بروز Antral Fistula Oral شود؟

الف) منونوکلئوز عفونی
ب) کندیلوما
ج) گوم سیفیلیتیک
د) سوزاک

۷۳- خانمی ۶۴ ساله مبتلا به دیابت کنترل نشده با شکایت از تورم دوطرفه بدون درد ناحیه پاروتید مراجعه کرده است. کدام گزینه بهترین توجیه برای این یافته می‌باشد؟

الف) نفوذ چربی در آسینوس‌های غدد بزاقی
ب) نوروپاتی اتونوم ناشی از دیابت
ج) آسیب پارانشیم غدد پاروتید
د) کم آبی بدن ثانویه به پلی‌اوری

۷۴- در بیماری نتایج آزمایشات مربوط به تیروئید به‌شرح زیر است:

Serum TSH: Low Serum T4 : Normal Serum T3: Normal

بروز کدام وضعیت محتمل است؟

الف) Euthyroid
ب) Hyperthyroidism
ج) Primary hypothyroidism
د) Subclinical hyperthyroidism

۷۵- کدام موارد در معاینه بالینی بیمار مبتلا به کم‌کاری تیروئید مشاهده می‌شود؟

الف) تاکی‌کاردی و تپش قلب
ب) عدم تحمل گرما و تعریق زیاد
ج) خشکی پوست و خستگی
د) برآمدگی چشم و زخم قرنیه

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۷۶- در بیمارانی که MRONJ به‌طور خود به خود ایجاد می‌شود، شایع‌ترین شکایت اولیه در دهان کدام است؟

الف) خونریزی لثه

ب) زخم در سالکوس ماندیبل

ج) وجود زبری در مخاط نرم

د) از دست رفتن پاپی‌های زبان

۷۷- تزریق اپی‌نفرین همراه با کدام نوع بی‌حسی موضعی در مبتلایان به نارسایی آدرنال، مناسب‌تر است؟

الف) Bupivacaine ب) Lidocaine ج) Prilocaine د) Benzocaine

۷۸- خانمی در ماه هشتم بارداری، برای درمان اورژانسی آبسه دندانی مراجعه کرده است. بیمار تهوع و استفراغ شدید دارد و در ۲۴ ساعت گذشته نتوانسته است مایعات کافی دریافت کند. هنگام دراز کشیدن به پشت، دچار سرگیجه و تنگی نفس می‌شود. صحیح‌ترین اقدام کدام است؟

الف) تعویق اقدام اورژانسی تا پس از زایمان

ب) چرخاندن بیمار به پهلوی چپ و درمان پس از کنترل فشار خون

ج) تجویز مایع وریدی و کشیدن دندان

د) کشیدن دندان بیمار در وضعیت سوپاین با یک دوز آنتی‌بیوتیک

۷۹- اینله طلا در تماس مستقیم با مخاط گونه می‌تواند موجب بروز کدام نوع از حساسیت گردد؟

الف) Delayed Hypersensitivity

ب) Immune Complex–Mediated

ج) Antibody-Mediated

د) Anaphylactic

۸۰- کدام مورد از تظاهرات دهانی لوپوس اریتماتوز دیسکوئید (DLE) محسوب می‌شود؟

الف) معمولاً دوطرفه در مخاط گونه ظاهر می‌شوند.

ب) به‌صورت نواحی سفید با استریا شعاعی است.

ج) شایع‌ترین جایگاه ابتلا کام نرم است.

د) به‌صورت زخم‌های عمیق و دردناک هستند.

۸۱- شایع‌ترین تظاهر اولیه بالینی در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک، کدام است؟

الف) فیبروز بینابینی ریه

ب) بحران کلیوی

ج) رفلاکس معده به مری

د) پدیده رینود

۸۲- کدام بیماری می‌تواند موجب درد مفاصل گردن و پای بیمار در حالت سوپاین روی صندلی دندان‌پزشکی شود؟

الف) دیسکوئید لوپوس

ب) اسکلرودرمی

ج) آرتریت روماتوئید

د) لوپوس اریتماتوسیستمیک

۸۳- شایع‌ترین غده بزاقی درگیر در مبتلایان به HIV که دچار هیپوفانکشن می‌شود، کدام است؟

الف) پاروتید ب) ساب لینگوال ج) ون ابنر د) ساب ماندیبل

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۸۴- در بیمارانی که متعاقب پیوند، تاکرولیموس دریافت می‌کنند، همراهی کدام ضایعه دهانی شایع‌تر است؟

الف) ضایعات شبه آفت

ب) پیوژنیک گرانولوما

ج) هیپرتروفی لثه

د) لکوپلاکیای مویی

۸۵- کدام عارضه در پیوند سلول‌های بنیادی شایع است و می‌تواند با ظاهر لیکنوئید، اریتم یا زخم در مخاط دهان تظاهر یابد؟

الف) بیماری پیوند علیه میزبان

ب) سندرم انسدادی سینوزوئیدی

ج) برونشیولیت اوبلیترانت

د) بیماری عروق کرونر

۸۶- در کدام آنمی، در نمای رادیوگرافی از صورت بیمار ۱۸ ساله، سینوس فک بالا کوچک و کانال آلوئولار تحتانی محو شده است؟

الف) G6PD ب) تالاسمی ج) Pernicious د) فقر آهن

۸۷- برای تشخیص قطعی آنمی آپلاستیک (Aplastic Anemia) کدام‌یک از روش‌ها ضروری است؟

الف) الکتروفورز هموگلوبین

ب) تست شیلینگ

ج) بیوپسی مغز استخوان

د) اندازه‌گیری فریتین سرم

۸۸- ابتلا به کدام آنمی ریسک بروزAML را افزایش می‌دهد؟

الف) فقر آهن ب) فانکونی ج) سیکل سل د) تالاسمی

۸۹- جایگزینی فاکتور جهت انجام کدام‌یک، درکودک ۹ ساله مبتلا به هموفیلی لازم است؟

الف) جراحی دندان دائمی

ب) اس اس کراون

ج) پالپوتومی

د) تزریق داخل لیگامان

۹۰- شایع‌ترین اختلال خونریزی‌دهنده ارثی در جمعیت عمومی کدام است؟

الف) تلانژکتازی هموراژیک ارثی

ب) هموفیلی B

ج) بیماری ون ویلبراند

د) ترومباستنی گلانزمن

۹۱- در بیمار مبتلا به یک اختلال خونریزی دهنده، اگرچه تعداد پلاکت‌ها تغییر نمی‌کند، اما میزان تجمع پلاکتی بسیارضعیف است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف) سندرم اهلردانلوس

ب) ترومباستنی گلانزمن

ج) بیماری ون ویلبراند

د) بیماری برنارد سولیر

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

۹۲- در کدام صرع، بیمار بدون این که تونسیته عضلات بدن تغییر نماید، دچار خیره شدن چشم و چند ثانیه عدم هوشیاری می‌شود؟

الف) Absence ب) Tonic-Clonic ج) Simple Partial د) Myoclonic

۹۳- کدام عارضه ناشی از استفاده قاشق و چنگال هنگام غذا خوردن در دندان‌های افراد مبتلا به آلزایمر، کمتر گزارش شده است؟

الف) اتریشن ب) ابرژن ج) میگریشن د) اروژن

۹۴- شایع‌ترین فرم کاندیدیازیس در سالمندان کدام است؟

الف) سودومامبران ب) اریتماتوز ج) آنگولرکلایتیس د) پلاک تایپ

۹۵- کدام نوع مطالعه برای پاسخ به سوال پژوهشی ذیل مناسب‌تر است؟

"درمبتلایان به کنسرهای سر و گردن کاندیدای شیمی درمانی, تاثیراستفاده از داروی آمیفوستین جهت کاهش عوارض شیمی درمانی چگونه است؟"

الف) Randomized Control Trial

ب) Cross Sectional

ج) Case Control

د) Cohort

۹۶- در بیماران تحت درمان با وارفارین، کدام شاخص آزمایشگاهی برای بررسی خطر خونریزی استفاده می‌شود؟

الف) PTT ب) INR ج) BT د) TT

۹۷- کاربرد Beers Criteria در سالمندان به چه منظور می‌باشد؟

الف) عدم تجویز داروهای بالقوه نامناسب

ب) برنامه مراقبت متعاقب جراحی دهان

ج) تکنیک بهبود حس همکاری حین درمان

د) کمک به مراقبت از بهداشت دهان و دندان

۹۸- پوزیشن کاربردی و معمول معاینه دهان کودک دو ساله چیست؟

الف) Lays flat ب) Supine ج) Semi supine د) Knee to knee

۹۹- در بیماران دچار سوء مصرف متامفتامین، کدام‌یک از مشکلات دندانی با عنوان Meth Mouth شناخته می‌شود؟

الف) پوسیدگی و اروژن شدید و وسیع

ب) ضایعات سفید رنگ مخاطی

ج) هیپرتروفی لثه‌ها

د) خشکی شدید دهان

۱۰۰- خط اول درمان کاندیدیازیس در بیماران دچار عفونت HIV، کدام دارو می‌باشد؟

الف) نیستاتین ب) آمفوتریسین B ج) فلوکنازول د) کتوکنازول

موفق باشید

Telegram: @dental_k

www.konkur.in

وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

ازمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی
- رشته رشته بیماریهای دهان و فک و صورت
کلید اولیه

توجه! اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سئوالات باید با مداد مشکی نرم و پر رنگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح غلط

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی نزنید.

۱ د	۵۱ د	۱۰۱ د	۱۵۱ د	۲۰۱ د	۲۵۱ د
۲ ج	۵۲ ج	۱۰۲ ج	۱۵۲ ج	۲۰۲ ج	۲۵۲ ج
۳ ب	۵۳ ب	۱۰۳ ب	۱۵۳ ب	۲۰۳ ب	۲۵۳ ب
۴ د	۵۴ ج	۱۰۴ ج	۱۵۴ ج	۲۰۴ ج	۲۵۴ ج
۵ ب	۵۵ د	۱۰۵ د	۱۵۵ د	۲۰۵ د	۲۵۵ د
۶ ب	۵۶ ج	۱۰۶ ج	۱۵۶ ج	۲۰۶ ج	۲۵۶ ج
۷ د	۵۷ ب	۱۰۷ ب	۱۵۷ ب	۲۰۷ ب	۲۵۷ ب
۸ ب	۵۸ د	۱۰۸ د	۱۵۸ د	۲۰۸ د	۲۵۸ د
۹ د	۵۹ د	۱۰۹ د	۱۵۹ د	۲۰۹ د	۲۵۹ د
۱۰ ب	۶۰ ب	۱۱۰ ب	۱۶۰ ب	۲۱۰ ب	۲۶۰ ب
۱۱ د	۶۱ د	۱۱۱ د	۱۶۱ د	۲۱۱ الف	۲۶۱ د
۱۲ ب	۶۲ ب	۱۱۲ ب	۱۶۲ ب	۲۱۲ ب	۲۶۲ ب
۱۳ د	۶۳ د	۱۱۳ د	۱۶۳ د	۲۱۳ د	۲۶۳ د
۱۴ د	۶۴ د	۱۱۴ د	۱۶۴ د	۲۱۴ د	۲۶۴ د
۱۵ ج	۶۵ ب	۱۱۵ ب	۱۶۵ ب	۲۱۵ ب	۲۶۵ ب
۱۶ ب	۶۶ د	۱۱۶ د	۱۶۶ د	۲۱۶ د	۲۶۶ د
۱۷ ب	۶۷ ب	۱۱۷ ب	۱۶۷ ب	۲۱۷ ب	۲۶۷ ب
۱۸ ب	۶۸ د	۱۱۸ د	۱۶۸ د	۲۱۸ د	۲۶۸ د
۱۹ ب	۶۹ ب	۱۱۹ ب	۱۶۹ ب	۲۱۹ ب	۲۶۹ ب
۲۰ ب	۷۰ ب	۱۲۰ ب	۱۷۰ ب	۲۲۰ ب	۲۷۰ ب
۲۱ ب	۷۱ ب	۱۲۱ ب	۱۷۱ ب	۲۲۱ ب	۲۷۱ ب
۲۲ ب	۷۲ ب	۱۲۲ ب	۱۷۲ ب	۲۲۲ ب	۲۷۲ ب
۲۳ ب	۷۳ ب	۱۲۳ ب	۱۷۳ ب	۲۲۳ ب	۲۷۳ ب
۲۴ ب	۷۴ د	۱۲۴ د	۱۷۴ د	۲۲۴ د	۲۷۴ د
۲۵ ب	۷۵ ب	۱۲۵ ب	۱۷۵ ب	۲۲۵ ب	۲۷۵ ب
۲۶ ب	۷۶ ب	۱۲۶ ب	۱۷۶ ب	۲۲۶ ب	۲۷۶ ب
۲۷ د	۷۷ ب	۱۲۷ ب	۱۷۷ ب	۲۲۷ ب	۲۷۷ ب
۲۸ ب	۷۸ ب	۱۲۸ ب	۱۷۸ ب	۲۲۸ ب	۲۷۸ ب
۲۹ ب	۷۹ ب	۱۲۹ ب	۱۷۹ ب	۲۲۹ ب	۲۷۹ ب
۳۰ ب	۸۰ ب	۱۳۰ ب	۱۸۰ ب	۲۳۰ ب	۲۸۰ ب
۳۱ د	۸۱ د	۱۳۱ د	۱۸۱ د	۲۳۱ د	۲۸۱ د
۳۲ ب	۸۲ ب	۱۳۲ ب	۱۸۲ ب	۲۳۲ ب	۲۸۲ ب
۳۳ ب	۸۳ ب	۱۳۳ ب	۱۸۳ ب	۲۳۳ ب	۲۸۳ ب
۳۴ ب	۸۴ ب	۱۳۴ ب	۱۸۴ ب	۲۳۴ ب	۲۸۴ ب
۳۵ ب	۸۵ ب	۱۳۵ ب	۱۸۵ ب	۲۳۵ ب	۲۸۵ ب
۳۶ ب	۸۶ ب	۱۳۶ ب	۱۸۶ ب	۲۳۶ ب	۲۸۶ ب
۳۷ ب	۸۷ ب	۱۳۷ ب	۱۸۷ ب	۲۳۷ ب	۲۸۷ ب
۳۸ د	۸۸ د	۱۳۸ د	۱۸۸ د	۲۳۸ د	۲۸۸ د
۳۹ ب	۸۹ ب	۱۳۹ ب	۱۸۹ ب	۲۳۹ ب	۲۸۹ ب
۴۰ ب	۹۰ ب	۱۴۰ ب	۱۹۰ ب	۲۴۰ ب	۲۹۰ ب
۴۱ ب	۹۱ ب	۱۴۱ ب	۱۹۱ ب	۲۴۱ ب	۲۹۱ ب
۴۲ ب	۹۲ ب	۱۴۲ ب	۱۹۲ ب	۲۴۲ ب	۲۹۲ ب
۴۳ ب	۹۳ د	۱۴۳ د	۱۹۳ د	۲۴۳ د	۲۹۳ د
۴۴ ب	۹۴ ب	۱۴۴ ب	۱۹۴ ب	۲۴۴ ب	۲۹۴ ب
۴۵ ب	۹۵ ب	۱۴۵ ب	۱۹۵ ب	۲۴۵ ب	۲۹۵ ب
۴۶ ب	۹۶ ب	۱۴۶ ب	۱۹۶ ب	۲۴۶ ب	۲۹۶ ب
۴۷ د	۹۷ ب	۱۴۷ ب	۱۹۷ ب	۲۴۷ ب	۲۹۷ ب
۴۸ ب	۹۸ د	۱۴۸ د	۱۹۸ د	۲۴۸ د	۲۹۸ د
۴۹ ب	۹۹ ب	۱۴۹ ب	۱۹۹ ب	۲۴۹ ب	۲۹۹ ب
۵۰ ب	۱۰۰ ب	۱۵۰ ب	۲۰۰ ب	۲۵۰ ب	۳۰۰ ب

Telegram: @dental_k