

کد کنترل

448

E

448E

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

ایمنی‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۶)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۴۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ایمونولوژی	۴۰	۳۱	۷۰
۳	باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل‌شناسی	۳۰	۷۱	۱۰۰
۴	بیوشیمی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۵	بیولوژی سلولی و مولکولی	۲۰	۱۲۱	۱۴۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال‌ها به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفان برابر مقروطات رفتار می‌شود.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.
1) inevitable 2) intangible 3) unforeseeable 4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!
1) concern 2) candor 3) endurance 4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.
1) identified 2) emerged 3) hesitated 4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.
1) proceeds 2) requires 3) fascinates 4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.
1) refuge 2) remedy 3) paradox 4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.
1) genuine 2) definitive 3) secretive 4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.
1) modesty 2) hindsight 3) prescience 4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.
1) stabilized 2) hampered 3) diversified 4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.
1) prescriptive 2) versatile 3) dormant 4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.
1) proposes 2) puts 3) shapes 4) runs

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) ----- . But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11- | 1) that they argue
3) an argument by those | 2) those who argue
4) arguing those who |
| 12- | 1) with 2) for | 3) by 4) in |
| 13- | 1) whose consensus
3) the consensus has been | 2) who has the consensus
4) is the consensus |
| 14- | 1) a 2) the | 3) what 4) that |
| 15- | 1) and our cultures vary
3) than our cultures that vary | 2) than to our varying cultures
4) as to our varying cultures |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

The major histocompatibility (MHC) class I antigen presentation pathway plays an important role in alerting the immune system to virally infected cells. MHC class I molecules are expressed on the cell surface of all nucleated cells and present peptide fragments derived from intracellular proteins.

Cytokines have been described in adaptive immunity in some aquatics and with the recent discovery of CD4 in boney fish it seems likely these cytokines will drive the activation and differentiation of T helper cell subsets to release different cytokine repertoires. It has been shown in *Oncorhynchus mykiss* that transcripts of CD8+ T cells and MHC class I are detectable and also TCR mRNA in T cells appears one week after insemination. While MHC class I molecules and CD8 are expressed from the larval stage, suggesting that very young piscine can be vaccinated to develop cellular immunity.

In relation to T helper 2-type cytokines, a molecule which is claimed to be a homologue of IL-4 has been found recently; however, the presence of the transcription factor that drives T helper 2 cell differentiation, GATA3, suggests that T helper 2 responses may exist in aquatics. The white blood cells in aquatics are capable of

generating cellular cytotoxicity reactions, but the cells that are responsible for cell-mediated cytotoxicity in aquatics are hard to be recognized due to lacking proper instruments for cellular and molecular recognition.

- 16- Which statement does not match with the text related to cytokines in aquatics?**
- 1) Act as motivator for differentiation of all helper cells
 - 2) Can activate the subsets of T helper cells
 - 3) Able to induce release of repertoires
 - 4) Are involved in adaptive immunity
- 17- In *Oncorhynchus mykiss*, all substances are detectable one week after insemination EXCEPT;**
- 1) TCR mRNA
 - 2) CD 8 + T cells
 - 3) Cytokines
 - 4) MHC class I
- 18- Expression of CD8 and MHC class I molecules are indicative of;**
- 1) Cellular immunity is provided
 - 2) It is the time for insemination
 - 3) Presence of adaptive immunity
 - 4) Proper time for vaccination in young fish
- 19- Which of the following items has been considered to be homologue of IL-4?**
- 1) CD4 in boney fish
 - 2) T helper 2-type
 - 3) T helper 1-type
 - 4) Cytokine repertoires
- 20- Difficulty in characterization of cell-mediated cytotoxicity might be because of -----.**
- 1) unavailability of appropriate tools for recognition
 - 2) capability of leukocytes being difficult
 - 3) absence of cytotoxicity in aquatics
 - 4) reactions to cytotoxicity are rare

PASSAGE 2:

Any bacteria that infect the interstitial body fluid are taken up by the lymphatic capillaries and transported to a regional lymph node. Lymph nodes are bean-shaped, small organs located throughout the lymphatic system. The main function of these structures, is practically removing debris and pathogens from the lymph, and are thus sometimes considered as the “filters of the lymph”. As the vertebrate immune system evolved, the network of lymphatic vessels became convenient avenues for transporting the cells of the immune system.

Also, the transport of fat-soluble vitamins and the fats absorbed in the gut uses this system. Cells of the immune system not only use lymphatic vessels to make their way from interstitial spaces back into the circulation, but they also use lymph nodes as major staging areas for the development of critical immune responses. Dendritic cells and macrophages within lymph nodes internalize and kill many of the pathogens that pass through, thereby removing them from the body.

The lymph node is also the site of adaptive immune responses mediated by T cells, B cells, and accessory cells of the adaptive immune system. Like the thymus, the bean-shaped lymph nodes are surrounded by a tough capsule of connective tissue and are separated into compartments by trabeculae. In addition to the structure provided by the capsule and trabeculae, the structural support of the lymph node is provided by a series of reticular fibers laid down by fibroblasts.

- 21-** In the first paragraph, the phrase “filters of the lymph” refers to;
- 1) Lymphatic capillaries
 - 2) Debris and pathogens
 - 3) Lymph nodes
 - 4) Lymphatic system
- 22-** All of the following components are carried through the lymphatic vessels EXCEPT;
- 1) Fat-soluble vitamins
 - 2) Dietary lipids
 - 3) Lymphatic cells
 - 4) Abdominal fats
- 23-** According to the text, the following function does not occur in the lymph nodes.
- 1) Destruction of pathogens
 - 2) Activation of macrophages
 - 3) Initiation of lymph collecting
 - 4) Improving of the immune responses
- 24-** Which of the following cells are excluded from the adaptive immune responses?
- 1) Epithelial cells
 - 2) T lymphocytes
 - 3) B lymphocytes
 - 4) Accessory cells
- 25-** Which of the following components is NOT considered as a supportive structure?
- 1) Trabeculae
 - 2) Fibroblasts
 - 3) Reticular fibers
 - 4) Capsule

PASSAGE 3:

Receptors are a special class of proteins that function by binding a specific ligand molecule. When a ligand binds to its receptor, the receptor can change conformation, transmitting a signal into the cell. In some cases the receptors will remain on the surface of the cell and the ligand will eventually diffuse away. In relation with the aquatic animals, it has been shown that their defensive and immune system despite certain differences is functionally similar to that of higher vertebrates.

Literature are available that the receptor proteins in aquatics identify molecular patterns that are typical of pathogenic microorganisms, including polysaccharides, lipopolysaccharide, viral RNA beside some other molecules that are not normally on the surface of multicellular organisms. This response is divided into physical barriers and cellular and humoral immune response.

Various internal and external factors can influence innate immune response parameters. Temperature changes, stress management and density may have suppressive effects on this type of response, while several food additives and immune stimulants can enhance their efficiency.

In contrast to higher vertebrates, aquatics are free-living organisms from early embryonic stages of life and depend on their innate immune system for survival. Nonspecific immunity is a fundamental defense mechanism in piscine. Besides, it plays a key role in homeostasis and the acquired immune response through the system of receptor proteins.

- 26-** In aquatics, the receptor proteins are able to detect all of the following elements EXCEPT;
- 1) Viral RNA
 - 2) Polysaccharides
 - 3) Lipopolysaccharide
 - 4) Glucosaminoglycans
- 27-** Which of the following options is NOT counted as a subdivision of the acquired immune response?
- 1) Physical barriers
 - 2) Humoral immune response
 - 3) Cellular immune response
 - 4) Multicellular organisms

- 28- Which parameter has a positive effect on innate immune response?
- 1) Immune stimulants
 - 2) Stress management
 - 3) Density of pathogens
 - 4) Changes in temperature
- 29- According to the statements in the text, the 'innate immunity' means;
- 1) Defensive immunity
 - 2) Immediate immunity
 - 3) Maternally transported
 - 4) Environmental or secondary
- 30- In the phrase "Besides, it plays a key role -----" the word 'it' refers to;
- 1) Nonspecific immunity
 - 2) Innate immune system
 - 3) Acquired immune response
 - 4) Homeostasis in body fluids

/یمونولوژی:

- ۳۱- سلول‌های Macrophage-M2 چه سایتوکاین‌هایی را ترشح می‌کند؟
- IL10, IL-4, TGF-β (۲) IL1β, TGF-β, IL-6 (۱)
 IL1β, TGF-β, TNF-α (۴) IL1β, IL-6, TNF-α (۳)
- ۳۲- جهت تشخیص فراوانی لنفوцит‌هایی که قادر به پاسخ‌دهی به آنتی‌ژن هستند از چه روشی استفاده می‌شود؟
- (۱) ELISPOT (۲) کشت سلولی
 (۳) هیریداسیون سلول (۴) کشت رقت محدود (Limitation Dilution Culture)
- ۳۳- اوزیتوفیل فعال شده به وسیله آنتی‌ژن حامل کدامیک از مولکول‌های زیر است؟
- CD225 (۴) CD156 (۳) CD124 (۲) CD69 (۱)
- ۳۴- جهت تشخیص توالی RNA, DNA و پروتئین به ترتیب از چه روشی استفاده می‌شود؟
- (۱) ساترن بلات، نوردن بلات، وسترن بلات (۲) نوردن بلات، وسترن بلات، ساترن بلات
 (۳) وسترن بلات، نوردن بلات، ساترن بلات (۴) نوردن بلات، ساترن بلات، وسترن بلات
- ۳۵- خاتمه پاسخ ایمنی توسط کدام مورد صورت نمی‌گیرد؟
- (۱) بیان 4-CTLA-4 (۲) Th1 بیان 1-PDL (۳) CTLA-4 تنظیمی
- ۳۶- کدام دسته از پذیرنده‌های مونوسیتی باعث حرکت و ورود آنها به سمت رگ و ایجاد آماس و پلاک در بیماری اتروواسکلرز می‌شود؟
- CCR5, CCR2 (۲) CCR3, CCR2 (۱)
 CXCR3, CCR3 (۴) CXCR3, CCR5 (۳)
- ۳۷- از جمله ویژگی‌های مهم نانوپارتیکل‌ها که باعث می‌شود به عنوان حامل دارویی استفاده شوند چیست؟
- (۱) غیر بیماری‌زایند. (۲) بار الکتریکی ندارند.
 (۳) از سد فیزیکی عبور نمی‌کنند. (۴) بدن قادر به ساخت آن‌ها است.
- ۳۸- کدام مورد در خصوص آزمایش‌های معمول ایمنی‌شناسی درست است؟
- (۱) بهترین زمان لازم برای تشکیل آگلوتیناسیون در آزمایش رزبنگال ۱ ساعت است.
 (۲) حساسیت آزمایش‌های Precipitation از آزمایش‌های Agglutination بیشتر است.
 (۳) بهترین روش ELISA برای تشخیص آنتی‌ژن در نمونه‌های بیولوژیک ELISA غیرمستقیم است.
 (۴) آزمایش‌های 2-ME, RF, CRP و 2-ME به ترتیب بر مبنای آگلوتیناسیون غیرمستقیم، غیرمستقیم و مستقیم می‌باشد.

- ۳۹- کدام یک از گیرنده‌های ایمنی ذاتی محلول در غشا می‌باشد؟
 ۱) TLRs ۲) پنتراسین ۳) اسکاونجر رسپتور
 ۴) گیرنده شبه لکتین
- ۴۰- کدام یک از TLRs جهت شناسایی فلازلای باکتری‌ها عمل می‌کند؟
 ۱) TLR۳ ۲) TLR۹ ۳) TLR۵ ۴) TLR۴
- ۴۱- کدام TLR قادر است تنها مسیر TRIF را فعال کند و توانایی فعال‌سازی مسیر NF-KB را ندارد؟
 ۱) TLR۴ ۲) TLR۷ ۳) TLR۲ ۴) TLR۹
- ۴۲- سایتوکاین تولیدی توسط سلول‌های لنفوئید ذاتی (ILC2) کدام است?
 ۱) IL-25 و IL-33 ۲) IL-12 و IL-33 ۳) IL-12 و IL-17 ۴) IL-17 و IL-22
- ۴۳- پروفورین و گرانزیم از کدام یک از سلول‌های ایمنی زیر ترشح می‌شود؟
 ۱) NK cells ۲) نوتروفیل‌ها ۳) ماکروفازها ۴) دندرتیک سل‌ها
- ۴۴- کدام گزینه در مورد ماکروفازها درست است؟
 ۱) ماکروفاز فاقد الاستیسیته است. ۲) ماکروفاز M1 خاصیت ضدالتهابی دارد.
 ۳) مارکروفاز M2 خاصیت پیش‌التهابی دارد. ۴) القای جمعیت بالاتر M2 نسبت به M1 موجب مهار التهاب می‌شود.
- ۴۵- مهار گیرنده اینفلامازومی منجر به کدام رخداد ایمونوبیوشیمیایی زیر می‌گردد؟
 ۱) مهار IL-1 β ۲) برش Gasdermin ۳) فعال شدن IL-1 β ۴) فعال شدن آپوپتوز
- ۴۶- در بیماری التهابی آترواسکلروز، کدام عامل NLRP3 را فعال نمی‌کند؟
 ۱) IL-1 β ۲) Ox-LDL ۳) رژیم غذایی پرچرب ۴) کریستال‌های کلسیترول
- ۴۷- در روش ایمونوپریپیتاسیون از کدام مورد استفاده می‌شود؟
 ۱) پروتئین A، استرپیتوکوک متصل به IgM ۲) پروتئین A، استرپیتوکوک متصل به IgG ۳) پروتئین A، استافیلوکوک متصل به IgM ۴) پروتئین A، استافیلوکوک متصل به IgG
- ۴۸- کدام یک از CD های زیر رسپتور اینترلوکین ۵ می‌باشد؟
 ۱) CD63 ۲) CD123 ۳) CD125 ۴) CD320
- ۴۹- رسپتور کموکاین CCR2 در مونوکیت باعث اتصال به کدام یک در زمان التهاب می‌شود؟
 ۱) MCP1 ۲) CXCL3 ۳) NLRP3 ۴) NF-KB
- ۵۰- از دلایل حفظ جنین در برابر پاسخ‌های ایمنی مادر به عنوان پیوند آلوگرافت، می‌باشد.
 ۱) وجود تروفوبلاست ۲) ترشح IL-1beta ۳) بیان MHC II ۴) عدم بیان سیتوکین‌های مهاری
- ۵۱- تفاوت اساسی بین ازدیاد حساسیت نوع دو با نوع سه در چیست؟
 ۱) در نوع سه یاخته T دخیل است. ۲) زمان واکنش در دو تأخیری است.
 ۳) نوع دو مسمومیت یاخته‌ای است. ۴) زمان واکنش نوع سه تأخیری است.
- ۵۲- مسیر جایگزین عامل مکمل کدام مولکول‌ها را هدف قرار می‌دهد؟
 ۱) میتوپرین ۲) مانوز ۳) زیموزان ۴) مجتمع پادگن - پادتن
- ۵۳- کدام یاخته سیتوکوکسیک است ولی محدود به MHC نیست؟
 ۱) NK ۲) Th ۳) B ۴) Tc

- ۵۴- کدام گزینه در مورد مغز استخوان درست است؟
- (۱) بافت لمفاوی اطرافی کپسوله است.
 - (۲) بافت لمفاوی اطرافی کپسوله است.
 - (۳) بافت لمفاوی مرکزی است و نقش اطرافی ندارد.
 - (۴) بافت لمفاوی مرکزی است ولی نقش اطرافی هم دارد.
- ۵۵- کدام روش وجود پادتن بر علیه پروتئین‌های مختلف ویروس ایدز را به تفکیک تشخیص می‌دهد؟
- (۱) وسترن بلات
 - (۲) دات بلات
 - (۳) مانسینی
 - (۴) الیزا
- ۵۶- واکسن‌های تحت واحدی چه مزیتی نسبت به واکسن غیرفعال دارند؟
- (۱) به تزریق یادآور نیاز ندارند.
 - (۲) نیاز به مواد کمک ایمنی ندارند.
 - (۳) کمتر باعث واکنش‌های ناخواسته می‌شوند.
 - (۴) به دلیل فعل بودن احتمال برگشت به حدت دارند.
- ۵۷- خاطره ایمنی با واسطه کدام ترکیبات در بافت لمفاوی است؟
- (۱) اندوزوم
 - (۲) ایکوزوم
 - (۳) انفلامازوم
 - (۴) فاگولیزوزوم
- ۵۸- نام دستگاه MHC موس چیست؟
- | | | | |
|---------|----------|-------|-------|
| HLA (۴) | MoLA (۳) | B (۲) | H (۱) |
|---------|----------|-------|-------|
- ۵۹- در مرحله تعویض IgG به IgM چه رخدادی می‌دهد؟
- (۱) ایزوتیپ و ایدیوتیپ هر دو تغییر می‌کنند.
 - (۲) ایزوتیپ ثابت و ایدیوتیپ تغییر می‌کنند.
 - (۳) ایزوتیپ و ایدیوتیپ هر دو ثابت می‌مانند.
 - (۴) کدام مولکول‌ها در کشتار غیر وابسته به اکسیژن نقش دارند؟
- | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| ۲) کاتالاز و دیفسین | ۳) کاتپسین و میلوپراکسیداز | ۱) NOS و NADPH |
|---------------------|----------------------------|----------------|
- ۶۰- یاخته‌های حرفه‌ای عرضه کننده پادگن کدامند؟
- (۱) اوزینوفیل، ماستسل و هتروفیل
 - (۲) ماکروفاز، نوتروفیل و گلبول قرمز
 - (۳) نوتروفیل، بازوفیل و لمفوسيت B
 - (۴) ماکروفاز، لمفوسيت B و شجری
- ۶۱- کدام گروه از لمفوسيتها II-4 تولید می‌کنند؟
- | | | | |
|--------|--------|---------|---------|
| Ts (۴) | Tc (۳) | Th1 (۲) | Th2 (۱) |
|--------|--------|---------|---------|
- ۶۲- بیماری سرمی چیست؟
- (۱) بیماری خودایمن
 - (۲) ازدیاد حساسیت نوع سوم
 - (۳) ازدیاد حساسیت تأخیری
 - (۴) ازدیاد حساسیت نوع دوم
- ۶۳- کدام روش برای غربالگری بروسلوز مناسب است؟
- | | | | |
|------------|----------|--------|---------|
| ۴) رزبنگال | ۳) ویدال | ۲) CFT | ۱) رایت |
|------------|----------|--------|---------|
- ۶۴- کدام بخش ایمونوگلوبولین با پادگن واکنش می‌دهد؟
- | | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| CH2 (۴) | Fc (۳) | Fab (۲) | CH1 (۱) |
|---------|--------|---------|---------|
- ۶۵- تحمل ایمنی (Immunotolerance) چیست؟
- (۱) خودایمنی کاهش یافته
 - (۲) حذف ایمنی در برابر پادگن
 - (۳) نقصان ایمنی غیرفعال
 - (۴) بی‌پاسخی فعال به پادگن خودی
- ۶۶- کدام بخش از زنجیر پادتن بسیار متغیر است؟
- | | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| CH (۴) | CDR (۳) | VH (۲) | VL (۱) |
|--------|---------|--------|--------|

BB (۴)	AA (۳)	AB (۲)	O (۱)
(۴) پپتیدی	(۳) غیرفعال ۲) تحت واحدی ۱) اسید نوکلئیک	(۳) کدام نوع واکسن برای تحریک ایمنی سلولی مناسب است؟	(۱) -۶۹
CD4 (۴)	BCR (۳)	TCR (۲)	CD8 (۱)

باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل شناسی:

tRNA (۴)	mRNA (۳)	DNA (۲)	rRNA (۱)
(۴) کدامیک از پادگن‌های اشریشیاکولی مقاوم به مانوز هستند؟	(۳) پادگن کپسولی ۲) پادگن آنتروتوکسین ۱) پادگن فیمبریهای F_1	(۲) کدامیک به عنوان الگوی سنتز پروتئین در ریبوزوم عمل می‌کند؟	(۱) -۷۱
(۴) کلستریدیوم	(۳) باسیلوس ۲) بروسللا	(۲) کدامیک از باکتری‌های زیر بعد از فاگوسیتوز در سلول فاگوسیت کننده زنده می‌ماند؟	(۱) -۷۲
(۴) آنچه در مورد اگزوتوكسین باکتری‌ها غلط است؟	(۳) باسیلوس ۲) بروسللا	(۱) پاستورلا	(۱) -۷۳
(۴) اگزوتوكسین فقط توسط باکتری‌های گرم مثبت تولید می‌شود.	(۳) باسیلوس ۲) بروسللا	(۱) ایجاد تب نمی‌کنند. ۲) خیلی سمی هستند. ۳) آنتیزن قوی هستند.	(۱) -۷۴
(۴) کدام عبارت در مورد باسیلوس آنتراسیس صحیح نیست؟	(۳) باسیلوس ۲) تولید کپسول وابسته به پلاسید pxo_2 است.	(۱) غیرمحرك است. ۲) کپسول آن پلیمری از D-گلوتامیک اسید است.	(۱) -۷۵
(۴) در لاشه حیوانات تا مدت زیادی به فرم رشته‌ای زنده می‌ماند.	(۳) پروتئین M ۲) پروتئین F	(۱) کدام عامل از عوامل حدت استرپتوكوکوس محسوب نمی‌شود؟	(۱) -۷۶
(۴) آنزیم کاتالاز	(۳) پروتئین M ۲) پروتئین F	(۱) کدام گزینه در مورد ترکیبات دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت درست است؟	(۱) -۷۷
(۱) دارای پرده بیرونی	(۲) دارای اسید تکوئیک	(۱) دارای لیپوپلی ساکارید	(۱) -۷۸
(۴) دارای فضای پری‌پلاسمی	(۳) دارای لیپوپلی ساکارید	(۴) سقط جنین در گاو در نتیجه ابتلاء به بروسلوز معمولاً در مشاهده می‌شود.	(۱) -۷۹
(۴) روزهای اول آبستنی	(۳) ماههای آخر آبستنی ۲) اوایل آبستنی	(۱) کدام آنتیزن زیر مربوط به کپسول باکتری است؟	(۱) -۸۰
k۹۹ (۴)	H (۳)	O (۲)	K (۱)

- ۸۰ کدام گزینه درباره LPS باکتری‌های گرم منفی صحیح می‌باشد؟
 ۱) خاصیت توکسیک LPS مربوط به بخش پلی‌ساکاریدی آن است.
 ۲) لیپید A در خارجی‌ترین ناحیه LPS بوده که با محیط در ارتباط است.
 ۳) LPS در داخلی‌ترین قسمت دیواره سلول باکتری‌های گرم منفی قرار دارد.
 ۴) آنتیژن O در ساختار LPS، عامل خصوصیات سرلوژیکی باکتری‌های گرم منفی است.

-۸۱ یکی از دلایل ایجاد ناقلین بیماری‌های ویروسی کدام است؟
 ۱) ایجاد موتانت متعارض ناقص در میزبان
 ۲) نوترکیبی‌های ویروسی در میزبان
 ۳) نوترکیبی‌های ویروسی در میزبان
 ۴) ایجاد موتانت فراری در میزبان

-۸۲ موتاسیون در کدام‌یک از ویروس‌های زیر بیشتر اتفاق می‌افتد؟
 ۱) ICH (۲) IBR (۳) BVD-MD (۴) تورم دهان دانه‌ای گاو

-۸۳ منظور از تعارض (Interference) چیست؟
 ۱) دوباره فعال شدن ویروس‌ها به دنبال پدیده تکمیل
 ۲) مهار تکثیر یک ویروس توسط ویروس دیگر در یک میزبان
 ۳) تبادل DNA بین ویروس‌ها جهت تولید ویروس موتان جدید
 ۴) جلوگیری از اتصال ذره ویروسی به گیرنده میزبان توسط آنتی‌بادی میزان جهش در ویروس‌های واحد DNA چه میزان است؟

-۸۴ ۱) 10^{-9} - ۲) 10^{-5} - ۳) 10^{-3} - ۴) 10^{-12} - 10^{-15}

-۸۵ پاروویروس‌ها بیشتر به کدام اندام‌ها تمایل دارند؟
 ۱) کبد و کلیه‌ها
 ۲) مجرای دستگاه تنفس
 ۳) مجرای دستگاه تناسلی و ادراری
 ۴) دستگاه گوارش و سلول‌های خونی

-۸۶ کدام‌یک از ویروس‌های زیر کپسید دو یا سه لایه دارد؟
 ۱) هانتاویروس
 ۲) زبان آبی گوسفند
 ۳) تاج آبی بوقلمون
 ۴) ویروس تب‌خال

-۸۷ مهم‌ترین علامت تشخیص آبله گوسفند کدام است؟
 ۱) زخم دهان
 ۲) افزایش دمای بدن
 ۳) بروز ندول در نقاطی که مو یا پشم کوتاه‌تر است.
 ۴) فاکتورهای ژنتیکی

-۸۸ مهم‌ترین فاکتور برای انتشار ویروس و عفونت ویروسی کدام است؟
 ۱) سن
 ۲) جنس
 ۳) مسافت
 ۴) پروتئین ساختمند

-۸۹ کدام‌یک از اجزای زیر در همه اندام‌های حیوانی وجود ندارد؟
 ۱) کپسید
 ۲) میتوکندری
 ۳) اسیدونکلئیک

-۹۰ کدام‌یک از سیستم‌های زیر در مقابل عفونت سل، دفاع اصلی را به عهده دارد؟
 ۱) سلولی
 ۲) کمپلمان
 ۳) مولورال
 ۴) ایمنی ذاتی (نوتروفیل‌ها)

-۹۱ شیوع آلودگی با کدام‌یک از سستودهای زیر در ایران کمتر است?
 ۱) تیزانزیا ژیاردي
 ۲) مونیزیا بندنی
 ۳) استیلزیا هپاتیکا
 ۴) آویتلینا سانتری پونکتاتا

- | | |
|------|--|
| ۹۲- | <p>به نظر شما ابتلا به سستودها و ترماتودها در اسبهای سواری کشور چگونه است؟</p> <p>(۱) آلودگی به هر دو مورد بسیار شدید است.</p> <p>(۲) آلودگی به ترماتودها بیشتر از سستودها است.</p> <p>(۳) آلودگی به هر دو مورد نادر است.</p> <p>(۴) آلودگی به سستودها بیشتر از ترماتودها است.</p> |
| ۹۳- | <p>به ترتیب وضعیت اینمی‌زایی در آلودگی با پارامفیستوم و دیکروسلیوم در گوسفند چگونه است؟</p> <p>(۱) در هر دو اینمیت ایجاد می‌شود.</p> <p>(۲) در هر دو اینمیت ایجاد نمی‌شود.</p> <p>(۳) فقط در دیکروسلیوم اینمیت پدید می‌آید.</p> <p>(۴) فقط در پارامفیستوم اینمیت پدید می‌آید.</p> |
| ۹۴- | <p>آلودگی مجدد نشخوارکنندگان با کدامیک از نماتودهای زیر منجر به آماس گرانولوماتوز در دستگاه گوارش می‌گردد؟</p> <p>(۱) نماتودیروس (۲) تریکوسترونیللوس (۳) او佐وفاگوستوم (۴) استرونژیلوبئیدس</p> |
| ۹۵- | <p>آلودگی نشخوارکنندگان به کرم‌های قلابدار در کدامیک از استان‌های زیر بیشتر مورد انتظار است؟</p> <p>(۱) اصفهان (۲) مازندران (۳) کردستان (۴) زاهدان</p> |
| ۹۶- | <p>در کدام میزبان سقط توکسوپلاسمایی <u>گزارش نشده</u> است؟</p> <p>(۱) خوک (۲) گاو (۳) انسان (۴) گوسفند و بز</p> |
| ۹۷- | <p>عامل تیلریوز بدخیم گوسفندان کدام است؟</p> <p>(۱) تیلریا اویس (۲) تیلریا آنولاتا (۳) تیلریا موتانس (۴) تیلریا لستوکاردی</p> |
| ۹۸- | <p>عموماً کوکسیدیوز همراه با اسهال شدید خونی در ماکیان در اثر کدامیک ایجاد می‌گردد؟</p> <p>(۱) ایمربیا تنلا (۲) ایمربیا ماگریما (۳) ایمربیا آسرولینا (۴) ایمربیا متیسیس</p> |
| ۹۹- | <p>ترشح مواد آنتی کوآگولانت توسط کدام تیپ از آسینی‌های غدد بزاقی کنه‌ها انجام می‌پذیرد؟</p> <p>(۱) تیپ I (۲) تیپ II (۳) تیپ III (۴) تیپ IV</p> |
| ۱۰۰- | <p>کدامیک از بندپایان زیر در مرحله بلوغ آزادزی است و <u>تغذیه نمی‌کند</u>؟</p> <p>(۱) اتوپیوس (۲) درمانیسوس (۳) اورنیتونیسوس (۴) اورنیتودوروس</p> |

بیو شیمی:

- احیای گلوتاتیون، تحت تأثیر آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز مستلزم حضور کدام کوآنزیم است؟
- NADH (۴) NADPH (۳) FMNH₂ (۲) FADH₂ (۱)
- کدامیک از RNA‌های زیر حاوی باز آلی تیمین می‌باشد؟
- mRNA (۴) tRNA (۳) tRNA (۲) snRNA (۱)
- در ساختمان کدامیک از کربوهیدرات‌های زیر فروکتوز وجود دارد؟
- ۴) سلولز (۴) ۳) هپارین (۲) ۲) کیتین (۱) ۱) اینولین (۱)
- کدامیک از آنزیم‌های زیر آلوستریک نیست؟
- ۲) پیروات‌کیناز (۲) ۴) فسفوگلیسرات کیناز (۳) ۱) هگزوکیناز (۱)
- کدامیک از کربوهیدرات‌های زیر احیاکننده نمی‌باشد؟
- ۴) مانوز (۴) ۳) لاکتوز (۳) ۲) ایزومالتوز (۲) ۱) ترhaloz (۱)
- وارفارین با اثر بر کدامیک از پروسه‌های زیر اثرات ضد انعقادی خود را اعمال می‌کند؟
- ۱) از افزایش تعداد پلاکت‌ها جلوگیری می‌کند.
 ۲) از تبدیل فیبرینوژن به فیبرین جلوگیری می‌کند.
 ۳) چرخه متابولیسم کبدی ویتامین K را مهار می‌کند.
 ۴) از فعال شدن فاکتور X انعقادی جلوگیری می‌کند.
- گابا به واسطه دکربوکسیلاسیون از اسیدهای آمینه زیر حاصل می‌شود؟
- Gln (۴) Asn (۳) Asp (۲) Glu (۱)
- دیابت بی‌مزه با کدام گزینه زیر ارتباط دارد؟
- ۲) کمبود ترشح انسولین از سلول‌های β پانکراس (۲)
 ۴) کاهش یا عدم فعالیت گیرنده انسولین (۴)
 ۳) عدم تأثیر مناسب وازوپرسین بر سلول‌های کلیوی (۳)
 ۱) افزایش ترشح هورمون ADH از هیپوفیز (۱)
- استاتین‌ها مهارکننده کدامیک از آنزیم‌های زیر هستند؟
- ۲) لیپوکاسیئنаз (۲) ۱) سیکلواکسیزناز (۱)
 ۴) HMG-CoA ردوکتاز (۴) ۳) HMG-CoA سنتاز (۳)
- در ارتباط با متابولیسم کربوهیدرات‌ها، انسولین تمام موارد زیر را باعث می‌شود، به جز:
- ۲) کاهش گلوکونوژن (۲)
 ۴) افزایش گلیکوزن (۴)
 ۱) افزایش گلیکوزنولیز (۱)
 ۳) افزایش گلیکولیز (۳)
- کدامیک از هورمون‌های زیر از لحاظ ساختمانی با بقیه متمایز است؟
- ۴) اکسی‌توسین (۴) TSH (۳) FSH (۲) LH (۱)
- برای انجام کاتالیز واکنش توسط AST، کدام کوآنزیم مورد نیاز است؟
- ۴) تیامین پیروفسفات (۴) ۳) پیریدوکسال فسفات (۳) ۲) نیاسین (۲) ۱) بیوتین (۱)
- کدامیک از اسیدآمینه‌های زیر در سیکل اوره وجود ندارد؟
- ۴) آسپارتات (۴) ۳) سیترولین (۳) ۲) گلوتامات (۲)
 ۱) اورنیتین (۱)
- همه اسیدآمینه‌های زیر جزء اسیدآمینه‌های شاخه‌دار هستند، به جز:
- ۴) ایزولوسین (۴) ۳) ترئونین (۳) ۲) والین (۲) ۱) لوسین (۱)

بیولوژی سلولی و مولکولی:

۱۲۱- ژنوم پروکاریوتی به طور مداوم دچار تغییرات و نابهنجاری‌هایی می‌شود که توسط سیستم‌های ترمیم DNA اصلاح می‌شوند کدام مورد زیر فراوان‌ترین این تغییرات را به درستی بیان می‌کند؟

Depyrimidination (۲)

Depurination (۱)

7-Methylguanine formation (۴)

3-Methyladenine formation (۳)

۱۲۲- کدام گزینه درباره tRNAها نادرست است؟

۱) اتصال آمینواسید به یک tRNA نیازمند مصرف دو ATP است.

۲) هر tRNA از انتهای ۳' خود به اسیدآمینه اختصاصی متصل می‌شود.

۳) هر کدون، دارای tRNA حاوی آنتیکدون مخصوص و دقیق خود است.

۴) نوکلئوتیدهای غیراستاندارد موجود در ساختار tRNAها از تغییر نوکلئوتیدهای استاندارد و پس از اتمام رونویسی ایجاد می‌شوند.

۱۲۳- «بخشی از mRNA بالغ که در دو انتهای کدون آغاز و کدون پایان قرار گرفته‌اند و ترجمه نمی‌شوند»، توصیف درستی از کدام مورد زیر است؟

enhancer (۴)

Intron (۳)

UTR (۲)

A-tail (۱)

۱۲۴- کدامیک از موارد زیر کاربرد DNA microarray را به درستی بیان می‌کند؟

۱) وسیله‌ای جهت توالی‌بایی سریع توالی‌های ژنومی

۲) وسیله‌ای جهت بررسی همزمان بیان تعداد زیادی ژن

۳) وسیله‌ای جهت جداسازی یک ژن اختصاصی از یک توالی ژنومی

۴) وسیله‌ای جهت القا وارد کردن DNA لیگاز به یک سلول باکتریایی

۱۲۵- یک ژن یوکاریوتی را به درون DNA یک باکتری انتقال دادیم. پروتئین تولید شده فاقد فعالیت زیستی است. چرا؟

۱) mRNA این ژن درون باکتری پردازش نشده است.

۲) نیمه عمر mRNA باکتریایی بسیار کوتاه است.

۳) یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها کدهای ژنتیکی متفاوتی دارند.

۴) پروتئین‌های مهارکننده ژن، رونویسی و ترجمه را مختلف کرده است.

۱۲۶- محصولات رونویسی کدام پلیمراز یوکاریوتی پردازش می‌شود؟

III RNA پلیمراز (۲)

II RNA پلیمراز (۱)

۴) محصولات رونویسی هر سه پلیمراز پردازش می‌شوند.

I RNA پلیمراز (۳)

۱۲۷- کدامیک از انواع RNA به عنوان یک مولکول تطبیق‌دهنده (adaptor) عمل می‌کند؟

mRNA (۲)

rRNA (۱)

mRNA, tRNA (۴)

tRNA (۳)

۱۲۸- آنزیم‌های محدود کننده (Restriction enzymes) هستند.

۴) اندونوکلئاز

۳) اگزونوکلئاز

۲) پلیمراز

۱) پروتئاز

۱۲۹- کدام آنزیم هر دو عملکرد لیگازی و نوکلئازی را دارا است؟

۴) پلیمراز I DNA

III DNA پلیمراز (۳)

۲) توپوایزومراز

۱) هیکلаз

- ۱۳۰- دامیناسیون باز آلی سیتوزین منجر به تولید کدام باز آلی می‌شود؟
 ۱) یوراسیل
 ۲) ۵- متیل سیتوزین
 ۳) تیمین
 ۴) دی‌هیدرو یوراسیل
- ۱۳۱- در ترمیم DNA پروکاریوتی توسط آنزیم Dam متیلاز، دهنده گروه متیل کدام مولکول است؟
 ۱) بیوتین
 ۲) تراهیدروفولات
 ۳) دی‌هیدروفولات
 ۴) S-آدنوزیل میتوئین
- ۱۳۲- کدام رابطه سلولی زیر (Cell junction) اسکلت سلولی دو سلول مجاور را به هم مرتبط می‌کند؟
 ۱) دسموزوم
 ۲) همی دسموزوم
 ۳) اتصالات سخت (tight junction)
 ۴) اتصالات فاصله‌انداز (gap junction)
- ۱۳۳- بیماری بلوس پمفیگوئید (bullous pemphigoid) نوعی بیماری خودایمنی پوستی است که با تولید اتوآنٹی‌بادی (autoantibody) باعث جدایی اپیتلیوم پوست از محل غشا پایه خود از بافت پیوندی زیرین می‌شود که نتیجه آن بروز تاول‌های نازک و متعدد در نواحی درگیر پوست است، به نظر شما این اتوآنٹی‌بادی علیه کدام ساختار سلولی زیر تولید شده است؟
 ۱) دسموزوم
 ۲) همی دسموزوم
 ۳) اتصالات سخت (tight junction)
 ۴) اتصالات فاصله‌انداز (gap junction)
- ۱۳۴- در آزمایشی قصد جداگردن ریبوزوم‌های یک سلول بیکاریوتی را دارید، از کدام ماده زیر برای تخریب غشای سلولی استفاده می‌کنید؟
 ۱) SDS
 ۲) اوره
 ۳) الكل اتیلیک
 ۴) سالین هایپرتونیک
- ۱۳۵- تمام گزینه‌های زیر از محرك‌های آپوپتوز هستند، به جز:
 ۱) Bid
 ۲) Bcl_x
 ۳) Cyt c
 ۴) Fas Ligand
- ۱۳۶- کدام مولکول سریع‌تر از خلال یک غشاء دو لایه لیپیدی عبور می‌کند؟
 ۱) آب
 ۲) اتانول
 ۳) فروکتوز
 ۴) یون منیزیوم
- ۱۳۷- کدام یک از سایکلین‌های زیر برای دوره کوتاه‌تری از چرخه سلولی در غلظت‌های عملکردی، داخل سلول یافت می‌شود؟
 ۱) Cyclin G₁
 ۲) Cyclin G₁, S
 ۳) Cyclin M
 ۴) Cyclin S
- ۱۳۸- کدام ساختار زیرسلولی غشاء مضاعف ندارد؟
 ۱) هسته
 ۲) میتوکندری
 ۳) لیزوژوم
 ۴) کلروپلاست
- ۱۳۹- کدام روش آزمایشگاهی زیر را برای استخراج یک قطعه ۱۵ کیلو جفت بازی از یک نمونه مخلوط DNA انتخاب می‌کنید؟
 ۱) HPLC
 ۲) الکتروفورز روی ژل آگاروز
 ۳) کروماتوگرافی تبادل کاتیونی
 ۴) الکتروفورز دوبعدی روی ژل پلی‌اکریل‌آمید
- ۱۴۰- کدام مولکول رابط شیمیایی بین کاتابولیسم و آنابولیسم سلولی می‌باشد؟
 ۱) ATP
 ۲) FAD
 ۳) H⁺
 ۴) O₂



سایت کنکور

Konkur.in



سایت کنکور

Konkur.in