

کد کنترل

۸۱۵

F

دوره‌های گیاهی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۲

از مون و روی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود
ملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۴۰۱/۱۲/۱۲

بیماری‌شناسی گیاهی (کد ۱۳۱۵)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	گیاه‌شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)	۲۰	۲۶	۴۵
۳	قارچ‌شناسی	۲۰	۴۶	۶۵
۴	بیماری‌های گیاهی (بیماری‌های قارچی، بیماری‌های ویروسی، بیماری‌های باکتریایی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماری‌های فیزیولوژیک و انگل‌های گلدار)	۴۰	۶۶	۱۰۵
۵	اصول مبارزه و سهم‌شناسی در بیماری‌های گیاهی	۲۵	۱۰۶	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجلز می‌باشد و با مخالفین برابر مقربات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Despite the fact that Gross Domestic Product (GDP) has increased substantially in the industrialized West, the levels of human contentment have remained -----.
1) apposite 2) interwoven 3) static 4) implicit
- 2- Immigration ----- from the Latin word migration and means the act of a foreigner entering a country in the aim of obtaining the right of permanent residence.
1) gathers 2) obtains 3) arises 4) derives
- 3- Not speaking the same language as your customers can lead to communication -----.
1) breakdown 2) brevity 3) gesture 4) imitation
- 4- The factory's workforce has ----- from over 4,000 to a few hundred.
1) withdrawn 2) dwindled 3) undercut 4) forecasted
- 5- The police came up empty-handed despite an ----- exploration of the suspect's home.
1) exhaustive 2) inescapable 3) ephemeral 4) inevitable
- 6- When the old man married a woman in her thirties, all everyone talked about was the ----- in the couple's ages.
1) diversity 2) disparity 3) longevity 4) extension
- 7- One local factory will ----- the town's job shortage by providing 250 more jobs.
1) overlook 2) adjust 3) displace 4) alleviate

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

One commentator argues that the success of private schools is not in their money, (8) ----- their organization. State schools fail their pupils because, under government control, they lack options. But if head teachers at state schools (9) ----- given the same freedom as those at private schools, namely (10) ----- poor teachers and pay

more to good ones, parents would not need to send their children to private schools any more.

- | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------|------------|
| 8- | 1) that is | 2) it is in | 3) but in | 4) is |
| 9- | 1) had | 2) were | 3) to be | 4) be |
| 10- | 1) by sacking | 2) sacking | 3) sacked | 4) to sack |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Aspergillus is an important genus in foods with most species occurring as spoilage or bio-deterioration fungi. Aspergillus is a large genus containing more than 100 recognized species, several of which are capable of producing mycotoxins. Nearly 50 species of Aspergillus have been listed as producing toxic metabolites.

Aspergillus species produce toxins that exhibit a wide range of toxicities, with the most significant effects being long term. Aflatoxin B1 is a potent liver carcinogen. Ochratoxin A and citrinin both affect kidney function. Cytopiazonic acid has a wide range of effects and tremor genic toxins affect the nervous system.

While there is a known link between aflatoxin and cancer in animals, it should also be noted that the Aspergillus species of fungi also have many beneficial uses. One of the largest commercial uses of Aspergillus fungi is in the production of soft drinks. The extraction of pure citric acid from fruits and vegetables has proved to be too expensive, so the manufacturers have developed a way to use large vats to ferment Aspergillus Niger to form artificial citric acid.

- 11- **The author of this passage wants to -----.**
- 1) inform how toxic Aspergillus is
 - 2) represent data about Aspergillus
 - 3) alter the people's ideas about Aspergillus
 - 4) put emphasis on classification of Aspergillus species
- 12- **All of the following, according to the passage, are true about Aspergillus EXCEPT -----.**
- 1) it is a type of fungus
 - 2) it has more than one hundred mold species
 - 3) all species of Aspergillus are unable to generate mycotoxins
 - 4) more than half species of Aspergillus produce toxic metabolites
- 13- **It's stated in the passage that Aflatoxin B1 -----.**
- 1) lives in liver
 - 2) is a carcinogenic compound
 - 3) is a rare species of Aspergillus
 - 4) produces several types of toxins
- 14- **The information given in paragraph 3 -----.**
- 1) highlights the usefulness of some Aspergillus species
 - 2) is about the commercial uses of Aspergillus species
 - 3) stresses on the link between aflatoxin and cancer in animals
 - 4) shows the way of producing soft drinks
- 15- **The word "vats" in paragraph 3 is closest in meaning to -----.**
- 1) containers
 - 2) machines
 - 3) sources
 - 4) quantities

PASSAGE 2:

Root rots have a significant impact on global crop production. Depending on the causal agent, host susceptibility, and the environmental conditions, crop losses can range from slightly above the economic threshold to losing complete fields. Interestingly, legumes seem to be the most common host for these pathogens.

Fungi and oomycetes most commonly cause root rot disease. However, bacteria and even viruses can be the causal agents. Due to more than one pathogen's involvement, the disease is commonly referred to as a root rot complex. Unless the root rot complex affects seed germination, the root-specific symptoms go unnoticed or are not visible. If symptoms appear aboveground, the plants usually fail to recover.

Cultural, physical, biological, and chemical control methods have been used as management strategies to control root rot disease. However, to date, these strategies have only been partially successful. Most of the root rot pathogens are distributed globally, and some species can survive up to 10 years in the soil. Several root rot pathogens are host-specific, however, some have a wide range of hosts. Therefore, crop rotation may not be fully effective as a control method. Chemical control is often inefficient due to these pathogens' soilborne nature and is not the most sustainable option as it also impacts beneficial microbes. Furthermore, there is high likelihood of cross contamination between contiguous plots and when using shared field equipment.

- 16- **Crop losses due to root rot, according to the passage, rely on all of these factors but -----.**
- 1) any entity that produces an effect
 - 2) the rate of liability to be infected
 - 3) ecological conditions
 - 4) the fields of growth
- 17- **It's mentioned in the passage that legumes -----.**
- 1) are the most common pathogens infecting roots
 - 2) are one of crops having economic benefits
 - 3) are the most usual prey to root rots
 - 4) are effective as a chemical control method
- 18- **Root rot complex, as stated in the passage, is -----.**
- 1) a disease attributed to oomycete
 - 2) occurred when the plants fail to recover
 - 3) mainly caused by two or more types of pathogen
 - 4) referred to symptoms involving aboveground parts
- 19- **Which sentence, based on given information in the passage, is NOT true?**
- 1) The symptoms of root rot complex are not visible.
 - 2) It is necessary to study more in the field of root rot diseases.
 - 3) Today, the root rot disease is one main factor of crop losses.
 - 4) There are various methods used in controlling root rot diseases.
- 20- **Root rot pathogens have all these features EXCEPT -----.**
- 1) they have mainly soil-borne nature
 - 2) they spread throughout the world
 - 3) they can survive up to 10 years in the soil
 - 4) they live solely on or in one host species

PASSAGE 3:

Given the different origins of parasitism, it is not surprising that parasitism is manifested in diverse ways. Some species parasitize the roots of their hosts, whereas others attack stems. The haustorium itself may develop from roots or stems, depending on the parasite species, and haustoria display a wide range of morphologies. One prominent distinction is in the proportion of a parasite that grows internally versus externally to the host. For most parasite species, only the haustorium is embedded inside the host, serving to feed the parasite located externally to the host. However, the haustorium of some species proliferates in such a way that all vegetative growth occurs within the host, and the parasite emerges only to flower.

There are many other examples of specialized morphology or life cycles that have evolved either as a necessity for parasitism or as a result of the transition from autotrophy. Holoparasite species that do not need to absorb water from the soil may have root systems that are greatly reduced in size or missing entirely. Similarly, leaves that are not needed for photosynthesis may be reduced to scales, and parasite colour may range from cream to yellow to purple, since chlorophyll production is unnecessary. An example of a holoparasite with such features is dodder, which during vegetative growth has no roots and only scale leaves and therefore appears to be simply a yellow or orange stem with a network of host connections. Flowers of parasitic species often are similar to those of nonparasitic plants, although notable examples of extreme morphology include the huge Rafflesia flower and the bizarre, fleshy Hydnora inflorescence.

- 21- The best title for this passage is -----.**
- 1) Origins of parasitism
 - 2) Impact of parasitic plants
 - 3) Host-plant recognition by parasites
 - 4) Morphology of parasitic plants
- 22- Haustorium, you can conclude from the passage, -----.**
- 1) is an invasive organ
 - 2) determines the parasite species
 - 3) helps plants to absorb nutrients
 - 4) restricts the parasites growth rates
- 23- A parasite located externally to the host -----.**
- 1) may transit its life cycle to an autotroph
 - 2) proliferates more rapidly than internal ones
 - 3) can feed the stem and root of its host simultaneously
 - 4) feed through the haustorium embedded inside the host
- 24- Lack of root in holoparasite species shows that they -----.**
- 1) absorb water from their hosts
 - 2) don't need to be watered at all
 - 3) rely more on hosts' leaves for growth
 - 4) are supported by other plants
- 25- Dodder, according to the passage, is a -----.**
- 1) host for leafless parasites
 - 2) rootless parasitic plant
 - 3) plant with chlorophyll storage
 - 4) plant affected by other vegetation

گیاه‌شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی):

- ۲۶- کدام اندامک سلولی در ساختن دیواره سلولزی نقش دارد؟
 ۱) لیزوژوم ۲) دیکتیوزوم
 ۳) کلروپلاست ۴) میتوکندری
- ۲۷- گیاهان گزروفیت، به آب و هوای کدام منطقه سازگاری بیشتری دارند؟
 ۱) حاره ۲) خشک
 ۳) مرطوب ۴) گرم و استوایی
- ۲۸- کدام مورد، از خصوصیات سلول‌های اپیدرم گیاهان عالی نیست؟
 ۱) عموماً فاقد کلروفیل است.
 ۲) دارای فضا و فاصله بین سلولی است.
 ۳) بافت محافظ سطح اندام‌های هوایی جوان است.
 ۴) دارای یک یا دو واکوئل نسبتاً بزرگ است.
- ۲۹- کدام مورد، درست است؟
 ۱) بافت استحکامی اندام‌های مسن در گیاهان کلانشیم است.
 ۲) ریتیدوم (Rhytidom) منشأ کامبیوم آوندی است.
 ۳) سلول‌های همراه آوندهای آبکشی در نهان‌دانگان وجود دارد.
 ۴) در بازدانگان، پارانشیمی که باعث نرمی چوب می‌شود، چوب نرم گویند.
- ۳۰- در کدام برگ‌ها، روزنه‌ها منحصراً در سطح فوقانی برگ یافت می‌شوند؟
 ۱) برگ‌های شناور آبزی
 ۲) برگ‌های غوطه‌ور آبزی
 ۳) برگ‌هایی که به طور مایل قرار می‌گیرند.
 ۴) برگ‌هایی که به طور افقی قرار می‌گیرند.
- ۳۱- در سرخس‌ها، کدام نوع متاگزیلم یافت می‌شود؟
 ۱) منقوط
 ۲) مخطط
 ۳) نردبانی
 ۴) هاله‌ای
- ۳۲- نام فارسی *Juniperus polycarpus* چیست و به کدام تیره گیاهی تعلق دارد؟
 ۱) ارس - سرو
 ۲) ارس - سرخدار
 ۳) مای مرز - سرو
 ۴) مای مرز - سرخدار
- ۳۳- سرخس‌ها به کدام گروه تعلق دارند؟
 ۱) اسپرماتوفیت‌ها
 ۲) بریوفیت‌ها
 ۳) پتریدوفیت‌ها
 ۴) تالوفیت‌ها
- ۳۴- کدام مورد در خصوص جنس موز، درست است؟
 ۱) گیاهانی چوبی و دوپایه با میوه سته
 ۲) گیاهانی چندساله با میوه سته
 ۳) علفی‌های چندساله و دوپایه با گل‌آذین‌های چتر
- ۳۵- میوه هیسپریدیوم، در کدام تیره گیاهی مشاهده می‌شود؟
 ۱) انگور
 ۲) مرکبات
 ۳) گل سرخ
 ۴) کدو
- ۳۶- گیاهان کدام تیره، عموماً هرمافروdit هستند؟
 ۱) Amarantaceae
 ۲) Betulaceae
 ۳) Fagaceae
 ۴) Salicaceae
- ۳۷- گیاه صنوبر که کاربرد زیادی در صنایع چوب دارد، متعلق به کدام تیره است؟
 ۱) Betulaceae
 ۲) Fagaceae
 ۳) Salicaceae
 ۴) Ulmaceae
- ۳۸- گل‌آذین گرزن دم‌عقربی در گیاهان کدام تیره، مشاهده می‌شود؟
 ۱) Asteraceae
 ۲) Boraginaceae
 ۳) Fabaceae
 ۴) Lamiaceae
- ۳۹- در گیاه عروسک پشت‌پرده (فیسالیس)، کدام قسمت پایا است؟
 ۱) پرچم‌ها
 ۲) کلاله
 ۳) گلبرگ‌ها
 ۴) کاسه گل

<i>Salicaceae</i> (۴)	<i>Moraceae</i> (۳)	<i>Fagaceae</i> (۲)	<i>Chenopodiaceae</i> (۱)
			- ۴۰ در گیاهان کدام تیره، میوه در داخل یک پیاله چوبی‌شونده، تشکیل می‌شود؟
			(۱) گیاهانی که دارای ساقه زیرزمینی تغییرشکل یافته هستند را چه می‌نامند؟
<i>Verbenaceae</i> (۴)	<i>Cannabinaceae</i> (۳)	<i>Papaveraceae</i> (۲)	<i>Asteraceae</i> (۱)
			- ۴۱ کدام موجود تثبیت‌کننده نیتروژن جو، در خاک‌های فعالیت دارد که از تهويه خوبی برخوردار نیستند؟
			(۱) آنابنا (۲) ازتوباکتر (۳) نوستوک (۴) کلستریدیوم
			- ۴۲ ماده مؤثره لوپولین از گیاهان کدام تیره به دست می‌آید؟
<i>Verbenaceae</i> (۴)	<i>Cannabinaceae</i> (۳)	<i>Papaveraceae</i> (۲)	<i>Asteraceae</i> (۱)
			- ۴۳ کدام کدام موجود تثبیت‌کننده نیتروژن جو، در خاک‌های فعالیت دارد که از تهويه خوبی برخوردار نیستند؟
			(۱) آنابنا (۲) ازتوباکتر (۳) نوستوک (۴) کلستریدیوم
<i>Verbenaceae</i> (۴)	<i>Cannabinaceae</i> (۳)	<i>Papaveraceae</i> (۲)	<i>Asteraceae</i> (۱)
			- ۴۴ در کدام یک از گیاهان هورمون جیبریلین، در پارتنوکارپی مؤثر است؟
			(۱) انگور (۲) بادمجان (۳) توت‌فرنگی (۴) هلو
			- ۴۵ کدام مورد، از ضمائم سیتوپلاسم سلولی نیست؟
<i>Verbenaceae</i> (۴)	<i>Cannabinaceae</i> (۳)	<i>Papaveraceae</i> (۲)	<i>Asteraceae</i> (۱)
			(۱) دیکتیوزوم (۲) واکوئل (۳) کلروپلاست

قارچ‌شناسی:

<i>Pucciniaceae</i> - <i>Ustilaginaceae</i> (۲)	<i>Ustilaginaceae</i> - <i>Tilletiaceae</i> (۴)	<i>Melampsoraceae</i> - <i>Exobasidiaceae</i> (۱)	<i>Tilletiaceae</i> - <i>Melampsoraceae</i> (۳)
			- ۴۶ اصطلاح Fungicolous fungi به کدام گروه از قارچ‌ها اطلاق می‌شود؟
			(۱) همزیست با دیگر قارچ‌ها و گیاهان (۲) مشارکت در ایجاد رابطه گلشنگی با شریک جلبکی (۳) داخل بافت‌های دیگر قارچ‌ها به صورت اندوفیتی رشد می‌کنند. (۴) روی ساختارهای رویشی و زایشی دیگر قارچ‌ها رشد می‌کنند.
			- ۴۷ نحوه جوانهزنی تلیوسپور در اعضای کدام خانواده‌ها از نظر رفتار هسته مشابه است؟
<i>Phytophthora</i> (۴)	<i>Saprolegnia</i> (۳)	<i>Pythium</i> (۲)	<i>Allomyces</i> (۱)
			- ۴۸ کدام یاخته به صورت ساده در لایه هیمنیوم برخی قارچ‌های بازیدیومیست با قطری به اندازه بازیدیوم و عقیم که کمی بلندتر از سطح هیمنیوم است؟
<i>Cytosporae</i> (۴)	<i>Cystosome</i> (۳)	<i>Cystidium</i> (۲)	<i>Cystidiole</i> (۱)
			- ۴۹ در کدام آسکوکارپ، لایه هیمنیوم <u>تشکیل نمی‌شود؟</u>
<i>Hypocreales</i> (۴)	<i>Stemphylium</i> - <i>Bipolaris</i> (۴)	<i>Altemaria</i> - <i>Fusarium</i> (۱)	<i>Metarhizium</i> - <i>Cladosporium</i> (۳)
			- ۵۰ در کدام آرایه تشکیل می‌شود؟
			- ۵۱ هیف خارجی (extraradical hypha)، در کدام گروه از قارچ‌ها وجود دارد؟
			- ۵۲ در کدام گروه از آرایه‌ها، کنیدیومزایی به شیوه اینتروبلاستیک است؟
			- ۵۳ کدام مورد درباره سلسله قارچ‌های حقیقی درست است؟
			(۱) نبود قطعی سلولز در ترکیب دیواره سلولی (۲) تغذیه به شیوه فاگوسیتوز (۳) داشتن میتوکندری با کریستال لوله‌ای
			(۴) وجود اسپور تاژک‌دار از نوع شلاقی در برخی گروه‌ها

- ۵۴- کدام گروه از ساختارها، نقش‌های تقریباً مشابهی را ایفا می‌کنند؟
- (۱) آپرسوریوم - آرباسکول
 (۲) ریزومورف - آرباسکول
 (۳) وزیکول - هیفوپودیوم
 (۴) هاستوریوم - آرباسکول
- ۵۵- آرکیکارپ (Archicarp) و تریکوژن (Tricogyne) را کدام‌یک از اندام‌ها تشکیل می‌شوند؟
- (۱) آسکوگونیوم یا گامتانژیوم ماده
 (۲) آنتریدیوم یا گامتانژیوم نر
 (۳) روی سلول‌های پایه آنتریدیوم
 (۴) روی سلول‌های تیره و دوغشائی، در کدام جنس تولید می‌شوند؟
- ۵۶- تلیوسپورهای زیراپیدرمی چندسلولی با دیواره‌های تیره و دوغشائی، در کدام جنس تولید می‌شوند؟
- (۱) *Cronartium*
 (۲) *Gymnosporangium*
 (۳) *Melampsora*
 (۴) *Phragmidium*
- ۵۷- کدام تفاوت بین پوسیدگی قهوه‌ای و پوسیدگی سفید ناشی از قارچ‌های Polyporales، از نظر آنزیمی وجود دارد؟
- (۱) در پوسیدگی قهوه‌ای سلولز و لیگنین از بین می‌رونده، ولی در پوسیدگی سفید فقط لیگنین باقی می‌ماند.
 (۲) در پوسیدگی قهوه‌ای سلولز و لیگنین از بین می‌رونده، ولی در پوسیدگی سفید سلولز و لیگنین باقی می‌ماند.
 (۳) در پوسیدگی قهوه‌ای سلولز و همی‌سلولز از بین می‌رونده، لیگنین باقی می‌ماند، ولی در پوسیدگی سفید لیگنین نیز از بین می‌رود.
 (۴) در پوسیدگی قهوه‌ای سلولز، همی‌سلولز و لیگنین از بین می‌رونده، ولی در پوسیدگی سفید فقط لیگنین از بین می‌رود.
- ۵۸- کدام اندامک مختص سلول قارچی است و معادل کدام اندامک در سایر یوگاریوت‌ها است؟
- (۱) پرآکسی زوم - گلی‌اکسی زوم
 (۲) جسم قطبی دوکی‌شکل - سنتروزوم
 (۳) لومازوم - وزیکل‌های ترشحی
 (۴) هیدروژنوزوم - میتوکندری
- ۵۹- ویژگی‌های اعضای شاخه **Glomeromycota** کدام است؟
- (۱) اندومايكوريزا، فاقد تولیدمثل جنسی، دارای تولیدمثل غیرجنسی، دارای ساختارهایی درون سلول میزبان
 (۲) اندومايكوريزا، دارای تولیدمثل جنسی، فاقد تولیدمثل غیرجنسی، دارای ساختارهایی درون سلول میزبان
 (۳) اكتومايكوريزا، فاقد تولیدمثل جنسی، دارای تولیدمثل غیرجنسی، دارای ساختارهایی درون سلول میزبان
 (۴) اكتومايكوريزا، دارای تولیدمثل جنسی، فاقد تولیدمثل غیرجنسی، فاقد ساختارهایی درون سلول میزبان
- ۶۰- زئوسپورهای قارچ‌های حقیقی (true fungi) از کدام نوع هستند؟
- (۱) Multiflagellate
 (۲) Heterokont
 (۳) Uniflagellate
 (۴) Opistokont
- ۶۱- راموکونیدیاها (ramoconidia) در گونه‌های کدام جنس دیده می‌شوند؟
- (۱) *Curvularia*
 (۲) *Cercospora*
 (۳) *Cephalosporium*
 (۴) *Cladosporium*
- ۶۲- ساختار هیفوپودیوم (Hypopodium) در اعضای کدام خانواده وجود دارد؟
- (۱) Magnaportheaceae
 (۲) Venturiaceae
 (۳) Diaporthaceae
 (۴) Pleosporaceae
- ۶۳- ترتیب مراحل مختلف تولیدمثل جنسی در **Oomycota** به کدام صورت است؟
- (۱) پلاسموگامی، کاریوگامی و میوز
 (۲) میوز، پلاسموگامی و کاریوگامی
 (۳) کاریوگامی، پلاسموگامی و میوز

-۶۴- کدام مورد درباره آسکوکارپ و آسک در اعضای رده **Eurotiomycetes**، درست است؟

- (۱) آسکوکارپ از نوع جیمنوتیسیوم، کلیستوتیسیوم، پریتیسیوم، آسکواستروم - پروتوتونیکیت یا دوجداره
- (۲) آسکوکارپ از نوع سودوتیسیوم، جیمنوتیسیوم، هیستروتیسیوم، آپوتیسیوم - تک‌جداره یا پروتوتونیکیت
- (۳) آسکوکارپ از نوع کلیستوتیسیوم، پریتیسیوم، سودوتیسیوم، تیروپوتیسیوم - تک‌جداره
- (۴) آسکوکارپ از نوع تیریوتیسیوم، آپوتیسیوم، آسکواستروم، کاسموتیسیوم - دوجداره

-۶۵- ساختاری ضخیم و مقاوم به نام **Oospore** (از چه لایه یا لایه‌هایی تشکیل شده است؟

- (۱) دولايه پرسپور که لایه ضخیم و اساسی است و اندوسپور که محل ذخیره کربوهیدرات‌ها است.
- (۲) سه لایه اگزوسپور، پرسپور و اندوسپور که محل ذخیره کربوهیدرات‌ها لایه اندوسپور است.
- (۳) دو لایه اگزوسپور و اندوسپور که اگزوسپور از بقایای پری‌پلاسم است و اندوسپور شکل اسپور را تعیین می‌کند.
- (۴) سه لایه اگزوسپور، پرسپور و اندوسپور که اندوسپور لایه‌ای ضخیم و اساسی است که شکل اسپور را تعیین می‌کند.

بیماری‌های گیاهی (بیماری‌های قارچی، بیماری‌های ویروسی، بیماری‌های باکتریایی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماری‌های فیزیولوژیک و انگل‌های گلدار):

-۶۶- عامل بیماری **Leather rot** در توت‌فرنگی، کدام است؟

Phytophthora cactorum (۲)

Phytophthora megasperma (۱)

Rhizoctonia solani (۴)

Rhizoctonia fragariae (۳)

-۶۷- علائم **Hard Spot** در کدام بیماری دیده می‌شود؟

- (۱) آنراکنوز مرکبات
- (۲) لکه قهوه‌ای مرکبات
- (۳) لکه سیاه مرکبات
- (۴) گموز مرکبات

-۶۸- کدام زنگ‌ها از نظر تکمیل چرخه روی میزبان، با بقیه متفاوت هستند؟

(۱) ذرت - جنوب غربی پنبه

(۲) گلرنگ - آفتابگردان

(۳) یونجه - چندرقند

-۶۹- عارضه قهوه‌ای شدن و پژمردگی برگ‌ها، زوال شاخه‌ها و فنجانی شدن برگ‌ها به ترتیب از راست به چپ در اثر کمبود کدام عنصر در گیاه ایجاد می‌شوند؟

(۱) فسفر - کلسیم - بُر

(۲) مس - گوگرد - مولیبدن

(۳) منگنز - پتاسیم - منیزیم

-۷۰- کدام مورد درباره بیماری آنراکنوز مو، نادرست است؟

(۱) آسکواسترومای چندحجره‌ای در زیر اپیدرم میزبان تشکیل می‌شود.

(۲) با افزایش سن اندام‌های گیاهی، حساسیت گیاه به بیماری بیشتر می‌شود.

(۳) سختینه‌های قارچ درون اندام‌های آلوده تشکیل می‌شوند.

(۴) وجود زخم باعث تسهیل رخنه عامل بیماری به درون میزبان می‌شود.

-۷۱- کدام مورد درباره گیاه انگل سیس، نادرست است؟

(۱) از جوانهزنی بذر، ساقه و ریشه اولیه به وجود می‌آیند.

(۲) زمستان گذرانی آن به صورت بذر در خاک انجام می‌گیرد.

(۳) میزبان آن عمدهاً گیاهان پهنه برگ هستند.

(۴) مکینه‌های آن درون سیستم آوندی گیاه میزبان تشکیل می‌شود.

- ۷۲ کدام مورد، بیمارگر مُرده خوار (**necrotroph**) است؟
- Colletotrichum musae* (۲) *Colletotrichum capsici* (۱)
Colletotrichum lindemuthianum (۴) *Colletotrichum destructivum* (۳)
- ۷۳ کدام بیماری زنگ برای کشور ایران قرنطینه است؟
- (۱) پنبه (۲) چندرقند
(۳) سویا (۴) گلنگ
- ۷۴ کدام مورد، جزو ساختارهای دفاعی هیستولوژیکی گیاه در برابر بیمارگرها است؟
- (۱) تایلوز و لایه چوب پنبه‌ای
(۲) رسوب صمغ و موم
(۳) موم و تایلوز (۴) لایه جداکننده و کوتیکول
- ۷۵ عامل بیماری لکه قهوه‌ای یوکا، کدام است؟
- Berkeleyomyces basicola* (۲) *Athelia rolfsii* (۱)
Phaeosphaeria obtusispora (۴) *Cylindrocladium scoparium* (۳)
- ۷۶ کدام باکتری بیماری‌زای گیاهی، تولید اسپر (**Spore**) می‌کند؟
- Rathayibacter tritici* (۲) *Clavibacter michiganensis* (۱)
Xylella fastidiosa (۴) *Streptomyces scabies* (۳)
- ۷۷ بیماری پژمردگی باکتریایی لوپیا، توسط کدام عامل بیمارگر ایجاد می‌شود؟
- Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (۱)
Pseudomonas savastanoi pv. *Phaseolicola* (۲)
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (۳)
Pseudomonae viridiflava (۴)
- ۷۸ کدام دو جنس باکتریایی، قربت بیشتری با هم دارند؟
- Erwinia* و *Pseudomonas* (۲) *Clavibacter* و *Rathayibacter* (۱)
Ralstonia و *Xanthomonas* (۴) *Pseudomonas* و *Xanthomonas* (۳)
- ۷۹ کدام باکتری روی غلات، بیماری‌زا است؟
- Agrobacterium radiobacter* (۲) *Agrobacterium tumefaciens* (۱)
Xanthomonas translucens (۴) *Xanthomonas campestris* (۳)
- ۸۰ کدام مورد، عامل بیماری شانکر پوستی گردو است؟
- Brenneria nigrifluens* (۲) *Brenneria rubrifacies* (۱)
Xanthomonas arboricola pv. *juglandis* (۴) *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (۳)
- ۸۱ زنجرک‌ها، کدام بیماری‌ها را منتقل می‌کنند؟
- (۱) پیرس انگور
(۲) پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی
(۳) شانکر باکتریایی مرکبات
(۴) شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی
- ۸۲ در مفهوم واژه **Pathovar**، تقسیم‌بندی یک گونه، براساس کدام مورد است؟
- (۱) خصوصیات بیوشیمیایی
(۲) خصوصیات سروولوژیک
(۳) تخصص میزبان
- ۸۳ برخی از استرین‌های کدام باکتری، فازئولوتوکسین تولید می‌کنند؟
- Ralstonia solanacearum* (۲) *Rhodococcus fascians* (۱)
Pseudomonas syringae (۴) *Streptomyces scabies* (۳)

- ۸۴ کدام باکتری هوایی، اجباری است؟
- Brenneia nigrifluens* (۲) *Erwinia amylovora* (۱)
- Xanthomonas campestris* (۴) *Pectobacterium atrosepticum* (۳)
- ۸۵ کدام نماتدها در ایران شیوع دارند؟
- (۱) حلقه قرمز نخل، نقب زن (خراط)، گره کاذب ریشه
 (۲) زخم، خنجری، سوزنی
 (۳) ساقه و پیاز، نیش، کاج
 (۴) نیش، خنجری، گره کاذب ریشه
- ۸۶ بخش جلویی استایلت اعضاخانواده *Longidoridae* و *Trichodoridae* به ترتیب کدام است؟
- Odontophore* و *Conus* (۲) *Onchium* و *Conus* (۱)
- Odontophore* و *Shaft* (۴) *Odontostyle* و *Onchium* (۳)
- ۸۷ کدام نماتدها، محل تغذیه تخصصی در بافت میزبان القامی کنند؟
- Belonolaimus*, *Trichodorus*, *Pratylenchus* (۱)
- Longidorus*, *Helicotylenchus*, *Filenchus* (۲)
- Meloidogyne*, *Globodera*, *Heterodera* (۳)
- Pratylenchus*, *Paratylenchus*, *Heterodera* (۴)
- ۸۸ کدام جنس از نماتدها، انگل نیمه‌داخلی ریشه محسوب می‌شوند؟
- Xenocriconemella* (۴) *Tylenchulus* (۳) *Paratylenchus* (۲) *Cacoparus* (۱)
- ۸۹ کدام خانواده‌ها در رده‌بندی دلیل وجود دارد و لی برای رده‌بندی مجنّتی و همکاران (*Maggenti et al., 1987*) وجود ندارد؟
- (۱) *Belonolaimidae* و *Heteroderidae*
 (۲) *Telotylenchidae* و *Dolichodoridae*
 (۳) *Hemicycliphoridae* و *Meloidogynidae*
 (۴) *Merliniidae* و *Psilenchidae*
- ۹۰ وجه مشترک نماتدهای انگل گیاهی که در ایران به محصولات کشاورزی خسارت اقتصادی وارد می‌کند، کدام است؟
- (۱) داشتن فاسیلید
 (۲) داشتن استایلت رشدیافته
 (۳) داشتن دو لوله تناسلی در ماده‌ها
 (۴) داشتن سه غده ترشحی در مری
- ۹۱ صفات زیر، صفات کدام جنس است؟
- «اکتوپارازیت مهاجر بودن، داشتن یک لوله جنسی در افراد ماده، ایجاد کلفتی در ریشه‌های آلووده شده و عدم وجود بورسا»
- Meloidogyne* (۲) *Helicotylenchus* (۱)
Trichodorus (۴) *Radopholus* (۳)
- ۹۲ شکل آمفید، تعداد پاپیل‌های جنسی در افراد نر و مشخصات استایلت، کدام دو جنس را از هم متمایز می‌سازد؟
- Paratylenchus* و *Pratylenchus* (۲) *Paratrichodorus* و *Trichodorus* (۱)
Longidorus و *Xiphinema* (۴) *Globodera* و *Meloidogyne* (۳)
- ۹۳ ایجاد زیگزاگی یا آکاردئونی شدن برگ در میزبان آلووده شده و بقای نماتد در مرحله لاروی سن دوم، مشخصه کدام گونه است؟
- Ditylenchus dipsaci* (۲) *Anguina tritici* (۱)
Subanguina picridis (۴) *Ditylenchus destructor* (۳)

- | | |
|---|--|
| <p>۹۴- عامل بیماری شارکای جنس پرونوس، کدام است؟</p> <p>۱) Prunus necrotic ringspot virus (۲)</p> <p>۲) Prune dwarf virus (۴)</p> <p>۳) Tomato brown rugose fruit virus روش مدیریتی کارآمد و مؤثر در حال حاضر، علیه Tomato brown rugose fruit virus کدام است؟</p> <p>۱) استفاده از بذور و نشاهاي عاري از ويروس</p> <p>۳) ضدغونی بذر با سوموم سیستمیک</p> <p>۴) فرایند ساخت پروتئین در ويروس‌ها با استفاده از روش پیوسته‌خوانی (read through) به کدام معنی است؟</p> <p>۱) دو پروتئین به صورت همزمان ساخته می‌شود.</p> <p>۲) کدون خاتمه‌دهنده اول اشتباهی خوانده می‌شود.</p> <p>۳) یک پروتئین ساخته شده و بعد شکسته می‌شود.</p> <p>۴) یک پروتئین ساخته شده و بعد شکسته می‌شود.</p> <p>پوتی ويروس‌ها، محدود به کدام مورد هستند؟</p> <p>۱) آوند چوبی (۲) آوند آبکشی</p> <p>۳) تفاوت مهم میان حرکت پیکره‌ها در ويروس موازیک توتون (TMV) و ويروس ایکس سیب‌زمینی (PVX) کدام است؟</p> <p>۱) در TMV عامل اصلی حرکت، پروتئین پوششی است، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه دخیل هستند.</p> <p>۲) در TMV عامل اصلی حرکت، یک پروتئین ۳۰ کیلو دالتونی است، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه و نیز پروتئین پوششی دخیل هستند.</p> <p>۳) در TMV عامل اصلی حرکت، یک بلوک سه‌گانه پروتئینی است، ولی در PVX، یک پروتئین کمکی Helper component) و نیز پروتئین پوششی دخالت دارند.</p> <p>۴) در TMV عامل اصلی حرکت، دو پروتئینی هستند که تشکیل یک لوله را در پلاسمودسماata می‌دهند، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه و نیز پروتئین پوششی دخیل هستند.</p> <p>ترانویسی در کدام گروه از ويروس‌ها به صورت دوطرفه انجام می‌شود؟</p> <p>۱) جمینی ويروس‌ها (۲) پاتی ويروس‌ها</p> <p>۳) کالیمو ويروس‌ها (۴) نانو ويروس‌ها</p> <p>۱) ۹۶- کدام ويروس دارای ژنوم آمبی سنس است؟</p> <p>۱) اورتوتوسپو ويروس‌ها (۲) جمینی ويروس‌ها</p> <p>۳) کدام مورد جزو خصوصیات جمینی ويروس‌ها است؟</p> <p>۱) ۹۷- ژنوم ssDNA حلقوی و انتقال با شته‌ها (۲) ژنوم dsDNA و پیکره‌های دوقلو</p> <p>۳) ژنوم ssDNA حلقوی و پیکره‌های دوقلو (۴) ژنوم ssDNA حلقوی و پیکره‌های رشته‌ای</p> <p>۱) ۹۸- عامل بیماری لکه سفید چغندرقند، کدام مورد است و چگونه بذرزاد می‌شود؟</p> <p>۱) Uromyces betae و در مناطق خشک در اثر پرات اردوسپورها بذرزاد می‌شود.</p> <p>۲) Urophlyctis leptoides و در مناطق مرطوب، زئوسپورها وارد گل شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۳) Peronosporon و در مناطق خشک در اثر باران و پراش آن، اسپورانژیولیا وارد گل شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۴) Cercospora beticeli و در مناطق مرطوب در اثر باران و پراش آن، کنیدیولها وارد گل‌ها شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۱) ۹۹- کدام سیاهک برخلاف سیاهک‌های معمول، بر گیاه، ساقه، گل‌های نر و ماده گیاه را آلوده می‌کند؟</p> <p>۱) سیاهک آشکار جو (۲) سیاهک عمولی ذرت Ustilago maydis</p> <p>۳) سیاهک بیگن، گندم Urocystis agropyri</p> <p>۴) سیاهک سخت جو Ustilago hordei</p> | <p>۱) Apple stem grooving virus</p> <p>۲) Plum pox virus</p> <p>۳) ۹۵- روشن مدیریتی کارآمد و مؤثر در حال حاضر، علیه Tomato brown rugose fruit virus کدام است؟</p> <p>۱) استفاده از بذور و نشاهاي عاري از ويروس</p> <p>۳) ضدغونی بذر با سوموم سیستمیک</p> <p>۴) فرایند ساخت پروتئین در ويروس‌ها با استفاده از روش پیوسته‌خوانی (read through) به کدام معنی است؟</p> <p>۱) دو پروتئین به صورت همزمان ساخته می‌شود.</p> <p>۲) کدون خاتمه‌دهنده اول اشتباهی خوانده می‌شود.</p> <p>۳) یک پروتئین ساخته شده و بعد شکسته می‌شود.</p> <p>۴) یک پروتئین ساخته شده و بعد شکسته می‌شود.</p> <p>پوتی ويروس‌ها، محدود به کدام مورد هستند؟</p> <p>۱) آوند چوبی (۲) آوند آبکشی</p> <p>۳) تفاوت مهم میان حرکت پیکره‌ها در ويروس موازیک توتون (TMV) و ويروس ایکس سیب‌زمینی (PVX) کدام است؟</p> <p>۱) در TMV عامل اصلی حرکت، پروتئین پوششی است، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه دخیل هستند.</p> <p>۲) در TMV عامل اصلی حرکت، یک پروتئین ۳۰ کیلو دالتونی است، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه و نیز پروتئین پوششی دخیل هستند.</p> <p>۳) در TMV عامل اصلی حرکت، یک بلوک سه‌گانه پروتئینی است، ولی در PVX، یک پروتئین کمکی Helper component) و نیز پروتئین پوششی دخالت دارند.</p> <p>۴) در TMV عامل اصلی حرکت، دو پروتئینی هستند که تشکیل یک لوله را در پلاسمودسماata می‌دهند، ولی در PVX، یک گروه پروتئین سه‌گانه و نیز پروتئین پوششی دخیل هستند.</p> <p>ترانویسی در کدام گروه از ويروس‌ها به صورت دوطرفه انجام می‌شود؟</p> <p>۱) جمینی ويروس‌ها (۲) پاتی ويروس‌ها</p> <p>۳) کالیمو ويروس‌ها (۴) نانو ويروس‌ها</p> <p>۱) ۹۶- کدام ويروس دارای ژنوم آمبی سنس است؟</p> <p>۱) اورتوتوسپو ويروس‌ها (۲) جمینی ويروس‌ها</p> <p>۳) کدام مورد جزو خصوصیات جمینی ويروس‌ها است؟</p> <p>۱) ۹۷- ژنوم ssDNA حلقوی و انتقال با شته‌ها (۲) ژنوم dsDNA و پیکره‌های دوقلو</p> <p>۳) ژنوم ssDNA حلقوی و پیکره‌های دوقلو (۴) ژنوم ssDNA حلقوی و پیکره‌های رشته‌ای</p> <p>۱) ۹۸- عامل بیماری لکه سفید چغندرقند، کدام مورد است و چگونه بذرزاد می‌شود؟</p> <p>۱) Uromyces betae و در مناطق خشک در اثر پرات اردوسپورها بذرزاد می‌شود.</p> <p>۲) Urophlyctis leptoides و در مناطق مرطوب، زئوسپورها وارد گل شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۳) Peronosporon و در مناطق خشک در اثر باران و پراش آن، اسپورانژیولیا وارد گل شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۴) Cercospora beticeli و در مناطق مرطوب در اثر باران و پراش آن، کنیدیولها وارد گل‌ها شده و بذرزاد می‌شود.</p> <p>۱) ۹۹- کدام سیاهک برخلاف سیاهک‌های معمول، بر گیاه، ساقه، گل‌های نر و ماده گیاه را آلوده می‌کند؟</p> <p>۱) سیاهک آشکار جو (۲) سیاهک عمولی ذرت Ustilago maydis</p> <p>۳) سیاهک بیگن، گندم Urocystis agropyri</p> <p>۴) سیاهک سخت جو Ustilago hordei</p> |
|---|--|

۱۰۵ - بارزترین علائم بیماری پوسیدگی ذغالی آفتابگردان، کدام است؟

۲) پژمردگی ناگهانی و سیاه شدن ساقه

۱) پژمردگی ناگهانی و سیاه شدن برگ‌ها

۴) ظهور لکه‌های قهوه‌ای بافت مرده روی ریشه و ساقه

۳) ظهور لکه‌های قهوه‌ای و شانکر ساقه

اصول مبارزه و سهم‌شناختی در بیماری‌های گیاهی:

۱۰۶ - نحوه عمل قارچ‌کش‌های استروپیلورینی، چگونه است؟

۲) اختلال در فسفریله شدن اکسیداتیو

۱) اختلال در تقسیم سلولی

۴) تحریک ساخت فیتوالکسین‌ها در گیاه

۳) اختلال در تنفس میتوکندریا

۱۰۷ - برای تهیه ۵۰۰ میلی‌لیتر امولسیون به غلظت 10^0 ppm از یک امولسیون نیم‌درصد، به چند میلی‌لیتر از امولسیون غلیظتر نیاز است؟

۱۰۰ (۴)

۵۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۱۰۸ - نحوه اثر قارچ‌کش **Acibenzolar-S-methyl**، کدام مورد است؟

۲) بازدارنده تنفس سلولی

۱) بازدارنده تنفس سلولی

۴) فعال‌کننده مکانیسم دفاعی طبیعی گیاه

۳) جلوگیری از تولید اسپور

۱۰۹ - کدام گروه از سموم شیمیایی، از توانایی کنترل طیف وسیع تری از قارچ‌های بیمارگر گیاهی برخوردار هستند؟

۴) اکساتئین‌ها

۳) تیوفانات‌ها

۲) پیریمیدین‌ها

۱) تریاژول‌ها

۱۱۰ - کدام قارچ‌کش، باعث اختلال در ساخت ارگوسترون در قارچ‌ها می‌شود؟

۴) مانکوزب

۳) کاربندازیم

۲) کاپتان

۱) پنکونازول

۱۱۱ - پلی‌اکسین‌ها، روی کدام گروه از قارچ‌ها مؤثرتر هستند؟

۴) Rhizoctonia

۳) Phytophthora

۲) Pythium

۱) Puccinia

۱۱۲ - برای کنترل بیماری گموز درختان میوه، استفاده از کدام قارچ‌کش مؤثر است؟

۲) پروپیکونازول

۱) بنومیل

۴) فوزتیل آلومینیوم

۳) تبوکونازول

۱۱۳ - قارچ‌کش متالاکسیل، علیه کدام دسته از قارچ‌ها کاربرد دارد؟

۲) اوومیست‌ها

۱) آسکومیست‌ها

۴) قارچ‌های ناقص

۳) بازیدیومیست‌ها

۱۱۴ - کدام عامل، از اهمیت بیشتری در مدیریت بیماری‌های تک‌چرخه‌ای، برخوردار است؟

۲) تغییر تاریخ کشت

۱) استفاده از قارچ‌کش‌های سیستمیک

۴) کاهش مایه تلقیح اولیه

۳) دستکاری شرایط محیطی

۱۱۵ - کدام روش، از بیشترین تأثیر در مدیریت بیماری‌های گیاهی ناشی از شبکه‌قارچ‌ها برخوردار است؟

۲) کاهش درجه حرارت محیط

۱) استفاده از سموم دی‌تیوکاربامات

۴) ضد‌عفونی بذور

۳) کاهش رطوبت خاک

۱۱۶ - آنتی‌بیوتیک گلیوتوكسین، توسط کدام جنس از عوامل بیوکنترل تولید می‌شود؟

۴) Talaromyces

۳) Trichoderma

۲) Penicillium

۱) Chaetomium

- | | | |
|--|---|----------------------|
| ۱۱۷- ترکیب زویترمایسین آ که توسط <i>Bacillus cereus</i> تولید می‌شود، روی کدام گروه از بیمارگرها مؤثرتر است؟ | Actinomycetes (۲) | Ascomycetes (۱) |
| | Oomycetes (۴) | Basidiomycetes (۳) |
| ۱۱۸- تجزیه میکروبی کدام ترکیب، موجب کنترل مؤثر باکتری <i>Erwinia amylovora</i> شده است؟ | (۱) نیکوتینیک اسید
(۲) اتیلن
(۳) متانول
(۴) بیوتین | |
| ۱۱۹- مکانیسم اصلی قارچ <i>Chaetomium globosum</i> علیه قارچ‌های بیماری‌زا (مانند عامل لکه سیاه سیب)، کدام است؟ | (۱) آنجاد مقاومت القایی در گیاه
(۲) آنتی‌بیوز
(۳) رقابت
(۴) پارازیتیسم | |
| ۱۲۰- بیشترین آنتی‌بیوتیک‌ها توسط کدام باکتری‌ها تولید می‌شوند؟ | (۱) استرپتومیسزها
(۲) باسیل‌ها
(۳) ریزوبیوم‌ها | |
| ۱۲۱- مکانیسم عمل پایوچلین (Pyochelin) در کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی، کدام است؟ | (۱) آنتی‌بیوز
(۲) پارازیتیسم
(۳) رقابت
(۴) هیپوویرونلانس | |
| ۱۲۲- حضور باکتری‌های همزیست در ریزوسفر گیاه، بیشتر منجر به ایجاد کدام نوع مقاومت در گیاه می‌شود؟ | Vertical resistance (۲) | Local resistance (۱) |
| Systemic acquired resistance (۴) | Induced systemic resistance (۳) | |
| ۱۲۳- کدام مورد، معرف پایوردین (Pyoverdine) است؟ | | |
| (۱) یک نوع سیدروفور که توسط سودوموناس‌های فلورسنت تولید می‌شود.
(۲) یک نوع سیدروفور که توسط گونه‌های <i>Trichoderma</i> تولید می‌شود.
(۳) یک نوع آنتی‌بیوتیک که توسط گونه‌های <i>Trichoderma</i> تولید می‌شود.
(۴) یک نوع آنتی‌بیوتیک که توسط سودوموناس‌های فلورسنت تولید می‌شود. | | |
| ۱۲۴- کدام بیماری، با وجود اعمال قرنطینه در دهه‌های اخیر، وارد کشور شده است؟ | (۱) آنتراکنوز مرکبات
(۲) سیاهک آشکار گندم
(۳) نماتد گال بذر گندم | |
| ۱۲۵- کدام نوع از مرکبات در شمال ایران، به عنوان بهترین پایه برای کنترل گموز معرفی شده است؟ | (۱) پونسیروس
(۲) نارنج
(۳) گریپ‌فروت
(۴) لیموترش | |
| ۱۲۶- کدام گیاه تله برای کنترل نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی، مناسب است؟ | | |
| <i>Capsicum pubescens</i> (۲) | <i>Capsicum annuum</i> (۱) | |
| <i>Solanum nigrum</i> (۴) | <i>Solanum aviculare</i> (۳) | |
| ۱۲۷- کنترل نماتدهای ریشه‌گرهای، در کاهش خسارت کدام بیماری مؤثرer است؟ | (۱) بلاست برنج
(۲) فوازاریوز گوجه‌فرنگی
(۳) لکه گرد چغندر قند | |
| ۱۲۸- کاهش نرخ رشد در مورد کدام بیماری، اهمیت بیشتری در میزان بیماری دارد؟ | (۱) لکه برگی سپتوريایی گندم
(۲) لکه آجری بادام
(۳) لکه قرمز آله | |

- ۱۲۹- کشت متراکم در کدام بیماری، باعث کاهش میزان بیماری می‌شود؟
- ۱) بادزدگی سیب‌زمینی
۲) پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه
۳) پوسیدگی پی‌تیومی طوقه و ریشه خیار
۴) سفیدک داخلی انگور
- ۱۳۰- براساس یافته‌های جدید، مهم‌ترین و مؤثرترین مکانیسم کنترل بیولوژیک در بیشتر گونه‌های *Trichoderma* کدام است؟
- ۱) آنتی‌بیوز
۲) پارازیتیسم
۳) رقابت
۴) مقاومت القایی

