

کد کنترل

469

A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

## رشته آمار – (کد ۲۲۳۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – مبانی آنالیز ریاضی – ریاضی عمومی ۱ و ۲ و احتمال ۱ و استنباط آماری ۱	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ مکان هندسی نقاط  $z = x + iy$  که در نامساوی  $|z - i| < 2$  صدق می‌کنند، کدام است؟ ( $i^2 = -1$ )

(۱) خارج دایره‌ای به مرکز  $(-\frac{5}{3}, 0)$  و شعاع  $\frac{4}{3}$

(۲) خارج دایره‌ای به مرکز  $(\frac{5}{3}, 0)$  و شعاع  $\frac{4}{3}$

(۳) خارج دایره‌ای به مرکز  $(-\frac{4}{3}, 0)$  و شعاع  $\frac{5}{3}$

(۴) خارج دایره‌ای به مرکز  $(\frac{4}{3}, 0)$  و شعاع  $\frac{5}{3}$

-۲ فرض کنید برای دو تابع چندجمله‌ای  $f$  و  $g$  داشته باشیم:

$$f(x) + g(x) = 5, \quad f(g(x)) = 8 - 4x$$

مجموعه مقادیر ممکن برای  $g(2)$  کدام است؟

(۱)  $\{1, -3\}$

(۲)  $\{-1, 3\}$

(۳)  $\{1, 3\}$

(۴)  $\{-1, -3\}$

-۳ ضابطه تابع  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  کدام باشد تا  $f$  روی  $\mathbb{R}$  پیوسته باشد؟ ([x] جزء صحیح  $x$  است).

$$f(x) = [x]^r + (x - [x] + 1)^r \quad (1)$$

$$f(x) = [x]^r + (x - [x])^r \quad (2)$$

$$f(x) = (x - [x])^r + (x - [x] + 1)^r \quad (3)$$

$$f(x) = (x - [x])^r + (x - [x] - 1)^r \quad (4)$$

- ۴ ناحیه درون سه‌می  $x^3 = y$  و نیمساز ربع اول را حول خط  $x = y$  دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل از این دوران کدام است؟

$$\frac{2\pi}{15} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{30} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{15} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{60} \quad (4)$$

- ۵ تابع  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^3 + xy + y^3} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$  در مبدأ مختصات  $f(x,y)$  را در نظر بگیرید. حاصل  $\nabla^2 f(x,y)$  کدام است؟

۳ (۴)

۳) تعریف نشده

۵ (۲)

۱) صفر

- ۶ حاصل انتگرال  $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(\pi x^3) dx dy$  کدام است؟

$$-\frac{2}{3\pi} \quad (1)$$

۰ (۲)

$$\frac{1}{3\pi} \quad (3)$$

$$\frac{2}{3\pi} \quad (4)$$

- ۷ کار انجام شده توسط نیروی  $\vec{F}(x,y,z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \vec{i} - \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \vec{j} + \vec{k}$  روی منحنی بسته

$z = (a > 0)x^2 + y^2 = a^2$  در صفحه  $x = z$  در جهت مثبت کدام است؟

۱) صفر

$$\frac{a^2}{a^2 + 1} \quad (2)$$

$$\frac{-a^2}{a^2 + 1} \quad (3)$$

$$\frac{-2a^2}{a^2 + 1} \quad (4)$$

- ۸ نیروی  $\vec{F}(x,y,z) = y^2\vec{i} - x^2\vec{j} - 3z^2\vec{k}$  بر سطح جانبی استوانه‌ای شکل  $S$  با ضابطه  $r = 2(1 + \cos\theta)$  محدود به صفات ۱ و  $z = 2$  جریان دارد. شارگذرا از سطح  $S$  کدام است؟
- (۱)  $-\pi$   
 (۲)  $\pi$   
 (۳) صفر  
 (۴)  $3\pi$
- ۹ فرض کنید  $\mathbb{R}$  مجموعه اعداد حقیقی با متر قدرمطلق باشد. گوییم  $A \subseteq \mathbb{R}$  عجیب است هرگاه زیرمجموعه بسته در  $\mathbb{R}$  و زیرمجموعه باز  $C$  در  $\mathbb{R}$  موجود باشند، به طوری که  $A = B \cap C$  کدام‌یک از مجموعه‌های زیر عجیب نیست؟
- (۱)  $[0,1)$   
 (۲) مجموعه اعداد گویا  
 (۳) یک مجموعه باز دلخواه در  $\mathbb{R}$   
 (۴) یک مجموعه باز دلخواه در  $\mathbb{R}$
- ۱۰ فرض کنید  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  یک تابع مشتق‌پذیر و برای هر  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(\frac{1}{n}) = 0$  می‌تواند صفر نباشد. کدام مورد درست است؟
- (۱)  $f(0) = f'(0) = 0$   
 (۲)  $f'(0) = 0$  می‌تواند صفر نباشد.  
 (۳)  $f'$  روى  $[0,1)$  کراندار است.
- ۱۱ فرض کنید  $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$  یک تابع پیوسته و بر  $(0,1)$  مشتق‌پذیر بوده و  $f(0) = f(1)$ . کدام مورد حتماً درست است؟
- (۱)  $c \in (0,1)$  موجود است به طوری که  $cf'(c) - f(c) = 0$   
 (۲)  $c \in (0,1)$  موجود است به طوری که  $f'(c) + f(c) = 0$   
 (۳)  $c \in (0,1)$  موجود است به طوری که  $cf'(c) + f(c) = 0$   
 (۴)  $c \in (0,1)$  موجود است به طوری که  $f'(c) - f(c) = 0$
- ۱۲ فرض کنید تغیر تابع پیوسته و دوبار مشتق‌پذیر  $f$  در نقطه  $x = 1$ , به سمت پایین باشد. اگر  $(1)$  ماکریم نسبی تابع  $f$  باشد، وضعیت تابع  $g(x) = f(x) + f(x^2) + f(x^4)$  در  $x = 1$  چگونه است؟
- (۱) می‌نییم نسبی است.  
 (۲) ماکریم نسبی است.  
 (۳) نقطه عطف است.  
 (۴) هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
- ۱۳ فرض کنید  $A$  یک زیرمجموعه فضای متریک  $(M,d)$  باشد.  $A$  بی‌نقص نامیده می‌شود، هرگاه بسته و هر عنصر آن یک نقطه حدی باشد. کدام مورد درست است؟
- (۱) مجموعه  $\{2\} \cup \{1\} \cup \{0\}$  در فضای  $\mathbb{R}$  و متریک معمولی بی‌نقص است.  
 (۲) مجموعه  $\mathbb{Q} \cap [0,1]$  در فضای  $\mathbb{Q}$  و متریک معمولی بی‌نقص است.  
 (۳) هر مجموعه بسته در فضای  $\mathbb{R}$  بی‌نقص است.  
 (۴) مجموعه‌های بی‌نقص در هر فضای متریک، شمارش ناپذیرند.

- ۱۴- ۹۰ بلیط بخت آزمایی توسط ۹ نفر و هر کدام ۱۰ بلیط خریداری می‌شود که شامل ۵ بلیط برنده است. احتمال اینکه هر ۵ بلیط برنده را یک نفر دریافت کند، کدام است؟

$$\frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{86 \times 87 \times 88 \times 89} \quad (1)$$

$$\frac{6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10}{86 \times 87 \times 88 \times 89 \times 90} \quad (2)$$

$$\frac{6 \times 7 \times 9 \times 10}{86 \times 88 \times 89 \times 90} \quad (3)$$

$$\frac{7 \times 8 \times 9}{87 \times 88 \times 89} \quad (4)$$

- ۱۵- فرض کنید  $R$  دامنه تغییرات و  $Q_1, Q_2$  و  $Q_3$  به ترتیب چارک‌های اول، دوم و سوم داده‌ها باشند. کدام شاخص جزء شاخص‌های پراکندگی غیرحساس به داده‌های دور افتاده (پرت) است؟

$$\frac{R}{Q_2} \quad (1)$$

$$\frac{Q_3 - Q_1}{R} \quad (2)$$

$$\frac{Q_3 + Q_1}{Q_2} \quad (3)$$

$$\frac{Q_3 - Q_1}{Q_2} \quad (4)$$

- ۱۶- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  ( $n \geq 2$ ) یک نمونه تصادفی از توزیعی پیوسته با تابع توزیع  $F$  باشد، احتمال اینکه دو مین آماره ترتیبی کوچکتر یا مساوی میانه توزیع باشد، چقدر است؟

$$1 - \frac{n}{2^n} \quad (1)$$

$$1 - \frac{n+1}{2^n} \quad (2)$$

$$1 - \frac{n-1}{2^{n-1}} \quad (3)$$

$$1 - \frac{n}{2^{n-1}} \quad (4)$$

- ۱۷- اگر  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت استاندارد باشند ( $X, Y \sim U(0, 1)$ ), آنگاه

$$P[(1-X)(1-Y) > \frac{1}{4}]$$

$$\frac{3 + 2\ln(2)}{4} \quad (1)$$

$$\frac{3 + \ln(2)}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3 - \ln(2)}{4} \quad (3)$$

$$\frac{3 - 2\ln(2)}{4} \quad (4)$$

- ۱۸- فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی گسسته با تابع جرم احتمال

$$P(X = x, Y = y) = \begin{cases} c(x+y) & x, y \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{سایر مقادیر} \end{cases}$$

$$\frac{1}{n} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2n} \quad (2)$$

$$\frac{n-1}{2n} \quad (3)$$

$$\frac{n-1}{n} \quad (4)$$

- ۱۹- در ظرفی تعدادی مهره سفید و آبی وجود دارد. نسبت مهره‌های آبی ( $\theta$ ) یک متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال

$(g(\theta))$  است. اگر دو مهره با جایگذاری برداریم و  $E$  و  $F$  به ترتیب پیشامد آبی بودن مهره اول و دوم باشد، آنگاه:

$$P(E \cap F) < P(E)P(F) \quad (1)$$

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) \quad (2)$$

$$P(E \cap F) > P(E)P(F) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}P(E)P(F) < P(E \cap F) < P(E)P(F) \quad (4)$$

- ۲۰- فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل به ترتیب با تابع توزیع تجمعی ( $F(x)$  و  $G(y)$  باشند. اگر

$$B = \int_1^{\infty} (1 - G(x)) dF(x) \quad \text{و} \quad A = \int_1^{\infty} (1 - F(y)) dG(y)$$

$$P(X > 1, Y > 1) \quad (1)$$

$$P(X > Y > 1) \quad (2)$$

$$P(Y > X > 1) \quad (3)$$

$$P(X > 1) + P(Y > 1) \quad (4)$$

- ۲۱- فرض کنید تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی  $W$  به صورت  $M_W(t) = e^{-3+3e^t} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^t\right)^3$  باشد، مقدار

$P(W \leq 1)$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲)  $e^{-3}$

(۳)  $\frac{46}{27}e^{-3}$

(۴)  $\frac{44}{27}e^{-3}$

- ۲۲- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان نمایی با میانگین ۱ باشند. مقدار

$\rho(\max(X, Y), \min(X, Y))$  چقدر است؟

(۱) صفر

(۲)  $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(۳)  $\frac{1}{5}$

(۴) ۱

- ۲۳- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل پواسون به ترتیب با پارامترهای  $\lambda$  و  $2\lambda$  باشند، مقدار

$E(X^2 + Y^2 | X + Y = m)$  کدام است؟

(۱)  $\frac{4m^2}{9}$

(۲)  $\frac{5m^2}{9}$

(۳)  $\frac{4m^2 + 5m}{9}$

(۴)  $\frac{5m^2 + 4m}{9}$

- ۲۴- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک مجموعه از متغیرهای تصادفی پیوسته مستقل و نامتفاوت و  $I_{p_1}, \dots, I_{p_n}$  نیز یک مجموعه از متغیرهای تصادفی برنولی مستقل از هم و مستقل از  $X_i$  ها باشند که در آن  $E(I_{p_i}) = p_i$  است و

$Y_{n:n} = \max\{X_1 I_{p_1}, \dots, X_n I_{p_n}\}$  کدام است؟ (۱). تابع توزیع  $Y_{n:n}$  (۲). تابع توزیع  $X_i$  (۳). تابع توزیع  $I_{p_i}$  (۴).

$$\prod_{i=1}^n [1 - p_i \bar{F}_{X_i}(x)]$$
 (۱)

$$\prod_{i=1}^n [1 - (1 - p_i) \bar{F}_{X_i}(x)]$$
 (۲)

$$\prod_{i=1}^n [1 - p_i F_{X_i}(x)]$$
 (۳)

$$\prod_{i=1}^n [1 - (1 - p_i) F_{X_i}(x)]$$
 (۴)

۲۵- فرض کنید  $(1 \leq n \leq 6)$  دارای توزیع پواسون با پارامتر  $\frac{n}{X_n^2 + 2n^2}$  باشد. در این صورت دنباله  $T_n = \frac{n X_n}{X_n^2 + 2n^2}$  در احتمال

به کدام مقدار میل می‌کند؟

۱) ۰

۲)  $\frac{2}{9}$

۳)  $\frac{1}{3}$

۴) ۴

۲۶- فرض کنید  $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع نرمال دو متغیره با میانگین‌های یکسان صفر و واریانس‌های یکسان ۱ و کوواریانس  $\theta$  باشد. اگر:

$$T_1 = \sum_{i=1}^n X_i \quad T_2 = \sum_{i=1}^n Y_i \quad T_3 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad T_4 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 \quad T_5 = \sum_{i=1}^n X_i Y_i$$

کدام گزینه صحیح است؟

۱) آماره فرعی  $(T_1, T_2)$  است.

۲) آماره فرعی  $(T_2, T_3, T_1, T_4)$  است.

۳) آماره فرعی هستند ولی  $(T_3, T_1, T_4)$  آماره فرعی نیستند.

۴) آماره فرعی هستند ولی  $(T_3, T_4)$  آماره فرعی نیست.

۲۷- فرض کنید  $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع نرمال دو متغیره‌ای باتابع چگالی توام زیر باشد.

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\pi\theta^2} I_{(0, \theta)}(\sqrt{x^2 + y^2})$$

آماره بسنده کامل کدام است؟

$$X_{(n)}^2 + Y_{(n)}^2 \quad (1)$$

$$\max_{i=1, \dots, n} (X_i^2 + Y_i^2) \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i^2 + Y_i^2) \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{X_i^2 + Y_i^2} \quad (4)$$

- ۲۸- فرض کنید متغیر تصادفی  $X$  دارای توزیع برآورده گشته اوری  $\theta$  باشد.  $f(x) = \binom{x+3}{3} \theta^4 (1-\theta)^x$ ,  $x = 0, 1, 2, \dots$  باشند، کدام است؟ وقتی که مشاهدات برابر  $2, 5, 3, 2, 3, 2$  باشند،

- (۱)  $\frac{4}{7}$   
 (۲)  $\frac{3}{7}$   
 (۳)  $\frac{3}{4}$   
 (۴)  $\frac{1}{3}$

- ۲۹- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت  $U(\theta, \theta+1)$  باشد. برآورده گر ماکسیمم درستنمایی پارامتر  $\theta \in R - \{0\}$  برای زمانی که  $X_i > 0$  باشند، عبارتست از:

- (۱)  $\frac{X_{(1)}}{2}$   
 (۲)  $X_{(n)}$   
 (۳)  $X_{(1)}$   
 (۴)  $\frac{X_{(n)}}{2}$

- ۳۰- فرض کنید تابع چگالی متغیر تصادفی  $X$  به صورت  $f_\theta(x) = 2\theta^2 x + 1 - \theta^2$ ,  $0 < x < 1$ ,  $-1 \leq \theta \leq 1$  باشد. براساس تک مشاهده  $x$ , برآورده گر درستنمایی ماکزیمم  $\theta$  کدام است؟

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \geq \frac{1}{2} \\ -1 & x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \quad (۲)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1, -1 & x > \frac{1}{2} \\ c \in [-1, 1] & x = 0 \\ 0 & x < \frac{1}{2} \end{cases} \quad (۱)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1, -1 & x < \frac{1}{2} \\ c \in [-1, 1] & x = \frac{1}{2} \\ -1 & x < \frac{1}{2} \end{cases} \quad (۴)$$

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & x \geq \frac{1}{2} \\ 0 & x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \quad (۳)$$

- ۳۱ فرض کنید  $x$  یک تک مشاهده از توزیع باتابع چگالی  $f_{\theta}(x)$  باشد، که

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & [x] = \theta \\ \frac{2}{3} & [x] = \theta + 1 \end{cases} \quad \theta \in \{1, 2, \dots\}$$

در آن  $\theta$  یک عدد صحیح مثبت است. برآورده مکسیمم درستنمایی  $\hat{\theta}$  کدام است؟

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1 & 1 \leq x < 2 \\ [x] - 1 & x \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$x - 1 \leq a < x \quad \hat{\theta} = a \quad (2)$$

$$x - 1 < a \leq x \quad \hat{\theta} = a \quad (3)$$

$$\hat{\theta} = [x] \quad (4)$$

- ۳۲ فرض کنید  $n$  متغیر تصادفی مستقل باشد به گونه‌ای که  $X_i \sim N(\theta, \frac{\theta^2}{i})$ . در صورت وجود،

بهترین برآورده نااریب  $\hat{\theta}$  کدام است؟

$$\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i=1}^n i X_i^2} \quad (2)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{2}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sum_{i=1}^n i |X_i| \quad (1)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{2}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{\sum_{i=1}^n i X_i^2} \quad (4)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{2}} \sum_{i=1}^n i |X_i| \quad (3)$$

- ۳۳ فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی دوتایی از تابع احتمال  $P(X=x) = \frac{\theta^x}{x!(e^\theta - 1)}$  باشد.

کدام  $h(T)$  برآورده UMVU برای  $\theta$  است؟

$$\sum_{i=1}^{T-1} \frac{1}{i!(T-i)!} \left/ \sum_{i=1}^{T-2} \frac{1}{i!(T-1-i)!} \right.; T = 3, 4, \dots \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{T-1} \frac{1}{i!(T-1-i)!} \left/ \sum_{i=1}^{T-1} \frac{1}{i!(T-i)!} \right.; T = 3, 4, \dots \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^T \frac{1}{i!(T-i)!} \left/ \sum_{i=1}^T \frac{1}{i!(T-1-i)!} \right.; T = 3, 4, \dots \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^T \frac{1}{i!(T-1-i)!} \left/ \sum_{i=1}^T \frac{1}{i!(T-i)!} \right.; T = 3, 4, \dots \quad (4)$$

- ۳۴- فرض کنید  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  یک نمونه تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال یکسان

$$f(y) = \frac{\theta}{2(1+y)^{\theta+1}}, \theta > 0, y \in \mathbb{R}$$

پارامتر  $\theta$  کدام است؟

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+|Y_i|} \quad (1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+|Y_i|) \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1+|Y_i|) \quad (3)$$

$$-\frac{1}{n} \sum \ln(|Y_i|) \quad (4)$$

- ۳۵- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی  $n$  تایی از توزیع  $N(\mu, \theta)$  باشند. برآورده  $UMVU$  پارامتر  $\sqrt{\theta}$  کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2} \quad (1)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\sqrt{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})} \sqrt{|\sum_{i=1}^n X_i|} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{|\sum_{i=1}^n X_i|} \quad (3)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\sqrt{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})} \sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2} \quad (4)$$

- ۳۶- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع لگ نرمال با تابع چگالی  $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{1}{2\theta}(\ln x)^2}$

$$f_\theta(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{1}{2\theta}(\ln x)^2}$$

باشد، اطلاع فیشر پارامتر  $\theta$  کدام است؟

$$n\theta^2 \quad (2)$$

$$\frac{n}{2\theta^2} \quad (1)$$

$$\frac{2}{n}\theta \quad (4)$$

$$\frac{n}{2\theta} \quad (3)$$

- ۳۷ - فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی باشند، به طوری که:

$$X_i = \ln(Y_i) \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$$

همچنین فرض کنید  $Y_{(1)}, \dots, Y_{(n)}$  بیانگر آماره‌های مرتب متناظر با  $Y_1, \dots, Y_n$  باشند. برآوردگر

$$T = \left\{ \prod_{i=1}^n Y_{(i)} \right\}^{\frac{1}{n}} \quad (1)$$

$$e^{\mu} \quad (2)$$

$$e^{\mu} \quad (3)$$

$$\sigma^2 \quad (4)$$

- ۳۸ - فرض کنید  $X$  دارای توزیع برنولی با پارامتر  $\theta$  باشد. تحت تابع زیان توان دوم خطای مخاطره برآوردگر تصادفی شده زیر کدام است؟

$$T(X) = \begin{cases} X & \text{با احتمال} \\ \frac{1}{2} & \text{با احتمال} \\ 1-X & \end{cases}$$

$$\frac{1-\theta}{4} \quad (1)$$

$$\frac{\theta(1-\theta)}{4} \quad (2)$$

$$\theta \left( \theta^2 + (\theta - \frac{1}{2})^2 \right) \quad (3)$$

$$(1-\theta) \left( \theta^2 + (\theta - \frac{1}{2})^2 \right) \quad (4)$$

- ۳۹ - فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $U(0, \theta)$  باشد. اگر توزیع پیشین  $(3, 4)$  و تابع زیان برابر باشد، برآوردگر بیز  $\theta$  کدام است؟

$$(\theta \sim Pa(\alpha, \sigma) \rightarrow \pi(\theta) = \frac{\alpha \sigma^\alpha}{\theta^{\alpha+1}}, \theta \geq \sigma)$$

$$\frac{n+1}{n+2} \max(\mathfrak{x}, X_{(n)}) \quad (1)$$

$$\frac{n+3}{n+2} \max(\mathfrak{x}, X_{(n)}) \quad (2)$$

$$\frac{n+2}{n+3} \max(\mathfrak{x}, X_{(n)}) \quad (3)$$

$$\frac{n+2}{n+1} \max(\mathfrak{x}, X_{(n)}) \quad (4)$$

- ۴۰ فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $U(\theta, \theta + 1)$  باشد. اگرتابع چگالی پیشین (ناسره)

$$\pi(\theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\theta}, \quad \theta > 0$$

$$\frac{4}{3} X_{(5)} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} X_{(5)} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} X_{(5)} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} X_{(5)} \quad (4)$$

- ۴۱ فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $P(\lambda)$  باشد. با درنظر گرفتن تابع توان دوم خطای توزیع پیشین (ناسره) جفریز، برآوردگر بیز تعیین یافته کدام است؟

$$\bar{X} \quad (1)$$

$$X + \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\bar{X} + \frac{1}{2n} \quad (3)$$

$$\bar{X} + \frac{1}{n} \quad (4)$$

- ۴۲ فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع نمایی با میانگین  $\frac{1}{\lambda}$  باشد. با درنظر گرفتن تابع زیان

$$L(\lambda, \delta) = (\frac{\delta}{\lambda} - 1)^2 \quad \text{و} \quad V(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\bar{X} + \frac{2}{n} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\bar{X} + \frac{1}{2n}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\bar{X} + \frac{2}{n}} \quad (3)$$

$$\bar{X} + \frac{1}{2n} \quad (4)$$

- ۴۳- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $P(\lambda)$  باشد. با در نظر گرفتنتابع توان دوم خطای وزنی با

$$\text{وزن} = \frac{1}{\lambda} w(\lambda), \text{ گزینه صحیح کدام است؟}$$

۱)  $\bar{X}$  نمی‌تواند یک برآورده بیز، نسبت به یک توزیع پیشین سره باشد، همچنین مجاز نیست ولی یک برآورده مینماکس برای  $\lambda$  است.

۲)  $\bar{X}$  یک برآورده بیز، مینماکس برای  $\lambda$  است، اما مجاز نیست.

۳)  $\bar{X}$  یک برآورده بیز و مجاز برای  $\lambda$  است، اما مینماکس نیست.

۴)  $\bar{X}$  نمی‌تواند یک برآورده بیز، نسبت به یک توزیع پیشین سره باشد، اما یک برآورده مینماکس و مجاز برای  $\lambda$  است.

- ۴۴- با فرض  $R(\theta, \delta)$  نمایانگر مخاطره  $\delta$  و  $r(\pi, \delta)$  نمایانگرتابع مخاطره بیز  $\delta$  باشد و  $\pi$ تابع چگالی احتمال پیشین،  $\delta_\pi$  برآورده بیز نسبت به  $\pi$  باشد.  $\Psi$  نمایانگر تمام توزیع‌های پیشین (سره) باشد،  $\delta_\pi$  یک برآورده مینماکس است، اگر:

$$r(\pi, \delta_\pi) \leq R(\theta, \delta_\pi), \forall \theta \in \Theta \quad (1)$$

$$R(\theta, \delta_\pi) \leq r(\pi, \delta_\pi), \forall \theta \in \Theta \quad (2)$$

$$\sup_{\theta} R(\theta, \delta_\pi) \geq \sup_{\pi \in \Psi} r(\pi, \delta) \quad (3)$$

$$\sup_{\theta} R(\theta, \delta_\pi) \geq \inf_{\pi \in \Psi} r(\pi, \delta) \quad (4)$$

- ۴۵- مسئله تصمیم زیر را در نظر بگیرید.

		A						X					
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>			x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>				
		θ <sub>1</sub>	2	1	2	4	θ <sub>1</sub>	0/2	0/8				
		θ <sub>2</sub>	4	3	2	3	θ <sub>2</sub>	0/6	0/4				

کدام‌یک از قاعده‌های تصمیم‌های ناتصادفی زیر قطعاً و بدون نیاز به محاسبه غیرمجاز (ناپذیرفتی) هستند؟

D x	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	d <sub>10</sub>	d <sub>11</sub>	d <sub>12</sub>	d <sub>13</sub>	d <sub>14</sub>	d <sub>15</sub>	d <sub>16</sub>
x <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>4</sub>	
x <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	

$$d_1, d_4, d_7, d_{10}, d_{13}, d_{16} \quad (1)$$

$$d_1, d_5, d_9, d_{13} \quad (2)$$

$$d_1, d_5, d_6, d_8, d_{10}, d_{12}, d_{14}, d_{16} \quad (3)$$

$$d_1, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8, d_{10}, d_{11}, d_{13}, d_{14}, d_{15}, d_{16} \quad (4)$$



