

کد کنترل

168

F



168F

آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد ۲۴۱۲)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سؤال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: - شیمی مواد غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی - میکروبیولوژی صنعتی - خواص فیزیکی مواد غذایی - روش‌های نوین آزمایشگاهی - انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی	۸۰	۱	۸۰	۱۲۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ واکنش دیلز - آlder (Diels- Alder) منجر به تولید کدام ترکیبات در روغن می‌شود؟

- (۱) آکرولئین (۲) ترکیبات پلیمری (۳) گاما‌لاکتون (۴) متیل‌کتون‌ها

-۲ شرایط اسیدی بر تجزیه کدام دسته از رنگدانه‌ها اثر بیشتری دارد؟

- (۱) بتالائین‌ها (۲) کاروتونوئیدها (۳) کلروفیل‌ها (۴) میوگلوبین‌ها

-۳ بخش پروتئینی به شکل میسل‌های کلئیدی کروی همراه فسفات کلسیم که به صورت منومرهایی با پیوند دی‌سولفیدی به هم متصل شده‌اند، کدام است؟

- (۱) آلفاکاربئین (۲) بتاکاربئین (۳) پروتئین‌های سرم شیر (۴) کاپاکازئین

-۴ کدام ترکیب سلطان‌زا از هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای است که در غذاهای دود داده و کباب کرده دیده می‌شود؟

- (۱) آزبست (۲) آلکالوئید (۳) ۳ و ۴-بنزپیرن (۴) گلوکوزینولات

-۵ کدام آمینواسید به طور معمول در کاهش واکنش‌های قهقهه‌ای آنزیمی مؤثر است؟

- (۱) سیستئین (۲) فنیل‌آلانین (۳) گلیسین (۴) لیزین

-۶ از پایدارترین ویتامین‌ها که از منبع حیوانی بوده و نقش جذب و تحرک کلسیم و فسفر از روده، استخوان و گلیه را بازی می‌کند، کدام است؟

- (۱) آلفا-کوفرول (۲) رتینول (۳) کوله‌کلسیفرول (۴) منادیون

-۷ در کدام تبدیل، گرما موجب کاهش سختی آب می‌شود؟

- (۱) بی‌کربنات‌ها به کربنات‌های کلسیم (۲) سختی کربنات‌ه و غیرکربنات‌ه به فسفات کلسیم

- (۳) سختی کربنات‌ه و غیرکربنات‌ه به سولفات کلسیم (۴) کربنات‌ها به بی‌کربنات‌های کلسیم

-۸ کدام واکنش مربوط به تبدیل کلروفیل به فُوفوربید است؟

- (۱) کلروفیل تحت تأثیر اسید یا باز و یا از دست دادن منیزیم

- (۲) کلروفیل تحت تأثیر اسید و با از دست دادن منیزیم

- (۳) کلروفیل در مجاورت آنزیم کلروفیلаз و با از دست دادن فیتول

- (۴) کلروفیل تحت تأثیر اسید قوی و با از دست دادن فیتول و منیزیم

-۹ پلارگونیدین و گزانتوفیل به ترتیب جزء کدام دسته رنگدانه‌ها هستند؟

- (۱) آنتوسیانین‌ها و آنتوسیانین‌ها (۲) آنتوسیانین‌ها و کاروتونوئیدها

- (۳) کاروتونوئیدها و کاروتونوئیدها (۴) کاروتونوئیدها و آنتوسیانین‌ها

-۱۰ استفاده از کدام آنزیم می‌تواند منجر به حصول حدود $DE = 100$ در هیدرولیز نشاسته شود؟

- (۱) آلفا‌امیلаз (۲) ایزو‌امیلاز (۳) بتا‌امیلاز (۴) گلوکو‌امیلاز

- ۱۱ کدام میکرووارگانیسم باعث سبز شدن گوشت های DFD بسته بندی شده تحت خلا در اثر نگهداری طولانی مدت می شود؟
- Yersinia enterocolitica* (۲) *Lactobacillus* sp. (۱)
- Shewanella putrefaciens* (۴) *Serratia liquefaciens* (۳)
- ۱۲ کدام روش می تواند به عنوان پیش تیمار در افزایش حساسیت تشخیص میکرووارگانیسم ها به کار رود؟
- Immunomagnetic Separation (۱)
Immunofluorescence Assay (۲)
Metabolic Fingerprint (۳)
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (۴)
- ۱۳ کدام مورد جزء ویژگی شاخص میکروب های توموفیل است؟
- (۱) مولد آنزیم نیستند.
(۲) فاز Lag کوتاه است.
(۳) فاز Lag طولانی است.
(۴) ترکیبات آنتی باکتریال تولید می کنند.
- ۱۴ آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت توسط کدام میکروب تولید می شود؟
- Ps. aeruginosa* (۲) *B. subtilis* (۱)
- B. Thermoproteolyticus* (۴) *B. Stearothermophilus* (۳)
- EPEC (۴) EHEC (۳) ETEC (۲) EIEC (۱)
- ۱۵ (عامل اسهال خونی) به کدام مورد تعلق دارد؟
- E. coli* 0157:H7 (۱)
- ۱۶ در روش استفاده از میدان الکتریکی برای از بین بردن میکرووارگانیسم ها، کدام مورد باعث مرگ میکرووارگانیسم ها می شود؟
- (۱) ایجاد حفراتی در غشاء سیتوپلاسمی و تخلیه مواد درون سلولی
(۲) اکسیده شدن ترکیبات سازنده سلولی
(۳) تخریب ماده ژنتیکی سلول های میکروبی
(۴) دگرگون شدن پروتئین های سلولی
- ۱۷ محیط کشت اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس کدام است؟
- PDA (۲) TSA (۱)
- TSA + ٪٪ NaCl (۴) Lactose + Bile salt (۳)
- ۱۸ در فرایند آزمون سیمون سیترات، بروز کدام رنگ سبب مشبت شدن نتیجه آزمایش می شود؟
- (۱) آبی (۲) زرد (۳) قرمز (۴) نارنجی
- ۱۹ فساد Dry rot و Neck rot توسط کدام میکرووارگانیسم ایجاد می شود؟
- (۱) آلترا ناریا (۲) فوزاریوم (۳) بوتریتیس (۴) کلادوسپوریوم
- ۲۰ کدام گونه جهت رشد در مواد غذایی کمترین نیاز به آب را دارد؟
- Debaryomyces hasenii* (۲) *Aspergillus glaucus* (۱)
- Xeromyces bisporus* (۴) *Walemia sebi* (۳)
- ۲۱ کدام پمپ از تبدیل انرژی سرعتی به انرژی استاتیک، ارتفاع ایجاد می کند؟
- (۱) دورانی (۲) دیافراگمی (۳) پیستونی (۴) سانتریفیوژ
- ۲۲ در جداسازی با استفاده از سرسره مارپیچی از کدام خصوصیت استفاده می شود؟
- (۱) اندازه (۲) دانسیته (۳) خصوصیت سطحی (۴) شکل
- ۲۳ برای تهیه ۱۰۰ کیلوگرم محلول ساکارز ۲۲ درصد به ترتیب چه مقدار از محلول آبی ساکارز ۱۰ و ۵ درصد مورد نیاز است؟
- (۱) ۴۵ و ۶۵ (۴) ۴۰ و ۶۰ (۳) ۲۰ و ۷۰ (۲) ۲۵ و ۷۵ (۱)

- ۲۴- کدام مورد برای تغليظ شیر بدون از دست دادن ترکيبات مغذي استفاده می‌شود؟
 Ultra filtration (۴) Vacuum filtration (۳) Micro filtration (۲) Osmosis (۱)
- ۲۵- کدام مورد روش انتقال حرارت از بخار به دیواره قوطی، در دیواره قوطی و در درون قوطی آب میوه را به ترتیب درست مشخص می‌کند؟
 Slow transfer, conduction, Slow convection (۱)
 Convection, conduction, condensation (۲)
 Convection, conduction, convection (۳)
 Conduction, convection, conduction (۴)
- ۲۶- برای محاسبه ضریب انتقال حرارت کنوکسیونی از ترکیب کدام اعداد بدون بعد استفاده می‌شود؟
 (۱) اشمیت، رینولدز و شروود
 (۲) فوریه، رینولدز و پرانتل
 (۳) ناسلت، رینولدز و پرانتل
 (۴) ناسلت، رینولدز و شروود
- ۲۷- مقدار رطوبت ۱۵ کیلوگرم محصول در یک مرحله از تولید ۲۰ درصد برمبنای ماده خشک است. مقدار کل آب موجود در این محصول چند کیلوگرم است؟
 (۱) ۲,۵ (۲)
 (۲) ۳,۵ (۴)
 (۳) ۳
- ۲۸- کدام مورد در ارتباط با انتقال حرارت هدایتی درست است؟
 (۱) هم در جامدات و هم در سیالات می‌تواند صورت گیرد.
 (۲) هنگام تماس یک سیال با سطح جامد صورت می‌گیرد.
 (۳) منحصرآ در جامدات صورت می‌گیرد.
 (۴) منحصرآ در سیالات صورت می‌گیرد.
- ۲۹- کدام مورد معرف Suction Lift است؟
 (۱) میزان بلندی است که سیال از یک سطح پایین‌تر به مرکز پمپ، پمپ می‌شود.
 (۲) میزان ارتفاعی است که سیال از مرکز پمپ به یک سطح پایین‌تر، پمپ می‌شود.
 (۳) میزان بلندی است که سیال از یک سطح بالاتر به مرکز پمپ، پمپ می‌شود.
 (۴) همان ارتفاع مکش است.
- ۳۰- دانسیته جامد کدام ماده غذایی بیشتر است؟
 (۱) آب دارای ۲ درصد ساکارز
 (۲) چربی
 (۳) ساکارز
 (۴) نمک
- ۳۱- اگر پس از انجام فرایند حرارتی و قبل از عملیات سرد کردن قوطی‌ها، قسمت درب و کف قوطی‌ها حالت باد گرده داشته باشند، دلیل احتمالی آن کدام است؟
 (۱) فعالیت میکروبی
 (۲) بازگردان نادرست اتوکلاو
 (۳) درصد پری کم و سر فضای بیش از حد کنسرو
 (۴) تأثیر اسید محصول بر روی دیواره قوطی و ایجاد گاز هیدروژن در قوطی

- ۳۲- سوما در سیکل تبرید از تغییر فاز ایجاد می‌شود.
- (۱) گاز سرمaza به مایع در کمپرسور
 - (۲) گاز سرمaza به مایع در شیر انبساط
 - (۳) گاز سرمaza به مایع در کندانسور
 - (۴) مایع سرمaza به گاز در اوپرتور
- ۳۳- در منحنی فارینوگرام هرچه ذرات زبرتو و سخت‌تر باشند,
- (۱) درجه نرم شدن خمیر بیشتر می‌شود.
 - (۲) زمان رسیدن، کوتاه‌تر می‌شود.
 - (۳) زمان رسیدن طولانی‌تر خواهد شد.
 - (۴) مقاومت خمیر کوتاه‌تر خواهد شد.
- ۳۴- آرد کدام محصول را می‌توان به جای آرد گندم برای بیماران سیلیاگی جایگزین کرد؟
- (۱) برنج
 - (۲) چاودار
 - (۳) سمولینا
 - (۴) گندم سیاه
- ۳۵- اگر از گندمی با ظاهری مات و آردی (گندم نرم) برای تهیه آرد نانوایی استفاده شود، کدام راهکار برای بهبود کیفیت خمیر و محصول نهایی بهتر است؟
- (۱) افزایش زمان تخمیر
 - (۲) استفاده از آنزیم پروتئاز و بهبوددهنده
 - (۳) استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز
 - (۴) کاهش میزان نمک فرمولاسیون نان
- ۳۶- در آرد کدام فراورده‌ها وجود مقادیر بیشتر نشاسته آسیب دیده مطلوب است؟
- (۱) بیسکویت و کراکر
 - (۲) پاستا و نودل
 - (۳) کیک و کوکی
 - (۴) نان‌های تخمیری
- ۳۷- کدام مورد درباره سلول‌های لایه آلورون درست است؟
- (۱) خارجی‌ترین لایه آندوسپرم، دارای دیواره ضخیم، مکعبی شکل و عاری از نشاسته هستند.
 - (۲) بخشی از اسکوتلوم بوده و مانند یک عضو ذخیره‌ای به هنگام رشد دانه عمل می‌کنند.
 - (۳) بخشی از پوشش دانه، دارای نشاسته قابل توجه، کروی‌شکل و دیواره نازک هستند.
 - (۴) محل تجمع رنگریزه‌های کاروتونوئیدی بوده و در آن‌ها مقدار فیتات اندک اما مقدار خاکستر زیاد است.
- ۳۸- معمولاً در تولید سورجات تخمیری در کدام محدوده غلظت نمک، روند تخمیر مناسب است؟
- (۱) ۱۵-۱۶ درصد
 - (۲) ۱۰-۶ درصد
 - (۳) آب نمک اشباع
 - (۴) کمتر از ۲ درصد
- ۳۹- کدام ترکیب باعث دیرتر خشک‌شدن محصول می‌شود؟
- (۱) سلولز
 - (۲) شکر
 - (۳) کربوهیدرات‌ها
 - (۴) همی سلولز
- ۴۰- کدام ترتیب عملیات (چپ به راست) برای تولید کنسرو نخودفرنگی مناسب‌تر است؟
- (۱) Sorting & Grading, Peeling, Blanching, Filling, Exhausting
 - (۲) Sorting & Grading, Blanching, Peeling, Filling, Exhausting
 - (۳) Sorting & Grading, Blanching, Exhausting, Filling
 - (۴) Sorting & Grading, Blanching, Filling, Exhausting
- ۴۱- کدام مورد، درباره وظيفة ترکیبات محافظ انجمادی نادرست است؟
- (۱) ممانعت از شوک‌های اسمزی
 - (۲) جلوگیری از کریستالیزاسیون آب
 - (۳) حفظ انعطاف‌پذیری دیواره و غشاء سیتوپلاسمی
 - (۴) ممانعت از شوک اکسیداتیو و کربستالیزاسیون چربی‌ها و تغییر E_h
- ۴۲- به منظور جلوگیری از بازگشت DNA در روش‌های موتابزایی با UV از کدام ترکیبات استفاده می‌شود؟
- (۱) اگزالیک اسید و کاتچین
 - (۲) اسکوربیک اسید و بتاکاروتین
 - (۳) نالیدیکسیک اسید و کافئین
 - (۴) مالیک اسید و سیتریک اسید

- ۴۳- کدام ترکیب به عنوان آنتی فوم در بیوراکتورهای میکروبی به کار می رود؟
 ۱) آنتی اکسیدان ها ۲) اسیدهای ارگانیک ۳) پلی ساکاریدها
- ۴۴- کدام مورد در فرایند موتاسیون شیمیایی میکروب ها استفاده می شود؟
 TBHQ (۴) NTG (۳) BHT (۲) BHA (۱)
- ۴۵- منظور از Down stream processing در فرایند تخمیر چیست؟
 ۱) تخلیص فرآورده ۲) بازیافت محصول ۳) عملیات بالادستی ۴) مدیریت پسماند
- ۴۶- برای رسیدن به نژادهای اصلاح شده میکروبی معمولاً از چه طول موج هایی از UV استفاده می شود؟
 ۱) ۱۸۸nm ۲) ۲۵۴nm ۳) ۳۲۸nm ۴) ۴۲۰nm
- ۴۷- در فرایند تلقیح انتخاب میکرووارگانیسم و انتقال آن از کدام فاز مرحله رشد انجام می گیرد؟
 ۱) لگاریتمی ۲) تطبیق ۳) سکون ۴) هر سه مورد
- ۴۸- در فرایند تولید مخمر نانوایی به منظور جلوگیری از اثر گرابترا کدام تدبیر به کار می رود؟
 ۱) اضافه کردن مواد مغذی با سرعت ثابت ۲) اضافه کردن تمام مواد مغذی در آغاز تخمیر ۳) حذف ترکیبات سولفیدی از سوبستراٹ تخمیر
- ۴۹- گستردگی ترین حشره کش میکروبی کدام است؟
 Pseudomonas putida (۲) Bacillus thuringiensis (۱)
 Thiobacillus spp. (۴) Sulfolobus spp. (۳)
- ۵۰- کدام فرایند در مرحله پایین دستی طرح های بیوتکنولوژی انجام می پذیرد؟
 ۱) انتخاب میکرووارگانیسم ۲) بهینه سازی محیط کشت ۳) استخراج
- ۵۱- کدام مورد در ارتباط با ضریب اصطکاک دینامیک و استاتیک درست است؟
 ۱) $\mu_d < \mu_s$ ۲) $\mu_d \leq \mu_s$ ۳) $\mu_d > \mu_s$
- ۵۲- کدام مورد می تواند خاصیت Rheopectic داشته باشد؟
 ۱) کچاپ با ویسکوزیته بالا ۲) مخلوط شیره و ارده ۳) مقدار مشخص شکر در آب
- ۵۳- ویسکوزیته شیر در اثر حرارت چگونه تغییر می کند؟
 ۱) کم می شود. ۲) زیاد می شود. ۳) تغییر نمی کند.
- ۵۴- Shear thining نسبت به زمان را می گویند.
 Thixotropy (۴) Rehopectic (۳) Pseudoplastic (۲) Non Viscous (۱)
- ۵۵- کدام مورد، Bulk Modulus را برای یک نمونه داخل آب مشخص می کند؟
 ۱) کرنش حجمی تقسیم بر فشار هیدرولیکی اطراف نمونه
 ۲) Bulk Stress تقسیم بر فشار هیدرولیکی اطراف نمونه
 ۳) فشار هیدرولیکی وارد بر نمونه بر Bulk Strain
 ۴) Bulk Stress تقسیم بر Bulk Strain
- ۵۶- نیروی مقابله با اصطکاک لایه ها در مایعات، مشابه کدام نیرو در جامدات است?
 Torsion (۴) Tensile (۳) Shear (۲) Impact (۱)

-۵۷- کدام مایعات حالت Non-Newtonian دارند؟

- (۱) رابطه Shear rate و Shear stress خطی است و منحنی آن از مرکز محور مختصات شروع می‌شود.
- (۲) رابطه تنش بر کرنش غیرخطی است و منحنی آن از مرکز مختصات شروع می‌شود.
- (۳) رابطه Shear rate و Shear stress خطی است و دارای Yield Shear Stress مشخص است.
- (۴) رابطه تنش بر کرنش خطی است و منحنی آن از نقطه‌ای روی محور stress شروع می‌شود.

-۵۸- کدام مورد معرف رئولوژی است؟

- (۱) تنش حاصل از کرنش اعمال شده
- (۲) کرنش حاصل از تنش اعمال شده
- (۳) عکس‌العمل یک ماده وقتی تحت تأثیر کرنش مشخص قرار می‌گیرد.
- (۴) عکس‌العمل یک ماده نسبت به نیروی اعمال شده

-۵۹- اگر میانگین دانسیتۀ حقیقی سیب ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و دانسیتۀ فله‌ای آن ۵۷۷ کیلوگرم بر مترمکعب باشد و همچنین میانگین دانسیتۀ حقیقی گندم ۱۴۲۵ و دانسیتۀ فله‌ای آن ۷۹۳ کیلوگرم بر مترمکعب باشد، کدام درست است؟

- (۱) حجم مخصوص سیب از گندم بیشتر است.
- (۲) سیب در مقایسه با گندم، آسان‌تر و سالم‌تر با جریان سیالات حمل می‌شود.
- (۳) ضریب کرویت گندم و سیب تقریباً یکسان است.
- (۴) متوسط پوروزیته سیب از متوسط پوروزیته گندم بیشتر است.

-۶۰- کدام خصوصیت Appearent property نیست؟

- | Size (۴) | Sensory (۳) | Shape (۲) | Color (۱) |
|--|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| (۱) حساسیت آشکارساز هدایت گرمایی به طور کلی به کدام عامل(ها) وابسته است؟ | (۲) نوع گاز حامل | (۳) فاز ساکن و ضخامت آن | (۴) فاز ساکن، ضخامت آن و دمای ستون |
| (۱) نوع گاز ساکن | | | |
| (۲) فاز ساکن و ضخامت آن | | | |

-۶۱- ۸۲,۳ گرم از سیب‌زمینی عصاره‌گیری شده و به حجم ۵۰۰ میلی‌لیتر رسیده است. ۳ میلی‌لیتر از محلول فوق سه بار بدون آنژیم برای اندازه‌گیری گلوکز استفاده شده و نتایج ۲۱۲، ۲۰۴ و ۲۰۷ میلی‌گرم بر لیتر به دست آمده است. در ادامه سه نمونه نیز در حضور آنژیم اندازه‌گیری شده و نتایج ۴۶۲، ۴۵۷ و ۴۵۴ میلی‌گرم بر لیتر به دست آمده است. غلظت گلوکز حاصل از تجزیه ساکارز موجود در سیب‌زمینی چند میلی‌گرم بر لیتر است؟

- (۱) ۲۵
 - (۲) ۱۲۵
 - (۳) ۲۵۰
 - (۴) ۵۰۰
- ۶۲- کدام شرایط، جذبی بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده به‌وسیله قانون (بیر) ایجاد می‌کند؟
- (۱) وجود تابش‌های هرز
 - (۲) وجود ذرات معلق در نمونه
 - (۳) وجود تابش ورودی غیرتکفام
 - (۴) وجود عوامل کمپلکس‌دهنده
- ۶۳- کدام درست است؟

- (۱) فرکانس پرتوهای الکتروماگنتیک مستقل از محیط هستند.
- (۲) سرعت پرتوهای الکتروماگنتیک مستقل از محیط هستند.
- (۳) میزان انرژی پرتوهای الکتروماگنتیک رابطه مستقیمی با طول موج آن‌ها دارد.
- (۴) میزان انرژی پرتوهای الکتروماگنتیک رابطه عکسی با تعداد موج آن‌ها در سانتی‌متر دارد.

۶۵- مقدار ۲ میلی‌لیتر نمونه حاوی Fe^{2+} آهن (III) را با مقدار کافی KSCN واکنش داده و حجم آن را به ۵۰ میلی‌لیتر می‌رسانیم. جذب محلول در سل ۲/۵ سانتی‌متری چقدر است؟

$$\left(\epsilon_{\text{FeSCN}^{2+}} = ۷۰۰۰ \frac{\text{lit}}{\text{Mol.cm}}, \text{Fe} = ۵۶ \frac{\text{g}}{\text{mole}} \right)$$

- (۱) ۳.۹۲
 (۲) ۱.۷۵
 (۳) ۰.۰۷
 (۴) ۰.۰۲۸

۶۶- کدام مورد درباره اسپکترو فوتومتری درست است؟

- (۱) برای تعیین λ_{max} در یک گونه شیمیایی منحنی جذب بر حسب غلظت رسم می‌شود.
 (۲) عبارت از طول موجی است که بیشترین عبور (Transmittance) در آن صورت می‌گیرد.
 (۳) در بعضی موارد با افزایش غلظت میزان جذب به صورت خطی کاهش می‌یابد.
 (۴) همواره با افزایش غلظت میزان جذب به صورت خطی افزایش می‌یابد.

۶۷- جدول ارائه شده مربوط به کدام روش تجزیه‌ای (طیف‌بینی) است؟

Compound	CAS Number	Molecular formula	Molecular weight	Precursor ion
Gallic acid-propyl ester	121-79-9	$\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_5$	212.1	$[\text{M}-\text{H}]^-$
Acesulfame (K^+)	259-715-3	$\text{C}_4\text{H}_4\text{NO}_4\text{S}$	200.9	$[\text{M}]^-$
Saccharin (Na^+)	128-44-9	$\text{C}_7\text{H}_4\text{NO}_3\text{S}$	205.0	$[\text{M}]^-$
Basic orange 2	532-82-1	$\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_4$	212.1	$[\text{M}+\text{H}]^+$
Basic orange 21	3056-93-7	$\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{N}_2$	314.2	$[\text{M}+\text{H}]^+$
Solvent yellow 2	60-11-7	$\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{N}_3$	225.1	$[\text{M}+\text{H}]^+$

۶۸- با توجه به منحنی سری همولوگ استرهای اسیدهای چرب در کروماتوگرافی گازی، کدام اسید چرب بیشترین زمان بازداری را دارد؟

(۱) بوتیریک اسید (۲) پالمیتیک اسید (۳) استاریک اسید (۴) آرشیدیک اسید

برای جداسازی اجزای شیمیایی یک نمونه با اوزان مولکولی بسیار متنوع توسط کروماتوگرافی گازی (GC)، از کدام راهکار استفاده می‌شود؟

(۱) افزایش تدریجی دمای ستون (۲) تغییر تدریجی نوع گاز حامل
 (۳) استفاده از دمای بالا در طول آزمایش (۴) افزایش تدریجی قطبیت فاز ساکن در طول ستون

کدام روش کروماتوگرافی برای جدا کردن انتخابی یک ترکیب در یک مخلوط مرکب از دهه ترکیب دیگر، قابل استفاده است؟

Affinity (۴) HPTLC (۳) Partition (۲) SEC (۱)

-۷۱ عوامل مؤثر بر سرعت جداسازی جامدات در سیال کدام است؟

- (۱) اختلاف دانسیته فازها
- (۲) اختلاف ویسکوزیته فازها
- (۳) شکل ذرات
- (۴) فشار سیال

-۷۲ اهمیت عدد ناسلت در محاسبات انتقال حرارت کدام است؟

- (۱) نسبت سرعت انتقال حرارت هدایتی به سرعت انتقال حرارت جایه‌جایی را نشان می‌دهد.
- (۲) نسبت سرعت انتقال حرارت جایه‌جایی به سرعت انتقال حرارت هدایتی را نشان می‌دهد.
- (۳) نسبت مقاومت داخلی به مقاومت خارجی در مقابل انتقال حرارت را نشان می‌دهد.
- (۴) نسبت ضخامت لایه مرزی حرارتی به ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی را نشان می‌دهد.

-۷۳ بیشترین تغییر آنتالپی در سیستم سرمایشی فشرده‌سازی مکانیکی بخار، مربوط به کدام بخش است؟

- (۱) اواپراتور
- (۲) شیر انبساط
- (۳) کمپرسور
- (۴) کندانسور

-۷۴ لوله‌ای با مقاومت حرارت هدایتی $10^{\circ}\text{C}/\text{W}$ برای انتقال روغن داغ استفاده می‌شود. دمای سطح داخلی لوله 135°C بوده و جهت حفظ افت حرارتی روغن در کمتر از 100 W ، عایق‌کاری در طول لوله لازم است. اگر دمای سطح بیرونی عایق 25°C باشد، به ترتیب مقاومت حرارتی عایق و دمای سطح مشترک عایق و لوله کدام است؟

- (۱) $80^{\circ}\text{C}, 1^{\circ}\text{C}/\text{W}$
- (۲) $80^{\circ}\text{C}, 1/1^{\circ}\text{C}/\text{W}$
- (۳) $125^{\circ}\text{C}, 1^{\circ}\text{C}/\text{W}$
- (۴) $125^{\circ}\text{C}, 1/1^{\circ}\text{C}/\text{W}$

-۷۵ در کدام حالت، انتقال حرارت به مرکز قوطی کنسرو سریع‌تر است؟ (جنس و اندازه قوطی کنسرو برابر فرض شده است)

- (۱) قوطی آب میوه در بخار با دمای 110° درجه سلسیوس
- (۲) قوطی آب میوه در هوا با دمای 120° درجه سلسیوس
- (۳) قوطی کنسرو ماهی در آب با دمای 110° درجه سلسیوس
- (۴) قوطی کنسرو ماهی در هوا با دمای 120° درجه سلسیوس

-۷۶ در هنگام فرایند حرارتی در صنایع غذایی، افزایش کیفیت یک ماده غذایی در کدام حالت بیشتر است؟

- (۱) $\text{Bi} > 40$
- (۲) $\text{Bi} < 10$
- (۳) $40 > \text{Bi} > 10$

(۴) در حالت کلی، کیفیت یک ماده غذایی در فرایندهای حرارتی هیچ ارتباطی با عدد بایوت (Bi) ندارد.

-۷۷ مایع غذایی با دمای 100° درجه سلسیوس وارد دستگاه تبادل حرارت می‌شود و با دمای 60° درجه سلسیوس خارج می‌شود. یک مایع سرد کننده به صورت counter flow و با دمای 40° درجه سلسیوس نیز وارد این دستگاه می‌شود. اگر مقدار جریان و گرمای ویژه جریانات به گونه‌ای انتخاب شده باشد که ظرفیت حرارتی هر دو جریان برابر باشد مقدار mean temperature difference بین دو مایع چند درجه سلسیوس است؟

- (۱) 20°
- (۲) 40°
- (۳) $40/67$
- (۴) 60°

-۷۸ در یک آون مایکروویو، سرعت گرمایش کدام نوع مواد غذایی بیشتر است؟

- (۱) دارای چربی کمتر
- (۲) دارای نمک کمتر
- (۳) دارای گرمای ویژه بیشتر

- ۷۹ - در مرحله نرخ ثابت خشک کردن مواد غذایی، کدام نوع مقاومت در مقابل انتقال جرم و حرارت اهمیت دارد؟
- ۱) داخلی و خارجی
۲) نه داخلی و نه خارجی
۳) خارجی
۴) داخلی
- ۸۰ - برای جلوگیری از surface cracking در خشک کردن ماکارونی از کدام عامل می‌توان بهره برد؟
- ۱) افزایش سرعت هوای داغ
۲) افزایش رطوبت نسبی هوای داغ
۳) ثابت نگه داشتن سرعت هوای داغ
۴) کاهش رطوبت نسبی هوای داغ

