



180F

کد کنترل

180

F

## آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

### رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی (۲۴۳۱) کد

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: - آمار و طرح آزمایش‌ها - ژنتیک - اصلاح نباتات - ژنتیک پیشرفته - ژنتیک گیاهی - بهنژادی گیاهی پیشرفته (اصلاح نباتات تکیلی) - بیومتری	۸۰	۱	۸۰	۱۲۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ میزان فشرده‌گی خاک در یک ناحیه دارای توزیع نرمال با میانگین ۲۰ و انحراف معیار ۴ است. مقدار میانه برای فشرده‌گی خاک در این ناحیه کدام است؟

- |        |        |
|--------|--------|
| ۲۰ (۲) | ۱۶ (۱) |
| ۲۸ (۴) | ۲۴ (۳) |

-۲ اگر ترتیب قرار گرفتن درخت‌ها مهم باشد، به چند طریق می‌توان ۵ درخت مختلف را در کنار یک خیابان کاشت؟

- |         |         |
|---------|---------|
| ۱۰۰ (۲) | ۲۴ (۱)  |
| ۲۴۰ (۴) | ۱۲۰ (۳) |

-۳ اگر همه  $x$ ‌ها از یک جامعه برداشت شده باشند، واریانس ترکیب خطی  $Z = ax_1 + bx_2 + cx_3$  کدام است؟

$$\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2 + \sigma_{x_3}^2 \quad (۲) \qquad (a^2 + b^2 + c^2)\sigma_x^2 \quad (۱)$$

$$a^2\sigma_{x_1}^2 + b^2\sigma_{x_2}^2 + c^2\sigma_{x_3}^2 \quad (۴) \qquad a\sigma_{x_1}^2 + b\sigma_{x_2}^2 + c\sigma_{x_3}^2 \quad (۳)$$

-۴ از بین ۵ زوج (زن و شوهر) به چند روش می‌توان یک کمیته ۵ نفری شامل ۳ مرد و ۲ زن تشکیل داد؟

- |         |        |
|---------|--------|
| ۲۰ (۲)  | ۱۰ (۱) |
| ۱۰۰ (۴) | ۸۰ (۳) |

-۵ در توزیع دوچمده‌ای  $\sigma = 6$  و  $\mu = ۱۴۴$  است، مقدار  $n$  و  $p$  به ترتیب کدام است؟

- |                         |
|-------------------------|
| $\frac{3}{4}$ و ۱۹۲ (۱) |
| $\frac{1}{3}$ و ۴۳۲ (۲) |
| $\frac{1}{2}$ و ۲۸۸ (۳) |
| $\frac{1}{2}$ و ۷۲ (۴)  |

-۶ در یک مجموعه داده حداقل و حدکثر به ترتیب ۳۲۱ و ۵۲۰ است. اگر ۱۰ دسته انتخاب شده باشد فاصله دسته‌ها کدام است؟

- |        |          |
|--------|----------|
| ۱۹ (۲) | ۱۰ (۱)   |
| ۲۰ (۴) | ۱۹/۵ (۳) |

-۷ ارتفاع منحنی کدام توزیع کمتر است؟

- (۱)  $t$  با  $5^\circ$  درجه آزادی      (۲)  $t$  با  $15^\circ$  درجه آزادی  
 (۳)  $t$  با  $20^\circ$  درجه آزادی      (۴)  $t$  با  $30^\circ$  درجه آزادی
- اگر  $\bar{x} = 1/5$  و  $\bar{y} = 4/5$  باشد، معادله خط رگرسیون  $y$  نسبت به  $x$  کدام است؟

$$y = -3 + 5x \quad (1)$$

$$y = 3 - 5x \quad (2)$$

$$y = 5 - 3x \quad (3)$$

-۸ فرض کنید  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  است. رابطه  $Y = aX + b, a \neq 0$  دارای کدام توزیع است؟

$$N(a\mu, a\sigma^2) \quad (1)$$

$$N(a\mu + b, a^2\sigma^2 + b^2) \quad (2)$$

$$N(a\mu + b, a^2\sigma^2) \quad (3)$$

-۹ میزان مصرف سوخت تراکتور در هر صد کیلومتر دارای توزیع نرمال است. نمونه‌ای  $n=9$  تایی تراکتور به تصادف انتخاب و میانگین و واریانس مصرف سوخت نمونه  $14$  و  $4$  به دست آمده است. آماره لازم برای آزمون  $H_0: \mu = 12$  کدام است؟

- (۱)  $5^\circ$       (۲)  $1^\circ$   
 (۳)  $4^\circ$       (۴)  $1/5^\circ$

-۱۰ اگر  $p$  ضریب همبستگی جامعه و  $r$  ضریب همبستگی نمونه‌ای باشد. برای آزمون فرض همبستگی جامعه

$$\begin{cases} H_0: p = 0 \\ H_1: p \neq 0 \end{cases}$$

$$\frac{r\sqrt{n-1}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (1)$$

$$\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (2)$$

$$\frac{r(n-2)}{1-r} \quad (3)$$

-۱۱ ضریب همبستگی دو متغیر  $X$  و  $Y$  کدام است؟

X	۳	۳	۳	۴	۴	۴	۸	۸	۸
Y	۱	۴	۷	۱	۴	۷	۱	۴	۷

- (۱) مثبت      (۲) منفی      (۳) صفر      (۴) یک

-۱۲ در آزمایشی فاکتوریل  $2 \times 2 \times 2$  با  $4$  تکرار در شرایط یکنواخت محیطی، مقدار مجموع مربعات خطای برابر  $144$  حاصل شده است. اگر طرح آماری مناسبی استفاده شده باشد و میانگین آزمایش نیز برابر  $100$  باشد، مقدار CV آزمایش (ضریب تغییرات آزمایش) چند درصد است؟

- (۱) ۲  
 (۲) ۴  
 (۳) ۲۰  
 (۴) ۴۰

-۱۳ از خودگشتنی یک گیاه منوهیرید  $496$  گیاه حاصل می‌شود که  $31$  گیاه آن فنتیپ مغلوب را نشان می‌دهند. این صفت چگونه کنترل می‌شود؟

- (۱) ژن‌های مضاعف      (۲) غالیت ناقص      (۳) فوق غالبیت      (۴) همتوانی

- ۱۵ در مولکول DNA از نوع هارپیج  $\beta$  که دارای ۱۰ دور است، ۴۰ نوکلئوتید آدنین وجود دارد، تعداد گوانین در این کدام است؟
- |        |        |
|--------|--------|
| ۴۰ (۲) | ۱۰ (۱) |
| ۸۰ (۴) | ۶۰ (۳) |
- ۱۶ گیاهی با ژنتیپ وحشی GGHG با گیاه دیگری با ژنتیپ gghh تلاقی داده می‌شود و سپس نتاج F1 تست کراس می‌شوند، اگر دو زن ۱۰ سانتی‌مترگان از هم فاصله داشته باشند، چند درصد از نتاج gghh می‌شوند؟
- |        |        |
|--------|--------|
| ۴۰ (۲) | ۲۰ (۱) |
| ۵۰ (۴) | ۴۵ (۳) |
- ۱۷ آمینو اسیدها در کدام قسمت با هم تفاوت دارند؟
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ۱) گروه آمین     | ۲) گروه R        |
| ۳) گروه کربوکسیل | ۴) نوع کربن آلفا |
- ۱۸ گیاهی با ژنتیپ AaBb با مغلوب خالص خودش تلاقی داده می‌شود، ژنتیپ جنین و آندوسپرم حاصل از این گیاه کدام است؟
- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AaaBBB . aaBb (۲) | AAaBbb . Aabb (۱) |
| AaaBbb . AaBb (۴) | AaaBBb . aabb (۳) |
- ۱۹ اگر گیاه مونوپلولئیدی با  $7 = x$  کروموزوم تقسیم می‌بوزی انجام دهد، احتمال به دست آمدن یک گامت زنده (۷ کروموزومی) چقدر است؟
- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| $\frac{1}{128}$ (۲) | $\frac{1}{256}$ (۱) |
| $\frac{1}{32}$ (۴)  | $\frac{1}{64}$ (۳)  |
- ۲۰ پریماز در ترکیب با کدام مورد پریمازوم را تشکیل می‌دهد؟
- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ۱) آنزیم لیگاز     | ۲) هلیکاز |
| ۳) DNA پلیمراز III | ۴) گیراز  |
- ۲۱ کدام مورد در یوکاریوت‌ها وظیفه رونویسی ژن‌های tRNA را به عهده دارد؟
- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ۱) RNA پلیمراز III | ۲) RNA پلیمراز II |
| ۳) هلو آنزیم       | ۴) RNA پلیمراز I  |
- ۲۲ کدام توالی مربوط به جعبه Pribnow در پروکاریوت‌ها است؟
- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| TATAAT (۴) | TTGACA (۳) | AACTTC (۲) | AACTGT (۱) |
|------------|------------|------------|------------|
- ۲۳ تعداد ژنتیپ‌های ممکن برای صفتی که با دو زن A و B در یک گیاه اتوترابلوئید کنترل می‌شود، کدام است؟
- |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| ۶۴ (۴) | ۲۵ (۳) | ۱۶ (۲) | ۹ (۱) |
|--------|--------|--------|-------|
- ۲۴ کدام فرایند مرتبط با DNA، اپی ژنتیک محسوب نمی‌شود؟
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Phosphorylation (۲) | Acetylation (۱) |
| Tautomerization (۴) | Sumoylation (۳) |
- ۲۵ کدام مورد به مفهوم Heteroplasmy است؟
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ۲) چند شکلی اجزای سیتوپلاسم                | ۱) پلاسمید هتروژن           |
| ۴) وجود بیش از یک نوع mtDNA در سلول یا فرد | ۳) سلول دارای پلاسمید حلقوی |

فراآنی	ژنوتیپ
HH	% ۴۰
Hh	% ۴۰
hh	% ۲۰

- ۲۶- کدام مورد درباره سه گروه ژنوتیپی زیر در یک جمعیت نادرست است؟

۱) فراآنی‌ها حاکی از تعادل هاردی - وینبرگ در جمعیت است.

۲) تعادل هاردی - وینبرگ در جمعیت برقرار نیست.

۳) در آمیزش تصادفی این جمعیت فراآنی‌های ژنوتیپی نسل بعد تغییر می‌کند.

۴) تعادل در جمعیت برقرار نیست و فراآنی ژنوتیپ‌ها در نسل بعد متفاوت از نسل کنونی خواهد بود.

- ۲۷- مهم‌ترین روش اصلاح جو و چغدرقند به ترتیب کدام است؟

۱) بالک تغییر یافته، هیبرید تری‌وی کراس

۲) شجره‌ای، هیبرید دبل کراس

- ۲۸- نتایج حاصل از خودگشتن یک R - لاین و یک B - لاین گندم به ترتیب از سمت راست به چه کدام است؟

N - rr و S - Rr (۱)

S - rr و S - RR (۳)

- ۲۹- در روش شجره‌ای و نسل تک بذر گزینش به ترتیب از راست به چه در کدام نسل آغاز می‌شود؟

F<sub>۱</sub> ، F<sub>۲</sub> (۱)

F<sub>۲</sub> ، F<sub>۳</sub> (۳)

- ۳۰- رقم هیبرید در کدام محصولات به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱) آفتاب‌گردان و سویا (۴) سویا و برنج

۲) آفتاب‌گردان و پنبه

۳) جو و برنج

- ۳۱- برای جلوگیری از Variety degeneration در پنبه، کدام گزینش مناسب‌تر است؟

۱) اکوتیپ

۲) دوره‌ای برادر خواهران ناتنی

۳) دوره‌ای برادر خواهران تنی

- ۳۲- کدام مورد درباره پوسته‌بودی درست است؟

۱) نوعی روش تلاقی لاین‌ها برای تهیه رقم هیبرید در یونجه است که از جمعیت آغاز می‌شود.

۲) نوعی روش تلاقی لاین‌ها برای تهیه رقم مصنوعی در یونجه است که با تلاقی جفتی اینبرد لاین‌ها آغاز می‌شود.

۳) نوعی روش سلکیون برای تهیه رقم جدید در آفتاب‌گردان است که با تلاقی جفتی اینبرد لاین‌ها آغاز می‌شود.

۴) نوعی روش سلکیون برای تهیه رقم جدید در آفتاب‌گردان است که از جمعیت آغاز می‌شود.

- ۳۳- کدام مورد برای اصلاح یونجه و اسپرس مناسب‌تر است؟

۱) تهیه رقم هیبرید (۳) تهیه رقم op (۲) تهیه رقم دبل‌هایلوبنید (۴) تهیه رقم سینتتیک

- ۳۴- نحوه تهیه دبل‌هایلوبنید در جو و برنج به ترتیب کدام است؟

۱) تلاقی با ذرت - تلاقی با ساتیوا

۲) تلاقی با بولبوزوم - تلاقی با گلابریما

۳) تلاقی با بولبوزوم - کشت بساک

۴) کشت تخمک - کشت تخمک

- ۳۵- کدام سیستم برای تولید هیبرید سینگل کراس در گیاهان خودگشن کاربرد بیشتری دارد؟

۱) خودناسازگاری

۲) نر عقیمی سیتوپلاسمی

- ۳۶- مهم‌ترین کاربرد واریته مولتی‌لاین کدام است؟

۱) افزایش سازگاری

۲) افزایش هتروزیس

۳) جلوگیری از فرسایش ژنتیکی

۴) جلوگیری از اپیدمی بیماری‌ها

- ۴۷ زبان توارث (ژنتیک) در کلیه موجودات زنده چهار حرفی و ..... است ولی در موجودات متفاوت دارای ..... است.

۱) کاملاً متفاوت - لهجه‌های مشابه  
۲) تقریباً مشابه - لهجه‌های متفاوت  
۳) کاملاً مشابه - لهجه‌های متفاوت  
۴) ژنوم ..... می‌تواند از جنس ..... تک یا دو رشته‌ای باشد.

-۴۸ معمولاً میزان بیان یک ژن تحت تأثیر کدام عامل کمتر قرار می‌گیرد؟

۱) توالی‌های القاگر  
۲) میزان پایداری  
۳) طول ژن  
۴) مخمر - RNA  
۵) باکتری - DNA یا RNA  
۶) باکتریوفاژ - RNA یا DNA  
۷) Cis-acting elements  
۸) Trans-acting elements  
۹) Transcription factors  
۱۰) Trans-acting elements و Cis-acting elements

-۴۹ ماهیت مولکول تشکیل دهنده پیوند پپتیدی بین دو آمینو اسید در ساخت پروتئین به کمک ریبوزوم کدام است؟

۱) آنزیم پپتیدیل ترانسفراز  
۲) آنژیم tRNA دی‌اسیلان  
۳) ریبوزیم tRNA دی‌اسیلان

-۵۰ در کدام مورد با وجود فعال بودن دانه گرده و مادگی امکان تولید بذر از طریق خودباروری وجود ندارد؟

۱) آپومیکسی  
۲) خودناسازگاری  
۳) نر عقیمی ژنتیکی  
۴) خلوص بیشتر

-۵۱ مزیت واریته‌های سینتetiک نسبت به هیبرید سینگل کراس کدام است؟

۱) استفاده کشاورز از بذر مزرعه خود  
۲) عملکرد بیشتر  
۳) مزیت واریته‌های سینتetiک نسبت به هیبرید سینگل کراس کدام است؟

-۵۲ در کدام یک از ساختارهای RNA یا DNA توالی‌های پارالل یا موازی کنار هم دیگر قرار می‌گیرند؟

۱) H-DNA  
۲) A-DNA  
۳) بخشی از H-DNA  
۴) تمام قسمت هیبرید

-۵۳ طی کدام فرایند تغییراتی در پیش - mRNA (Pre-RNA) ایجاد و توالی‌های غیرکدشونده حذف می‌شوند؟

۱) بازآرایی  
۲) پیرايش  
۳) نوترکیبی  
۴) ویرايش

-۵۴ تغییرات در سطح توالی DNA را ..... و تغییرات بر روی ساختار مولکول DNA (غیرتوالی) را ..... می‌گویند.

۱) اپیژنتیکی - ژنتیکی  
۲) ژنتیکی - اپیژنتیکی  
۳) اپیژنتیکی - ژنتیکی  
۴) ژنتیکی - ژنتیکی

-۵۵ تغییرات پس از رونویسی، اغلب به وسیله کدام مورد تنظیم می‌شود؟

۱) Cis-acting elements  
۲) Trans-acting elements  
۳) Transcription factors  
۴) باکتریوفاژ - RNA یا DNA یا RNA  
۵) RNA - قارچ

-۵۶ زبان توارث (ژنتیک) در کلیه موجودات زنده چهار حرفی و ..... است ولی در موجودات متفاوت دارای ..... است.

۱) کاملاً متفاوت - لهجه‌های مشابه  
۲) تقریباً مشابه - لهجه‌های متفاوت  
۳) کاملاً مشابه - لهجه‌های مشابه  
۴) ژنوم ..... می‌تواند از جنس ..... تک یا دو رشته‌ای باشد.

-۵۷ معمولاً میزان بیان یک ژن تحت تأثیر کدام عامل کمتر قرار می‌گیرد؟

۱) توالی‌های القاگر  
۲) میزان پایداری  
۳) طول ژن  
۴) مخمر - RNA

- ۴۹- قطعه DNA ای با ویژگی‌های زیر یک ژن را نمایندگی می‌کند، طول این قطعه چند bp است؟  
 (پیش‌برنده آن  $800\text{ bp}$ ، خاتمه‌دهنده  $200\text{ bp}$ ، تعداد  $3$  اینترون هر یک  $500\text{ bp}$ ، طول پروتئین تولیدی  $500$  عدد)  
 ۱)  $1500$       ۲)  $2000$       ۳)  $3000$       ۴)  $4000$
- ۵۰- تنظیم بیان ژن در موجودات پروکاریوت و یوکاریوت به ترتیب بیشتر به روش کنترل ..... است.  
 ۱) هر دو منفی      ۲) هر دو مثبت      ۳) منفی - مثبت      ۴) مثبت - منفی
- ۵۱- اگر برای یک مکان ژنی دو آللی جمعیت در تعادل هارددی - واینبرگ باشد، حداکثر فراوانی ژنتیپ هتروزیگوت و حداکثر مجموع فراوانی دو ژنتیپ هموزیگوت به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  
 ۱)  $0/25, 0/25$       ۲)  $0/25, 0/50$       ۳)  $0/25, 0/50$       ۴)  $0/50, 0/50$
- ۵۲- اگر در صفتی واریانس محیطی  $35$  درصد واریانس فنتیپی را تبیین کند، وراثت‌پذیری عمومی این صفت کدام است?  
 ۱)  $0/35$       ۲)  $0/45$       ۳)  $0/65$       ۴) با این اطلاعات قابل برآورد نیست
- ۵۳- در هشتاد خانواده ناتنی، وراثت‌پذیری محاسبه شده برای صفتی از طریق رگرسیون پسaran بر پدران  $64$  درصد برآورده شده است، ضربی رگرسیون کدام است?  
 ۱)  $0/16$       ۲)  $0/32$       ۳)  $0/50$       ۴)  $0/64$
- ۵۴- یک جمعیت مگس سرکه که فراوانی آلل  $a$  در آن  $0/6$  بوده است به تعدادی لوله آزمایش تقسیم شده و به مدت چندین نسل درون‌زاد شده است. اگر واریانس فراوانی ژنی در این زیرجمعیت‌ها  $2/5$  باشد، میانگین فراوانی ژنتیپ  $aa$  در آن‌ها چند درصد است?  
 ۱)  $12$       ۲)  $24$       ۳)  $38$       ۴)  $62$
- ۵۵- میانگین طول بلال نتاج حاصل از گرده افسانی آزاد یک بوته ذرت  $18$  سانتی‌متر و میانگین طول بلال در جمعیت  $16$  سانتی‌متر بوده است، ارزش اصلاحی این بوته کدام است?  
 ۱)  $2$       ۲)  $4$       ۳)  $17$       ۴)  $18$
- ۵۶- اگر واریانس فنتیپی جمعیت برای صفتی  $2500$  و وراثت‌پذیری خصوصی  $50$  درصد و  $i=1/6$  باشد، پاسخ به گزینش کدام است?  
 ۱)  $40$       ۲)  $1250$       ۳)  $2000$       ۴)  $2500$
- ۵۷- به فرض عمل افزایشی ژن، تأثیر گزینش در کدام فراوانی ژنی بیشتر است?  
 ۱)  $0/1$       ۲)  $0/4$       ۳)  $0/9$       ۴)  $1/4$
- ۵۸- کدام رابطه خویشاوندی، موجب اریبی بیشتر در برآورده وراثت‌پذیری خصوصی می‌شود؟  
 ۱) رگرسیون نتاج بر یک والد      ۲) رگرسیون نتاج بر میانگین والدین  
 ۳) کوواریانس بین خانواده‌های ناتنی
- ۵۹- در یک جمعیت در حال تعادل، فراوانی بوته‌های بیمار و دارای ژنتیپ  $aa$  برابر  $4$  درصد است، اگر میانگین ارزش سه ژنتیپ  $AA$  و  $Aa$  و  $aa$  به ترتیب، برابر  $4$ ،  $2$  و  $0$  باشد، میانگین جمعیت چقدر است?  
 ۱)  $5/4$       ۲)  $4/5$       ۳)  $3/6$

- ۶۰- اگر در جمعیتی با تلاقی تصادفی، فراوانی آلل‌های A و B به ترتیب برابر  $5/3$  و  $5/2$  و فراوانی گامت AB برابر  $25/0$  باشد، به فرض اینکه این دو زن روی دو کروموزوم قرار دارند، میزان عدم تعادل در نسل بعد چقدر است؟
- (۱) ۵٪  
(۲) ۱٪  
(۳) ۱۵٪  
(۴) ۲۵٪
- ۶۱- در مورد تجزیه QTL و نقشه‌یابی ارتباطی association mapping کدام درست است؟
- (۱) تجزیه ارتباطی از یک جمعیت دو والدی و در تجزیه QTL از یک جمعیت طبیعی استفاده می‌شود.  
(۲) تجزیه ارتباطی براساس عدم تعادل لینکازی و تجزیه QTL براساس لینکاز است.  
(۳) در تجزیه ارتباطی ساختار جمعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.  
(۴) در تجزیه ارتباطی، دو والد باید کرانه (extreme) باشند.
- ۶۲- کدام مورد درباره shuttle breeding درست است؟
- (۱) از محیط‌های اکولوژیکی متفاوت برای اصلاح ارقام با سازگاری بالا استفاده می‌شود.  
(۲) ارقام مختلف در یک محیط اکولوژیکی در شرایط تنفس خشکی و آبیاری نرمال ارزیابی می‌شوند.  
(۳) کشاورزان خبره در انتهای برنامه اصلاحی با بهنژادگر همکاری می‌کنند.  
(۴) کشاورزان خبره از ابتدای برنامه اصلاحی با بهنژادگر همکاری می‌کنند.
- ۶۳- **NILS** و **RILS** به ترتیب با استفاده از کدام روش‌های اصلاحی ایجاد می‌شوند؟
- (۱) SSD و pedigree (۲) SSD و BC (۳) BC و SSD (۴) pedigree و SSD
- ۶۴- هدف از speed Breeding چیست و کدام عامل بیشترین کاربرد را در این تکنیک دارد؟
- (۱) افزایش سازگاری ارقام - اقلیم‌های مختلف  
(۲) افزایش سازگاری ارقام - تنفس خشکی  
(۳) کاهش زمان برنامه بهنژادی - دما  
(۴) کاهش زمان برنامه بهنژادی - نور
- ۶۵- در شاخص حساسیت به تنفس فیشر حداقل شدت تنفس چقدر است؟
- (۱) ۱٪  
(۲) ۱۰٪
- ۶۶- از تلاقی دو والد با ارتفاع متوسط و ژنتیک  $AaBb \times AaBb$  نتایج  $AABB$  بسیار بلند تولید شده‌اند، این حالت با کدام مورد قابل توجیه است؟
- (۱) اینترگرسیون هیبرید (۲) اینبریدینگ دپرشن (۳) تفکیک متجاوز (۴) هتروزیس
- ۶۷- برای اینکه یک هیبرید قابلیت تجاری‌سازی داشته باشد، مقدار کدام مورد باید بالا باشد؟
- (۱) هتروزیس نسبت به والد برتر  
(۲) هتروزیس نسبت به میانگین والدین  
(۳) هتروبولیتیوسیس  
(۴) هتروزیس استاندارد
- ۶۸- واریانس وزن میوه در یک تلاقی به شرح زیر است، واریانس ژنتیکی کدام است؟
- | واریانس | نسل |
|---------|-----|
| $P_1$   | ۵۰  |
| $P_2$   | ۶۰  |
| $F_1$   | ۲۵  |
| $F_2$   | ۱۰۰ |
- (۱) ۴۵  
(۲) ۵۰  
(۳) ۶۰  
(۴) ۱۰۰

- ۶۹- براساس معیارهای اکووالانس ریک و واریانس پایداری شوکلا کدام رقم پایدار است؟  
 ۱) اکووالانس کمتر، واریانس بیشتر  
 ۲) اکووالانس بیشتر، واریانس کمتر  
 ۳) هر دو کمتر  
 ۴) هر دو بیشتر
- ۷۰- با استفاده از کدام روش می‌توان مقاومت عمودی را در اصلاح گیاهان ایجاد کرد؟  
 ۱) جهش  
 ۲) هرمی کردن زن‌ها  
 ۳) دورگ‌گیری  
 ۴) فوق حساسیت
- ۷۱- در ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & s \end{bmatrix}$ , ماتریس متنم عنصر روی سطر اول و ستون دوم یعنی متنم  $b$  کدام است؟  
 ۱)  $\begin{bmatrix} a & c \\ g & s \end{bmatrix}$   
 ۲)  $\begin{bmatrix} d & e \\ h & s \end{bmatrix}$   
 ۳)  $\begin{bmatrix} d & e \\ g & h \end{bmatrix}$   
 ۴)  $\begin{bmatrix} d & f \\ g & s \end{bmatrix}$
- ۷۲- بیس (دانشمند انگلیسی) در اوایل قرن نوزدهم قضیه‌ای را در حساب احتمالات ثابت کرد، نام آن قضیه کدام است؟  
 ۱) احتمال پسین  
 ۲) احتمال پیشین  
 ۳) احتمال مستقیم  
 ۴) احتمال معکوس
- ۷۳- اگر داده‌های جمع‌آوری شده در آزمایش دارای توزیع نرمال باشند. مجموع مربعات آن‌ها دارای کدام توزیع است؟  
 ۱) نرمال  
 ۲) نمایی  
 ۳)  $\chi^2$   
 ۴) t
- ۷۴- اگر n بی‌نهایت زیاد شود توزیع دو جمله‌ای طبق کدام قضیه به توزیع نرمال نزدیک می‌شود و به عبارتی دارای کدام توزیع می‌شود؟  
 ۱) حد مرکزی،  $N(np, \sqrt{npq})$   
 ۲) حد مرکزی،  $\frac{\bar{x} - np}{npq}$   
 ۳) کمترین توان‌های دوم،  $N(npq, \sqrt{np})$   
 ۴) کمترین توان‌های دوم،  $\frac{\bar{x} - np}{q\sqrt{np}}$
- ۷۵- از نظر طبیعت مخصوصی که  $\sum x_j$  و  $\sum x_j x_{j'}$  در برآزandن کشیده‌جمله دارد. کدام روش به عنوان روش عمومی ابداع گردیده است؟  
 ۱) محاسبه دولیتل  
 ۲) محاسبه لگاریتمی  
 ۳) کشیده‌جمله‌های متعمد  
 ۴) کشیده‌جمله‌های غیرلگاریتمی
- ۷۶- میزان برتری ضرایب رگرسیون برآورد شده با روش ..... بر ضرایب رگرسیون برآورد شده با روش ..... به مقادیر حقیقی این ضرایب در مدل بستگی دارد.  
 ۱) ریج - متعمد  
 ۲) ریج - معمول  
 ۳) معمول - ریج  
 ۴) معمول - ریج
- ۷۷- در تجزیه کواریانس یک عامل وقتی به عنوان متغیر همبسته در نظر گرفته می‌شود که .....  
 ۱) بر روی متغیر مورد بررسی (وابسته) بی‌اثر باشد.  
 ۲) تحت تأثیر تیمار قرار گرفته و بر متغیر وابسته مؤثر باشد.  
 ۳) تحت تأثیر تیمار قرار نگرفته باشد.
- ۷۸- در حالتی که چند متغیر و نمونه وجود داشته باشد کدام آزمون می‌تواند برای مقایسه بردارهای میانگین نمونه‌ها استفاده شود؟  
 ۱) استیوونت  
 ۲)  $T^2$  هتلینگ  
 ۳) نسبت درست‌نمایی  
 ۴) کمترین توان‌های دوم
- ۷۹- مهم‌ترین و علمی‌ترین روش‌ها که روش تجزیه به عامل اصلی نامیده می‌شود کدام است؟  
 ۱) استرلینگ  
 ۲) فیشر  
 ۳) کندال  
 ۴) هتلینگ

- ۸۰- اگر واریانس  $e$  های مدل آماری رگرسیون  $\sigma_e^2 = \sigma_e^2(sp)^{-1} E(e^2)$  باشد ماتریس  $V = \sigma_e^2(sp)^{-1}$  را ماتریس ..... می‌نامند.
- ۱) کواریانس  $\beta_j$  ها  
۲) کواریانس  $b_j$  ها  
۳) واریانس - کواریانس  $b_j$  ها  
۴) واریانس  $b_j$  ها



