

کد کنترل

320

F



320F

# آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

**دفترچه شماره (۱)**

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

## رشته مهندسی محیط‌زیست – منابع آب (کد ۲۳۴۳)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی	مجموعه دروس تخصصی:
– ریاضیات عمومی ۱ و ۲ – معادلات دیفرانسیل – منابع آب	۴۵	۱	۴۵	۱۵۰ دقیقه	–

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ مقدار  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{4n}}{n\sqrt{n}}$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲)  $\frac{2}{3}$

(۳) ۱

(۴)  $\frac{16}{3}$

-۲ مقدار  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} \left( e^x - e^{x+1} \right)$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲) ۲

(۳) ۱

(۴)  $\frac{1}{2}$

-۳ ضریب  $x^5$  در سری مک‌لورن تابع  $f(x) = \arcsin x$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲)  $\frac{1}{6}$

(۳)  $\frac{3}{40}$

(۴)  $\frac{7}{20}$

-۴ طول خم حاصل از تقاطع رویه‌های  $z = 1 - \sqrt{2}x$  و  $3x^2 + y^2 = 3$  چند برابر عدد  $\pi$  است؟

(۱)  $\sqrt{3}$

(۲)  $\sqrt{6}$

(۳)  $2\sqrt{2}$

(۴)  $2\sqrt{3}$

-۵ مساحت ناحیه محصور به منحنی پسته  $\begin{cases} x = 2\cos t + \cos 2t \\ y = 2\sin t - \sin 2t \end{cases}$  برای  $0 \leq t \leq 2\pi$ ، کدام است؟

$$\frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$4\pi \quad (2)$$

$$5\pi \quad (3)$$

$$2\pi \quad (4)$$

-۶ مقدار انتگرال  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy dx}{(x+3y)\sqrt{1-x^2-y^2}}$  کدام است؟

$$\frac{\pi \ln \frac{15}{4}}{8 \ln 3} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{8 \ln 3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8 \ln 3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{\ln \frac{3}{4}} \quad (4)$$

-۷ فرض کنیم  $f(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}) = z = z(x, y)$  به صورت ضمنی توسط معادله  $f$  بیان شود که  $f$  تابعی مشتق‌پذیر است. اگر

به ازای نقطه  $A(x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = 2)$  که در معادله تابع صدق می‌کند  $\frac{\partial z}{\partial y}(A) = 3$ ، آنگاه  $\frac{\partial z}{\partial x}(A)$  کدام است؟

$$-2 \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$0 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

-۸ اگر  $\theta$  زاویه بین خطوط عمود بر دو روبه  $z = e^{rx+y+z}$  و  $z = xy - y^2 + 6y - 3$  در نقطه  $(1, 1, 1)$  باشد، آنگاه  $\cos \theta$  کدام است؟

$$\frac{7}{11} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (2)$$

$$\frac{2}{11} \quad (3)$$

$$\frac{2}{9} \quad (4)$$

-۹ حجم ناحیه محصور به رویه  $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt[3]{xyz}$  در یک هشتم اول فضا کدام است؟

$$\frac{1}{24} \quad (1)$$

$$\frac{1}{12} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8} \quad (3)$$

$$\frac{1}{6} \quad (4)$$

-۱۰ اگر  $S$  سطح بسته حاصل از رویه  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$  بالای صفحه  $z = 0$  و  $n$  بردار یکه قائم بروز سوی رویه  $S$  باشد و  $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = (x + 4y^2)\vec{i} + (3y + 2x^2)\vec{j} + (-2z + 2y \cos x)\vec{k}$ . کدام است؟

$$12\pi \quad (1)$$

$$8\pi \quad (2)$$

$$4\pi \quad (3)$$

$$2\pi \quad (4)$$

-۱۱ مسیرهای قائم بر دسته منحنی‌های  $y = \ln(\tan x + c)$ , کدام است؟

$$y = \ln\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + k\right) \quad (1)$$

$$y = -\ln\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\cos 2x + k\right) \quad (2)$$

$$y = -\ln\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x + k\right) \quad (3)$$

$$y = \ln\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\cos 2x + k\right) \quad (4)$$

-۱۲ اگر تابع ضمنی  $f(y, x) = \frac{(x+y)^2 - (x-y)}{(x-y) + (x+y)}$  جواب معادله دیفرانسیل  $y' = f(y, x)$ , به شرط این که در  $y = 1$  مقدار  $y = 1$  باشد،  $f(x, y)$ , کدام است؟

$$\frac{-x+y-1}{x-y+e^{-x+y}} \quad (1)$$

$$\frac{-x-y-1}{x-y+e^{-x-y}} \quad (2)$$

$$\frac{-x+y-1}{x+y+e^{-x+y}} \quad (3)$$

$$\frac{-x-y-1}{x+y+e^{-x-y}} \quad (4)$$

۱۳ - جواب خصوصی معادله دیفرانسیل  $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ , به ازای  $x = 1$  کدام است؟

$$\frac{e}{2} \left( \frac{\pi}{2} + \ln 2 \right) \quad (1)$$

$$\frac{e}{2} \left( \frac{\pi}{2} - \ln 2 \right) \quad (2)$$

$$\frac{e}{4} \left( \ln 4 + \frac{\pi}{4} \right) \quad (3)$$

$$\frac{e}{4} \left( \ln 4 - \frac{\pi}{4} \right) \quad (4)$$

۱۴ - جواب غیرهمگن معادله دیفرانسیل  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2\ln x$ , کدام است؟

$$\ln x + x \quad (1)$$

$$x \ln x + x \quad (2)$$

$$\ln x + \frac{x}{2} \quad (3)$$

$$x \ln x + \frac{x}{2} \quad (4)$$

۱۵ - حاصل  $\int_0^\infty \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{x}} dx$ , کدام است؟

$$\frac{\Gamma(-\frac{1}{4})}{4} \quad (1)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\Gamma(-\frac{1}{4})}{\lambda} \quad (3)$$

$$\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{\lambda} \quad (4)$$

۱۶ - با توجه به تغییرات اقلیمی آب و هوا، کاهش دما منجر به چه چیزی خواهد شد؟

- (۱) تگرگ      (۲) بارش برف      (۳) تبخیر بیشتر      (۴) تبخیر کمتر

۱۷ - بارش ناشی از بلند شدن یک توده هوا که در اثر اختلاف فشار به وجود می‌آید، چه نام دارد؟

- (۱) بارش کوهنگاری      (۲) بارش صحراوی      (۳) بارش طوفانی      (۴) بارش همرفتی

۱۸ - میزان رواناب از یک حوضه زهکش برابر با کدام گزینه است؟

- (۱) بارندگی + افزایش آب زیرزمینی - تغذیه اولیه      (۲) بارندگی - افزایش آب زیرزمینی + تغذیه اولیه

- (۳) بارندگی + افزایش آب زیرزمینی + تغذیه اولیه      (۴) بارندگی - افزایش آب زیرزمینی - تغذیه اولیه

-۱۹ در به دست آوردن فرمول **Thiem**، کدام فرض زیر درست نیست؟

- ۱) فرو رفتن چاه تا سطح آبخوان نامحدود
- ۲) جریان شعاعی و افقی خطوط
- ۳) آبخوان همگن و همسان گرد
- ۴) شب خیلی کم سطح آب

-۲۰ بهترین روش برای تعیین میانگین بارندگی سالانه در یک حوضه آبریز، کدام است؟

(۱) میانگین تیسن (Thiessen's mean method)

(۲) ایزوھیتال (Isohyetal method)

(۳) حسابی (Arithmetical method)

(۴) ماهواره‌ای (Sedelite method)

-۲۱ عمدتاً عامل مهم و حاکم در توزیع آلودگی در رودخانه و مخزن سد به ترتیب کدام است؟

- ۱) انتقال - پخش
- ۲) پخش - انتقال
- ۳) پخش - پخش
- ۴) انتقال - انتقال

-۲۲ کدام گزینه دلیل سنجش ۵ روزه برای پارامتر **BOD** است؟

(۱) تجزیه بیولوژیک آلودگی که عمدتاً با مصرف اکسیژن همراه است زمان بر بوده و حداقل ۵ روز طول می‌کشد تا به شرایط پایدار نزدیک شود.

- ۲) ظرف ۵ روز تجزیه بیولوژیکی اکسیژن خواه به حد نهایی خود می‌رسد.
- ۳) با توجه به رابطه رگرسیونی در رودخانه‌های مهم انتخاب شده است.
- ۴) زمان تمرکز رودخانه‌های مهم لندن عمدتاً ۵ روزه بوده است.

-۲۳ در یک رودخانه سنجش‌های موردي نشان می‌دهد که میزان اکسیژن محلول بسیار بالا و در عین حال مقادیر نیتروژن کل و فسفر کل هم بالا هستند. کدام گزینه در مورد آلوده بودن رودخانه درست است؟

- ۱) قطعاً آلوده است چون مقادیر نیتروژن و فسفر کل بالا است.
- ۲) قطعاً آلوده است چون در رودخانه تغذیه‌گرایی رخ داده است.
- ۳) قطعاً آلوده نیست چون مقادیر اکسیژن محلول بسیار بالا است.

-۲۴ (۴) دقیقاً نمی‌شود اظهار نظر کرد و باید در طی چند روز متوالی و به صورت ساعتی در طی شبانه‌روز نسبت به اندازه‌گیری اکسیژن محلول اقدام نمود.

-۲۴ زمان ماند مخزن،تابع چه فاکتورهایی است و رابطه آن چگونه تعریف می‌شود؟

- ۱) دبی ورودی و دبی خروجی مخزن؛ با دبی ورودی رابطه مستقیم و با دبی خروجی رابطه معکوس دارد.
- ۲) حجم مخزن و دبی ورودی مخزن؛ با حجم مخزن رابطه مستقیم و با دبی ورودی رابطه معکوس دارد.
- ۳) حجم مخزن و دبی خروجی مخزن؛ با حجم مخزن رابطه مستقیم و با دبی خروجی رابطه معکوس دارد.
- ۴) دبی ورودی و دبی خروجی مخزن؛ با دبی خروجی رابطه مستقیم و با دبی ورودی رابطه معکوس دارد.

-۲۵ فرق دو راکتور **Plug Flow** و **CFSTR** در موضوع توزیع آلودگی کدام مورد است؟

- ۱) در راکتور CFSTR هم انتقال و هم پخش حاکم است و در Plug Flow انتقال حاکم است.
- ۲) در راکتور CFSTR پخش حاکم است و در Plug Flow انتقال و پخش هر دو حاکم است.
- ۳) در راکتور CFSTR پخش حاکم است و در Plug Flow انتقال حاکم است.
- ۴) در راکتور CFSTR انتقال حاکم است و در Plug Flow پخش حاکم است.

-۲۶ منحنی لایه‌بندی شوری و حرارتی در یک مخزن عمیق سد از سطح به عمق، به ترتیب به چه صورت خواهد بود؟

- ۱) افزایشی - کاهشی
- ۲) کاهشی - افزایشی
- ۳) یکنواخت - یکنواخت
- ۴) یکنواخت - کاهشی

- ۲۷- کدام یک از پارامترهای زیر در پایش آنلاین نمی‌تواند مدنظر قرار گیرد؟
- (۱) شوری و دما
  - (۲) شوری و DO
  - (۳) سوم و فلزات سنگین
  - (۴) pH و DO
- ۲۸- عوامل مؤثر بر کنترل تغذیه‌گرایی رودخانه با نگاه اقتصادی چه خواهد بود؟
- (۱) کنترل نیتروژن به دلیل مقدار بیشتر و هزینه کنترل کمتر
  - (۲) کنترل فسفر به دلیل مقدار کمتر و هزینه کنترل بالاتر
  - (۳) کنترل فسفر به دلیل مقدار بیشتر و هزینه کنترل کمتر
  - (۴) کنترل نیتروژن و فسفر براساس ارزش اقتصادی آنها
- ۲۹- مهم‌ترین مشکل LID یا همان روش‌های توسعه کم اثر در کنترل رواناب در شهری مانند تهران کدام گزینه است؟
- (۱) با توجه به بافت کالبدی شهر امکان پیاده‌سازی عملی زیاد ندارند.
  - (۲) روش‌هایی روزآمد و تکنولوژیکی برای شهر تهران نیستند.
  - (۳) اصولاً برای کشورهای توسعه‌یافته قابل طرح است.
  - (۴) قابلیت مدل‌سازی در شهر تهران را ندارند.
- ۳۰- کدام گزینه مهم‌ترین پارامتر آلودگی آب زیرزمینی در شهرهای بزرگ بوده و دلیل آن کدام است؟
- (۱) نیتریت - پایداری بالایی در محیط آبی دارد.
  - (۲) نیترات - پایداری بالایی در محیط آبی دارد.
  - (۳) فلزات سنگین - با خاک واکنش نشان داده و پایدار می‌گردد.
  - (۴) BOD<sub>5</sub> - نشت فاضلاب به چاههای شهری خیلی متداول است.
- ۳۱- کدام گزینه درباره پارامترهای کیفی بیولوژیک و شاخص‌های بیولوژیک در تشخیص آلودگی، به ترتیب درست است؟
- (۱) تشخیص آلودگی زودگذر - تشخیص آلودگی درازمدت
  - (۲) تشخیص آلودگی درازمدت - تشخیص آلودگی کوتاه‌مدت
  - (۳) تشخیص آلودگی کوتاه‌مدت - تشخیص آلودگی درازمدت
  - (۴) تشخیص آلودگی کوتاه‌مدت - تشخیص آلودگی زودگذر
- ۳۲- کدام گزینه به رابطه فسفر و فرسایش اشاره می‌کند؟
- (۱) مستقل خطی هستند.
  - (۲) رابطه معکوسی دارند.
  - (۳) رابطه مستقيمي دارند.
  - (۴) مستقل غيرخطی هستند.
- ۳۳- عمق سکی با شدت تغذیه‌گرایی چه رابطه‌ای دارد؟
- (۱) رابطه لگاریتمی
  - (۲) رابطه معکوس
  - (۳) رابطه مستقيمي
  - (۴) رابطه نمایی
- ۳۴- در رابطه  $(TDS = K * EC)$ ، حدود متغیر K کدام است؟
- (۱) بین ۰/۸ تا ۰/۹
  - (۲) بین ۱/۱۱ تا ۱/۲۵
  - (۳) بین ۱/۴۲ تا ۲/۲۲
  - (۴) بین ۰/۷ تا ۰/۴۵
- ۳۵- تعداد ایستگاه‌های پایش،تابع چه ویژگی‌هایی از داده‌های آماری کیفی گذشته است؟
- (۱) هزینه ثابت، واریانس و میانه
  - (۲) هزینه متغیر، واریانس و میانگین
  - (۳) هزینه ثابت، میانه و میانگین
  - (۴) هزینه متغیر، میانه و میانگین

- ۳۶- در جدول زیر، حجم آب تأمین شده در هر ماه آورده شده است. درصورتی که نیاز آبی MCM ۱۵ در ماه باشد، میزان اطمینان پذیری و برگشت پذیری به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

ماه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
MCM حجم آب	۲۰	۱۲	۱۵	۱۰	۱۰	۱۵	۱۵	۱۳	۱۷	۱۶

725, 74° (2) 725, 74° (1)  
770, 78° (4) 770, 78° (5)

<sup>۳۷</sup>- در یک مدل تخصص، بار آلوودگ، کدام هدف در بخش بهسنه‌سازی اهمت کمتری دارد؟

- (۱) حداقا سایی، مجموع هنرهاه، تصفه  
۲) حداقا سایی، مجموع خودبالار، و دخانه

(۳) حداقة ساز، مجموع تخطه، از استاندارد کفیت آب ۴) حداقة ساز، دفعات تخطه از استاندارد کفیت آب

-۳۸- بای، مدیر بت کیفیت آب خروجی، از سد، کدام، اهکا، بیشنها دی درست است؟

(۱) پرداخت آب از ترازهای مختلف  
۲) پیر داری مطابق با منحنی فرمان

(۳) جلوگیری از لایه‌بندی حرارتی سد  
۴) باز بودن مداوم در ریخه تختانی سد

- ۳۹- در یک جریان آب زیرزمینی، کدام متغیر اهمیت کمتری دارد؟

- ١) مجموع مواد محلول ٢) هدایت الکتریکی ٣) نیتر وزن کل ٤) کالیفرم

- ۴۰- شاخصی که برای نشان دادن حجمی از آب که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تولید کالا یا ارائه خدمات به مصرف مرسد، جه نام دارد؟

۱) سانه مصرف ۲) بھروی، آب ۳) آب محاذی ۴) دیای آب

گدام پارامتر در تعیین شاخص کیفیت آب NSF - WQI دخالت ندارد

٤) فسفات ٣) قلائحيت ٢) BOD ١) DO

نیت جذب سدیم (SAR) کدام است؟

$$\frac{\text{Na}^+}{\sqrt{\frac{1}{r}(\text{Ca}^{r+} + \text{Mg}^{r+})}} \quad (1)$$

$$\frac{\text{Na}^+}{\frac{1}{\sqrt{2}}(\text{Ca}^{++} + \text{Mg}^{++})} \quad (\text{f})$$

۴۳- کدامیک از علائم بروز تغذیه‌گرایی در مخزن سد محسوب نمی‌شود؟

- ۱) افزایش جلبک‌ها و گیاهان در آب  
۲) طعم و بوی نامطلوب آب

۳) افزایش اکسیژن محلول در لایه زیرین ۴) کاهش شفافیت و افزایش کدورت آب

- در یک مسئله بیهینه‌سازی چند هدفه با حداقل‌سازی  $Z_1$  و  $Z_2$ ، مقادیر جواب  $(Z_1, Z_2)$  به صورت زیر به دست آمده است، کدام جواب به عنوان جواب غیرپست مورد قبول نیست؟

A) (1, 10) B) (11, 1) C) (10, 1) D) (1, 1)

D (f) C (r) B (s) A (t)

در یک مدل بهره‌برداری از سد، کدام تابع هدف نمی‌تواند مدنظر قرار گیرد؟

۱) حداقل‌سازی مجموع نسبت تأمین به نیاز  
۲) حداقل‌سازی میزان عدم تأمین