

کد کنترل

368

F



دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه
۱۴۰۱/۱۲/۱۱جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد ۲۴۱۲)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی: - شیمی مواد غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی - میکروبیولوژی صنعتی - خواص فیزیکی مواد غذایی - روش های نوین آزمایشگاهی - انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی | ۷۰ | ۱ | ۷۰ |

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (شیمی مواد غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی - میکروبیولوژی صنعتی - خواص فیزیکی مواد غذایی - روش های نوین آزمایشگاهی - انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی):

- ۱ عامل اصلی عطر و بوی خاص زعفران، کدام ماده است؟
 - (۱) پیکروکروسین
 - (۲) جنتوبیوز
 - (۳) سافرانال
 - (۴) کروسین
- ۲ امولسیفایر با HLB پایین و کمتر از ۱۵، در تهیه کدام محصول می تواند استفاده شود؟
 - (۱) بستنی
 - (۲) خامه
 - (۳) سس مایونز
 - (۴) مارگارین
- ۳ کدام مورد درباره آلدئیدهای حاصل از مراحل اکسیداسیون روغن، درست است؟
 - (۱) اولیه، اسیدی
 - (۲) اولیه، توتوکس
 - (۳) ثانویه، آنیزیدین
 - (۴) ثانویه، پراکسید
- ۴ علت اینکه شیر استریلیزه می تواند جوشانده و تغليظ گردد بدون آنکه منعقد شود، کدام است؟
 - (۱) دناتوراسیون پروتئین و کاهش آرایش منظم پپتیدها
 - (۲) دناتوراسیون پروتئین و تشکیل پلیمرهای نیتروژنی
 - (۳) پایداری کازئین و زیادی تشکیل پیوندهای هیدروژنی
 - (۴) پایداری کازئین و کمی تشکیل پیوندهای دی سولفیدی
- ۵ مشتقات و انواع کدام رنگدانه بیشتر است؟
 - (۱) آنتوسیانین
 - (۲) کلروفیل
 - (۳) کاروتونئید
 - (۴) هموگلوبین
- ۶ در استریفیکاسیون داخلی تری استئارین با تری اولئین با نسبت مساوی در شرایط مطلوب، چند درصد تری گلیسرید اولئیک - استئاریک - اولئیک به دست می آید؟
 - (۱) ۱۲/۵
 - (۲) ۲۵
 - (۳) ۵۰
 - (۴) ۷۵
- ۷ کدام رنگدانه معمولاً در اثر فعالیت های میکروبی در گوشت به وجود می آید؟
 - (۱) سبز سولفو میوگلوبین
 - (۲) صورتی نیتروز میوگلوبین
 - (۳) قهوه ای مت میوگلوبین
 - (۴) قرمز اکسی میوگلوبین
- ۸ کدام اسید چرب به عنوان شاخص در شناسایی روغن کوچک به کار می رود؟
 - (۱) استئاریک اسید
 - (۲) اروپیک اسید
 - (۳) ریسینولئیک اسید
 - (۴) لینولنیک اسید
- ۹ کدام ترکیب جزو ترکیبات غیر صابونی محسوب می شود؟
 - (۱) الکل های بلند زنجیره اسکوآلن و استرول ها
 - (۲) الکل های ترپنی و آسیل گلیسرول ها
 - (۳) فسفولیپیدها و چربی های خنثی
 - (۴) هیدروکربن ها و تری آسیل گلیسرول ها
- ۱۰ کدام مورد به عنوان بازدارنده رشد مخمر در آبمیوه ها به کار می رود؟
 - (۱) Dimethyl Dicarbonate
 - (۲) Polyamino Acids
 - (۳) Chitosans
 - (۴) Glucose Oxidase

- | | | |
|--|--|------------|
| <p>۱) تخم مرغ ۲) جوانه غلات ۳) شیر گوسفند ۴) شیر گاو میش</p> | <p>لیزوزیم به عنوان یک عامل بازدارنده میکروبی در کدام ماده وجود دارد؟</p> <p>کدام مورد درست است؟</p> <p>۱) ویروس ها به کندی تکثیر پیدا می کنند و میزبان اختصاصی ندارند. ۲) ویروس ها خارج از میزبان اختصاصی خود حتی درون مواد غذایی هم می توانند رشد کنند. ۳) ویروس های گوارشی، ویروس های RNA دار بدون پوشش هستند و می توانند در اسید معده زنده بمانند. ۴) ویروس های گوارشی مسری نیستند و تعداد کمی از آنها برای ایجاد عفونت ناشی از مواد غذایی نیاز است.</p> | <p>-۱۱</p> |
| | <p>«توسط کدام میکروب در میوه ها ایجاد می شود؟</p> <p><i>Alternaria citri</i> (۲) <i>Colletotrichum coccodes</i> (۴)</p> | <p>-۱۲</p> |
| | <p><i>Aspergillus niger</i> (۱) <i>Botrytis cinerea</i> (۳)</p> | <p>-۱۳</p> |
| | <p>باکتری های میکرو ائروفیل با ذکر مثال چگونه باکتری هایی هستند؟</p> <p>۱) باکتری هایی که در فشار کم اکسیژن بهتر رشد می کنند - <i>Clostridium</i> ۲) باکتری های هوایی که در شرایط کمی احیاء بهتر رشد می کنند - <i>Campylobacter</i> ۳) باکتری های هوایی و بی هوایی اختیاری را می گویند - <i>Escherichia</i> ۴) باکتری های تحمل کننده هوا را می گویند - <i>Carnobacterium</i></p> | <p>-۱۴</p> |
| | <p><i>Pseudomonas</i> موجود در یک نمونه آب، باعث کدام واکنش در محیط EC Broth در دمای ۳۰ درجه سلسیوس می شود؟</p> <p>۱) رشد کرده و محیط را کدر می کند. ۲) اسید تولید می کند. ۳) گاز تولید می کند. ۴) رشد نمی کند.</p> | <p>-۱۵</p> |
| | <p>کدام مورد، مفهوم هردل (Hurdle Concept) را در عبارت زیر به نحو کامل تری بیان می کند؟</p> <p>«از ترکیب مؤثر بر میکرووار گانیسم، برای کنترل بهتر میکرووار گانیسم استفاده می شود.»</p> <p>۱) دو یا چند فاکتور درونی ۲) دو یا چند فاکتور (بیرونی - درونی) ۳) دو یا چند فاکتور بیرونی ۴) دما با یکی از فاکتورهای بیرونی دیگر</p> | <p>-۱۶</p> |
| | <p>در کدام حالت خاصیت ضد میکروبی گاز CO_2 افزایش می یابد؟</p> <p>۱) تحت فشار پایین هیدرواستاتیک ۲) تحت فشار بالای هیدرواستاتیک ۳) تحت خلاء ۴) در دمای محیط</p> | <p>-۱۷</p> |
| | <p>مايكوتوكسين فومونوزين (<i>Fumonosin</i>) به وسیله کدام کپک زیر تولید می شود؟</p> <p>۱) <i>Penicillium</i> (۴) ۲) <i>Fusarium</i> (۳) ۳) <i>Alternaria</i> (۲) ۴) <i>Aspergillus</i></p> | <p>-۱۸</p> |
| | <p>چرا ته برخی قابلمه های استیل، یک لایه مسی منظور می کنند؟</p> <p>۱) افزایش عمر قابلمه ۲) سرعت انتقال حرارت بیشتر ۳) نگهداری گرمای بیشتر ۴) مس اثر سلامت بخشی دارد.</p> | <p>-۱۹</p> |
| | <p>کدام مورد بر سرعت انتقال حرارت به قوطی کنسرو و قطعات مرغ در سس، مؤثر نیست؟</p> <p>۱) اندازه قوطی ۲) جنس بدنۀ قوطی ۳) دمای اتوکلاو ۴) نوع سس اطراف قطعات</p> | <p>-۲۰</p> |
| | <p>با کاهش کدام فاکتور، عدد رینولذ افزایش پیدا می کند؟</p> <p>۱) دانسیته ۲) سرعت جریان ۳) قطر لوله ۴) ویسکوزیته</p> | <p>-۲۱</p> |
| | <p>در ارتباط با سیکل گاز مبرد آمونیاک در سیستم های سرد کننده کمپرسوری، کدام مورد در خصوص آنتالپی گاز درست است؟</p> <p>۱) در کمپرسور افزایش پیدا می کند. ۲) در سوپاپ انبساط کاهش پیدا می کند. ۳) در اوپرатор افزایش پیدا می کند.</p> | <p>-۲۲</p> |

- ۲۳- دلیل خنک شدن هوا در کولرهای آبی کدام مورد است؟
- (۱) انتقال گرما از هوا به آب
 - (۲) افزایش رطوبت هوا
 - (۳) عبور هوا از کنار آب خنک
 - (۴) کاهش آنتالپی هوای مرطوب
- ۲۴- طول لوله یک مبدل لوله‌ای در کدام حالت در شرایط یکسان می‌تواند کمتر باشد؟
- (۱) جریان موازی
 - (۲) جریان متقابل
 - (۳) جریان عمود بر هم
 - (۴) مختلط موازی و متقابل
- ۲۵- دمای یک طرف صفحه فولادی به ضخامت ۱ میلی‌متر 80°C و طرف دیگر آن 20°C درجه سلسیوس است. اگر ضریب انتقال حرارت فولاد $17 \text{ وات بر متر درجه سلسیوس}$ باشد، مقدار انتقال گرما برای یک متر مربع بر حسب کیلو وات چقدر است؟
- (۱) $4/3$
 - (۲) 34
 - (۳) 43
 - (۴) 340
- ۲۶- دمای شیر ورودی به یک دستگاه تبادل حرارت 20°C و دمای خروجی آن 70°C و دمای آب ورودی 90°C و آب خروجی 60°C است. مقدار اختلاف دمای لگاریتمی برای حالت موازی برحسب سلسیوس چقدر است؟ (فرض کنید $\ln(7) = 2$ باشد).
- (۱) 15
 - (۲) 30
 - (۳) 45
 - (۴) 60
- ۲۷- در انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی (خودبه‌خود) از هوا به جسم، کدام مورد تأثیر ندارد؟
- (۱) چگالی جسم
 - (۲) چگالی هوا
 - (۳) دمای جسم
 - (۴) دمای هوا
- ۲۸- مرحله **Set Back** در آمیلوگرام را چگونه تفسیر می‌کنند؟
- (۱) افزایش ویسکوزیته به‌دلیل جذب آب و متورم شدن گرانول‌ها
 - (۲) کاهش ویسکوزیته و هم‌جهت شدن مولکول‌های نشاسته به همزن دستگاه
 - (۳) کاهش انرژی ناشی از سرد شدن خمیر نشاسته و تشکیل پیوندهای هیدورژنی
 - (۴) کاهش انرژی به‌دلیل از هم گسیختگی ساختار گرانولی ناشی از تورم بیش از حد
- ۲۹- افزایش نسبت گلایدین‌ها به گلوتنین‌ها $\left(\frac{\text{Gli}}{\text{Glu}} \text{ ratio} \right)$ در ارقام مختلف گندم، موجب افزایش در آزمون فارینوگراف خمیر می‌شود.
- (۱) پایداری خمیر (DTT) (Dough Stability)
 - (۲) زمان تشکیل خمیر (MTI) (FQN)
 - (۳) عدد کیفی فارینوگراف (MTI)
- ۳۰- برای تعریف و هدف «ارزیابی کیفیت تکنولوژیک چغندر قند»، کدام مورد درست‌تر است؟
- (۱) پیش‌بینی درصد ضایعات قندی ملاس و درصد شکر استحصال از چغندر
 - (۲) درصد افت وزنی چغندر همراه با تعیین درصد قند ساکارز در چغندر
 - (۳) اندازه‌گیری کل ضایعات قندی خط تولید شکر از چغندر
 - (۴) حاصل ضرب مقادیر عناصر αN (ازت آمینه)، K , Na

- ۳۱- علت استفاده از درجه حرارت $121/1^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس در تهیه کنسرو ماهی، کدام است؟
 ۱) انهدام سوم تولید شده توسط باکتری های بی هوازی ۲) بالا بودن تعداد باکتری های بی هوازی
 ۳) کندی سرعت نفوذ حرارت در ماهی ۴) داشتن pH بین ۶ تا ۷
- ۳۲- در روش ترسیمی برای محاسبه زمان استریلیزاسیون غذای کنسروی، منظور از ارزش استریل کنندگی (Sterilization Value) کدام است؟
 ۱) نشانگر فرایند حرارتی در $121/1^{\circ}\text{C}$ به مدت یک دقیقه
 ۲) سطح زیر منحنی اثر کشندگی (منحنی میزان کشندگی) (Lethal Rate Curve)
 ۳) مدت لازم برای از بین بردن 90° درصد از میکروارگانیسم خاص در یک درجه حرارت معین
 ۴) تعداد درجات حرارت که در آن منحنی زمان مرگ حرارتی (TDT) به اندازه یک سیکل لگاریتمی تغییر کند.
- ۳۳- شب منحنی در منحنی های TDT توسط کدام یک از عوامل زیر تعیین می شود؟
 ۱) تعداد درجه فارنهایت کاهش یک سیکل لگاریتمی زمان
 ۲) تعداد درجه فارنهایت کاهش 90° درصد از جمعیت میکروارگانیسم ها
 ۳) مدت زمان کاهش 90° درصد از جمعیت میکروارگانیسم ها بر حسب دقیقه
 ۴) مدت زمان کاهش یک سیکل لگاریتمی زمان بر حسب دقیقه
- ۳۴- کیفیت مواد غذایی در کدام روش انجام داد، بهتر حفظ می شود؟
 Air Blast Freezing (۲) Individual Quick Freezer (IQF) (۱)
 Slow Freezing (۴) Plate Freezing (۳)
- ۳۵- افزایش جمعیت و فعالیت فاژهای ویروسی در شیر، منجر به کدام مورد می شود؟
 ۱) بازدارندگی فعالیت ریز زنده ها در دما و زمان خاص می شود.
 ۲) توقف فرایند تخمیری و توقف افزایش اسیدیته می شود.
 ۳) تخریب کیفیت محصول نهایی ماست، پنیر و خامه تخمیری می شود.
 ۴) توقف و بازدارندگی عمل آوری پنیر (Ripening) می شوند.
- ۳۶- از کدام شاخص می توان برای نشان دادن فساد روغن ها استفاده نمود؟
 ۱) ایجاد پیوند هیدروژنی میان گروه های کربوکسیل - تشکیل مولکول های دیمر
 ۲) افزایش خمیدگی زنجیر کربنی در محل پیوندهای دو گانه - تغییر در نقطه ذوب
 ۳) جابه جایی پیوند دو گانه و تبدیل غیر کنزوگه به کنزوگه - جذب توسط اشعه ماوراء بنفش
 ۴) افزایش حلایت اسیدهای چرب در هگزان با افزایش تعداد پیوندهای دو گانه سیس - انجام جداسازی اسیدهای چرب در حرارت پایین
- ۳۷- در تولید کره گیاهی، بیشترین هسته زایی و رشد اولیه بلورهای چربی در کدام واحد اتفاق می افتد؟
 Cooling unit (۲) Crystallization unit (۱)
 Resting unit (۴) Emulsification unit (۳)
- ۳۸- مهم ترین ماده غذایی در جلبک *Spirulina* کدام است؟
 ۱) آمینو اسید لیزین ۲) سیتریک اسید ۳) اسید چرب امگا ۶ ۴) ویتامین C
- ۳۹- نقش اصلی نشاسته در فرایند تخمیری تولید آلفا آمیلاز با استفاده از ملاس چغندر قند، کدام است؟
 ۱) القاکننده ۲) تغليظ کننده ۳) ضد کف ۴) منبع کربن

- ۴۰- براساس کدام فرمول می‌توان Generation Time سلول‌ها را محاسبه کرد؟

$$T_d = \frac{\mu_{\max}}{\ln 2} \quad (2)$$

$$T_d = \frac{\ln 2}{\mu_{\max}} \quad (4)$$

$$T_d = \frac{\mu}{\ln 2} \quad (1)$$

$$T_d = \frac{\ln 2}{\mu} \quad (3)$$

- ۴۱- اگزو پلی‌ساکارید Curdlan توسط کدام جنس باکتری تولید می‌شود؟

Agrobacterium (۲)

Leuconostoc (۴)

Acetobacter (۱)

Azotobacter (۳)

- ۴۲- کدام مورد از مشکلات مربوط به استفاده از Continuous Culture در فرایند تخمیر است؟

(۲) پیچیدگی فرایند و زمان طولانی تخمیر

(۴) هزینه بالا

(۱) آلودگی میکروبی و جهش تصادفی

(۳) بازدهی پایین

- ۴۳- کدام میکروارگانیسم به عنوان GRAS در میکروبیولوژی صنعتی استفاده می‌شود؟

Bacillus cereus (۲)

Yersinia sp. (۴)

Aspergillus niger (۱)

Escherichia coli (۳)

- ۴۴- پدیده Diauxic Growth پدیده‌ای در محیط‌های کشت میکروبی است که در آن

(۱) دو منبع ازت وجود داشته باشد.

(۲) دو منبع کربن وجود داشته باشد.

(۳) یک منبع کربن و یک منبع ازت وجود داشته باشد.

(۴) یک منبع پروتئینی و یک منبع معدنی وجود داشته باشد.

- ۴۵- کدام مورد، معايب ضدکفهای رایج در فرمانتورها محسوب می‌شود؟

(۲) کشش سطحی بالا و عملکرد سریع

(۴) حلالیت کم و نیاز به یک حامل

(۱) وزن مولکولی کم

(۳) مقاومت حرارتی ضعیف

- ۴۶- ویسکوزیته ساختمانی برای کدام نوع محصول اتفاق می‌افتد؟

(۴) ماست

(۳) شیره

(۲) پنیر

(۱) ارد

- ۴۷- دلیل استفاده از پلاستی سایزر در پلیمرها چیست؟

(۲) مقاومت در برابر کشش

(۴) فرم پذیری

(۱) افزایش خاصیت الاستیسیته

(۳) برگشت پذیری

- ۴۸- Yield stress مربوط به کدام خصوصیت است؟

(۴) ویسکو الاستیک

(۳) سودو پلاستیک

(۲) پلاستیک

(۱) الاستیک

- ۴۹- کدام حالت، خصوصیت بینگهام پلاستیک است؟

(۱) منحنی رابطه Shear stress to Shear strain از صفر شروع نشده و بعد از Yield shear stress خطی باشد.

(۲) منحنی Stress to Strain از صفر شروع نشده و بعد حالت افقی داشته باشد.

(۳) منحنی Stress to Shear Strain ابتدا خطی و بعد منحنی شود.

(۴) منحنی Shear stress to strain ابتدا خطی بعد منحنی شود.

- ۵۰- کدام فاکتور در ارزیابی رنگ مؤثر نیست؟

(۴) نوع جسم

(۳) فرم جسم

(۲) منبع نور

(۱) دتکتور

- ۵۱ مقدار مدول الاستیسیته لوبیای چیتی قابل عرضه در بازار دو برابر لوبیای سویای قابل عرضه در بازار بود، تفاوت در کدام خصوصیت می‌تواند باعث این اختلاف شده باشد؟
- (۱) اندازه
(۲) ترکیبات
(۳) دانسیته
(۴) شکل
- ۵۲ دستگاه فالینگ نامبر بر اساس کدام مورد کار می‌کند؟
- (۱) انعقاد گلوتن و کاهش کانزیستانسی ژل آرد
(۲) کاهش ویسکوزیته در اثر فعالیت آنزیم فیتاز
(۳) کاهش ویسکوزیته در اثر فعالیت آلفا آمیلار
- ۵۳ مفهوم دو واژه **Loss modulus** و **Storage modulus** به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
- (۱) تلف کردن انرژی و حفظ انرژی
(۲) خاصیت انبارمانی و تلفات انباری
(۳) خصوصیت ویسکوز و الاستیک داشتن
- ۵۴ ویسکوزیته شربت ساکارز، وابستگی بیشتری به کدامیک از عوامل زیر دارد؟
- (۱) دما
(۲) فشار
(۳) سرعت برشی
(۴) زمان
- ۵۵ از کدام روش برای تعیین درصد نشاسته ژلاتینه شده و نشاسته بلوری باقیمانده، استفاده می‌شود؟
- (۱) XRD
(۲) NMR
(۳) FT-IR
(۴) AAS
- ۵۶ در تکنیک ICP-AES با دمای (K₁₀₀₀) در مقایسه با شعله (C₂H₂-N₂O) با دمای (K₃₀₀) شدت خطوط نشری و میزان یونیزاسیون به ترتیب کدام است؟
- (۱) بیشتر و بیشتر
(۲) بیشتر و کمتر
(۳) کمتر و بیشتر
(۴) کمتر و کمتر
- ۵۷ اگر پهنهای پیک‌ها در کروماتوگرام زیاد باشد، روش مناسب‌تر برای کاهش پهنهای پیک، کدام است؟
- (۱) آزمایش دوباره تکرار شود.
(۲) سرعت حرکت کاغذ ثبات افزایش یابد.
(۳) حساسیت آشکارساز کاهش یابد.
- ۵۸ برای جداسازی -۲-متیل پنتان و -۳-متیل پنتان، کدام روش کروماتوگرافی مناسب‌تر است؟
- (۱) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
(۲) کروماتوگرافی جذب سطحی
(۳) کروماتوگرافی با سیال فوق بحرانی
(۴) کروماتوگرافی طرد اندازه
- ۵۹ کدام تکنیک برای تشخیص استرول‌های گیاهی در فراورده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) HPLC
(۲) GC
(۳) PCR
(۴) AES
- ۶۰ یک ستون کروماتوگرافی به طول ۲۵ سانتی‌متر برای جداسازی دو گونه A و B استفاده شده است. مقدار N = ۲۵۰۰ و قدرت تفکیک ۱/۲۵ به دست آمده است، حداقل طول ستون برای تفکیک مناسب (Rs = ۱/۵) چند سانتی‌متر باید باشد؟
- (۱) ۳۰
(۲) ۳۶
(۳) ۳۷/۵
(۴) ۴۰
- ۶۱ ترتیب جداسازی گونه‌های مختلف براساس زمان رسیدن به آشکارساز، کدام است؟
- (۱) گونه‌های دارای بار غیرهمنام با الکترود مقصد، گونه‌های خنثی، گونه‌های دارای بار همنام با الکترود مقصد
(۲) گونه‌های دارای بار غیرهمنام، گونه‌های دارای بار همنام
(۳) گونه‌های باردار، گونه‌های خنثی
(۴) گونه‌های خنثی، گونه‌های باردار
- ۶۲ اگر ترکیبی با فرمول $\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$ در طول موج ۲۰۰ nm جذب داشته باشد، انتظار دارید که بیشینه جذب این ترکیب $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ به طرف چه طول موج‌هایی جابه‌جا شود و شدت آن نسبت به ترکیب اول چگونه تغییر می‌یابد؟
- (۱) آبی، شدت کمتر
(۲) آبی، شدت بیشتر
(۳) قرمز، شدت بیشتر
(۴) قرمز، شدت کمتر

-۶۳- مفهوم Effective diffusivity (D_{eff}) در انتقال جرم چیست؟

- ۱) خاصیت انتقالی کلی است که برای استفاده در انتقال جرم، ساده‌سازی شده است.
- ۲) حداکثر ضریب انتشار جرم که معمولاً به صورت نشر اتمی رخ می‌دهد.
- ۳) ضریب انتشار (نفوذ) مؤثر است، با فرض اینکه همه انتقال جرم از طریق مؤینگی رخ می‌دهد.
- ۴) ضریب انتشار (نفوذ) مؤثر است، با فرض اینکه فقط جزیی از انتقال جرم از طریق شیب غلظت رخ می‌دهد.

-۶۴- تعریف زیر برای کدام عدد بدون بعد صدق می‌کند؟

«عبارت است از نسبت گرمای انتقال یافته از طریق جابه‌جایی به گرمای انتقال یافته از طریق هدایتی در مرز سیستم.»

- ۱) بایویوت
- ۲) عکس بایویوت
- ۳) گراشوفر
- ۴) ناست

-۶۵- با توجه به اصل تشابه بین پدیده‌های انتقال حرارت و جرم، بهجای اعداد بدون بعد رینولدز Re ، ناسلت Nu و پرانتل Pr در انتقال حرارت، کدام اعداد بدون بعد به ترتیب از راست به چپ در انتقال جرم، قابل استفاده هستند؟

- ۱) Sc و Sh, Pe (۲)
- ۲) Sc و Sh, Re (۴)
- ۳) Sc و Sh, Re (۳)

-۶۶- مهم‌ترین کاربرد رابطه $Sh = C Re^m Sc^n$ در محاسبه کدام مورد است؟

- ۱) بعد مشخصه ماده غذایی
- ۲) ضریب انتقال جرم جابه‌جایی
- ۳) ضریب انتشار مؤثر رطوبت

-۶۷- دمای درون اتاقی $C = 20^{\circ}C$ و ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی هوای داخل اتاق $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ است. اتاق، پنجره به شیشه‌ای به مساحت $2 m^2$ دارد که دمای سطح بیرونی شیشه $5^{\circ}C$ است. اگر میزان انتقال حرارت از پنجره به بیرون $\frac{J}{s} = 10^0$ و شرایط پایا برقرار باشد، ضخامت شیشه بر حسب متر کدام است؟ (ضریب هدایت حرارتی شیشه

$$\frac{W}{m \cdot ^\circ C} = 0.04$$

(۱) 0.1
 (۲) 0.12
 (۳) 0.02
 (۴) 0.006

-۶۸- در مرحله نرخ نزولی خشک کردن مواد غذایی، کدام مقاومت در مقابل انتقال جرم و حرارت اهمیت پیدا می‌کند؟

- ۱) مقاومت داخلی
- ۲) مقاومت خارجی
- ۳) نه مقاومت داخلی و نه مقاومت خارجی
- ۴) مقاومت داخلی و مقاومت خارجی

-۶۹- هرگاه در یک فرایند حرارتی در صنایع غذایی، عدد فوریه (FO) بزرگ‌تر از یک باشد، کدام مورد افزایش می‌یابد؟

- ۱) انتقال حرارت هدایتی
- ۲) انتقال حرارت تابشی
- ۳) انتقال حرارت جابه‌جایی
- ۴) ذخیره حرارتی

-۷۰- هرگاه در یک فرایند حرارتی در صنایع غذایی، انتشار مولکولی مومنتوم خیلی بیشتر از انتشار مولکولی حرارت باشد، کدام مورد درست است؟

- ۱) عدد ناسلت خیلی بزرگ‌تر از یک است.
- ۲) عدد ناسلت خیلی کوچک‌تر از یک است.
- ۳) عدد پرانتل خیلی بزرگ‌تر از یک است.