

کد کنترل



412F

412

F

آزمون (نیمه‌تمکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

رادیولوژی دامپزشکی (کد ۲۷۰۵)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – کالبدشناسی استخوان و مفاصل – رادیولوژی – فیزیک پزشکی – بیماری‌های اندام‌های حرکتی	۷۵	۱	۷۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپه تکنیک و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نهادها ممنوع است. این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (کالبدشناسی استخوان و مفاصل - رادیولوژی - فیزیک پزشکی - بیماری های اندام های حرکتی):

- | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| در سگ ها کدام مرکز استخوان سازی، دیرتر از سایرین بسته می شود؟ | -۱ | | |
| (۱) صفحه رشد دیستال رادیوس | | | |
| (۲) صفحه رشد پروکسیمال اولنا | | | |
| (۳) صفحه رشد پروکسیمال فمور | | | |
| (۴) صفحه رشد پروکسیمال بال ایلیوم | | | |
| بزرگ ترین دندان در فک بالایی گرمه کدام است؟ | -۲ | | |
| PM3 (۴) | PM4 (۳) | M2 (۲) | M1 (۱) |
| Temporal bone (۴) | Occipital bone (۳) | Basisphenoid (۲) | Presphenoid (۱) |
| در کدام حیوان، Hypophyseal Fossa در کدام استخوان قرار دارد؟ | -۳ | | |
| در کدام حیوان، Os Malleolare مشاهده می شود؟ | -۴ | | |
| (۱) گوسفند (۴) گرمه | (۲) سگ (۳) اسب | | |
| در کدام حیوان، Fovea Capitis به سمت مدیال حاشیه سر استخوان ران متمايل شده است؟ | -۵ | | |
| (۱) سگ (۴) گوسفند | (۲) گاو (۳) اسب | | |
| در سگ چندمین مهره سینه ای، Anticlinal Vertebra است؟ | -۶ | | |
| (۱) هشتمين (۴) یازدهمین | (۲) نهمین (۳) دهمین | | |
| کدام ساختار، خاص مهره های ستون مهره گوشتخواران است و در نشخوار کننده ها و تکسیمیان دیده نمی شود؟ | -۷ | | |
| Transverse Foramen (۲) | Ventral Crest (۱) | | |
| Mammillary Processes (۴) | Accessory Processes (۳) | | |
| در مهره اطلس کدام حیوان به جای Alar notch Alar Foramen ساختار وجود دارد؟ | -۸ | | |
| (۱) سگ (۴) گوسفند | (۲) اسب (۳) گاو | | |
| در سگ دستگاه لامی با کدام بخش از جمجمه مفصل می شود؟ | -۹ | | |
| Styloid Process (۲) | Nuchal Process (۱) | | |
| Mastoid Process (۴) | Muscular Process (۳) | | |
| تعداد استخوان های Carpal در سگ چند عدد است؟ | -۱۰ | | |
| ۹ (۴) | ۸ (۳) | ۷ (۲) | ۶ (۱) |
| کدام مورد، از مزایای بارز اولتراسونوگرافی است؟ | -۱۱ | | |
| (۱) یک تکنیک غیرتهاجمی است. | | | |
| (۲) به بیهوشی عمومی نیاز ندارد. | | | |
| (۳) در بیشتر مواقع، تشخیص قطعی می دهد. | | | |
| (۴) برای ارزیابی عملکرد ارگان ها به کار می رود. | | | |

- ۱۲ در تصاویر رادیوگرافی یک سگ، نشانه‌های زیر دیده می‌شود، تشخیص شما چیست؟
Under-expose «ناحیه شکمی بزرگ و رادیوپاک تر از نرمال است. ارگان‌ها نا واضح بوده و رادیوگرافی به نظر می‌رسد. اوپسیته ستون مهره‌ها کاملاً طبیعی است.»
- | | |
|----------------------|------------------|
| Ascites (۲) | Obesity (۱) |
| Pneumoperitoneum (۴) | Hepatomegaly (۳) |
- ۱۳ در تصاویر رادیوگرافی، حباب‌های کوچک گاز مابین روده‌ها دیده می‌شوند، تشخیص شما چیست؟
Pancreatitis (۲)
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Free gas in the abdomen (۴) | Local peritonitis (۱) |
| | Linear foreign body (۳) |
- ۱۴ در رادیوگرافی از قفسه سینه یک سگ، قسمتی از معده در کنار ناحیه خلفی مری قرار گرفته است، تشخیص شما چیست؟
Diaphragmatic hernia (۲)
- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Peritoneopericardial hernia (۴) | Sliding hiatal hernia (۱) |
| | Paraesophageal hernia (۳) |
- ۱۵ در سونوگرافی کبد معمولاً نشان‌دهنده کدام عارضه است؟
Hepatic abscess (۲)
- | | |
|------------|----------------------------------|
| Biloma (۴) | Consistent sign of neoplasia (۱) |
| | A benign lesion (۳) |
- ۱۶ روش تصویربرداری **Portal scintigraphy** برای تشخیص کدام عارضه کمک‌کننده است؟
Arteriovenous fistula (۲)
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Hepatic haemangiosarcoma (۴) | Hepatic cirrhosis (۱) |
| | Portosystemic shunts (۳) |
- ۱۷ علامت رادیوگرافی "Zollinger-Ellison syndrome" نشان‌گر کدام مورد است؟
Gastric dilation and volvulus (۴)
- | | |
|---|-------------------------|
| Increased prominence of the gastric rugal folds (۴) | Heptomegaly (۱) |
| | Splenomegaly (۲) |
| | Thrombosis in aorta (۳) |
- ۱۸ علامت "Compartmentalization" در رادیوگرافی معده در کدامیک از عوارض قابل رویت است؟
Pyloric obstruction (۲)
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Gastric intusception (۳) | Chronic gastritis (۱) |
|--------------------------|-----------------------|
- ۱۹ ظاهر رادیوگرافی **Plication and bunching** در روده‌های کوچک سگ نشان‌گر چیست؟
Intestinal neoplasia (۲)
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Radiopaque foreign body (۴) | Linear foreign body (۱) |
| | Inflammatory Bowel Disease (۳) |
- ۲۰ در رادیوگرافی شکمی - پشتی، در خصوص اندازه طبیعی کلیه در سگ کدام مورد، درست است؟
 ۱/۵ برابر طول بدن مهره پنجم کمری است. (۲) ۲/۵ تا ۳/۵ برابر طول بدن مهره دوم کمری است.
 ۱/۵ تا ۲ برابر طول بدن مهره هفتم کمری است. (۳) ۲ تا ۳ برابر طول بدن مهره اول کمری است.
- ۲۱ در رادیوگرافی محوطه شکمی یک سگ مبتلا به سیستیت عفونی، کدام نشانه قابل رویت است؟
Distended urinary bladder (۲)
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| There is no radiographic changes (۴) | Irregular bladder wall (۱) |
| | Thickening of the bladder wall (۳) |
- ۲۲ در سونوگرافی کدامیک از تومورهای بیضه، امکان رویت آتروفی در بیضه مقابل وجود دارد؟
Lymphoma (۲)
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Interstitial cell tumor (۴) | Seminoma (۱) |
| | Sertoli cell tumor (۳) |

- ۲۳ - کدامیک از توده‌های محوطه بطنی در رادیوگرافی می‌توانند کولون نزولی را به سمت شکمی جابه‌جا کند؟
 Adrenal tumors (۲) Pyometra (۱)
 Mesenteric lymphadenomegaly (۴) Ovarian tumors (۳)
- ۲۴ - در رادیوگرافی قفسه سینه، نشانه "Nodular opacity" با کدام مورد می‌تواند اشتباه گرفته شود؟
 End-on Bronchus (۲) Bulla appearance (۱)
 End-on blood vessels (۴) Doughnut appearance (۳)
- ۲۵ - الگوی رادیوگرافی ربوی پروانه‌ای شکل "Butterfly" در کدام بیماری می‌تواند دیده شود؟
 Pleural effusion (۲) Pneumothorax (۱)
 Mitral valve endocardiosis (۴) Upper airway obstruction (۳)
- ۲۶ - کدام قسمت قلب در رادیوگرافی جانبی قفسه سینه سگ‌ها قابل ارزیابی نیست؟
 Right atrium (۲) Left auricle (۱)
 Aortic arch (۴) Left atrium (۳)
- ۲۷ - نشانه‌های اکوکاردیوگرافی تنگی دریچه ششی، هایپرترووفی بطن راست، VSD و Overriding of aorta بیانگر کدام عارضه قلبی مادرزادی است؟
 Tetralogy of fallot (۲) Aortic stenosis (۱)
 Pulmonic valve dysplasia (۴) Kartagener's syndrome (۳)
- ۲۸ - مشاهده تومور در گوشک و یا دهلیز راست در اکوکاردیوگرافی در سگ‌های نژاد Boxer و German Shepherd در اثر کدام مورد می‌تواند ایجاد شود؟
 Chemodectoma (۲) Lymphoma (۱)
 Adenocarcinoma (۴) Hemangiosarcoma (۳)
- ۲۹ - عارضه Erosive polyarthritis در اثر کدام مورد می‌تواند ایجاد شود؟
 Rheumatoid Arthritis (۲) Idiopathic arthritis (۱)
 Lymphocytic-Plasmocytic Synovitis (۴) Systemic Lupus Erythematosis (۳)
- ۳۰ - تورم کپسول مفصلی و اروزبیون در کورتکس مجاور آن در محل اتصال غضروف به ساینوزیوم (Chondrosynovial Junction) در رادیوگرافی از مفصل فتلایک اسب نشانگر کدام مورد است؟
 Osteochondrosis (۲) Osselet (۱)
 Synovial Osteochondromatosis (۴) Villonodular Synovitis (۳)
- ۳۱ - در ارزیابی روند ترمیم استخوان توسط رادیوگرافی، خط شکستگی توسط کالوس استخوانی پرشده، لبه‌های شکستگی به هم متصل شده و کورتکس و مدولا هنوز قابل تفیریق نیستند. در این صورت چند هفته از وقوع شکستگی گذشته است؟
 ۱) ۲ تا ۳ (۴) ۱۲ تا ۱۴ (۳) ۸ تا ۱۲ (۲) ۴ تا ۸ (۱)
- ۳۲ - بیماری Hypertrophic osteodystrophy در چه سن و چه نژادی از سگ‌ها بیشتر دیده می‌شود؟
 ۱) ۲ تا ۸ ماهگی - سگ‌های نژاد بزرگ
 ۲) ۴ تا ۶ ماهگی - سگ‌های نژاد کوچک
 ۳) ۵ تا ۱۱ ماهگی - سگ‌های نژاد کوچک
- ۳۳ - نشانه رادیوگرافی Floating teeth در کدامیک از عارضه‌های استخوانی دیده می‌شود؟
 Secondary hyperadrenocorticism (۲) Primary hyperthyroidism (۱)
 Secondary Hyperparathyroidism (۴) Primary hypoadrenocorticism (۳)

- ۳۴ در رادیوگرافی پشتی شکمی از سر یک گربه، گاز درون مجرای خارجی گوش‌ها با اپسیته بافت نرم جایگزین شده است، تشخیص شما چیست؟
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Otitis media (۲) | Otitis externa (۱) |
| Otitis media and externa (۴) | Otitis interna (۳) |
- ۳۵ در رادیوگرافی از دندان‌های یک گربه، Lytic defects در ریشه دندان‌ها دیده می‌شود، تشخیص شما چیست؟
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Periodontal Disease (۲) | Dentigerous cyst (۱) |
|-------------------------|----------------------|
- Feline Odontoclastic Resorptive Lesions (۴) Periodontal (Periapical) Abscess (۳)
- ۳۶ عارضه Meningomyelocele می‌تواند همراه با مشاهده کدامیک از نتایج مادرزادی در رادیوگرافی باشد؟
- | | |
|------------------------|----------------------|
| Hemivertebra (۲) | Spina bifida (۱) |
| Butterfly vertebra (۴) | Blocked vertebra (۳) |
- ۳۷ در سونوگرافی از کبد یک سگ اصطلاح "Rabbit's ear" به کدام حالت گفته می‌شود؟
- | |
|--|
| (۱) ظاهر کبد در لنفوسارکوما |
| (۲) ظاهر کبد در همانژیوسارکوما |
| (۳) انسداد مجاري صفراوي و ظاهر پارانشیم کبدی ناشی از آن |
| (۴) محل درناز عروق اصلی کبد به CVC در ناحیه قدامی - پشتی ناف کبد |
- ۳۸ در سونوگرافی از کبد، کدام گزینه درست است؟
- | |
|---|
| (۱) شانت‌های داخل کبدی در گربه‌ها و شانت‌های خارج کبدی در سگ‌های بزرگ رایج‌تر می‌باشند. |
| (۲) شانت‌های داخل کبدی در سگ‌های نژاد کوچک و شانت‌های خارج کبدی در گربه‌ها رایج‌تر می‌باشند. |
| (۳) شانت‌های خارج کبدی در سگ‌های نژاد کوچک و شانت‌های داخل کبدی در سگ‌های نژاد بزرگ رایج‌تر می‌باشند. |
| (۴) شانت‌های خارج کبدی در سگ‌های نژاد بزرگ و شانت‌های داخل کبدی در سگ‌های نژاد کوچک رایج‌تر می‌باشند. |
- ۳۹ در کدام عارضه در سونوگرافی مشاهده می‌شود؟
- | |
|-------------------------|
| (۱) سنگ صفراوي |
| (۲) نفوپلازی صفراوي |
| (۳) موکوسل در کیسه صfra |
| (۴) کلانژیوهپاتیت |
- ۴۰ رایج‌ترین محل intussusception روده‌ها در سونوگرافی شکم سگ کدام است؟
- | | |
|--------------------|---------------|
| Jejunal (۲) | Ileocolic (۱) |
| Pyloroduodenal (۴) | Cecocolic (۳) |
- ۴۱ در رادیوگرافی با ماده حاجب از روده‌های سگ، کدام تومور روده ظاهر "Napkin ring" دارد؟
- | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (۱) کارسینوما | (۲) آدنوکارسینوما | (۳) لنفوسارکوما | (۴) لیومیوسارکوما |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
- ۴۲ برای بررسی حالت انتهایی سمت راست در سگ از کدام نمای رادیوگرافی اختصاصی استفاده می‌شود؟
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Rt V 30 degree – Le D O. (۲) | Le V 30 degree – Rt D O. (۱) |
| Rt V 15 degree – Le D O. (۴) | Le V 15 degree – Rt D O. (۳) |
- ۴۳ کدام تکنیک به طور اختصاصی برای تشخیص کلپس شاخه اصلی برونش (Main stem bronchial collapse) به کار می‌رود؟
- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| (۱) رادیوگرافی | (۲) فلوروسکوپی | (۳) سی‌تی اسکن | (۴) اولتراسونوگرافی |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|

- ۴۴ رایج ترین نقص مادرزادی قلب در سگ‌ها کدام است و در کدام نمای اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می‌شود؟
 ۱) Right sided parasternal long axis view / PDA
 ۲) Right sided parasternal short axis view / PDA
 ۳) Right sided parasternal long axis view / Subaortic stenosis
 ۴) Right sided parasternal short axis view / Subaortic stenosis
- ۴۵ کدام مورد باعث افزایش اپاسیته استخوانی در تصاویر رادیوگرافی نمی‌شود?
 ۱) Osteopetrosis
 ۲) Bone infarction
 ۳) Hypervitaminosis A
 ۴) Hyperadrenocorticism
- ۴۶ در کدام عارضه، در تصاویر رادیوگرافی، ظاهر لکه مانند "Stippled appearance" در ابی فیز استخوان مشاهده می‌شود?
 ۱) Marie's disease
 ۲) Legg- calve- perthes disease
 ۳) Multiple epiphyseal dysplasia
 ۴) Ununited medial humeral epicondyle
- ۴۷ کدام گزینه در ارتباط با عارضه "Paronychia" نادرست است?
 ۱) لیز شدید، واکنش پریوستی شدید و تورم بافت نرم از ویژگی‌های رادیوگرافی آن است.
 ۲) از نظر رادیوگرافی مشابه نئوپلازی یا کیست ابی درموئید داخل استخوانی است.
 ۳) عفونت بستر ناخن (Nail bed) است.
 ۴) عموماً بند اول انگشت را درگیر می‌کند.
- ۴۸ کدام عارضه در رادیوگرافی به صورت استخوان‌سازی از نوع Palisade-like در دیافیز استخوان‌های دراز و بندهای انگشتان مشاهده می‌شود?
 ۱) Hypertrophic osteopathy
 ۲) Rickets
 ۳) Hypertrophic osteodystrophy
 ۴) Panosteitis
- ۴۹ ظاهر رادیوگرافی "Thumprints" بیانگر کدام عارضه است?
 ۱) Panosteitis
 ۲) Metalosis
 ۳) Osteomyelitis
 ۴) Bone infarction
- ۵۰ تکنیک انتخابی برای تشخیص Chiari malformation کدام است?
 ۱) رادیوگرافی با نمای روسترو-کودال
 ۲) سینتی گرافی
 ۳) Panosteitis
 ۴) MRI
- ۵۱ ظاهر "Pseudolayering" روده‌ها، مشخصه کدام نئوپلازی در سونوگرافی است?
 ۱) سارکوما
 ۲) آدنوما
 ۳) آدنوكارسینوما
 ۴) مالتیپل میلوما
- ۵۲ در کدام مرحله از چرخه استروس در لومن رحم خط نازک هایپراکو در سونوگرافی مشاهده می‌شود?
 ۱) دی استروس
 ۲) پرواستروس
 ۳) استروس
 ۴) آنستروس
- ۵۳ در رادیوگرافی از کدام عارضه استخوانی دیده می‌شود?
 ۱) Rickets
 ۲) Panosteitis
 ۳) Hypertrophic osteodystrophy
 ۴) Hypertrophic osteopathy
- ۵۴ پارگی شدید فیبرهای تاندون SDF اسب در سونوگرافی به چه صورتی دیده می‌شود?
 ۱) آن اکوئیک همراه با سایه صوتی
 ۲) هیپر اکوئیک همراه با سایه صوتی
 ۳) آن اکوئیک
 ۴) هیپر اکوئیک

- ۵۵ به منظور ارزیابی رادیوگرافی عارضه قره‌قوش (Splints) در متاکارپ چهارم اندام حرکتی قدامی اسب، کدام یک از حالت گماری‌های زیر به کار می‌رود؟
- Dorsomedial-Palmarolateral (۲) Dorsolateral-Palmaromedial (۱)
Latero-Medial (۴) Dorso-Palmar (۳)
- ۵۶ کدام مورد در خصوص mode of display در سونوگرافی، درست است؟
- (۱) رایج‌ترین آن M-mode است.
(۲) استفاده B-mode محدود به معاینات تخصصی چشم است.
(۳) از M-mode برای اندازه‌گیری ساختارهای متحرک مثل قلب استفاده می‌شود.
(۴) در A-mode ارتفاع هر spike نشان‌دهنده فاصله ساختار تا سطح پروب است.
- ۵۷ کدام گزینه، درست است؟
- (۱) عنوان Decubitus به تابش اشعه ایکس به صورت افقی به بدن بیمار دارد.
(۲) هر چه جسم به منبع تابش اشعه ایکس نزدیک‌تر باشد، میزان بزرگنمایی کمتر خواهد بود.
(۳) فاصله استاندارد موردنظر رادیوگرافی تا منبع تابش اشعه ایکس معمولاً ۵ سانتی‌متر است.
(۴) سطح مایع (Fluid level) در رادیوگرافی‌های ایستاده جانبی با استفاده از اشعه ایکس با تابش عمودی قابل مشاهده است.
- ۵۸ قابلیت تفرقه بین بافت‌های مختلف مثل قسمت سفید مغز از قسمت خاکستری یا کبد از کیسهٔ صفرا، از مزایای کدام تکنیک تصویربرداری است؟
- (۱) رادیوگرافی (۲) سی‌تی اسکن (۳) فلوروسکوپی (۴) سینتی‌گرافی
- ۵۹ کدام یک از تنظیمات رادیوگرافی زیر باعث ایجاد تصاویر با دامنه وسیع خاکستری (Gray Scale) می‌شوند؟
- (۱) Kvp بالا و mA پایین (۲) Kvp پایین و mA بالا (۳) Kvp بالا و mA پایین (۴) Kvp پایین و mA بالا
- ۶۰ معنای Echogenic در سونوگرافی کدام است؟
- (۱) الگوی بافتی ساختار مورد مطالعه (۲) نواحی سیاه در تصاویر سونوگرافی (۳) نواحی خاکستری در تصاویر سونوگرافی (۴) توانایی انعکاس صوت در ساختار مورد مطالعه
- ۶۱ امپدانس صوتی و سرعت انتقال صوت در استخوان نسبت به بافت نرم، به ترتیب چگونه است؟
- (۱) بالاتر - بیشتر (۲) پایین‌تر - بیشتر (۳) بالاتر - کمتر (۴) پایین‌تر - کمتر
- ۶۲ در کدام یک از تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی زیر از صفحات تقویت‌کننده استفاده می‌شود؟
- (۱) سونوگرافی (۲) سی‌تی اسکن (۳) رادیوگرافی معمولی (۴) رادیوگرافی دیجیتال
- ۶۳ به تماس لبه‌های دو ساختار همدانسیته در رادیوگرافی، به صورتی که مرز بین آنها قابل مشاهده نباشد، چه می‌گویند؟
- Border Effacement (۲) Superimposition (۱)
Positive Effacement (۴) Negative Silhouette (۳)
- ۶۴ کدام طول موج اشعه ایکس برای کارهای تصویربرداری و تشخیص استفاده می‌شود؟
- (۱) ۱۰۰-۱۰۰٪ آنگستروم (۲) ۱۰۰-۱۰٪ آنگستروم (۳) ۱۰۰-۱۰۰٪ آنگستروم
- ۶۵ در کدام مورد میزان انعکاس یا Reflection امواج فراصوت بیشتر است؟
- (۱) بین خون و مغز (۲) بین هوا و استخوان (۳) بین کبد و کلیه (۴) بین استخوان و عضله

- ۶۶ در درمان مرحله حاد بیماری لامینایتیس در اسب استفاده از کدام داروها توصیه می‌شود؟
 ۱) زیلازین - دگرامتاژون
 ۲) کتمانین - بتامتاژون
 ۳) استیل پرومازین - هیپارین
 ۴) سدیم تیوپنتال - لیدوکائین
- ۶۷ در سندرم ناویکولار، تغییرات ظاهری جعبه شاخی سم (Hoof) چگونه است؟
 ۱) سایش پنجه همراه با جمع شدگی پاشنه‌ها
 ۲) سایش کناره‌های سم همراه با بازشدگی پاشنه‌ها
 ۳) سایش کناره‌های سم همراه با جمع شدگی پاشنه‌ها
 ۴) سایش شدید تمام نواحی سم همراه با جمع شدگی پاشنه‌ها
- ۶۸ وجود حرکت کشویی (Drawer) در مفصل استایفل، نشانگر اختلال در کدام ساختار است؟
 Warm blood (۴) Thoroughbred (۳) Arabian (۲) Quarter (۱)
 Patellar ligament (۲) Cruciate ligament (۱)
 Meniscus (۴) Collateral ligament (۳)
- ۶۹ در کدامیک از نژادهای اسب، ریسک ابتلا به سندرم ناویکولار کمتر است؟
 Canker - Quittor (۴) Sidebones - Thrush (۱)
- ۷۰ در کدامیک از بیماری‌های سم در اسب، جسم قورباغه (Frog) موضع و یا منشأ شروع بیماری است?
 Canker - Quittor (۴) Canker - Thrush (۳)
- ۷۱ تروپین (Thoroughpin) در اسب مربوط به کدام ناحیه است و تورم بیشتر در کدام سطح دیده می‌شود؟
 ۱) تارس - سطح داخلی
 ۲) کارپ - سطح داخلی
 ۳) تارس - سطح خارجی
 ۴) کارپ - سطح خارجی
- ۷۲ احتمال درگیری کدامیک از ساختارها متعاقب افزایش رشد استخوانی در عارضه قره‌قوش (Splints) وجود دارد؟
 Suspensory ligament (۲) Superior check ligament (۱)
 SDFT (۴) DDFT (۳)
- ۷۳ از کدام روش در درمان سندرم ناویکولار استفاده می‌شود؟
 Carpal Check Desmotomy (۲) Fasciotomy (۱)
 Palmar Digital Neurectomy (۴) Podotrochlear Lavage (۳)
- ۷۴ عارضه Spavin در اسب، بیانگر کدام مورد است?
 ۱) استئوآرتروز مفصل فتلار
 ۲) استئوآرتروز مفصل کارپ
 ۳) استئوآرتروز مفصل تارس
 ۴) استئوآرتروز مفصل استایفل
- ۷۵ کدام مورد جزء عوامل ایجاد‌کننده Laminitis نیست?
 ۱) تروما
 ۲) عوامل ارشی
 ۳) عوامل تغذیه‌ای
 ۴) بیماری‌های عفونی