


کد کنترل



574A

574

A



صبح جمعه

۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش گشوار

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمدد) - سال ۱۳۹۸

رشته علوم دامی - کد (۲۴۲۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیوشیمی - آمار و طرحهای آزمایشات - زیستک و اصلاح دام - بیوشیمی تکمیلی - فیزیولوژی تکمیلی - تغذیه تکمیلی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای برقرار رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱ کدام مورد در شکل‌گیری ساختمان نوع دوم پروتئین‌ها نقش دارد؟
- (۱) نیروهای هیدروفوبیک
 (۲) پیوندهای دی‌سولفیدی
 (۳) پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های جانبی
 (۴) پیوندهای هیدروژنی بین صفحات پپتیدی
- ۲ کدام کوآنزیم در فعال نمودن و انتقال گروه‌های تک‌کربنیه دخالت دارد؟
- (۱) بیوتین
 (۲) لیپوامید
 (۳) تراهیدروفولات
 (۴) تیامین پیروفسفات
- ۳ مسیر اصلی تأمین اکیوالان‌های احیا (H^+ و NADPH) برای بیوسنتز چربی در نشخوارکنندگان کدام است؟
- (۱) مالیک
 (۲) اگزالواستات
 (۳) پنتوز فسفات
 (۴) ایزوسيترات دهیدروژناز
- ۴ با توجه به pK_1 اسیدهایی آلى، کدام مورد اسید قوی‌تری محسوب می‌شود؟
- (۱) فسفریک ۲/۱۵
 (۲) سیتریک ۳/۰۸
 (۳) سوکسینیک ۶/۳۷
 (۴) کربنیک ۴/۲۱
- ۵ کدام مورد درباره مسیر کتوژن (Ketogenesis pathway) درست نیست؟
- (۱) در تبدیل استواستیت به استون، یک ملکول CO_2 آزاد می‌شود.
 (۲) β HB دهیدروژناز در تبدیل استواستیت به استون دخیل است.
 (۳) استواستیت دکربوکسیلاز در تبدیل استواستیت به β HB دخالت دارد.
 (۴) دو مول استیل -کوا تحت آنزیم انولاز به استو استیل - کوا تبدیل می‌شود.
- ۶ کازئین ترکیبی است که در شیر گاو و گوسفند به وفور یافت می‌شود، این ترکیب به کدام گروه تعلق دارد؟
- (۱) لیپوپروتئین‌ها
 (۲) فسفوپروتئین‌ها
 (۳) گلابیکوپروتئین‌ها
 (۴) کرومپوپروتئین‌ها
- ۷ برای تبدیل استیل کوا به مالونیل کوا، کدام ترکیب مورد نیاز است؟
- Folic Acid (۴) NADPH (۳) Biotin (۲) H_2O (۱)
- ۸ کدام ترکیب دارای بالاترین PK_b می‌باشد؟
- NaOH (۴) $NaNO_3$ (۳) KCl (۲) KNO_3 (۱)
- ۹ کدام اسید آمینه، غیرقطبی محسوب می‌شود؟
- (۱) والین
 (۲) سرین
 (۳) تیروزین
- ۱۰ پیش‌ماده ویژه برای فعالیت فسفوریلاسیون اکسیداتیو کدام است؟
- ATP (۴) ADP (۳) NAD^+ (۲) $NADP^+$ (۱)
- ۱۱ در زنجیره تنفسی، ترتیب فرارگیری کدام مورد درست است؟
- cyt c قبل از cyt b (۲)
 cyt c قبل از cyt a (۱)
 NAD⁺ قبل از FAD (۴) $cyta_3$ قبل از یوبی‌کینون (۳)

- ۱۲ - کدام آنژیم برای ساخت گلیکوژن از فروکتوز لازم است؟
- (۱) گلوکز ۶ - فسفاتاز
 - (۲) گلوکز ۶ - فسفاتاز
 - (۳) گلیکوژن فسفوریلаз
- ۱۳ - کمبود کدام آنژیم منجر به ایجاد بیماری فاویسم می‌شود؟
- (۱) گلوکز ۶ - فسفاتاز
 - (۲) فروکتوز ۱ و ۶ بیس فسفات
 - (۳) گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز
- ۱۴ - کدام مورد از مزیت‌های طرح چرخشی (change over) می‌باشد؟
- (۱) استفاده از تعداد واحدهای آزمایشی کم - تصحیح برای اثر زمان - کاهش درجه آزادی خطا
 - (۲) استفاده از تعداد واحدهای آزمایشی کم - تصحیح برای اثر حیوان - افزایش درجه آزادی خطا
 - (۳) استفاده از تعداد واحدهای آزمایشی زیاد - تصحیح برای اثر زمان - کاهش درجه آزادی خطا
 - (۴) استفاده از تعداد واحدهای آزمایشی زیاد - تصحیح برای اثر حیوان - افزایش درجه آزادی خطا
- ۱۵ - در یک طرح کاملاً تصادفی ۶ تیمار با ۴ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و از هر واحد آزمایشی ۳ مشاهده اندازه‌گیری شده است. با توجه به اطلاعات زیر، میانگین مربعات خطای نمونه‌برداری در آزمایش جقدر است؟
- $(SS_{\text{تیمار}} = 100, SS_{\text{کل}} = 280)$
- (۱) ۲
 - (۲) ۳
 - (۳) ۴
 - (۴) ۶
- ۱۶ - در انتخاب طرح مناسب برای یک آزمایش، دو عامل عمدی که دخالت دارند، کدام موارد هستند؟
- (۱) تعداد تیمار و تعداد تکرار
 - (۲) ماده آزمایشی و تعداد تیمارهای آزمایشی
 - (۳) تیمارهای آزمایشی و صفات مورد مطالعه
 - (۴) تعداد تکرار و تعداد صفات مورد مطالعه
- ۱۷ - در یک آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار، دو مشاهده مربوطبه بلوک ۳ از بین رفت، در این حالت درجه آزادی تیمار، بلوک و خطا به ترتیب از راست به چه چقدر است؟
- (۱) ۸ - ۲ - ۴
 - (۲) ۱۲ - ۳ - ۴
 - (۳) ۱۲ - ۲ - ۴
 - (۴) ۱۰ - ۳ - ۴
- ۱۸ - در آزمایشی دو فاکتور A و B به ترتیب با ۴ و ۳ سطح در ۳ تکرار ارزیابی شدند. اگر مجموع مربعات فاکتورهای A و B به ترتیب برابر با $71/86$ و $13/72$ و مجموع مربعات تیمار برابر با $88/97$ باشد، واریانس اثر متقابل دو فاکتور کدام است؟
- (۱) $0,565$
 - (۲) $2/39$
 - (۳) $6/86$
 - (۴) $23/95$

-۱۹ در یک آزمایش فاکتوریل 2^4 دارای چهار فاکتور A, B, C و D، متوسط اثر متقابل AC کدام است؟

$$\frac{(a-1)(b+1)(c-1)(d+1)}{2} \quad (1)$$

$$\frac{(a-1)(b+1)(c-1)(d+1)}{4} \quad (2)$$

$$\frac{(a-1)(b+1)(c-1)(d+1)}{8} \quad (3)$$

$$\frac{(a-1)(b+1)(c-1)(d+1)}{16} \quad (4)$$

-۲۰ اگر مقایسه بین میانگین دو تیمار با استفاده از روش t انجام شود و s^2 و r به ترتیب برابر مقدار واریانس خطأ و تعداد تکرار باشند، کدام مورد برابر با حد خطأ (Limit of error) است؟

$$\sqrt{\frac{2}{r} \times s^2 t} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{2}{r} \times s^2 t} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{2}{r} \times st} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{2}{r} \times st} \quad (4)$$

-۲۱ اگر در یک طرح آزمایشی، واریانس داخل گروهها به ترتیب معادل ۳، ۵ و ۸ و تعداد تکرارهای مربوطبه هر گروه به ترتیب برابر ۳، ۵ و ۶ باشد، مقدار واریانس خطأ چقدر است؟

۲ (۱)

۴ (۲)

۶ (۳)

۷ (۴)

-۲۲ در یک طرح کاملاً تصادفی با چند مشاهده در واحد آزمایش، درجه آزادی و مجموع مربعات خطای نمونه‌برداری به ترتیب از راست به چپ برابر کدام مورد می‌باشند؟

$$\sum(y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2, tr(s-1) \quad (1)$$

$$\sum(y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2, ts(r-1) \quad (2)$$

$$s \sum(y_{ij.} - \bar{y}_{i..})^2, ts(r-1) \quad (3)$$

$$s \sum(y_{ij.} - \bar{y}_{i..})^2, tr(s-1) \quad (4)$$

-۲۳- در یک آزمایش، چهار نژاد گاو شیری (A, B, C و D) از نظر میزان شیردهی با یکدیگر مقایسه می‌شوند. اگر آزمایش در چهار تکرار طراحی شده باشد و گاوها از نظر تمام شرایط به غیر از نژاد با هم متفاوت نباشند با این فرض که در طول اجرای آزمایش، یک گاو از هر یک از نژادهای A و B و دو گاو از نژاد C تلف شده و از آزمایش حذف شوند، خطای استاندارد برای مقایسه میانگین شیردهی نژادهای A و C چقدر است؟

منبع تغییرات	df	SS
نژاد		۷۵/۱۷
خطا		
کل		۸۱/۶۷

- (۱) ۰/۶۹
 (۲) ۰/۷۳
 (۳) ۰/۸۲
 (۴) ۰/۹۰

-۲۴- در یک طرح آزمایشی بلوک کاملاً تصادفی با چهار نوع جیره (D و C و B و A)، $SS_{\text{ب}} = 41$ می‌باشد. برای بلوک ۲ و جیره B یکی از مشاهدات از دست رفته است. با بکارگیری رابطه مربوطه، مقدار واحد از دست رفته محاسبه و برابر ۳ می‌باشد. اگر جمع مشاهدات بلوک ۲ برابر ۱۰ باشد، مقدار SS تیمار تصحیح شده چقدر است؟

- (۱) ۴۰/۲۷
 (۲) ۴۰/۶۷
 (۳) ۴۰/۷۵
 (۴) ۴۰/۹۲

-۲۵- در کدام روش مقایسه میانگین تیمارها، احتمال بروز اشتباه نوع اول از سایر روش‌ها بیشتر است؟
 (۱) LSD
 (۲) توکی
 (۳) دانکن
 (۴) دانت

-۲۶- در یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، ۱۵ تکرار بهمازای هر تیمار و ۳ نمونه بهمازای هر واحد آزمایشی، درجه آزادی اشتباه آزمایشی و اشتباه نمونه‌برداری به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

- (۱) ۸۰-۳۰
 (۲) ۱۰۸-۳۰
 (۳) ۸۰-۳۶
 (۴) ۱۰۸-۳۶

-۲۷- اگر ژنتیپ‌های $A_1A_2B_1B_2$ و $A_2A_1B_2B_1$ به‌طور مساوی دارای تولید پایه ۲۰ لیتر شیر باشند، چنانچه بدواسطه غلبه ماورایی در هر جایگاه ۵ لیتر تولید شیر افزایش یابد، میانگین تولید شیر در حیوانات F₁ چند لیتر است؟

- (۱) ۲۰
 (۲) ۲۵
 (۳) ۳۰
 (۴) ۳۵

-۲۸- شبه غالب در کدام مورد ممکن است دیده شود؟
 (۱) واژگونی پاراسنتریک
 (۲) جابه‌جایی دوطرفه
 (۳) مضاعف شدنگی
 (۴) حذف شدنگی

- ۲۹- در آزمون تلاقي زير، اگر ضريب تداخل برابر ۳۰ درصد و درصد کراسينگ اور قابل مشاهده ۴/۲ باشد، فاصله بين زن‌های b و c چند واحد سانتي مورگان است؟

$$\begin{array}{r} a \quad ۳۰ \quad + \quad c \\ \hline + \quad b \quad + \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{r} a \quad b \quad c \\ \hline a \quad b \quad c \end{array}$$

- (۱) ۱۴
(۲) ۲۰
(۳) ۳۰
(۴) ۴۶

- ۳۰- اگر فرض شود تولید شاخ در گوسفند يك صفت وابسته به جنس است، چنانچه فراوانی آلل تولیدکننده شاخ در قوچها و میشها به ترتیب ۱ و صفر باشد، فراوانی این آلل در زمان تعادل چقدر است؟

- (۱) صفر
°/۳۳ (۲)
°/۵۰ (۳)
°/۶۷ (۴)

- ۳۱- از آمیزش مگس ماده‌ای تری‌هیبرید با مگس نر مغلوبی در مجموع ۱۲۰۰ فرزند حاصل شده است که به هشت گروه فنتوتیپی تقسیم شده‌اند. اگر فاصله زن‌های کناری از وسطی ۲۵ و ۸ سانتي‌مورگان برآورد شده باشند و در دو گروه کمترین تعداد نتاج (۳ و ۶ مگس) مشاهده شود، ضريب تداخل چقدر بوده است؟

- °/۲۴۵ (۱)
°/۳۷۵ (۲)
°/۶۲۵ (۳)
°/۷۶۵ (۴)

- ۳۲- دو زن مستقل A و B را در نظر بگيريد که فراوانی آلل‌های غالب در هر دو زن مساوی، ۷۰ درصد و فراوانی آلل‌های مغلوب‌تر مساوی هم و برابر ۳۰ درصد است، بنابراین در جمعیت متعدد برای این دو زن، فراوانی زن‌تیپ AaBB چند درصد است؟

- ۳/۷۸ (۱)
۶/۸۱ (۲)
۱۰/۲۹ (۳)
۲۰/۵۸ (۴)

- ۳۳- اگر فراوانی زن شاخداری در گله‌های ۱ و ۲ به ترتیب ۳/۰ و ۶/۰ باشد و به اندازه ۲۰٪ جمعیت از گله ۲ به گله یک منتقل شود، فراوانی این آلل در گله یک بعد از انتقال چقدر می‌شود؟

- ۰/۳۶ (۱)
۰/۴۲ (۲)
۰/۴۵ (۳)
۰/۵۰ (۴)

- ۳۴- کدام رابطه معرف بهترین تلاقي برای تولید نتاج دو رگ با استفاده از دو نژاد می‌باشد؟

$$\frac{(\bar{x}_{i.} + \bar{x}_{.j})}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{(x_{ij} + x_{ji})}{2} \quad (۱)$$

$$\frac{(\bar{x}_i + x_{ji})}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{(x_{ij} + \bar{x}_{.j})}{2} \quad (۳)$$

- ۳۵- وراثت‌پذیری به دست آمده در ۱۰ خانواده ناتنی هر کدام با اندازه ۱۰۰ دام برابر ۲٪ می‌باشد. خطای معیار وراثت‌پذیری برای این خانواده‌ها چقدر است؟

۰/۰۰۲ (۱)

۰/۰۰۸ (۲)

۰/۰۲ (۳)

۰/۰۸ (۴)

- ۳۶- قابلیت انتقال دام نری با ۴۰ فرزند در سطح مدیریتی $M = 410 \text{ kg}$ برای صفت وزن از شیرگیری با وراثت‌پذیری ۴٪ و میانگین وزن فرزندان 460 kg چقدر است؟

۲۰/۴۱ (۱)

۴۰/۸۲ (۲)

۳۷۵/۵۱ (۳)

۷۴۹/۸ (۴)

- ۳۷- ضریب تابعیت رکورد فرزند به متوسط والدین برابر ۳٪ و ضریب تابعیت فرزند به والد مادر برابر ۲٪ می‌باشد. وراثت‌پذیری حاصل از این دو روش به ترتیب از راست به چه چند چقدر است؟

۰/۶-۰/۲ (۱)

۰/۴-۰/۳ (۲)

۰/۳-۰/۴ (۳)

۰/۲-۰/۶ (۴)

- ۳۸- در آزمون نتاج بر روی ۱۵ فرزند برای صفت با وراثت‌پذیری ۲۵٪، بازده نسبی صحت برآورد نسبت به انتخاب انفرادی بر مبنای یک رکورد چقدر است؟

۱/۴۱ (۱)

۱/۰۰ (۲)

۱/۱۲ (۳)

۱/۲۵ (۴)

- ۳۹- میانگین و انحراف معیار وزن از شیرگیری برده‌های یک نژاد گوسفند به ترتیب برابر ۱۸ و ۱/۵ کیلوگرم است. با فرض نرمال بودن توزیع این صفت چند درصد افراد جامعه در زمان از شیرگیری حداقل ۲۱ کیلوگرم وزن دارند؟

۲/۵ (۱)

۵ (۲)

۲۵ (۳)

۹۵ (۴)

- ۴۰- وقتی خربد ماده‌های جایگزین گران است، کدام سیستم آمیخته‌گیری مناسب‌تر است؟
 ۱) ایجاد نژاد ترکیبی
 ۲) تلاقی سه‌نژادی
 ۳) تلاقی چهارنژادی
 ۴) تلاقی چرخشی
- ۴۱- کدام تکنیک برای اندازه‌گیری وزن پروتئین دقیق‌تر است؟
 osmotic pressure (۲) sds-page (۱)
 gel filtration chromatography (۴) mas spectrometry (۳)
- ۴۲- کدام مورد، کاربرد روش ادمن در تعیین توالی اسیدهای آمینه است؟
 ۱) شکستن پیوندهای دی‌سولفید
 ۲) تشخیص اسید آمینه انتهایی آمینی
 ۳) هیدرولیز کامل پیوندهای پپتیدی
 ۴) تشخیص اسید آمینه انتهایی کربوکسیل
- ۴۳- هدف از استفاده mercaptoethanol در آزمایش پروتئین کدام مورد می‌باشد؟
 ۱) شکستن باندهای دی‌سولفیدی
 ۲) ممانعت از تشکیل باندهای دی‌سولفیدی
 ۳) هیدرولیز پروتئین به اسیدهای آمینه
 ۴) حذف ازت انتهایی اسید آمینه به‌هنگام تجزیه
- ۴۴- کدام مورد مربوط به نقش آنزیم ATP سیترات لیاز در متابولیسم گلوکز می‌باشد؟
 ۱) ساخت ایزوسیترات از سیترات
 ۲) ساخت آلفاکتوگلوتارات از سیترات
 ۳) تبدیل اسٹیل کوا و آگرالواستات به سیترات
 ۴) تبدیل سیترات به آگرالواستات و استیل کوا
- ۴۵- کدام مکانیسم آنزیمی در آنزیمهایی که دارای NAD^+ یا NADH هستند کاربرد دارد؟
 ۱) تک سوبسکریپتیو
 ۲) جایگزینی دوگانه
 ۳) جایگزینی پی‌درپی منظم
 ۴) جایگزینی پی‌درپی اتفاقی
- ۴۶- کدام مورد دارای ساختمان نوع دوم پروتئین به صورت کراتین بتا می‌باشد؟
 ۱) ناخن خزندگان و پرندگان
 ۲) شاخ
 ۳) مو
 ۴) چنگال و منقار خزندگان و پرندگان
- ۴۷- کدام مورد از اسید آمینه گلوتامیت ساخته نمی‌شود؟
 ۱) گلایسین
 ۲) آسپارژین
 ۳) سرین
 ۴) آلاتین
- ۴۸- امگا اکسیداسیون، یکی از مسیرهای فرعی اکسیداسیون اسیدهای چرب، با مداخله کدام سیتوکروم انجام می‌شود؟
 P450 (۲) aa₃ (۱)
 B (۴) C (۳)
- ۴۹- واکنش زیر، جزء کدام دسته از واکنش‌های می‌باشد؟
 اسید آمینه + آلفاکتوگلوتاریک \rightarrow آلفاکتواسید + گلوتامات
 ۱) اکسیداسیون
 ۲) هیدروژناسیون
 ۳) دی‌کربوکسیلاسیون
 ۴) ترانس آمیناسیون
- ۵۰- NADH و NADPH هر دو ناقلین اتم هیدروژن می‌باشند، کدام مورد درباره این ترکیبات درست است؟
 ۱) NADH از بیوسنتز اسیدهای چرب حاصل می‌شود.
 ۲) NADH برای بیوسنتز چربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 ۳) NADPH نقشی در تولید انرژی نداشته و تأمین کننده هیدروژن برای بیوسنتر اسیدهای چرب است.
 ۴) NADPH از بیوسنتز اسیدهای چرب تولید می‌شود و تأمین کننده انرژی برای واکنش‌های بیوشیمیایی است.

- ۵۱- کدام مورد یک ایمینواسید (Imino Acid) است؟
- (۱) آلانین (۲) پرولین (۳) گلایسین (۴) سرین
- ۵۲- بافت‌های حیوانات به طور طبیعی دارای کدام نوع اسید آمینه هستند؟
- (۱) L (۲) DL (۳) D (۴) هم L و هم D
- ۵۳- کدام مورد درباره انتقال گلوکز در سلول‌های دوازدهه درست است؟
- (۱) انتقال فعال اولیه و Symporter (۲) انتقال فعال ثانویه و Antiporter (۳) Antiporter (۴) انتقال فعال ثانویه و Symporter
- ۵۴- کدام مورد، افزایش اندازه یک بافت یا اندام به دلیل تقسیم سلولی بیش از اندازه است؟
- (۱) Hyperplasia (۲) Atresia (۳) Hypertrophy (۴) Aplasia
- ۵۵- کدام مورد با سایر موارد متفاوت است؟
- (۱) Intracellular receptors (۲) Enzymatic receptors (۳) G-Protein coupled receptors (۴) Channel linked receptors
- ۵۶- از زودگی (کلیرانس) کلیوی کدام مورد برای تخمین جریان خون کلیوی استفاده می‌شود؟
- (۱) پارا امینو هیپوریک اسید (۲) creatinine (۳) اینولین (۴) اوره
- ۵۷- در کدام مورد، ترشحات بدون اینکه از سلول خارج شود بر همان سلول اثر می‌کند؟
- (۱) اندوکراین (۲) پاراکراین (۳) اینترکراین (۴) اوتوكراین
- ۵۸- کدام مورد درست است؟
- (۱) NPY باعث کاهش اشتها و کاهش ترشح GnRH می‌شود. (۲) نروپیتید CCK تأثیری بر مصرف خوراک ندارد ولی GnRH را کم می‌کند. (۳) میانجی عصبی CCK سبب سیری شده و بر ترشح GnRH تأثیری ندارد. (۴) NPY باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش ترشح GnRH می‌شود.
- ۵۹- افزایش کدام مورد فشار سیستولی قلب را کاهش می‌دهد؟
- (۱) حجم ضربهای (۲) نیروی انقباضی قلب (۳) مقاومت کل عروق محیطی (۴) پذیرش (compliance) عروقی
- ۶۰- تغییر pH خون در چه حدودی باعث مرگ می‌شود؟
- (۱) ۰/۵ (۲) ۱ (۳) ۱/۵ (۴) ۲
- ۶۱- کدام مورد نادرست است؟
- (۱) تولیدمیث به مثابه عملی هموستاتیک نیست. (۲) سیستم هورمونی عمدتاً اعمال متابولیک بدن را تنظیم می‌کند. (۳) دستگاه‌های کنترل ژنتیک، پیچیده‌ترین دستگاه‌های کنترل در بدن هستند. (۴) دستگاه عصبی عمدتاً فعالیت‌های عضلانی و ترشحی بدن را کنترل (تنظیم) می‌کند.

- ۶۲- تحریکات پاراسمپاتیکی بر کدام مورد تأثیری ندارد؟

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Small intestine (۲) | Myometrium (۱) |
| Sweat glands (۴) | Salivary glands (۳) |

- ۶۳- کدام مورد درباره ماهیچه درست است؟

- (۱) در انقباض Isometric، طول ماهیچه ثابت ولی فشار آن کاهش می‌یابد.
- (۲) در انقباض Isotonic، طول ماهیچه ثابت ولی فشار آن افزایش می‌یابد.
- (۳) در انقباض Isotonic، ماهیچه کوتاه شده ولی فشار آن ثابت می‌ماند.
- (۴) در انقباض Isometric، طول ماهیچه کوتاه شده ولی فشار آن افزایش می‌یابد.

- ۶۴- کدام مورد درباره پروتئین‌ها درست است؟

- (۱) پروتئین‌های محیطی توسط دترجنت‌ها از غشاء جدا می‌شوند.
- (۲) پروتئین‌های سراسری توسط دترجنت‌ها از غشاء جدا می‌شوند.
- (۳) پروتئین‌های سراسری و محیطی توسط محلول‌های نمکی از غشاء جدا می‌شوند.
- (۴) پروتئین‌های سراسری توسط محلول‌های نمکی از غشاء جدا می‌شوند.

- ۶۵- از لحاظ Gap junction، کدام عضله با بقیه متفاوت است؟

- | | | | |
|----------|----------|---------|---------|
| (۱) روده | (۲) گردن | (۳) رحم | (۴) قلب |
|----------|----------|---------|---------|

- ۶۶- کدام مورد، مهم‌ترین هورمون‌های لازم برای ساخته شدن سورفکتانت ششی هستند؟

- (۱) تیروکسین و گلوكورتيکوئيدها
- (۲) استروژن و تیروکسین
- (۳) استروژن و پروژترون
- (۴) پروژترون و کورتیزول

- ۶۷- کدام اسید‌آمینه در ترکیب ماهیچه‌ها حداکثر می‌باشد؟

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| (۱) لیزین | (۲) متیونین | (۳) ترئونین | (۴) آرژین |
|-----------|-------------|-------------|-----------|

- ۶۸- حرارت‌دهی کنجاله‌ها در طی مراحل استخراج روغن چه تأثیری بر میزان و فعالیت آفلاتوکسین‌ها دارد؟

- (۱) حرارت‌دهی سبب کاهش مقدار و فعالیت آفلاتوکسین‌ها می‌شود.
- (۲) حرارت‌دهی سبب کاهش مقدار آفلاتوکسین می‌شود ولی تأثیری بر فعالیت آن‌ها ندارد.
- (۳) حرارت‌دهی با تغییر ساختار شیمیایی، بدون تغییر در مقدار سه سبب کاهش فعالیت آن‌ها می‌شود.
- (۴) آفلاتوکسین‌ها در برابر حرارت مقاوم بوده و مقدار و فعالیت آن‌ها تحت تأثیر حرارت‌دهی قرار نمی‌گیرد.

- ۶۹- NRC سال ۲۰۰۱ برای گاوهاشییری، از چه داده‌هایی برآورد مقدار پروتئین عبوری (RUP) خوراک‌ها استفاده کرده است؟

- (۱) تخمین از طریق برآورد NDIP

- (۲) روش کیسه‌گذاری شکمبه‌ای (in situ)

- (۳) روش هضم آنزیمی آزمایشگاهی (in vitro)

- (۴) تخمین از طریق تفاضل بخش C از B₇ در سیستم CNCPS

- ۷۰- در چیره‌های بر پایه علوفه، معروف‌ترین باکتری مسئول بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشبع کدام است؟

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Megasphaera elsdenii (۲) | Butyrivibrio fibrosolvens (۱) |
|--------------------------|-------------------------------|

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Ruminococcus albus (۴) | Prevotella ruminicola (۳) |
|------------------------|---------------------------|

- ۷۱- جیره‌های دارای عناصر عمده با درصد های زیر است. مقدار عددی تعادل آئیون و کاتیون آن (DCAD) بر حسب میلی اکی والان در ۱۰۰ گرم جیره چقدر می‌شود؟
 $(Na = \% / ۵۳ \quad K = \% / ۲۲ \quad Cl = \% / ۴۲ \quad S = \% / ۲)$

- (۱) ۳۰
 (۲) ۳۲/۱
 (۳) ۴۱/۲
 (۴) ۴۷/۴


- ۷۲- تفاوت قابلیت هضم (Digestibility) و فراهمی زیستی (Bioavailability) در کدام مورد می‌باشد؟

- (۱) قابلیت هضم بخشی از زیست فراهمی است.
 (۲) قابلیت هضم معرف بهتر از فراهمی زیستی است.
 (۳) تفاوت خاصی با هم ندارند و هر دو بیانگر یک خصوصیت هستند.
 (۴) در زیست فراهمی، مورد استفاده قرار گرفتن مواد پس از جذب نیز در نظر گرفته می‌شود.

- ۷۳- کدام مورد درباره تفاوت عملکرد هضم در نشخوارکنندگان و تخمیرکنندگان انتهای دستگاه گوارش درست است؟

- (۱) بازده هضم نشخوارکنندگان در واحد زمان بیشتر است.
 (۲) بازده هضم علفخواران و نشخوارکنندگان مشابه است.
 (۳) بازده هضم نشخوارکنندگان بهاری واحد وزن خوراک بیشتر است.
 (۴) بازده هضم تخمیرکنندگان انتهای دستگاه گوارش بهاری واحد خون خوراکی بیشتر است.

- ۷۴- فرمول زیر مربوط به کدام آمینواسید است و معادل پروتئین خام آن چند درصد است؟



- (۱) آرژین - ۲۰/۱
 (۲) آرژین - ۲۰۱
 (۳) لیزین - ۵۵/۵
 (۴) لیزین - ۱۱۹/۷

- ۷۵- زیست فراهمی منابع فسفر در جیره طیور به ترتیب چگونه است؟

- (۱) پودر استخوان، ۲- دی‌کلسیم فسفات، ۳- مونوکلسیم فسفات ۴- فیتات کلسیم
 (۲) ۱- مونوکلسیم فسفات، ۲- دی‌کلسیم فسفات، ۳- پودر استخوان، ۴- فیتات کلسیم
 (۳) ۱- فیتات کلسیم، ۲- پودر استخوان، ۳- دی‌کلسیم فسفات، ۴- مونوکلسیم فسفات
 (۴) ۱- پودر استخوان، ۲- مونوکلسیم فسفات، ۳- فیتات کلسیم ۴- دی‌کلسیم فسفات

- ۷۶- کدام مورد، بهترین معیار تعیین کمبود جزئی (marginal deficiency) تیامین است؟

- (۱) اندازه‌گیری میزان تیامین خون
 (۲) اندازه‌گیری میزان فعالیت آنزیم ترانس کتواز
 (۳) اندازه‌گیری میزان فعالیت آنزیم پیروات کربوکسیلاز
 (۴) اندازه‌گیری میزان فعالیت آنزیم الفاکیتوگلوتارات دی‌کربوکسیلاز

- ۷۷- تفاوت سنتز و تجزیه پروتئین ($k_s - k_d$) عمدتاً تحت تأثیر کدام عامل و در کدام مورد بیشتر است؟

(۱) تعادل انرژی - جوجه‌های گوشته
 (۲) تعادل انرژی - نیمچه‌های تخم‌گذار

(۳) تعادل اسیدهای آمینه - جوجه‌های گوشته
 (۴) تعادل اسیدهای آمینه - نیمچه‌های تخم‌گذار

- ۷۸- در کدام مورد، ارزیابی اثرات افزودن آنزیم بر بهبود انرژی قابل متابولیسم جیره‌های غذایی طیور، دقیق‌تر صورت می‌گیرد؟

TME_n (۲) AME_n (۱)

(۳) DE در خروس‌های کلستومی شده
 (۴) DE اندازه‌گیری شده در سطح ابلتوومی

- ۷۹- در کدام مورد، تغییر دما بر تعادل انرژی حیوان اثرات بیشتری دارد؟

(۱) مرغان تخم‌گذار (۲) نیمچه‌های تخم‌گذار (۳) جوجه‌های گوشته
 (۴) خروس‌های گله مادر

- ۸۰- کدام مورد از اثرات Extra-caloric چربی‌ها در جیره‌های غذایی طیور می‌باشد؟

(۱) پایین بودن اتلاف حرارتی چربی‌های غذا

(۲) زیادی انرژی قابل متابولیسم چربی‌های غذا

(۳) افزایش قابلیت هضم انرژی، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌های جیره غذایی

(۴) کاهش قابلیت هضم انرژی، و افزایش سرعت عبور محتویات دستگاه گوارش