


باسمہ تعالیٰ

نام و نام خانوادگی :	سال سوم آموزش متوسطه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تعداد صفحه:	۱۳۹۳/۳/۱۷	تاریخ امتحان:		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۳ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir				

ردیف	نمره	سوالات (پاسخ نامه دارد)
------	------	-------------------------


توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است.

۱	با توجه به شکل مقابل، پیشامد $(A - B) \cup (B - A)$ را هاشور بزنید. 	۰/۵
۲	اگر $P(A) = \frac{1}{3}$ و $P(B') = \frac{3}{4}$ و A و B دو پیشامد ناسازگار باشند، حاصل $P(A \cup B)$ را به دست آورید.	۱
۳	در گیسه‌ای ۵ مهره‌ی سفید و ۴ مهره‌ی آبی و ۳ مهره‌ی سبز وجود دارد. از این گیسه ۴ مهره به تصادف خارج می‌کنیم. احتمال این که حداقل ۲ مهره آبی باشد، چه قدر است؟	۱/۲۵
۴	چه قدر احتمال دارد در یک تیم کوهنوردی ۳ نفره: الف) همه در ماه تیر متولد شده باشند؟ ب) هیچ دو نفری در یک ماه از سال متولد نشده باشند؟	۱/۲۵
۵	الف) جواب مجموعه‌ی A را تعیین کنید. (راه حل نوشته شود) ب) مجموعه‌ی $A \cap B$ را به وسیله‌ی بازه نمایش دهید.	۱/۲۵
۶	فرض کنید $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ و α زاویه‌ای حاده باشد. حاصل $\sin 2\alpha$ را به دست آورید.	۱/۲۵
۷	تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x < 0 \\ 2 & x > 0 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. الف) نمودار تابع f رارسم کنید. ب) دامنه‌ی تابع f را به دست آورید.	۱
۸	دو تابع $y = x^2 + ax - 3b$ و $y = -x + b$ را چنان محاسبه کنید که نمودارهای این دو تابع روی محور x ها در نقطه‌ای به طول ۱ همدیگر را قطع کنند.	۱
	«آدامه‌ی پرسش‌ها در صفحه‌ی دوم»	

پاسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۷/۳/۱۴۰۲	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
------	------	-------------------------

۹	۲/۵	تابع $g(x) = \sqrt{x}$ و $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ داده شده‌اند. الف) تابع $f \circ g$ را تشکیل دهید. ب) دامنهٔ تابع $f \circ g$ را با استفاده از تعریف به دست آورید. ج) مقدار $\left(\frac{f-g}{2g}\right)(4)$ را محاسبه کنید.
۱۰	۱	با استفاده از نمودار زیو، عبارت خواسته شده را محاسبه کنید. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) - 3 \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + f(1)$ 
۱۱	۳	حدهای زیر را حساب کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{3 - \sqrt{x+7}}$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos 2x}$ ج) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{9-x^2}$ د) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 \cdot x^2 + \sqrt{x^2+x}}{2x^2+1}$
۱۲	۱	پیوستگی تابع $f(x) = \begin{cases} x-2 & x < 2 \\ x-2 & x = 2 \\ 3-x^2 & x > 2 \end{cases}$ را در نقطه‌ای به طول ۲ بررسی کنید.
۱۳	۱	آهنگ متوسط تغییر تابع $f(x) = 2x$ را وقتی متغیر از $\frac{3}{5}$ به $\frac{3}{5}$ تغییر می‌کند، به دست آورید.
۱۴	۲/۵	مشتق تابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) الف) $f(x) = \left(\frac{2x+1}{x}\right)^4$ ب) $g(x) = (\sqrt{5-7x})(4 - \frac{x}{3})$ ج) $h(x) = \tan x - 2 \cos^3(2x)$
۱۵	۰/۵	در جاهای خالی عبارات مناسب قرار دهید. الف) دامنهٔ مشتق پذیری تابع $f(x) = \sqrt{x}$ برابر است با ب) شیب خط مماس بر نمودار تابع $g(x) = \frac{1}{x}$ در $x = 1$ برابر است با
	۲۰	جمع نمره «موفق باشید»

با سمه تعالی

رشته‌ی : علوم تجربی	راهنمای تصویب امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۷/۳/۱۳۹۳	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولیان آزاد سراسر کشور (خرداد ماه) سال ۱۳۹۳

ردیف	راهنمای تصویب	نمره																				
۱	هاشور پیشامد $A - B$ (۰/۲۵) هاشور پیشامد $B - A$ (۰/۲۵)	۰/۵																				
۲	$P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{۳}{۴} = \frac{۱}{۴}$ (۰/۲۵) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۴} = \frac{۷}{۱۲}$ (۰/۲۵)	۱																				
۳	$P(A) = \frac{\binom{۱/۲۵}{۱}\binom{۱/۲۵}{۲} + \binom{۱/۲۵}{۱}\binom{۱/۲۵}{۳} + \binom{۱/۲۵}{۱}\binom{۱/۲۵}{۴}}{\binom{۱/۲۵}{۱}} = \frac{۴۶۲}{۴۹۵}$ (۰/۲۵)	۱/۲۵																				
۴	$P(A) = \frac{۱}{۱۲} \times \frac{۱}{۱۲} \times \frac{۱}{۱۲} = \left(\frac{۱}{۱۲}\right)^۳$ (۰/۲۵) $P(B) = \frac{۱۲}{۱۲} \times \frac{۱۱}{۱۲} \times \frac{۱۰}{۱۲} = \frac{۱۱۰}{۱۴۴}$ (۰/۲۵)	۱/۲۵																				
۵	$\frac{۵}{x} \geq ۲ \Rightarrow \frac{۵}{x} - ۲ \geq ۰$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{۵-۲x}{x} \geq ۰$ <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>0</td> <td>$\frac{۵}{۲}$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$5-2x$</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>۰</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>-</td> <td>۰</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>کسر</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>۰</td> <td>-</td> </tr> </table> جواب جواب (۰/۱۵) $A = \left(0, \frac{5}{2}\right]$ (۰/۲۵) ب) $A \cap B = (0, 2)$ (۰/۲۵)	x	$-\infty$	0	$\frac{۵}{۲}$	$+\infty$	$5-2x$	+	+	۰	-	x	-	۰	+	+	کسر	-	+	۰	-	۱/۲۵
x	$-\infty$	0	$\frac{۵}{۲}$	$+\infty$																		
$5-2x$	+	+	۰	-																		
x	-	۰	+	+																		
کسر	-	+	۰	-																		

با سمه تعالی

رشته‌ی: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۳/۳/۱۷	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولیان آزاد سراسر کشور (خرداد ماه) سال ۱۳۹۳

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۶	$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5} \quad (0/25)$ $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5} \quad (0/25)$ $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \left(\frac{3}{5} \right) \left(\frac{4}{5} \right) = \frac{24}{25} \quad (0/25)$	۱/۲۵
۷	<p>الف) رسم سهیمی $(0/05)$ رسم خط $(0/25)$</p> <p>$(0/25) D_f = R - \{\}$ (ب)</p>	۱
۸	$(1, \cdot) \Rightarrow \cdot = -1 + b \quad (0/25) \Rightarrow b = 1 \quad (0/25)$ $(1, \cdot) \Rightarrow \cdot = 1 + a - 2 \quad (0/25) \Rightarrow a = 2 \quad (0/25)$	۱
۹	<p>الف) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}} \quad (0/25)$</p> <p>ب) $D_f = R - \{\} \quad (0/25) \quad , \quad D_g = [1, +\infty) \quad (0/25)$</p> $D_{f \circ g} = \left\{ x \in D_g \mid g(x) \in D_f \right\} = \left\{ x \geq 1 \mid \sqrt{x} \neq 1 \right\} = [1, +\infty) - \{1\} \quad (0/25)$ <p>ج) $\left(\frac{f-g}{g} \right)(x) = \frac{f(x)-g(x)}{g(x)} = \frac{x-2}{2(x)} = \frac{1}{2} \quad (0/25)$</p>	۲/۵
۱۰	$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + f(1) = 2 - 3 \quad (0/25) \quad 0 \quad (0/25) \quad 1 = -3 \quad (0/25)$	۱

با سمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)

رشته‌ی: علوم تجربی	سال سوم آموزش متوسطه
تاریخ امتحان: ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۷	
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور (خرداد ماه) سال ۱۳۹۳

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{3 - \sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{3 - \sqrt{x+1}} \times \frac{3 + \sqrt{x+1}}{3 + \sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)(3 + \sqrt{x+1})}{(3 - \sqrt{x+1})(3 + \sqrt{x+1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} -(x+2)(3 + \sqrt{x+1}) = -24 \quad (0/25) \end{aligned}$ $\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\frac{1}{2} \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{2} \sin x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \quad (0/25)$ $\text{ج) } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{9-x^2} = \frac{4}{-1} = -\infty \quad (0/25)$ $\text{د) } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1+x^2 + \sqrt{x^2+x}}{2x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1+x^2}{x^2} + \frac{\sqrt{x^2+x}}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1 + \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}{x}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{2} = 0 \quad (0/25)$	۳
۱۲	$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1 \quad (0/25) \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= 3-4 = -1 \quad (0/25) \\ f(2) &= -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = -1 \quad (0/25)$ <p style="text-align: center;">تابع f در $x=2$ پیوسته است. (0/25)</p>	۱
۱۳	$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(2/5) - f(3)}{2/5 - 3} = \frac{\frac{(-1)^2}{5} - (-1)}{-1/5} = 2 \quad (0/25)$	۱
۱۴	$\text{الف) } f'(x) = 4 \left(\frac{2x+1}{x} \right)^3 \left(\frac{2x - (2x+1)}{x^2} \right) \quad \text{ب) } g'(x) = \frac{-4}{2\sqrt{5-4x}} \left(4 - \frac{x}{2} \right) - \frac{1}{3} \left(\sqrt{5-4x} \right) \quad (0/25)$ $\text{ج) } h'(x) = (1 + \tan^2 x) + 12 \sin 2x \cos^2(2x) \quad (0/25)$	۲/۵
۱۵	$(0/25) \quad m = -1 \quad (0/25) \quad D_{f'} = (-\infty, +\infty) \quad \text{الف)$	۰/۵
۲۰	جمع نمره	

با سلام و خسته نباشید، مصححین محترم ، لطفاً برای راه حل های درست دیگر بارم را به تناسب تقسیم نمائید.