

باشه تعالی

نام و نام خانوادگی:	دورة پيش دانشگاهي	ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح	رشنده: رياضي فزيك	مدت امتحان: ۱۵۰ دقيقه
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزادسراسرکشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پژوهش	تاریخ امتحان: ۱۰/۱۱/۱۳۹۵	تعداد صفحه:	۱
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزادسراسرکشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۵			http://aee.medu.ir	
ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است.

۱	اگر اشتراک دو بازه $(2,5)$ و $(4, \frac{3}{2})$ یک همسایگی متقابله به مرکز a و شاعع r باشد، مقدار a و r را بیابید.	۱
۱	در جاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید: الف) حد دنباله $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = a_n$ برابر..... است. ب) اگر دنباله $\{a_n\}$ که چنین تعریف شده است: $a_1 = \sqrt{6 + a_0}$ و $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ همگرا باشد، آنگاه حد دنباله $\{a_n\}$ برابر..... است.	۲
۱	یکنواختی و کرانداری دنباله $\left\{ \frac{(-1)^n}{n+2} \right\}$ را بررسی کنید.	۳
۱/۵	به کمک تعریف دنبالهای حد، ثابت کنید تابع $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ در $x = 0$ حد ندارد.	۴
۱/۵	حدهای توابع رو به رو را محاسبه کنید: الف) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+9x-1}}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^2-1}$	۵
۱	حجم آب یک منبع آب، t دقیقه پس از شروع تخلیه، بر حسب لیتر برابر است با: $V(t) = 250(16-t)^2$ ، آهنگ لحظه‌ای تخلیه آب بعد از t دقیقه چقدر است و آن را توصیف کنید.	۶
۱/۵	معادله خط مماس بر تابع $y = \frac{x}{x^2+6}$ را در نقطه $(2, 0/2)$ پیدا کنید.	۷
۱/۵	به ازای چه مقادیری از a ، b و c تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 & , x < 1 \\ ax^2+bx+c & , x \geq 1 \end{cases}$ مشتق مرتبه دوم دارد؟	۸
۱	مشتق بگیرید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست). الف) $y = e^{\cos x}$ (ب) $y = x^3 + y^3 - 6xy = 0$	۹
۱	فرض کنید $1 + 6x + 6x^2 + 3x^3 + 2x^4 = f(x)$ ، مقدار $f'(x)$ را در صورت وجود بیابید.	۱۰
۱/۵	به کمک آزمون مشتق مرتبه دوم نقاط ماقسیموم و مینیمم موضعی تابع $f(x) = \sqrt{3x - 2\cos x}$ روی بازه $(0, 2\pi)$ پیدا کنید.	۱۱
۱	شعاع کره‌ای با آهنگ 3 سانتی متر بر ثانیه بزرگ می‌شود. در لحظه‌ای که شعاع کره 6 سانتی متر است، حجم کره با چه آهنگی افزایش می‌یابد.	۱۲
۲	جدول رفتار و نمودار تابع $y = \frac{x^2}{x^2-1}$ را رسم کنید.	۱۳
۱/۵	با استفاده از افرازهای مناسب، مساحت ناحیه تحت $y = x$ و بالای $y = x^2$ و محدود به خطوط $x=1$ و $x=3$ را محاسبه کنید.	۱۴
۱	مقدار متوسط تابع $f(x) = x^2 + x$ در بازه $[1, 3]$ پیدا کنید.	۱۵
۱	انتگرال های معین و نامعین رو به رو را بیابید الف) $\int (e^{2x} + \cos x) dx$ (ب) $\int \frac{dx}{x^2}$	۱۶
۲۰	مجموع نمره	موفق باشید

مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه

رشته: ریاضی فیزیک

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس : حساب دیفرانسیل و انتگرال

تاریخ امتحان: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

پیش دانشگاهی

مرکز سنجش آموزش و پژوهش
http://aee.medu.ir

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۵

نمره

راهنمای تصحیح

ردیف

۱	$(2,5) \cap (\frac{3}{2}, 4) = (2, 4)$ (۰/۰۵) $a = \frac{2+4}{2} = 3$ (۰/۲۵) $r = \frac{4-2}{2} = 1$ (۰/۲۵)	۱
۱		الف) e^x (۰/۰۵) ب) ۳ (۰/۰۵)
۱	$\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5} \right)$ در نتیجه غیر یکتا است. (۰/۰۵) کراندار است (۰/۰۵) همگرا به صفر (۰/۰۵) $\Rightarrow (0/0)$	۳
۱/۰	$a_n = \frac{1}{2n\pi}$ (۰/۰۵) , $b_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ (۰/۰۵) , $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ (۰/۰۵) $f(a_n) = \sin 2n\pi = 0$ (۰/۰۵) , $f(b_n) = \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$ (۰/۰۵) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \xrightarrow{(0/0)}$ حد ندارد	۴
۱/۰	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1+\frac{3}{x})}{2x \sqrt{1+\frac{9}{4x}-\frac{1}{4x^2}}} \xrightarrow{(0/0)} \frac{1}{2}$ (۰/۰۵) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \xrightarrow{(0/0)} \frac{2}{3}$ (۰/۰۵)	۵ الف) ب)
۱	$v'(t) = -500(16-t) \xrightarrow{(0/0)} v'(4) = -4000$ (۰/۰۵) یعنی وقتی که ۴ دقیقه از زمان تخلیه آب منبع گذشته باشد، پس از یک دقیقه دیگر ۶۰۰۰ لیتر دیگر تخلیه می شود. (۰/۰۵)	۶
۱/۰	$y' = \frac{x^2 + 6 - 2x(x)}{(x^2 + 6)^2} \xrightarrow{(0/0)} \frac{-x^2 + 6}{(x^2 + 6)^2}$ (۰/۰۵) $m = f'(2) = \frac{1}{5}$ (۰/۰۵) $y - \frac{2}{1} = \frac{1}{5}(x-2) \xrightarrow{(0/0)} y = \frac{1}{5}x + \frac{8}{5}$ (۰/۰۵)	۷
ادامه در برگه ی دوم		

مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاریخ امتحان: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵		پیش دانشگاهی
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir		دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۵
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف
۱/۵	$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \Rightarrow a + b + c = 1 \quad (0/25)$ $f'(x) = \begin{cases} 2x & x < 1 \\ 2ax + b & x \geq 1 \end{cases} \quad (0/25), f'_+(1) = f'_-(1) \rightarrow 2a + b = 2 \quad (0/25)$ $f''(x) = \begin{cases} 2 & x < 1 \\ 2a & x \geq 1 \end{cases} \quad (0/25), f''_+(1) = f''_-(1) \rightarrow 2a = 6 \quad (0/25)$ $\rightarrow a = 3, b = -2, c = 1 \quad (0/25)$	۸
۱	y' = $-\sin x \times e^{\cos x}$ (الف) $3x^2 + 3y^2 y' - 6y - 6xy' = 0$ (ب) $(0/5)$	۹
۱	$y = 1 \Rightarrow x = 0 \quad (0/25) \quad f'(x) = 6x^2 + 6x + 6 \quad (0/25)$ $f'(0) = 6 \xrightarrow{(0/25)} (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{6} \quad (0/25)$	۱۰
۱/۵	$f'(x) = \sqrt{3} + 2\sin x = 0 \xrightarrow{(0/25)} x = \frac{4\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3} \quad (0/25)$ $f''(x) = 2\cos x \xrightarrow{(0/25)} \begin{cases} f''\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 < 0 \quad (0/25) \\ f''\left(\frac{5\pi}{3}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 > 0 \quad (0/25) \end{cases}$ نقطه $x = \frac{4\pi}{3}$ ماقسیمم موضعی و نقطه $x = \frac{5\pi}{3}$ مینیمم موضعی است. $(0/25)$	۱۱
۱	$v = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \times \frac{dr}{dt} \xrightarrow{(0/25)} 4\pi r^2 \times \frac{dr}{dt} \quad (0/25)$ $r = 6 \Rightarrow v(t) = 4\pi (6)^2 \times t \xrightarrow{(0/25)} 43200\pi \quad (0/25)$	۱۲
۲	$D_f = \mathbb{R} - \{\pm 1\} \quad (0/25)$ $x \rightarrow \pm\infty \quad y = 1 \quad (0/25)$ مجاذب افقی $x = \pm 1 \quad (0/25)$ مجاذب قائم	۱۳

ادامه در برگه سوم

مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاریخ امتحان: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵		پیش دانشگاهی
موکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir		دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۵
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف

		۱۳
	$y' = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2} \quad (0/25)$	(0/5) (0/5)
۱۴	<p>با ذهنی $[0, 2]$ را به n بازه های جزء با طول مساوی تقسیم می کنیم:</p> $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{n} \quad (0/25), \quad x_i = 1 + \frac{2}{n}i \quad (0/25), \quad f(x_i) = \frac{4}{n}i^2 + \frac{4}{n}i + 1 \quad (0/25)$ $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{n}i^2 + \frac{4}{n}i + 1 \right) \stackrel{(0/25)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left(\frac{4}{n} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{4}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} + n \right) \stackrel{(0/25)}{=} \frac{26}{3} \quad (0/25)$	
۱۵	$\bar{f}(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \stackrel{(0/25)}{=} \frac{1}{2-1} \int_1^2 (x^2 + x) dx \stackrel{(0/25)}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big _1^2 \stackrel{(0/25)}{=} 12 \quad (0/25)$	۱۵
۱۶	<p>الف) $\int (e^{rx} + \cos x) dx = \frac{1}{r} e^{rx} + \sin x + C \quad (0/5)$</p> <p>ب) $\int \frac{dx}{x^r} = \int x^{-r} dx = \left(-\frac{1}{r} x^{-r+1} \right) \Big _1^2 \stackrel{(0/25)}{=} \frac{4}{5} \quad (0/25)$</p>	
۲۰	همکاران گرامی، ضمن عرض خسته نباشید، به سایر راه حل های صحیح به تناسب نمره تعلق گیرد. با تشکر	